

FULL TEXT LINKS



Ann Neurol. 2017 Jan;81(1):35-45. doi: 10.1002/ana.24819. Epub 2016 Dec 5.

Human spinal ejaculation generator

Clément Chéhensse ¹, Patricia Facchinetti ¹, Stéphane Bahrami ^{2 3}, Philippe Andrey ^{4 5}, Jean-Marc Soler ⁶, Fabrice Chrétien ^{7 8}, Jacques Bernabé ¹, Pierre Clément ¹, Pierre Denys ^{1 9}, François Giuliano ^{1 9}

Affiliations

PMID: 27917533 DOI: [10.1002/ana.24819](#)

Абстрактный

Цель: у крыс был обнаружен спинальный генератор эякуляции (Spinal Ejaculation Generator, SEG), в котором ключевую роль играют поясничные галанинергические интернейроны (Science 2002;297:1566-1569). Целью исследования было доказать наличие SEG у людей.

Методы: Пространственное распределение галанинергических нейронов было изучено в посмертных сегментах спинного мозга 6 мужчин и сопоставлено с таковым у 6 женщин для выявления полового диморфизма. На основе выявленного сегментарного распределения галанинергических нейронов у 384 пациентов с клинически полной травмой спинного мозга (ТМС) и последующей анэякуляцией была изучена способность к эякуляции при вибрационной стимуляции полового члена (ВСПЧ) при повреждении соответствующих сегментов спинного мозга. Такие пациенты представляют собой уникальную модель для изучения роли определенных сегментов позвоночника в контроле эякуляции.

Результаты: Галанинергические нейроны в основном располагались между сегментами L2 и L5 в медиальной пластинке VII, с максимальной плотностью в сегменте L4. Трехмерная 3D-реконструкция показала, что эти нейроны были сгруппированы в отдельные колонки по обе стороны от центрального канала. Кроме того, плотность галанинергических нейронов в сегментах L3 и L4 у мужчин была выше, чем у женщин, что подтверждает половой диморфизм. В группе пациентов с травмами сегментов L3-L5 единственным независимым фактором, влияющим на неспособность PVS вызвать эякуляцию, было повреждение этих сегментов. Несмотря на то, что клинические наблюдения носят косвенный характер, они хорошо согласуются с нейроанатомическими данными.

Интерпретация: Организация и половой диморфизм спинальных галанинергических нейронов человека схожи с организацией и половым диморфизмом спинальных эякуляторных нейронов крыс. Нейрогистологические данные в сочетании с клиническими результатами подтверждают существование спинальных эякуляторных нейронов у человека в сегментах L3-L5. Такой генератор можно использовать для лечения нейрогенных и ненейрогенных нарушений эякуляции. ANN NEUROL 2017;81:35-45.

© 2016 Американская неврологическая ассоциация.

[Отказ от ответственности PubMed](#)

Related information

[GEO Profiles](#)

[MedGen](#)

[PubChem Compound \(MeSH Keyword\)](#)

LinkOut – дополнительные ресурсы

Полнотекстовые источники

[Ovid Technologies, Inc.](#)

[Wiley](#)

Другие Литературные источники

[используйте Умные цитаты](#)

Медицина

[Медицинская информация MedlinePlus](#)

Исследовательские материалы

[Программа по определению характеристик антител NCI CPTC](#)