




Реклама. ООО «Др. Редди'с Лабораторис», ИНН: 7707321227

ВИДАЛЬ

Справочник
лекарственных средств

Введите название

Расширенный поиск

Новости

Наши услуги

О компании

Видаль БОКС

Парафармацевтика

Ветеринария

Калькуляторы

МКБ-11

Внедрение ИИ

Препараты

Медицинская энциклопедия

Специалистам

Поиск аналогов

[Видаль](#)

[Описания препаратов](#)

[Уголь активированный](#)

Уголь активированный (Activated charcoal)

- 📄 Состав препарата Уголь активированный
- ✅ Применение препарата Уголь активированный



[Поиск аналогов](#)

[Взаимодействие](#)

**Вход для
специалистов**

E-mail учетной записи
Vidal:

Пароль:

Войти

Регистрация

Забыли пароль?

Описание активных компонентов препарата **Уголь активированный** (Activated charcoal)

Приведенная научная информация является обобщающей и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Дата обновления: 2020.12.17

Реклама



СОЦРЕКЛАМА

**Осталась одна
без щенков, с болью
и болезнями.
Помогите!**

→ daylapu-help.ru

[Узнать больше](#)


ПРОСТЫЕ
ФИНАНСЫ



РЕКЛАМА • 16+

На сайте Видаль используются файлы cookie
Продолжая, вы принимаете [пользовательское соглашение](#).

Ok



в Claude без BI
и кода

 finsimple.online

Записаться онлайн

Форма выпуска, упаковка и состав
Фармако-терапевтическая группа
Фармакокинетика
Режим дозирования
Противопоказания к применению
Лекарственное взаимодействие

Клинико-фармакологич. группа
Фармакологическое действие
Показания препарата
Побочное действие
Особые указания
Аналоги препарата

Владелец регистрационного удостоверения:

ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА, ОАО (Россия)

Код АТХ: **A07BA01** (Активированный уголь)

Активное вещество: **уголь активированный** (activated charcoal)

ВР Британская Фармакопея

Лекарственная форма



Уголь активированный

Таблетки 250 мг: 10, 20, 30, 50 или 5000 шт.

РУ: ЛП-№(013502)-(PF-RU) от 10.02.26 - Бессрочно

Предыдущий РУ: Р N001033/01

Форма выпуска, упаковка и состав препарата Уголь активированный

Таблетки	1 таб.
активированный уголь	250 мг

10 шт. - упаковки безъячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки безъячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки безъячейковые контурные (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки безъячейковые контурные (5) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки безъячейковые контурные (500) - коробки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (500) - коробки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: **Энтеросорбент**

Фармако-терапевтическая группа: **Энтеросорбирующее средство**

Фармакологическое действие

Адсорбирующее средство. Оказывает энтеросорбирующее, дезинтоксикационное и противодиарейное действие. Относится к группе поливалентных физико-химических антидотов, обладает большой поверхностной активностью. Адсорбирует яды и токсины из ЖКТ до их всасывания, в т.ч. алкалоиды, гликозиды, барбитураты и другие снотворные и наркотические средства, соли тяжелых металлов, токсины бактериального, растительного, животного происхождения, производные фенола, синильной кислоты, сульфаниламиды, газы. Также адсорбирует избыток некоторых продуктов обмена веществ - билирубина, мочевины, холестерина, эндогенные метаболиты, ответственные за

соли железа, цианиды, метанол, этиленгликоль). Не раздражает слизистую оболочку ЖКТ.

Фармакокинетика

Не всасывается, не расщепляется, выводится полностью через ЖКТ в течение 24 ч.

Показания активных веществ препарата Уголь активированный

Экзогенные и эндогенные интоксикации различного происхождения (в качестве детоксицирующего средства). Пищевые токсикоинфекции, дизентерия, сальмонеллез (при комплексном лечении). Отравления лекарственными препаратами (психотропными, снотворными, наркотическими средствами и др.), алкалоидами, солями тяжелых металлов и другими ядами. Заболевания ЖКТ, сопровождающиеся диспепсией и метеоризмом. Пищевая и лекарственная аллергия. Гипербилирубинемия, гиперазотемия. Для уменьшения газообразования в кишечнике перед УЗИ и рентгенологическим исследованиями. С целью профилактики хронических интоксикаций на вредном производстве.

[Открыть список кодов МКБ](#)

Реклама. ООО «Бионорика», ИНН 7729590470



Режим дозирования

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования.

Внутрь. Режим дозирования индивидуальный, в зависимости от показаний, клинической ситуации и возраста пациента.

Реклама

Побочное действие

Возможно: диспепсия, запор, диарея, окрашивание каловых масс в темный цвет; при длительном применении - гиповитаминозы, нарушение всасывания из ЖКТ питательных веществ.

Противопоказания к применению

Повышенная чувствительность к углю активированному, язвенные поражения ЖКТ (в т.ч. язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный колит), кровотечения из ЖКТ, одновременное назначение антитоксических лекарственных средств, эффект которых развивается после всасывания (в т.ч. метионин), атония кишечника; детский возраст до 3 лет.

Составитель: *Составитель*

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение при беременности и в период грудного вскармливания по назначению врача.

Применение у детей

Противопоказано применение у детей в возрасте до 3 лет.

Особые указания

При лечении интоксикаций необходимо создать избыток активированного угля в желудке (до его промывания), в кишечнике (после промывания желудка). Уменьшение концентрации активированного угля в среде способствует десорбции связанного вещества и его всасыванию (для предупреждения резорбции освободившегося вещества рекомендуется повторное промывание желудка и назначение активированного угля). Наличие пищевых масс в ЖКТ требует введения угля в высоких дозах, так как содержимое ЖКТ сорбируется углем и его активность снижается. Если отравление вызвано веществами, участвующими в enteroгепатической циркуляции (сердечные гликозиды, индометацин, морфин и другие опиаты), необходимо применять активированный уголь в течение нескольких дней.

Лекарственное взаимодействие

Уголь активированный обладает адсорбирующими свойствами и при одновременном приеме с другими лекарственными препаратами способен существенно снижать их абсорбцию из ЖКТ, что приводит к уменьшению эффективности других лекарственных препаратов.

Проверено врачом-экспертом



Толмачева Екатерина Александровна
кандидат медицинских наук, стаж 45 лет

Аналоги препарата

Уголь активированный
(ВИФИТЕХ, Россия)

Уголь активированный
(УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД, Россия)

Уголь активированный
(ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ, Россия)

Уголь активированный
(ПФК ОБНОВЛЕНИЕ, Россия)

Уголь активированный
(ИРБИТСКИЙ ХФЗ, Россия)

Уголь активированный Авексима
(АВЕКСИМА, Россия)

Уголь активированный Медисорб

Уголь активированный-УБФ
(УРАЛБИОФАРМ, Россия)

Экстрасорб®
(АВЕКСИМА, Россия)

Все аналоги (9)

Сохраните у себя



Если вы хотите разместить ссылку на описание этого препарата - используйте данный код

```
<a href="https://www.vidal.ru/drugs/activated_charcoal__19119" target="_blank"><b>Уголь активированный</b>. Описание препарата в справочнике Видаль.</a>
```

Заказать в аптеке Планета Здоровья



Уголь активированный таб 250 мг **от 37 руб.**
20 шт
Фармстандарт-Лексредства ОАО, Россия

Заказать

[Смотреть ещё](#)

Заказать в apteka.ru

apteka.ru

Уголь активированный 250 мг 20 **63.90 руб.**
шт. таблетки
Фармстандарт-Лексредства ОАО

Заказать

[Смотреть ещё](#)

Санкт-Петербург

Реклама. АО "Видаль Рус", ИНН 7728043605



Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов. Информация, содержащаяся на сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-79153 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 15 сентября 2020 года.

[Пользовательское соглашение](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[Политика обработки файлов cookie](#)

Copyright © Справочник Видаль «Лекарственные препараты в России»



[Контакты](#) [Редакция](#) [Карта сайта](#) [Лицензии](#) [Размещение рекламы](#) [Разработка сайта](#)