




Реклама. ООО «Др. Редди'с Лабораторис», ИНН: 7707321227

ВИДАЛЬ

Справочник
лекарственных средств

Введите название

Расширенный поиск

Новости

Наши услуги

О компании

Видаль БОКС

Парафармацевтика

Ветеринария

Калькуляторы

МКБ-11

Внедрение ИИ

Препараты

Медицинская энциклопедия



Специалистам

Поиск аналогов

[Видаль](#)

[Описания препаратов](#)

Мебеверин

Мебеверин (Mebeverine)

- Состав препарата Мебеверин
- Применение препарата Мебеверин



Поиск аналогов

Взаимодействие

Вход для
специалистов

E-mail учетной записи
Vidal:

Пароль:

Войти

Регистрация

Забыли пароль?

⚠ Срок действия регистрационного удостоверения данного продукта истёк 31.12.25

Описание активных компонентов препарата **Мебеверин (Mebeverine)**

Приведенная научная информация является обобщающей и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Дата обновления: 2020.05.08

Реклама

РЕКЛАМА



spb.stel-teh.ru

...




3 610 ₽

Стеллаж
Стандарт ДМ
750кг
(2500x700x300)

На сайте Видаль используются файлы cookie

Продолжая, вы принимаете [пользовательское соглашение](#).

Ok



13 000 ₽

Стеллаж MS Pro
1350/781х606
передвижной
для шин 4 шт

Форма выпуска, упаковка и состав

Фармако-терапевтическая группа

Фармакокинетика

Режим дозирования

Противопоказания к применению

Контакты

Клинико-фармакологич. группа

Фармакологическое действие

Показания препарата

Побочное действие

Особые указания

Аналоги препарата

Владелец регистрационного удостоверения:

БИОКОМ, АО (Россия)



Код АТХ: A03AA04 (Мебеверин)

Активное вещество: мебеверин (mebeverine)

Рес.INN зарегистрированное ВОЗ

Лекарственная форма



Мебеверин

Капсулы с пролонгированным высвобождением 200 мг: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 35, 40, 42, 50, 60, 63 или 90 шт.

РУ: ЛП-006796 от 18.02.21 - Истекло

Форма выпуска, упаковка и состав препарата Мебеверин

Капсулы с пролонгированным высвобождением твердые желатиновые № 1, белого цвета, содержимое капсул - сферические пеллеты белого или почти белого цвета.

	1 капс.
мебеверина гидрохлорид	200 мг

Вспомогательные вещества: сахарные шарики [сахароза - 62.5 - 91.5%, крахмал кукурузный - 8.5 - 37.5%] - 25.875 мг, повидон К30 - 4.125 мг, гипромеллоза - 0.4 мг, этилцеллюлоза - 9.25 мг, макрогол 6000 - 1.775 мг, магния стеарат - 8.575 мг.

Капсулы твердые желатиновые:

корпус: желатин - до 100%, титана диоксид (Е171) - 2%; крышечка: желатин - до 100%, титана диоксид (Е171) - 2%.

7 шт. - блистеры - пачки картонные.
7 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
7 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
7 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.
7 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.
7 шт. - блистеры (6) - пачки картонные.
7 шт. - блистеры (9) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (6) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Миотропный спазмолитик

Фармако-терапевтическая группа: Спазмолитическое средство

Фармакологическое действие

Спазмолитик миотропного действия, оказывает прямое действие на гладкую мускулатуру ЖКТ без влияния на нормальную перистальтику кишечника. Точный механизм действия неизвестен, но множественные механизмы, такие как снижение проницаемости ионных каналов, блокада обратного захвата норадреналина, местное анестезирующее действие, а также изменение абсорбции воды могут вызвать местное действие мебеверина на ЖКТ. Посредством этих механизмов мебеверин проявляет спазмолитическое действие, нормализуя перистальтику кишечника и не вызывая постоянной релаксации гладкомышечных клеток ЖКТ ("гипотонию").

Фармакокинетика

При приеме внутрь быстро и полностью всасывается, подвергается пресистемному гидролизу и не обнаруживается в плазме. Метаболизируется в печени до вератровой кислоты и мебеверинового спирта. Выводится главным образом почками в виде метаболитов, в небольших количествах – желчью (полностью - в течение 24 ч).



Показания активных веществ препарата Мебеверин

Симптоматическое лечение боли, спазмов, дисфункции и дискомфорта в области кишечника, связанных с синдромом раздраженного кишечника (симптомы могут включать боль в области живота, спазмы, ощущение вздутия и метеоризм, изменение частоты стула (диарея, запор или чередование диареи и запоров), изменение консистенции стула).

[Открыть список кодов МКБ](#)

Реклама. ООО «НАОС Восток», ИНН 7720394094



Реклама

Режим дозирования

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования.

Внутрь. Дозу, схему применения и длительность терапии определяют индивидуально, в зависимости от клинической ситуации и применяемой лекарственной формы.

Со стороны кожи подкожных тканей: крапивница (аллергическая сыпь), ангионевротический отек (серьезная аллергическая реакция, которая может включать: затруднение дыхания, отечность лица, шеи, губ, языка, горла), отек лица, экзантема (кожная сыпь).

Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности (анафилактические реакции - серьезные аллергические реакции, которые могут включать затруднение дыхания, учащенный пульс, резкое снижение АД (слабость и головокружение), повышенное потоотделение).

Противопоказания к применению

Повышенная чувствительность к мебеверину; возраст до 18 лет; беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Мебеверин противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

Применение у детей

Противопоказано применение у детей и подростков в возрасте до 18 лет.

Применение у пожилых пациентов

Если пациент старше 50 лет и если симптомы заболевания возникли впервые, перед началом применения мебеверина пациенту следует проконсультироваться с врачом.



Особые указания

Перед началом применения мебеверина пациенту следует проконсультироваться с врачом в следующих случаях: если симптомы заболевания возникли впервые; при непреднамеренной и необъяснимой потере веса; при анемии; при ректальном кровотечении или примеси крови в стуле; при лихорадке; в случае, если в семье пациента был диагностирован рак толстой кишки, целиакия или воспалительные заболевания кишечника; если пациент старше 50 лет и если симптомы заболевания возникли впервые; в случае недавнего применения антибиотиков.

Проверено врачом-экспертом



Юдинцева Мария Сергеевна

кандидат медицинских наук, стаж 40 лет

Адрес производителя

БИОКОМ , АО	Россия	355016, Ставропольский край, г. Ставрополь, Чапаевский пр., д. 54
----------------	--------	---

Аналоги препарата

Дюспаталин®

(ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS, Нидерланды)

Мебеверин Велфарм

(ВЕЛФАРМ, Россия)

Мебеверин солофарм

(ГРОТЕКС, Россия)

Мебеверин-Вертекс
(ВЕРТЕКС, Россия)

Мебеверин-СЗ
(СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА, Россия)

Меберин МЛ
(MICRO LABS, Индия)

Мебеспалин
(АТОЛЛ, Россия)

Мебеспалин ретард
(АТОЛЛ, Россия)

Мебетан
(ФОРП, Россия)



Все аналоги (14)


Сохраните у себя




Если вы хотите разместить ссылку на описание этого препарата - используйте данный код

```
<a href="https://www.vidal.ru/drugs/mebeverine-2" target="_blank">  
<b>Мебеверин</b>. Описание препарата в справочнике Видаль.</a>
```


Реклама. АО "Видаль Рус", ИНН 7728043605



Реклама. ООО «Интегрити»,
ИНН 7714836851



Реклама. ООО «Интегрити»,
ИНН 7714836851



Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов. Информация, содержащаяся на сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-79153 выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 15 сентября 2020 года.



[Пользовательское соглашение](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[Политика обработки файлов cookie](#)

Copyright © Справочник Видаль «Лекарственные препараты в России»



[Контакты](#) [Редакция](#) [Карта сайта](#) [Лицензии](#) [Размещение рекламы](#) [Разработка сайта](#)