



Парлазин Нео –

помогает открыть мир, свободный от симптомов аллергии



Таблетки для взрослых и капли детям



При аллергическом насморке



При кожных проявлениях аллергии

ПАРЛАЗИН НЕО (левоцетиризин)
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ. ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ.

«Фармацевтический завод ЭЛКО» (Беларусь). Рег. №: МЗ РБ ЛП-№001957-ГП-ВУ от 08.10.2024г. и ЛП-№001304-ГП-ВУ от 23.10.2024г. (бессрочно). Имеет медицинские противопоказания и нежелательные эффекты. При беременности проконсультируйтесь с врачом. Реклама.

ViDAL®
БЕЛАРУСЬ

Парлазин, пантопрозол, грипп...

Препараты

Заболевания

Новости

[Видаль-Беларусь](#) > [Описания препаратов](#) > ПАПАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИД

Реклама

**ДИСЛИПИДЕМИЯ. ПРОФИЛАКТИКА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА**
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Алгоритм VIDAL



Показать подразделы

ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА ПАПАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИД (PAPAVERINE HYDROCHLORIDE)

-  Описание препарата Папаверина гидрохлорид
-  Состав препарата Папаверина гидрохлорид
-  Показания препарата Папаверина гидрохлорид
-  Условия хранения препарата Папаверина гидрохлорид
-  Срок годности препарата Папаверина гидрохлорид



Владелец регистрационного удостоверения: [Борисовский завод медицинских препаратов, ОАО \(Республика Беларусь\)](#)

Активное вещество: [папаверин](#)

Код АТХ: Пищеварительный тракт и обмен веществ (A) > [Препараты для лечения функциональных нарушений со стороны ЖКТ \(A03\)](#) > [Препараты, применяемые при нарушениях функции кишечника \(A03A\)](#) > Папаверин и его производные (A03AD) > [Papaverine \(A03AD01\)](#)

Форма выпуска, состав и упаковка

◆ р-р д/инъекций 20 мг/мл: 2 мл амп. 10 шт.

Рег. №: 19/08/273 от 27.07.2016 - Срок действия рег. уд. не ограничен

Раствор для инъекций со слабым желтоватым оттенком, прозрачный.

1 амп. (2 мл)

40 мг

папаверина гидрохлорид

Вспомогательные вещества: DL-метионин, динатрия эдетат, вода д/и.

2 мл - ампулы (10) - коробки картонные.

2 мл - ампулы (10) - вкладыши (1) - пачки картонные.

Описание активных компонентов препарата **ПАПАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИД**.

Приведенная научная информация является обобщающей и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата. Дата обновления: 13.02.2006 г.

Фармакологическое действие

Этот раздел предназначен для специалистов здравоохранения. Редакция сайта не несет ответственности за использование информации пациентом для самолечения.



Фармакокинетика

Этот раздел предназначен для специалистов здравоохранения. Редакция сайта не несет ответственности за использование информации пациентом для самолечения.

Показания к применению

Спазмы гладких мышц органов брюшной полости, бронхов, периферических сосудов, сосудов головного мозга, почек; стенокардия (в составе комбинированной терапии).

Как вспомогательное средство для премедикации.

Режим дозирования

Внутрь - по 40-60 мг 3-5 раз/сут. Ректально - по 20-40 мг 2-3 раза/сут.

При в/м, п/к или в/в введении разовая доза для взрослых составляет 10-20 мг; интервал между введениями - не менее 4 ч. Для пациентов пожилого возраста начальная разовая доза - не более 10 мг. Для детей в возрасте от 1 года до 12 лет максимальная разовая доза составляет 200-300 мкг/кг.

Побочные действия

Возможно: тошнота, запоры, сонливость, повышенная потливость, артериальная гипотензия, повышение активности печеночных трансаминаз.

При быстром в/в введении, а также при применении в высоких дозах: развитие АВ-блокады, нарушений сердечного ритма.

Противопоказания к применению

AV-блокада, глаукома, тяжелая печеночная недостаточность, пожилой возраст (риск развития гипертермии), детский возраст до 6 месяцев, повышенная чувствительность к папаверину.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности и в период лактации (грудного вскармливания) безопасность и эффективность папаверина не установлена.

Применение при нарушениях функции печени

Противопоказан при тяжелой печеночной недостаточности.

Применение у пожилых пациентов

Противопоказан в пожилом возрасте (риск развития гипертермии).

Применение у детей

Противопоказан в детском возрасте до 6 месяцев.

Особые указания

С осторожностью применять при состояниях после черепно-мозговой травмы, при хронической почечной недостаточности, при недостаточности функции надпочечников, гипотиреозе, гиперплазии предстательной железы, наджелудочковой тахикардии, шоковых состояниях.

В/в следует вводить медленно и под контролем врача.

В период лечения следует исключить употребление алкоголя.

Реклама

Лекарственное взаимодействие

При одновременном применении с антихолинергическими средствами возможно усиление антихолинергических эффектов.

Полагают, что при одновременном применении с алпростадилом для интракавернозного введения существует риск развития приапизма.

Имеются сообщения об уменьшении эффективности леводопы при ее одновременном применении.

Уменьшает гипотензивный эффект метилдопы.



Все аналоги

Аналоги препарата

[ПАПАВЕРИН](#) (НИЖФАРМ, АО, Россия)

[ПАПАВЕРИН](#) (FARMAPRIM, SRL, Республика Молдова)

[ПАПАВЕРИН-ДАРНИЦА](#) (ДАРНИЦА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА, ЧАО, Украина)

Другие препараты этого производителя

[ЛАНСАЗОЛ](#) (Борисовский завод медицинских препаратов, ОАО, Республика Беларусь)

[МЕНОВАЗИН](#) (Борисовский завод медицинских препаратов, ОАО, Республика Беларусь)

[ЦИТИКОЛИН](#) (Борисовский завод медицинских препаратов, ОАО, Республика Беларусь)

[ЦЕФОПЕРАЗОН+СУЛЬБАКТАМ](#) (Борисовский завод медицинских препаратов, ОАО, Республика Беларусь)

[ИБУПРОФЕН](#) (Борисовский завод медицинских препаратов, ОАО, Республика Беларусь)

[ИБУПРОФЕН МАХ](#) (Борисовский завод медицинских препаратов, ОАО, Республика Беларусь)

[ДЕТРАВЕН® 1000](#) (Борисовский завод медицинских препаратов, ОАО, Республика Беларусь)

[ГЛИЦИН](#) (Борисовский завод медицинских препаратов, ОАО, Республика Беларусь)

[АМИНОБУТ®](#) (Борисовский завод медицинских препаратов, ОАО, Республика Беларусь)

[ФЕНИБУТ](#) (Борисовский завод медицинских препаратов, ОАО, Республика Беларусь)

