

FULL TEXT LINKS



Comparative Study [Neuron](#). 2004 Sep 16;43(6):897-905. doi: 10.1016/j.neuron.2004.08.042.

Extinction learning in humans: role of the amygdala and vmPFC

Elizabeth A Phelps ¹, Mauricio R Delgado, Katherine I Nearing, Joseph E LeDoux

Affiliations

PMID: 15363399 DOI: [10.1016/j.neuron.2004.08.042](#)

Free article

Абстрактный

Понимание того, как возникают страхи, — важный шаг на пути к применению фундаментальных исследований в лечении расстройств, связанных со страхами. Однако еще более ценным может оказаться понимание того, как ослабевают приобретенные страхи. Мы изучили нейронные механизмы угасания страха у людей. Исследования угасания страха у животных показали, что за этот процесс отвечают две взаимосвязанные области мозга: миндалевидное тело и вентральная медиальная префронтальная кора (vmPFC). В соответствии с результатами исследований на животных, согласно которым миндалевидное тело играет важную роль как в формировании, так и в угасании условного страха, активация миндалевидного тела у испытуемых коррелировала с условной реакцией как при формировании, так и при раннем угасании условного рефлекса. Активация вентромедиальной префронтальной коры (подбородочно-поясной области) в основном была связана с проявлением страха при отсроченном тестировании на угасание условного рефлекса, чего и следовало ожидать, учитывая результаты исследований, демонстрирующих, что эта область критически важна для сохранения угасания условного рефлекса. Эти результаты свидетельствуют о том, что механизмы угасания условного рефлекса могут быть схожи у разных видов.

[Опубликованный Отказ от ответственности](#)

Related information

[Cited in Books](#)

[GEO Profiles](#)

[PubChem Compound \(MeSH Keyword\)](#)

LinkOut – дополнительные ресурсы

Полнотекстовые источники

[Наука Эльзевира](#)