



показали убедительной связи с нарушениями нейроразвития у детей

17.04.2026 / [Новости](#)



БЕРЕМЕННОСТИ НЕ ПОКАЗАЛИ УБЕДИТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ С НАРУШЕНИЯМИ НЕЙРОРАЗВИТИЯ

Перевод: Вирт К. О.

Систематический обзор в *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry* не выявил убедительных данных о том, что приём антипсихотиков во время беременности повышает риск нарушений нейроразвития у детей школьного возраста после учёта смешивающих факторов. При этом в ряде исследований отмечались ранние моторные задержки, которые, по имеющимся данным, не сохранялись в более позднем возрасте.

Вопрос о безопасности антипсихотиков при беременности остаётся клинически сложным. Эти препараты широко применяются, в том числе у женщин репродуктивного возраста, но качественных данных о долгосрочных последствиях внутриутробного воздействия по-прежнему немного. Именно поэтому любые сообщения о возможном влиянии на развитие ребёнка требуют особенно аккуратного чтения: здесь очень трудно отделить действие самого препарата от



исследованиях, где оценивали этот исход, у детей, подвергшихся внутриутробному воздействию антипсихотиков, описывались ранние моторные задержки. Однако эти различия не сохранялись в более позднем детском возрасте. Иначе говоря, если влияние и существует, по имеющимся данным оно выглядит скорее транзиторным, чем стойким.

Нарушения нейроразвития оценивались в 7 исследованиях. В нескорректированных анализах риск у детей из группы воздействия выглядел более высоким. Но после поправки на смешивающие факторы большинство исследований уже не находили статистически значимой связи между внутриутробным воздействием антипсихотиков и нарушениями нейроразвития в школьном возрасте. Именно этот вывод и стал центральным для обзора.

Это особенно важно для практики, потому что именно смешение факторов здесь может радикально искажать картину. У женщин, которым во время беременности назначают антипсихотики, сама клиническая ситуация обычно сложнее, чем в общей популяции. Поэтому простой ответ на вопрос «виноват ли препарат» в таких исследованиях почти никогда не бывает надёжным без тщательной статистической коррекции и продуманного дизайна сравнения.

Почему это важно

Для психиатра этот обзор важен прежде всего тем, что он немного сдвигает разговор от автоматического страха перед препаратом к более трезвой оценке рисков. Доступные данные пока не подтверждают выраженного увеличения риска нарушений нейроразвития у детей школьного возраста после внутриутробного воздействия антипсихотиков, если учитывать смешивающие факторы. Но они также не позволяют объявить вопрос окончательно закрытым: число исследований невелико, группы неоднородны, а продолжительность наблюдения часто ограничена.

Что это меняет



Kaplan CA, Poels E, van den Heuvel MI, Bijma H, Bergink V, Rommel AS, et al. Systematic Review: Antipsychotic Medication in Pregnancy and Neurodevelopmental Outcomes in Children. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*. 2026;65(3):354-368. doi:10.1016/j.jaac.2025.04.008.

Перевод: Вирт К. О.

« Previous Post: Менее 12% психиатрических рекомендаций опираются на высокий уровень доказательности

Next Post: Психотропные препараты и потеря костной массы у мужчин »