

FULL TEXT LINKS



J Clin Psychol. 2018 Apr;74(4):579-593. doi: 10.1002/jclp.22522. Epub 2017 Sep 12.

Emotion-related impulsivity and rumination predict the perimenstrual severity and trajectory of symptoms in women with a menstrually related mood disorder

Danyelle N Dawson ¹, Tory A Eisenlohr-Moul ¹, Julia L Paulson ¹, Jessica R Peters ², David R Rubinow ¹, Susan S Girdler ¹

Affiliations

PMID: 28898408 PMCID: [PMC5847394](#) DOI: [10.1002/jclp.22522](#)

Абстрактный

Цель: Женщины с расстройствами настроения, связанными с менструальным циклом (РНСМЦ), испытывают клинически значимый дистресс в течение предменструальной недели, который проходит с началом менструации. О психосоциальных механизмах РНСМЦ известно относительно мало. Учитывая основные аффективные и поведенческие симптомы РНСМЦ, дисфункциональные реакции на эмоции (например, трудности с осознанием и регуляцией эмоций, руминация и импульсивное или дезадаптивное поведение в ответ на эмоции) могут быть важными факторами, которые следует изучить в качестве когнитивных и поведенческих механизмов РНСМЦ. Целью настоящего исследования было изучить взаимосвязь различных дисфункциональных реакций на эмоции (измеряемых с помощью шкалы трудностей в регуляции эмоций [DERS] и шкалы руминативных реакций [Ruminative Responses Scale, RRS]) с тяжестью и динамикой предменструальных симптомов.

Метод: В общей сложности 54 женщины (средний возраст — 38,11 года; 65 % европеоидной расы) с подтвержденным диагнозом МРМС прошли опросники DERS и RRS и предоставили ежедневные отчеты о симптомах за 2–4 менструальных цикла.

Результаты: Только подшкала импульсивности, связанная с эмоциями, в опроснике DERS достоверно коррелировала с тяжестью предменструальных симптомов. Задумчивость и руминация предсказывали более быстрое усиление некоторых симптомов в предменструальный период и более медленное их ослабление после менструации.

Вывод: Как руминация, так и импульсивность, связанная с эмоциями, могут быть важными мишенями для когнитивно-поведенческой терапии, направленной на снижение тяжести и цикличности симптомов при мультисистемных расстройствах.

Ключевые слова: регуляция эмоций; менструальный цикл; предменструальное дисфорическое расстройство; руминация.

© 2017 Wiley Periodicals, Inc.

[Отказ от ответственности в отношении публикаций в PubMed](#)

Цифры




Рисунок 1 Изображение
взаимодействия
между...

Related information

[GEO Profiles](#)

[MedGen](#)

LinkOut – more resources

Full Text Sources

[Europe PubMed Central](#)

[PubMed Central](#)

[Wiley](#)

Other Literature Sources

[scite Smart Citations](#)

Medical

[MedlinePlus Health Information](#)