

Сиенит

Сиенит (от *др.-греч.* Συήνη — Сиена, греческое название древнеегипетского города Сун, ныне *Асуан*) — **магматическая плутоническая горная порода среднего состава**, умереннощелочного ряда щёлочности из семейства сиенитов.

Термин *сиенит* для обозначения горной породы известен со времён **античности**: **Плиний Старший** использовал его для обозначения **гранита** с крупными красными кристаллами **микроклина**, который добывался в окрестностях современного **Асуана**. Тот же термин мог применяться и чёрному **гранодиориту**, так же добывавшемуся в Асуане. **Агрикола** определял сиенит как чёрную породу с красными вкраплениями. В дальнейшем термин стал использоваться для обозначения бедных кварцем гранитов^[1].

Сиенит



 [Медиафайлы на Викискладе](#)

Состав и свойства

Минеральный состав. Калиевый **полевой шпат**, **плагиоклаз**, с примесью цветных минералов: роговой обманки, **биотита**, **пироксена**, изредка **оливина**. В отличие от **гранита** практически не содержит **кварца** (менее 5 %). В зависимости от содержания цветных минералов сиениты называют роговообманковыми, слюдяными, кварцевыми и др. По содержанию щелочей разделяются на низко- и умереннощелочные. В низкощелочных сиенитах **плагиоклазы** представлены **олигоклазом** и **андезином**; в умереннощелочных — присутствуют калиевые **полевые шпаты**, реже — **альбит**.

Средний химический состав. SiO₂ 56—62 %, TiO₂ 0.5—2 %, Al₂O₃ 14—19 %, Fe₂O₃ 1—4 %, FeO 0.5—5 %, MgO 0.2—3 %, CaO 1—5.5 %, Na₂O 4—6.5 %, K₂O 4—9 %.^[2]

Цвет. Светлоокрашенные породы, сероватые и розоватые, в зависимости от цвета калиевого полевого шпата и содержания темноцветных минералов.

Структура. Полнокристаллическая, равномернокристаллическая, иногда **порфировидная**, мелко- и среднезернистая.

Текстура. Массивная.

Удельный вес. 2,6

Форма залегания. [Дайки](#), [штоки](#).

Отдельность. Пластовая или параллелепipedная.

Генезис. [Интрузивная](#) (плутоническая) порода.

Разновидности. При содержании кварца более 5 % порода называется кварцевым сиенитом. Сиениты, содержащие щелочные пироксены и [амфиболы](#), выделяются как щелочные сиениты, а [фельдшпатоиды](#) — как фельдшпатоидные сиениты.

Диагностика. В отличие от гранита «не блестит», так как практически не содержит кварца.

Месторождения

[Украина](#) ([Волынская область](#)), [Кавказ](#), [Урал](#), [Казахстан](#), [Средняя Азия](#), [США](#), [Канада](#), [Германия](#), [Норвегия](#) и др.



Сиенитами сложены знаменитые [Красноярские столбы](#).

Практическое значение. Строительный материал.

История и литература

В своё время интересные описания многообразия горных пород на [Восточном Саяне](#) оставил [князь Кропоткин](#), побывавший в середине XIX века в [Бурятии](#). В частности, он обратил внимание и на сиенит, периодически встречающийся среди обломков камней и пород, образующих окрестные склоны.

"...Так как уже было поздно, а впереди предстояло ещё два трудных переезда через Жемчуг, то я перешёл на правый его берег и еле выбрался среди густого леса, грязи и мшистых кочек к горам правого берега, где встретил обнажения только [еврейского камня](#), простирающиеся на полверсты. [Гнейс](#), о котором я говорю, изрезан весьма частыми жилами [кварца](#) и перемежается с [гранитом](#) и сиенитом, имеющим слоистое строение. В сиените попадает [венис](#).^[3]

— [Пётр Кропоткин](#) «Поездка в Окинский караул» (*глава II*
«Тункинская котловина»)

Примечания

1. *Davis A. Young*. Mind over magma. The story of igneous petrology (англ.). — Princeton university press, 2003. — P. 106. — ISBN 0-691-10279-1.
2. Петрографический кодекс России. — СПб.: ВСЕГЕИ, 2008. — С. 136. — 200 с. — 1 500 экз. — ISBN 978-5-93761-106-2
3. *Пётр Кропоткин*. «Поездка в Окинский караул». — Записки Сибирского отделения Императорского Русского географического об-ва. — 1867 г. — Кн. 9/10

Ссылки

- Сиенит // *Большая советская энциклопедия* : [в 30 т.] / гл. ред. *А. М. Прохоров*. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
 - *Статья* (<http://wiki.web.ru/wiki/Сиенит>) в ГеоВики
- [Сообщить об ошибке](#)

