



SUPER USER

Завершилась международная экспедиция в Северной Атлантике на судне «АтлантНИРО» (/index.php/novosti2/item/835-zavershilas-mezhdunarodnaya-ekspeditsiya-v-severnoj-atlantike-na-sudne-atlantniro)

29 ДЕКАБРЯ 2020 [Архив \(/index.php/novosti2/itemlist/category/23-arkhiv\)](/index.php/novosti2/itemlist/category/23-arkhiv)

Станьте первым комментатором! (/index.php/novosti2/item/835-zavershilas-mezhdunarodnaya-ekspeditsiya-v-severnoj-atlantike-na-sudne-atlantniro#itemCommentsAnchor)

spetsis:
promy:
rybolov:
superu
format



(/index.php/novosti2/item/835-zavershilas-mezhdunarodnaya-ekspeditsiya-v-severnoj-atlantike-na-sudne-atlantniro)

29 декабря 2020 года судно Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») вернулось в порт Калининград, выполнив научно-исследовательские работы в арктических морях. Международная экспедиция стартовала в начале сентября с выходом НИС «АтлантНИРО» из порта Калининград. В дальнейшем с 17 сентября по 13 октября на первом этапе научно-исследовательских работ выполнялась совместная российско-норвежская экосистемная съемка в южной части Баренцева моря от границы зоны Норвегии на западе до Карских ворот на востоке.

Основными задачами комплексных исследований были:

- выполнение траловой съемки донных видов рыб и беспозвоночных;
- проведение тралово-акустической съемки пелагических рыб (мойва, сайка, молодь сельди);
- изучение распределения камчатского краба на акватории исследований;
- изучение условий внешней среды, океанографических характеристик Баренцева моря;
- сбор материалов по зоопланктону, состоянию кормовой базы и питанию рыб.

По результатам донных тралений основу уловов составляли пикша и треска. Суммарная доля камбалы-ерш, морской камбалы и камчатского краба не превышала четверти вылова. Суммарный вылов менее значимых в количественном выражении трех видов зубаток, окуня-клювача, золотистого окуня, черного палтуса и сайды составил менее 5 %.



(https://atlant-ni-ro.ru/images/asset-gallery/70/original/5.jpg)



(https://atlant-ni-ro.ru/images/asset-gallery/70/original/4.jpg)



(https://atlant-ni-ro.ru/images/asset-gallery/70/original/3.jpg)

м. Основу уловов составили особи длиной 31-43 см. треска отмечалась практически на всей акватории съемки. в уловах была представлена треска длиной 11-130 см, средняя длина составляла 55,5 см. Камбала-ерш встречалась во всех донных тралениях. Размерный состав был представлен особями длиной от 5 до 52 см, средняя длина равнялась 19,8 см. Морская камбала отмечалась в южной и юго-восточной части акватории съемки, преимущественно на глубинах 30-100 м. Встречалась рыба длиной от 15 до 68 см, средняя длина – 30,4 см, преобладали особи длиной 19-40 см.

Наиболее значимые уловы камчатского краба получены к северу и северо-западу от полуострова Канин на глубинах от 55 до 130 м. Ширина карапакса изменялась от 9 до 22 см, в среднем – 14,7 см.

Результаты тралово-акустической съемки пелагических рыб (мойва, сайка, молодь сельди), пройденной с гидроакустическим зондированием, находятся в стадии обработки.

С 13 по 20 октября НИС «Атлантниро» осуществлял научно-исследовательские работы в открытой части Баренцева моря и смежных с ней участках района архипелага Шпицберген, где вместе с проведением тралово-акустической съемки пелагических рыб и траловой съемки донных рыб в рамках совместной российско-норвежской экосистемной съемки в Баренцевом море выполнял специализированные исследования краба-стригуна опилио и северной креветки. 21-22 октября был выполнен гидрологический разрез Медвежий-Восток.

С 23 октября судно приступило к выполнению стратифицированной траловой съемки на континентальном склоне Норвежского и Гренландского морей с целью сбора материала для оценки величины промыслового и нерестового запасов черного палтуса и пополнения морского окуня. До 25 ноября работы проводились в районе архипелага Шпицберген. С 26 ноября судно перешло в зону Норвегии, где на начальном этапе был выполнен гидрологический разрез Нордкап-Медвежий, а с 28 ноября по 19 декабря продолжалась траловая съемка черного палтуса и морского окуня.

По результатам выполнения экосистемной съемки в открытой части Баренцева моря и специализированных исследований краба-стригуна опилио и северной креветки определено, что на обследованной акватории выделялся локальный участок на севере открытой части Баренцева моря, где отмечались наиболее значимые уловы краба-стригуна опилио.



(https://atlas.vniro.ru/images/ps_imagegallery/708/original/2.jpg)



(https://atlas.vniro.ru/images/ps_imagegallery/708/original/7.jpg)



(https://atlas.vniro.ru/images/ps_imagegallery/708/original/6.jpg)

Основные уловы северной креветки были получены в открытой части Баренцева моря, на южном и северном склоне Центральной возвышенности в диапазоне глубин 250-300 м. На обследованной акватории в районе архипелага Шпицберген уловы креветки были небольшими. В ходе траловой съемки черного палтуса и морского окуня основу уловов составляли черный палтус, треска, окунь-клювач и морской окунь, в прилове преобладали пикша, зубатки, камбала-ерш.


В течение всего периода научно-исследовательских работ, проводившихся около трех месяце, было выполнено более 262 тралений, 181 океанографическая станция и 75 планктонных станций. Промерено около 70 тыс. гидробионтов, подвержено биологическому анализу более 4,6 тыс. экз. рыб, столько же взято возрастных проб.

Полученные данные будут использованы ФГБНУ «ВНИРО» для мониторинга состояния окружающей среды и биоресурсов Баренцева моря и сопредельных вод, для оценки состояния запасов, разработки прогнозов различной заблаговременности и определения объемов вылова гидробионтов в Баренцевом море, в том числе в рамках Рабочих групп ИКЕС. Полученные материалы будут играть значительную роль в рамках российско-норвежского сотрудничества.

Для справки:

2020 год для научно-исследовательских судов «АтлантНИРО» начался с выполнения научно-исследовательской экспедиции в антарктической части Атлантики по оценке ресурсов антарктического криля, которая стартовала в конце 2019 года. Рейс НИС «Атлантида» был приурочен к 200-летию открытия Антарктиды российскими моряками и выполнялся в рамках указания президента Российской Федерации Путина В.В. с целью укрепления позиций России в Антарктиде и защиты интересов Российской Федерации в сохранении и расширении научных исследований, а также промысла криля в зоне Конвенции АНТКОМ.

Завершается 2020 год для «АтлантНИРО» выполнением на НИС «Атлантниро» научных исследований в северном полушарии – в Баренцевом море и прилегающих морях. Программы работ и рейсовые задания масштабных, как по продолжительности, так и по охваченной исследованиями акватории, экспедиций выполнены в полном объеме.



(/images/stories/foto_sobitij/EXP_Barencevo_more_2020/Raioni_rabot_2020.png)

Районы работ научно-исследовательских судов Атлантического филиала
ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») в 2020 году

Таким образом, Атлантический филиал ФГБНУ «ВНИРО» успешно выполнил в 2020 году значимые для Российской Федерации экспедиционные исследования в океанических районах от Арктики до Антарктики, чем в очередной раз подтвердил компетенции специалистов института в планировании, организации и выполнении самых сложных задач, поставленных руководством. Собранные данные по оценке запасов промысловых водных биологических ресурсов, их распределению и биологическим характеристикам, а также параметрам окружающей среды внесут значительный вклад в изучение двух стратегических для Российской Федерации регионов – Арктики и Антарктики.

ПОДРОБНЕЕ ... (/INDEX.PHP/NOVOSTI2/ITEM/835-ZAVERSHILAS-MEZHDUNARODNAYA-EKSPEDITSIYA-V-SEVERNOJ-ATLANTIKE-NA-SUDNE-ATLANTNIRO)

Завершился рейс наблюдателя «АтлантНИРО» в Тихом океане в рамках Комиссии ЮТО (/index.php/novosti2/item/834-zavershilsya-rejs-nablyudatelya-atlantniro-v-tikhom-okeane-v-ramkakh-komissii-yuto)

19 НОЯБРЯ 2020 [Архив \(/index.php/novosti2/itemlist/category/23-arkhiv\)](#)

Станьте первым комментатором! (/index.php/novosti2/item/834-zavershilsya-rejs-nablyudatelya-atlantniro-v-tikhom-okeane-v-ramkakh-komissii-yuto#itemCommentsAnchor)



(/index.php/novosti2/item/834-zavershilsya-rejs-nablyudatelya-atlantniro-v-tikhom-okeane-v-ramkakh-komissii-yuto)

Закончилась работа научного наблюдателя Атлантического филиала «ВНИРО» («АтлантНИРО») на борту судна «Адмирал Шабалин» (ПАО «Мурманский траловый флот»). Работы выполнял старший научный сотрудник отдела научно-промысловой разведки, канд. биол. наук М.М. Дубищук.

Рейс выполнялся с целью информационного обеспечения промысла ставриды (*Trachurus murphyi*) в зоне действия Комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана (Комиссия ЮТО) и повышения его эффективности, выполнения требований и соблюдения мер по сохранению, принятых на 8-ом заседании Комиссии ЮТО в феврале 2020 г., а также выполнения работ по программам сбора научно-промысловых данных в соответствии с принятыми в рамках Комиссии ЮТО стандартами (СММ 02-2020) по сбору и предоставлению данных научными наблюдателями.

Научно-исследовательские работы включали:

rss
(/index.php/novosti2/item/834-zavershilsya-rejs-nablyudatelya-atlantniro-v-tikhom-okeane-v-ramkakh-komissii-yuto#itemCommentsAnchor)
spetsic
promy:
rybolov
superu
format

- определение видового состава и величины промысловых уловов рыб;
- оценку видового состава вылова в промысловом районе;
- изучение размерного состава и биологического состояния промысловых рыб;
- сбор проб для изучения возраста и роста рыб;
- сбор данных по видовому составу прилова;
- сбор данных о работе промыслового флота, анализ промысловой обстановки;
- обобщение и анализ собранных промыслово-биологических данных;
- количественный и видовой учет орнитофауны и морских млекопитающих, а также учет их гибели и травматизма во время проведения промысловых операций;
- фотосъемка промысловых рыб и рыб прилова, орнитофауны, морских млекопитающих, промысловых операций с целью пополнения фотографического банка института.



(https://atlant.uniro.ru/images/cs_imagegallery_705/original/rah-



(https://atlant.uniro.ru/images/cs_imagegallery_705/original/eudno inc



(https://atlant.uniro.ru/images/cs_imagegallery_705/original/berike inc

Перед началом перехода в основной район работ РТМКСм «Адмирал Шабалин» с конца июня до середины июля вел промысел в ИЭЗ Мавритании.


Период работы судна в ИЭЗ Мавритании, охваченный наблюдениями, относился к завершающему этапу сезонной миграции промысловых рыб через район и развитие промысла, в целом, было характерным для последних лет. В первой половине июня обстановка была благоприятной, в основном за счет облова скоплений западноафриканской ставриды. Во второй половине июня наметились признаки ослабления промысловой обстановки. Смещение основной части промысловых скоплений на север, за пределы зоны Мавритании и существенное ухудшение обстановки было отмечено 8-10 июля, во второй половине июля обстановка стала слабой. Окончание миграции западноафриканской ставриды и скумбрии ранее среднемноголетних сроков (16 июля), вероятно, было обусловлено особенностями океанологического режима – интенсивной адвекцией с юга теплых тропических вод.

В дальнейшем РТМКСм «Адмирал Шабалин» вел промысел в южной части Тихого океана. С 15 августа по 19 октября судно проводило поиск и промысел ставриды на акватории между границами зон островов Сан-Амбросио и материковой части Чили (24-30° ю.ш.). Из установленной для России квоты на вылов перуанской ставриды в зоне действия Комиссии ЮТО в 2020 г. для работы РТМКСм «Адмирал Шабалин» было выделено 5245 т.

В течение всего периода работ промысловая обстановка была в целом удовлетворительной, периодически она осложнялась тем, что скопления ставриды смещались в пределы ИЭЗ Чили, это обуславливало необходимость поиска новых участков с промысловыми скоплениями. Наибольшая производительность промысла отмечалась в августе, в сентябре и октябре она постепенно снижалась. В августе и сентябре в основе уловов была ставрида длиной от 18 до 31 см, с модальной группировкой 26-27 см. В октябре в уловах появилась крупная ставрида длиной от 32 до 51 см, с модальной группировкой 39-40 см, которая в небольших количествах встречалась на всех участках работ. Скопления ставриды имели нерестовый характер. Основным видом прилова была восточная скумбрия, доля которой в уловах составляла от 7 до 12%.



(https://atlantnipo.ru/images/ps_imagegallery/706/original/produkc



(https://atlantnipo.ru/images/ps_imagegallery/706/original/skumbria



(https://atlantnipo.ru/images/ps_imagegallery/706/original/ulov.jpg)

В конце рейса в течение 4 суток судно обследовало подводные горы хребта Наска, были обнаружены промысловые скопления южной красноглазки и берикса.

В период работы в южной части Тихого океана РТМКСм «Адмирал Шабалин» было выловлено около 5,7 тыс. т рыбы, в том числе 5,2 тыс. т ставриды. Выделенная для судна квота освоена в полном объеме.

Всего за рейс научным наблюдателем промерено 61848 особей рыб, 7418 экземпляров подвергнуто биологическому анализу, взято на возраст 1375 пар отолитов и плавников различных видов рыб.

Для справки:

Промысловые скопления ставриды в открытом море южной части Тихого океана были выявлены и освоены отечественными учеными и рыбаками, в 80-е годы прошлого столетия здесь был организован крупномасштабный промысел. В 1991 г. промысел прекратился, в начале 2000-х годов он возобновился и приобрел международный характер.

До середины 2000-х годов промысел ставриды в открытом море ЮТО был практически нерегулируемым. Затем в связи с наращиванием численности международного флота (до 30-35 судов разных стран) правительственные и рыбохозяйственные структуры Чили, Австралии, Новой Зеландии и других стран инициировали переговоры по созданию международной региональной организации по рыболовству в южной части Тихого океана (Комиссия ЮТО). В ноябре 2009 г. был принят окончательный текст Конвенции о сохранении и управлении водными биологическими ресурсами в открытых водах ЮТО. 24 августа 2012 г. Конвенция вступила в силу, была учреждена Комиссия по управлению рыболовством в южной части Тихого океана (Комиссия ЮТО).


В 2013 г. впервые в мерах по сохранению и управлению промыслом ставриды Комиссии ЮТО был определен ограничительный вылов ставриды в этом году в объеме 360 тыс. т и распределен между членами организации.

В середине первого десятилетия текущего века появились сведения об ухудшении состояния запаса ставриды, которое до этого было благополучным (результаты тралово-акустической съемки НИС «Атлантида» в 2009 г., расчеты Рабочей группы Научного Комитета Комиссии ЮТО). Сокращение запаса ставриды оказало негативное влияние на промысловую обстановку. Из-за этого, а также в связи с начавшимся регулированием промысла, общий вылов ставриды в открытом море ЮТО, достигший максимума в 2007-2009 гг., в последующем значительно снизился.

В последние годы промысел ставриды в южной части Тихого океана за пределами исключительных экономических зон прибрежных стран вели 5-6 крупнотоннажных траулеров ЕС, КНР, Республики Корея, а также ежегодно (за исключением 2016 г.) одно российское судно. В течение всего современного периода промысла ставриды в южной части Тихого океана, его сопровождение обеспечивали научные наблюдатели «АтлантНИРО».

В марте-июле промысел обычно проходил на акватории к югу от островов Хуан-Фернандес, где он базировался на облове нагульных скоплений ставриды (рисунок). В августе-октябре промысел был приурочен к акватории между зонами островов Сан-Амбросио и Хуан-Фернандес и материковой зоной Чили. Здесь скопления ставриды имели нерестовый характер и обеспечивали более высокую эффективность промысла. В целом промысел ставриды в последние годы характеризовался нестабильностью, что, по-видимому, во многом связано с сокращением запаса ставриды. Вылов ставриды судами экспедиционного лова в 2015-2019 гг. в районе регулирования Комиссии ЮТО находился в пределах 43-87 тыс.т. В 2020 г. суда других стран- участников Комиссии ЮТО в районе не работали, промысел осуществлял только российский траулер.

По данным Научного Комитета Комиссии ЮТО запас ставриды имеет тенденцию к росту, рекомендуемые объемы вылова ежегодно увеличиваются (таблица). При восстановлении запаса ставриды можно рассчитывать на улучшение промысловой обстановки и на увеличение эффективности промысла в районе регулирования. Это обуславливает заинтересованность российских судовладельцев в сохранении и использовании данного ресурса.



(//images/stories/foto_sobitij/YTO_Perebros_dek/akvatoria_eksp_promisla.png)

Акватория экспедиционного промысла ставриды

в районе регулирования Комиссии ЮТО в 2015-2020 гг.

ОДУ ставриды в ЮТО согласно рекомендациям Научного Комитета, возможный вылов, принятый на сессиях Комиссии ЮТО и квоты России, тыс. т:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ОДУ	438,0	440,0	460,0	460,0	493,0	576,0	591,0	680,0	782,0
ВВ	360,0	390,0	410,0	410,0	443,0	517,6	531,1	618,0	
Квота России	-	13,4	15,1	15,1	16,2	18,9	19,4	22,3	

ПОДРОБНЕЕ ... (//INDEX.PHP/NOVOSTI2/ITEM/834-ZAVERSHILSYA-REJS-NABLYUDATELYA-ATLANTNIRO-V-TIKHOM-OKEANE-V-RAMKAKH-KOMISSII-YUTO)

Сотрудники Атлантического филиала «ВНИРО» («АтлантНИРО») проводят мониторинговые работы в Балтийском море, Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах (//index.php/novosti2/item/833-sotrudniki-atlanticheskogo-filiala-vniro-atlantniro-provodyat-monitoringovye-raboty-v-baltijskom-more-kurshskom-i-kaliningradskom-vislinskom-zalivakh)

18 НОЯБРЯ 2020 [Архив](#) (//index.php/novosti2/itemlist/category/23-arkhiv)

Станьте первым комментатором! (//index.php/novosti2/item/833-sotrudniki-atlanticheskogo-filiala-vniro-atlantniro-provodyat-monitoringovye-raboty-v-baltijskom-more-kurshskom-i-kaliningradskom-vislinskom-zalivakh#itemCommentsAnchor)



(//index.php/novosti2/item/833-sotrudniki-atlanticheskogo-filiala-vniro-atlantniro-provodyat-monitoringovye-raboty-v-

baltijskom-more-kurshskom-i-kaliningradskom-vislinskom-zalivakh)

В рамках выполнения разделов государственного задания и плана ресурсных исследований в октябре-ноябре текущего года Атлантическим филиалом ФГБНУ «ВНИРО» были продолжены мониторинговые работы в Балтийском море, Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах.

мг ГР и ГВ различных форм собственности, ведущих добычу пелагических (шпрот (килька), сельдь балтийская (салака)) и донных (треска, речная камбала) видов рыб в юго-восточной части моря (26 подрайон ИКЕС, исключительная экономическая зона и территориальное море России).

На фоне сложившейся эпидемиологической обстановки все мониторинговые работы выполняются с учетом необходимых профилактических мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Характерной чертой гидрологии вод глубоководной части акватории Балтийского моря в четвертом квартале 2020 г. являлись условия гипоксии (концентрация растворенного в воде кислорода менее 2 мл/л). В Борнхольмской котловине в октябре 2020 г. лимитирующие биоту моря значения кислорода наблюдались от 70 м и глубже, в Восточно-Готландском бассейне условия гипоксии были характерны на глубинах от 80 м, при этом глубже 140-150 м фиксировался сероводород. В Гданьской котловине при гипоксии глубже 75-80 м в центральной части в августе, сентябре на горизонтах более 80-90 м наблюдалось расширение «заморной» зоны. Данный факт повлиял на распределение российских судов в четвёртом квартале 2020 г. в пределах 26 подрайона ИКЕС. По данным научного мониторинга промышленного лова донный траловый промысел трески и речной камбалы велся на глубинах не более 60 м в статистических квадратах ИКЕС 3864(G9) и 3965(H0). Район промысла российских рыбоналивных судов (пелагический лов шпрота и балтийской сельди) - акватория с глубинами 40-90 м (квадраты ИКЕС 3864(G9), 3964(G9) и 4065(H0)). Однако горизонт облова в глубоководной части моря не опускался ниже 80 м.



(https://atlantvoire.n/2019/08/21/10544/gallery/3/original/img-



(https://atlantvoire.n/2019/08/21/10544/gallery/3/original/img-



(https://atlantvoire.n/2019/08/21/10544/gallery/3/original/unnamed

На текущий момент основу уловов на пелагическом промысле составляет шпрот. В отличие от аналогичного периода 2019 г., когда в уловах преобладали особи длиной 10,5-12,0 см, в уловах октября-ноября 2020 г. к этой доминирующей группировке (56,4 %) добавилась и молодь шпрота – 8,0-9,0 см (26,6 %), что, вероятнее всего, связано с урожайностью поколения 2020 г. Около 25 % самцов и 10 % самок уже созревают для последующего нереста, что может свидетельствовать о его раннем начале.

Уловы сельди также были достаточно высокими. В широком размерном ряду доминировали особи длиной 16,0-19,0 см (64,3 % численности). Среди обоих полов вида отмечены рыбы с разной степенью созревания половых продуктов. Впервые за последние несколько лет в желудках крупных особей встречался бычок малый.

Основа уловов донного тралового промысла – речная камбала. Биологические характеристики (средняя длина 24,6 см, средняя масса 172 г) практически не отличаются от показателей 2019 г.

Небольшие уловы трески были обусловлены отсутствием достаточных скоплений и рассеянным пространственным распределением вида по районам промысла. В уловах преобладают особи среднего промыслового размера, средняя длина – 40,0 см.

Сетным промыслом облавливались более крупные особи трески и речной камбалы – средние длины 45,4 и 27,6 см соответственно.

Физиологическое состояние донных видов рыб в осенний сезон 2020 г. характеризуется традиционными для этого периода стадиями – восстановительной для трески и созревающей для речной камбалы.



После просмотра возрастных проб результаты работ будут загружены в международную базу ИКЕС и использованы как входные данные для оценочных моделей прогнозирования состояния запасов и их вылова на краткосрочную и среднесрочную перспективу по принятым единицам международного управления, а также для выработки рекомендаций по интенсивности использования запасов, как в целом по морю, так и в ИЭЗ и территориальном море Российской Федерации Балтийского моря.

Также в осенний период 2020 г. были проведены учетные траловые съемки в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах, включающие мальковые пелагические и донные съемки.

В Куршском заливе в период донной съемки уловы на траление изменялись от 22 до 333 кг, традиционно их основу составлял лещ (76 % численности вылова), который доминировал на всей акватории залива.

Индексы биомассы водных биоресурсов соответствовали среднемуголетнему уровню, а для чехони получены максимальные показатели за годы исследований. В отношении судака и окуня пресноводного отмечено доминирование неполовозрелых особей.

Величина уловов в мальковом трале изменялась от 0,05 до 1,7 кг на траление. Учитывалась молодь основных промысловых видов рыб. Размерный состав и средние показатели длины и массы молоди соответствовали среднемуголетнему уровню. Особенности съемки было, во-первых, пространственное распределение окуня пресноводного, сеголетки которого локализовались только на одной станции в южной части водоема, во-вторых, низкие показатели обилия снетка.

В Калининградском (Вислинском) заливе в период донной съемки уловы на траление изменялись от 0,2 до 47 кг, их основу составляли лещ и окунь пресноводный. Индексы биомассы и численности леща (10,7 кг, 20 экз. на траление) были ниже среднемуголетнего уровня, эти показатели у окуня пресноводного превышали средние значения. Размерные характеристики рыб соответствовали величинам последних лет.

Результаты учетных траловых съемок, проведенных в заливах, показали, что состояние большинства промысловых видов рыб в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах находится на удовлетворительном уровне.

ПОДРОБНЕЕ ... (</index.php/novosti2/item/833-sotrudniki-atlanticheskogo-filiala-vniro-atlantniro-provodyat-monitoringovye-raboty-v-baltijskom-more-kurshskom-i-kaliningradskom-vislinskom-zalivakh>)

Специалист АтлантНИРО принял участие в Международной конференции «Современные проблемы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды на пространстве СНГ» (</index.php/novosti2/item/830-zaveduyushchij-laboratoriej-gidrobiologii-atlantniro-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnoj-konferentsii-sovremennye-problemy-gidrometeorologii-i-monitoringa-okruzhayushchej-sredy-na-prostranstve-sng>)

02 НОЯБРЯ 2020 [Архив](#) (</index.php/novosti2/itemlist/category/23-arkhiv>)

Станьте первым комментатором! (</index.php/novosti2/item/830-zaveduyushchij-laboratoriej-gidrobiologii-atlantniro-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnoj-konferentsii-sovremennye-problemy-gidrometeorologii-i-monitoringa-okruzhayushchej-sredy-na-prostranstve-sng#itemCommentsAnchor>)



(/index.php/novosti2/item/830-zaveduyushchij-laboratoriej-gidrobiologii-atlantniro-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnoj-

konferentsii-sovremennye-problemy-gidrometeorologii-i-monitoringa-okruzhayushchej-sredy-na-prostranstve-sng)

С 22 по 24 октября 2020 г. в г. Санкт-Петербурге состоялась Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды на пространстве СНГ». Организаторами конференции выступили Российский государственный гидрометеорологический университет и Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ.

Задачами конференции было обсуждение достижений и перспектив развития фундаментальных и прикладных научных исследований в области гидрометеорологии, мониторинга окружающей среды, океанологии и обеспечения экологической безопасности. Также рассматривались вопросы регулирования в экосфере и проблемы экологического и гидрометеорологического образования в Российской Федерации и странах СНГ. Заявки на участие и материалы докладов подали более 500 участников из 8 стран СНГ.

Торжественное открытие и пленарное заседание проходило в Таврическом дворце, где был заслушан ряд обобщающих докладов, в частности, доклад д.г.н., член-кор. РАН Н.Н. Филатова «Актуальные проблемы системных исследований внутренних водоемов и пути их решения». В последующие дни работа конференции проходила в рамках 6 секций, 2 круглых столов, а также школы молодых ученых «Экогидромет». В том числе секции «Экосистемы в условиях глобальных изменений» и «Гидрология и океанология от Арктики до Антарктики: теория и практика».

Атлантический филиал ФГБНУ «ВНИРО» на конференции представлял заведующий лабораторией гидробиологии, к.б.н. С.В. Александров, который представил на секции «Экосистемы в условиях глобальных изменений» доклад «Экологическое состояние и негативные последствия эвтрофирования в водах юго-восточной Балтики, Вислинском и Куршском заливах». Также на секции был представлен совместный с сотрудником Атлантического отделения Института океанологии РАН доклад о влиянии трофности воды на состояние прибрежной зоны.

Обобщающие и интересные доклады на секции «Экосистемы в условиях глобальных изменений» были представлены сотрудником Тихоокеанского филиала ВНИРО д.б.н. Ю.И. Зуенко «Влияние климатических изменений в дальневосточных морях на морские экосистемы и промысловые ресурсы» и сотрудником ВНИРО к.г.н. К.К. Кивва «Многолетняя изменчивость распределения промысловых скоплений трески в Баренцевом море».

Немаловажной частью конференции была работа Школы молодых ученых «Экогидромет», целью которой было создание площадки для обмена опытом в области решения современных экологических проблем между опытными научными работниками, студентами, аспирантами, молодыми специалистами. В частности, в ее рамках студентами Балтийского федерального университета им. И. Канта и Российского государственного гидрометеорологического университета было представлено 3 совместных с С.В. Александровым доклада, представляющие первый опыт обобщения научных материалов по экологическому состоянию Балтийского моря (калининградский сектор и Финский залив), полученных в рамках совместного участия в экспедициях на НИС «Академик Иоффе» летом 2020 г.

ПОДРОБНЕЕ ... (/INDEX.PHP/NOVOSTI2/ITEM/830-ZAVEDUYUSHCHIJ-LABORATORIEJ-GIDROBIOLOGII-ATLANTNIRO-PRINYAL-UCHASTIE-V-MEZHDUNARODNOJ-KONFERENTSII-SOVREMENNYE-PROBLEMY-GIDROMETEOROLOGII-I-MONITORINGA-OKRUZHAYUSHCHEJ-SREDY-NA-PROSTRANSTVE-SNG)

Совещание рабочей группы АНТКОМ по оценке рыбных запасов (/index.php/novosti2/item/829-soveshchanie-rabochej-gruppy-antkom-po-otsenke-rybnykh-zapasov)

20 ОКТЯБРЯ 2020 [Архив \(/index.php/novosti2/itemlist/category/23-arkhiv\)](#)

Станьте первым комментатором! (/index.php/novosti2/item/829-soveshchanie-rabochej-gruppy-antkom-po-otsenke-rybnykh-zapasov#itemCommentsAnchor)



(/index.php/novosti2/item/829-soveshchanie-rabochej-gruppy-antkom-po-otsenke-rybnykh-zapasov)

В период с 12 по 14 октября 2020 года состоялось совещание рабочей группы АНТКОМ по оценке рыбных запасов (WGFSА), которое проходило в формате видеоконференции на платформе ZOOM под председательством руководителя научного отдела Секретариата АНТКОМ, Кита Рида (Keith Reid) (штаб – квартира АНТКОМ, г. Хобарт, Австралия) и созывающего Собале Сомлаба (Sobahle Somhlaba), Южная Африка. В работе Группы также приняли участие ряд сотрудников Секретариата АНТКОМ. Формат проведения WGFSА предусматривал размещение информации или комментариев на сайте э-группы, созданной для организации межсессионной работы WGFSА.



(/images/stories/foto_sobitij/ANTKOM_10_2020/Wtab_kvartira_ANTKOM.png)


Штаб-квартира АНТКОМ в г. Хобарт, Австралия

В совещании WGFSА приняли участие 74 специалиста из 20 стран-членов АНТКОМ, включая Австралию, Аргентину, Бразилию, Великобританию, Германию, Европейский Союз, Индию, Испанию, Италию, Республику Корею, Китай, Новую Зеландию, Норвегию, Российскую Федерацию, США, Чили, Украину, Уругвай, Францию, Японию. Российскую Федерацию представляла Касаткина С.М., начальник отдела Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО».

Основной целью проведения виртуальной Группы WGFSА являлось обсуждение приоритетных тем управления морскими ресурсами Антарктики. Группа рассмотрела результаты выполненных исследований и новые научные программы в районах промысла клыкача и ледяной рыбы на поисковых промыслах и в районах с недостаточным объемом данных, в том числе, в районах с нулевыми ограничениями на вылов. Объектом наиболее острых дискуссий являлись вопросы эффективности научных программ по исследованию состояния запасов клыкача в районах с недостаточным объемом данных. Позиция российской стороны – необходима стандартизация ресурсных исследований клыкача. Проведение международных многолетних программ требует использования стандартного орудия лова (ярусного порядка) и стандартизированного дизайна учетных съемок, особо остро вопрос стандартизации стоит в отношении ресурсных исследований клыкача в районах Восточной Антарктики (подрайоны 58.4.1 и 58.4.2).

Группа уделила внимание прилову рыб на промыслах клыкача и криля, прежде всего, прилова макруруса на промысле клыкача в регионе моря Росса (подрайоны 88.1 и 88.2), отметив необходимость совершенствования процедур оценки прилова.

Наибольшую дискуссию вызвали вопросы разработки приоритетного подхода к управлению промыслом криля, показав, что ключевые научные вопросы, такие как пространственная и временная изменчивость распределения криля, состояние и динамика популяций хищников, питающихся крилем (морские птицы, пингвины, котики и др.), критерии оценки возможного экосистемного воздействия промысла, по-прежнему, остаются нерешенными. Российской стороной была отмечена необходимость изучения изменчивости распределения криля под влиянием переноса в различных пространственно-временных масштабах, подчеркнув, что полученные оценки переноса криля по данным российских исследований свидетельствуют против гипотезы о возможном влиянии промысла на ресурсы криля и зависимых хищников через их трофические цепи.



(/images/stories/foto_sobitij/ANTKOM_10_2020/Prezentacia.jpg)

Презентация - Предложения Российской Федерации по выполнению исследований клыкача в Восточной Антарктики


Согласно регламенту проведения Рабочих групп АНТКОМ в формате видеоконференции, утвержденного Комиссией АНТКОМ на 2020 год, подготовка и принятие отчета WGFSА с разработкой рекомендаций для Научного Комитета не предусмотрены. Итогом совещания WGFSА-2020 будет являться резюме, подготовленное председателем группы с учетом замечаний участников совещания.

Атлантике на судне «Атлантниро» (/index.php/novosti2/item/828-prodolzhaetsya-mezhhdunarodnaya-ekspeditsiya-v-severnoj-atlantike-na-sudne-atlantniro)

19 ОКТЯБРЯ 2020 [Архив \(/index.php/novosti2/itemlist/category/23-arkhiv\)](#)

Станьте первым комментатором! (/index.php/novosti2/item/828-prodolzhaetsya-mezhhdunarodnaya-ekspeditsiya-v-severnoj-atlantike-na-sudne-atlantniro#itemCommentsAnchor)

spets:
rybolov:
superu
format



(/index.php/novosti2/item/828-prodolzhaetsya-mezhhdunarodnaya-ekspeditsiya-v-severnoj-atlantike-na-sudne-atlantniro)

17 сентября судно Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») приступило к выполнению научно-исследовательских работ в Баренцевом море. Рейс НИС «Атлантниро» выполняется в соответствии с Государственным заданием ФГБНУ «ВНИРО» на 2020 г., Планом ресурсных исследований и государственного мониторинга ВБР на 2020 год, Программой научно-исследовательских работ и календарным планом ФГБНУ «ВНИРО» на 2020 г., Программой совместных российско-норвежских исследований морских живых ресурсов на 2020 г., принятой на 49-й сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству.

Основными задачами рейса являются:

- проведение тралово-акустической съемки пелагических рыб в Баренцевом море;
- выполнение траловой съемки донных рыб;
- выполнение специализированных исследований краба-стригуна опилио;
- стратифицированная траловая съемка черного палтуса и морского окуня на континентальном склоне Норвежского и Гренландского морей, оценка величины промыслового и нерестового запасов черного палтуса и пополнения морского окуня;
- проведение траловой съемки северной креветки;
- изучение распределения камчатского краба на акватории исследований;
- изучение условий внешней среды, океанографических характеристик Баренцева моря и сопредельных вод;
- сбор материалов по зоопланктону, состоянию кормовой базы и питанию рыб;
- проведение ихтиопатологических исследований промысловых гидробионтов;
- исследование загрязнения промысловых гидробионтов и среды их обитания;
- отбор проб для исследований трофических взаимоотношений гидробионтов в системе «хищник-жертва».

Экспедиция включает два этапа работ. В первой части рейса выполняется совместная российско-норвежская экосистемная съемка. Работы проводятся в южной и центральной частях Баренцева моря, в ходе которых проводятся съемки пелагических и донных рыб, а также исследования краба-стригуна опилио и северной креветки. Заключительная часть экспедиции представляет собой траловую съемку черного палтуса и морского окуня на континентальном склоне Норвежского и Гренландского морей.

Исследования выполняются научной группой, состоящей из сотрудников «АтлантНИРО» и «ПИНРО». В течение всего периода научно-исследовательских работ будут проведены обширные исследования на значительной акватории Баренцева моря и прилегающих морей, в том числе планировалось сделать около 150 гидрологических и 80 планктонных станций, выполнить около 250 тралений.

13 октября были завершены научно-исследовательские работы в ИЭЗ Российской Федерации. Судно продолжило совместную российско-норвежскую экосистемную съемку в открытой части Баренцева моря.

В ходе донной траловой съемки в уловах основную долю занимали пикша, треска, камбала-ерш, в прилове встречались камчатский краб, золотистый морской окунь, окунь клювач, сайда, северная креветка, палтус и зубатки.

Результаты выполненных работ будут использованы для мониторинга состояния окружающей среды и биоресурсов Баренцева моря и сопредельных вод. Полученные данные будут использованы ФГБНУ «ВНИРО» для оценки состояния запасов, разработки прогнозов различной заблаговременности и определения объемов вылова гидробионтов в Баренцевом море, в том числе в рамках Рабочих групп ИКЕС. Полученные материалы будут играть значительную роль в рамках российско-норвежского сотрудничества.




(/index.php/novosti2/item/827-nauchnye-nablyudateli-atlantniro-zavershili-raboty-v-severnoj-i-tsentralno-vostochnoj-atlantike)




(/index.php/novosti2/item/827-nauchnye-nablyudateli-atlantniro-zavershili-raboty-v-severnoj-i-tsentralno-vostochnoj-atlantike)



(/index.php/novosti2/item/827-nauchnye-nablyudateli-atlantniro-zavershili-raboty-v-severnoj-i-tsentralno-vostochnoj-atlantike)



(/index.php/novosti2/item/827-nauchnye-nablyudateli-atlantniro-zavershili-raboty-v-severnoj-i-tsentralno-vostochnoj-atlantike)



(/index.php/novosti2/item/827-nauchnye-nablyudateli-atlantniro-zavershili-raboty-v-severnoj-i-tsentralno-vostochnoj-atlantike)

ПОДРОБНЕЕ ... (/index.php/novosti2/item/828-prodolzhaetsya-mezhdunarodnaya-ekspeditsiya-v-severnoj-atlantike-na-sudne-atlantniro)

Научные наблюдатели АтлантНИРО завершили работы в Северной и Центрально-Восточной Атлантике (/index.php/novosti2/item/827-nauchnye-nablyudateli-atlantniro-zavershili-raboty-v-severnoj-i-tsentralno-vostochnoj-atlantike)

15 ОКТЯБРЯ 2020 [Архив \(/index.php/novosti2/itemlist/category/23-arkhiv\)](#)

Станьте первым комментатором! (/index.php/novosti2/item/827-nauchnye-nablyudateli-atlantniro-zavershili-raboty-v-severnoj-i-tsentralno-vostochnoj-atlantike#itemCommentsAnchor)

(/index.php/novosti2/item/827-nauchnye-nablyudateli-atlantniro-zavershili-raboty-v-severnoj-i-tsentralno-vostochnoj-atlantike)



(/index.php/novosti2/item/827-nauchnye-nablyudateli-atlantniro-zavershili-raboty-v-severnoj-i-tsentralno-vostochnoj-atlantike)

atlantike)

13 октября состоялось заседание Ученого совета АтлантНИРО, в ходе которого были заслушаны отчеты научных наблюдателей работавших на российских рыбодобывающих судах в море Ирмингера и ИЭЗ Мавритании.

Северная Атлантика

В море Ирмингера в районах регулирования Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике – НЕАФК и Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана – НАФО в июле-сентябре 2020 г. научные наблюдатели выполняли сбор промыслово-биологической информации на российских судах на промысле окуня-клевача. На борту БМРТ «Иосиф Шмелькин» (ООО «Морская звезда») работал Иванов С.В., БМРТ «Алексей Аничкин» (АО «Атлантрыбфлот») – Сыс М.М., ТСМ «Карачарово» (ООО «Морская звезда») – Бандуров А.Г., ТСМ «Останкино» (ООО «Запморфлот») – Шидловский М.А.

Научными наблюдателями решались следующие задачи:

- определение величины промысловых уловов и видового состава рыб;
- изучение размерного состава и биологического состояния окуня-клевача;

- сбор данных о работе промыслового флота, анализ промысловой обстановки;
- обобщение и анализ собранных промыслово-биологических данных.



(https://atlantuniro.ru/images/ps-images/gallery-696/original/doklad4ik



(https://atlantuniro.ru/images/ps-images/gallery-696/original/ibtiofour



(https://atlantuniro.ru/images/ps-images/gallery-696/original/okun-

Также в районе деятельности НАФО научные наблюдатели следили за выполнением требований и соблюдения «Мер по сохранению и принуждению НАФО».

В течение всего хода работ в море Ирмингера научными наблюдателями обработано около 200 тралений, промерено более 62 тыс. рыб, проанализировано около 10 тыс. рыб, собрано около 2,5 тыс. проб для определения возраста окуня-клювача. Ежедневно осуществлялся мониторинг гидрометеорологических параметров в районе промысла.

В период работы научных наблюдателей в июле-августе, как обычно, суда смещались вдоль рыболовной зоны Восточной Гренландии в юго-западном направлении, облавливая скопления пелагического окуня. В районе регулирования НЕАФК (к востоку от 42°з.д.) в августе промысловая обстановка была слабой, уловы ТСМ в основном составляли 10-15 т за судо-сутки лова. По этой причине во второй декаде августа все суда перешли в район регулирования НАФО (западнее 42°з.д.), где скопления окуня были более плотными, что вероятно было обусловлено активным прохождением процесса спаривания. Уловы ТСМ возросли до уровня 20-25 т, БМРТИБ – 25-35 т за судо-сутки лова, промысловая обстановка до середины сентября оставалась благоприятной. Основу уловов составлял окунь длиной 28-41 см, с модальным классом длины 35 см, средней массой около 500 г. Распределение скоплений, размерный состав и биологическое состояние окуня были сходными с таковыми в аналогичный период прошлого года, однако уловы в 2019 г. были выше – у ТСМ 25-35 т, БМРТИБ 35-40 т за судо-сутки лова.

В середине сентября процесс спаривания окуня стал близок к завершению, промысловая обстановка в районе регулирования НАФО ухудшилась. Для продолжения промысла суда вернулись на близлежащую акваторию района регулирования НЕАФК, где обнаружили плотное скопление окуня, уловы возросли.

В целом сезон промысла 2020 г. можно оценить как менее успешный, чем в 2017-2019 гг. Средняя производительность российских ТСМ на промысле окуня-клювача в апреле-августе 2020 г. составила 20,0 т за судо-сутки лова. Этот же показатель за аналогичный период 2019 г. равнялся 23,8 т за судо-сутки лова.

Центрально-Восточная Атлантика

В ИЗЗ Мавритании рейс научных наблюдателей Линникова Р.А. и Фоминых Е.С. проходил на борту промыслового судна РТМКСм «Капитан Богомоллов» компании АО «Эридан».

В период рейса выполнялся сбор данных по величине уловов, видовому составу, размерно-весовой структуре, биологическим характеристикам и среде обитания облавливаемых биоресурсов в целях получения научных материалов для прогноза общих допустимых уловов (ОДУ) и объемов возможного вылова водных биологических ресурсов на 2022 г., разработки научно обоснованных рекомендаций по регулированию и развитию российского рыболовства осуществляемого в океанических районах, защиты интересов российского рыболовства в рамках международного сотрудничества Российской Федерации в области рыбного хозяйства, в частности по линии российско-мавританского сотрудничества.

В течение рейса обработаны уловы 35 тралений, промерено более 10 тыс. рыб, проанализировано более 1 тыс. рыб, собрано более 400 проб для определения возраста промысловых рыб. Ежедневно осуществлялся мониторинг гидрометеорологических условий, выполнено более 100 наблюдений за направлением и скоростью ветра, состоянием поверхности моря, температурой заборного воздуха и температурой поверхности океана.



(https://atlantniiro.ru/...original/ulov.jpg)



(https://atlantniiro.ru/...original/rabo4no-



(https://atlantniiro.ru/...original/44enii-

Рейс выполнялся в период сезонного спада промысловой обстановки в ИЭЗ Мавритании, в связи с миграцией основных скоплений западноафриканской ставриды и скумбрии в северном направлении в рыболовную зону Марокко. По результатам наблюдений средняя суточная производительность РТМКСМ в августе текущего года составила около 30 т, что является одним из самых низких показателей с 2004 г.

Повышенный температурный фон, а также напряжённое состояние запасов мелких пелагических рыб в целом, негативно повлияли на развитие промысловой обстановки в конце июля и в августе текущего года.

Промысел развивался на двух основных участках. В конце июля - первой декаде августа основная группа флота работала на севере района от 20°00' с.ш. до границы с рыболовной зоной Марокко. В конце первой - начале второй декады августа несколько траулеров, в том числе суда группы компаний «ФЭСТ» сместилась южнее в центральную часть района, где вели промысел между 17°50' с.ш. и 18°50' с.ш.

Западноафриканская ставрида была основным объектом промысла в центральной части ИЭЗ Мавритании. Преобладала рыба длиной 19-23 см. Африканский каранкс был вторым по численности объектом промысла после западноафриканской ставриды. В уловах преобладали особи длиной 26-31 см. Характерной особенностью промысла в августе текущего года являлось отсутствие промысловых скоплений скумбрии и круглой сардинеллы. Суммарная доля этих объектов в общем вылове за рейс составила менее 3 %.

ПОДРОБНЕЕ ... (/index.php/novosti2/item/827-NAUCHNYE-NABLYUDATELI-ATLANTNIRO-ZAVERSHILI-RABOTY-V-SEVERNOJ-I-TSENTRALNO-VOSTOCHNOJ-ATLANTIKE)

В лаборатории радиоэкологических исследований АтлантНИРО изучен радионуклидный состав донных осадков Балтийского моря (/index.php/novosti2/item/826-v-laboratorii-radioekologicheskikh-issledovanij-atlantniro-izuchen-radionuklidnyj-sostav-donnykh-osadkov-baltijskogo-morya)

14 ОКТЯБРЯ 2020 [Архив \(/index.php/novosti2/itemlist/category/23-arkhiv\)](#)

Станьте первым комментатором! (/index.php/novosti2/item/826-v-laboratorii-radioekologicheskikh-issledovanij-atlantniro-izuchen-radionuklidnyj-sostav-donnykh-osadkov-baltijskogo-morya#itemCommentsAnchor)



(/index.php/novosti2/item/826-v-laboratorii-radioekologicheskikh-issledovanij-atlantniro-izuchen-radionuklidnyj-sostav-

donnykh-osadkov-baltijskogo-morya)

Специалистами лаборатории радиоэкологических исследований закончена обработка проб и получены данные по радионуклидному составу донных осадков Балтийского моря.

(/images/stories/foto_sobitij/Radiology_2020/2.jpg)Пробы были отобраны специалистами АтлантНИРО, которые участвовали в 55-й и 56-й экспедициях в Балтийское море научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.



восточной Балтике и Финском заливе, а также в юго-западной Швеции, Финляндии и Польше. (/index.php)

В пробах донных осадков методом спектрометрического анализа определено содержание природных радионуклидов (радия-226, тория-232, калия-40) и техногенного цезия-137.

Предварительно оценивая результаты исследований можно заключить, что распределение природных радионуклидов в донных отложениях Балтики варьирует в широком диапазоне значений в зависимости от типа грунтов.

Относительно техногенных радионуклидов сравнение разных регионов Балтийского моря показывает, что наибольшее количество цезия-137 сосредоточено в донных осадках Финского залива. (/images/stories/foto_sobitij/Radiology_2020/H7.jpg)

Выявлены зоны с повышенным содержанием цезия-137 и радия-226 в Финском заливе, цезия-137 на глубоководных участках Готландской и Гданьской впадин.

Предыдущее исследование донных осадков подобного масштаба проводилось в 2005 г. по трассе газопровода «Северный поток».

Сравнение данных позволяет отметить почти двукратное снижение максимальных уровней содержания цезия-137 в донных осадках Финского залива и значительное перераспределение изотопа в глубоководных районах собственно Балтики.

Наблюдения за радиационной обстановкой в экосистеме Балтийского моря имеют важное значение для населения всех стран Балтийского региона, что обусловлено наличием большого количества радиационно опасных объектов в водосборном бассейне, последствиями аварии на Чернобыльской АЭС и крайне низкой способностью этого моря к самоочищению.

Попадание радиоактивных веществ в морскую среду может повлиять на возможность устойчивого использования его биоресурсов и нанести вред здоровью человека.

ПОДРОБНЕЕ ... (/index.php/novosti2/item/826-V-LABORATORII-RADIOEKOLOGICHESKIH-ISSLEDOVANIJ-ATLANTNIRO-IZUCHEN-RADIONUKLIDNYJ-SOSTAV-DONNYKH-OSADKOV-BALTIJSKOGO-MORYA)

Специалист АтлантНИРО принял участие в заседании рабочей группы HELCOM PEG-2020 (/index.php/novosti2/item/825-spetsialist-atlantniro-prinyal-uchastie-v-zasedanii-rabochej-gruppy-helcom-peg-2020)

13 ОКТЯБРЯ 2020 Архив (/index.php/novosti2/itemlist/category/23-arkhiv)

Станьте первым комментатором! (/index.php/novosti2/item/825-spetsialist-atlantniro-prinyal-uchastie-v-zasedanii-rabochej-gruppy-helcom-peg-2020#itemCommentsAnchor)



HELCOM

(/index.php/novosti2/item/825-spetsialist-atlantniro-prinyal-uchastie-v-zasedanii-rabochej-gruppy-helcom-peg-2020)

24 сентября 2020 года состоялось заседание рабочей группы ИКЕС (HELCOM PEG-2020) по исследованию фитопланктона Балтийского моря, которое проходило в формате (/images/stories/foto_sobitij/Dmitrieva_helcom_2020/1.jpg) видеоконференции под председательством Иветы Юргенzone (Латвия). В работе группы приняли участие 23 специалиста из 9 прибалтийских стран, а также представитель ИКЕС. Российскую Федерацию представляла О.А. Дмитриева, старший научный сотрудник лаборатории гидробиологии Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»).



Комиссия по защите морской среды Балтийского моря, которая является руководящим органом «Конвенции по защите морской среды Балтийского моря», известна под названием Хельсинская конвенция (ХЕЛКОМ). Основные задачи ХЕЛКОМ – разработка рекомендаций, направленных на поддержание здоровой окружающей среды экосистемы Балтийского моря со сбалансированным функционированием

различных биологических компонентов, приводящих к хорошему экологическому статусу и поддержке широкого спектра устойчивой экономической и социальной деятельности стран Балтийского региона.

Сотрудником АтлантНИРО был подготовлен доклад «Использование биологических индикаторов для оценки качества вод Куршского и (/images/stories/foto_sobitij/Dmitrieva_helcom_2020/3.jpg) Вислинского заливов Балтийского моря». Из-за онлайн-формата проведения заседания группы обсуждение запланированной ранее темы: «О региональных подходах к оценке качества морских и прибрежных вод» с представлением расширенных докладов от стран-участников группы HELCOMPEG с приглашением офицера ХЕЛКОМ было решено перенести. Такое обсуждение будет проведено в ходе заседания группы в очном формате в 2021 г.

В рамках Рабочей группы проведено обобщение и анализ национальных материалов по исследованию биологической продуктивности вод Балтийского моря. В ходе встречи обсуждались: вопросы развития руководящих принципов, используемых в национальных программах экологического мониторинга в Балтийском море; подходы к оценке уровня биологического загрязнения экосистемы моря и его заливов с

spetsialist-atlantniro-prinyal-uchastie-v-zasedanii-rabochej-gruppy-helcom-peg-2020




ПОДРОБНЕЕ ... (/INDEX.PHP/NOVOSTI2/ITEM/825-SPETSIALIST-ATLANTNIRO-PRINYAL-UCHASTIE-V-ZASEDANII-RABOCHEJ-GRUPPY-HELCOM-PEG-2020)

Специалисты АтлантНИРО продолжают оперативное научно-информационное обеспечение промысла в Мировом океане (/index.php/novosti2/item/824-operativnoe-nauchno-informatsionnoe-obespechenie-promysla-v-mirovom-okeane)

24 СЕНТЯБРЯ 2020 [Архив \(/index.php/novosti2/itemlist/category/23-arkhiv\)](#)

Станьте первым комментатором! (/index.php/novosti2/item/824-operativnoe-nauchno-informatsionnoe-obespechenie-promysla-v-mirovom-okeane#itemCommentsAnchor)



(/index.php/novosti2/item/824-operativnoe-nauchno-informatsionnoe-obespechenie-promysla-v-mirovom-okeane)

 (/index.php/novosti2/item/824-operativnoe-nauchno-informatsionnoe-obespechenie-promysla-v-mirovom-okeane#itemCommentsAnchor)
RSS
format

Выполнение рыболовным флотом промысловых операций в океанических районах на обширных акваториях, в условиях большой изменчивости в распределении промысловых объектов под воздействием внешних факторов требует постоянного обеспечения персонала судов оперативной научной информацией и краткосрочными рыбопромысловыми прогнозами.

В советский период развития отечественного рыболовства эта задача решалась силами специализированных организаций – управлений промысловой разведки. В условиях рыночной экономики деятельность этих организаций прекратилась, однако вышеуказанные задачи остаются актуальными и являются важной составной частью деятельности рыбохозяйственной науки.

В Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») оперативное научно-информационное обеспечение промысла является одним из основных направлений работы отдела научно-промысловой разведки.

Современный этап рыбохозяйственных исследований характеризуется разнонаправленными тенденциями в получении и обработке научной информации. С одной стороны, в связи с сокращением объема экспедиционных научно-поисковых и научно-исследовательских работ резко сократилось количество прямых наблюдений за условиями среды и распределением промысловых рыб. С другой стороны, большое развитие получили дистанционные методы сбора океанологической информации, системы позиционирования судов, компьютерные способы обработки и анализа данных. Освоение и использование современных средств получения и обработки информации открывает новые возможности в научном обеспечении океанического промысла, позволяет вывести его на качественно новый уровень.

Специалисты отдела научно-промысловой разведки АтлантНИРО стремятся к наиболее полному и вместе с тем целесообразному использованию доступной информации. В настоящее время накапливаются и анализируются следующие основные ее виды:

- оперативные спутниковые океанологические данные из открытых источников сети Интернет;
- сведения международных баз океанологических данных;
- данные о биологии и распределении промысловых объектов, собираемые специалистами АтлантНИРО в ходе научно-исследовательских экспедиций и на промысловых судах;
- данные суточных судовых донесений (ССД), поступающие в рамках отраслевой системы мониторинга;
- сведения о распределении иностранного промысла по данным систем позиционирования судов.


В отделе научно-промысловой разведки создана и успешно применяется «Комплексная система оперативного научно-информационного обеспечения океанического рыболовства на базе современных технологий». Система основана на регулярном приеме и обработке двух видов информации – промыслово-статистической и спутниковой океанологической. Комплексная обработка информации осуществляется с помощью созданных специалистами отдела оригинальных компьютерных программ. В 2014 г. эта научная разработка была удостоена премии Правительства Калининградской области «Эврика» – за достижения в области науки, технологий и инновационной деятельности.

задания ФГБУ «ВНИРО» на выполнение государственных работ, результатами являются.

(/index.php)

- ежемесячные обзоры промысла;
- промысловые атласы-ежегодники;
- рекомендации по использованию промысловых районов.

Важной частью использования системы является подготовка материалов для специалистов рыбодобывающих предприятий и капитанов рыболовных судов. Данные материалы включают оперативные карты распределения океанологических характеристик (рисунки 1 – 3), анализ промысловой деятельности российских судов (рисунок 4), рекомендации по оптимизации промысла. Первоочередное внимание уделяется районам ответственности АтлантНИРО, в частности, для района Центрально-Восточной Атлантики создана программа поддержки принятия решений «Промысловый прогноз ЦВА». В то же время, отдельные элементы системы используются и в других промысловых районах Мирового океана. Так, в атласе «Океанологические карты районов промысла» (рисунок 5) аккумулированы ежедневные океанологические карты за период с 2007 г. по основным промысловым районам российского рыболовства. Использование атласа позволяет анализировать океанологическую и промысловую ситуацию в районах промысла в любые сутки многолетнего ряда.




(/images/stories/foto_sobitij/Gerber_obespe4enie_promisla/ris_1.png)

Рисунок 1 – Температура поверхности океана и позиции российских рыболовных судов
в районе ИЭЗ Мавритании

Работы по обеспечению информацией предприятий рыбной промышленности проводятся в режиме максимальной оперативности. Для более качественного и объективного анализа промысловых ситуаций в отделе научно-промысловой разведки еженедельно проводятся обзоры промысловой обстановки с участием компетентных специалистов других подразделений АтлантНИРО.

В число партнеров АтлантНИРО - потребителей научной продукции входят крупнейшие рыбодобывающие предприятия Калининградской области и других регионов Северо-Запада России. Заинтересованность в получении океанологической информации проявляют и иностранные компании. Появление новых партнеров всегда приветствуется. География районов, по которым ведется мониторинг и информационное обеспечение промысла представлена на рисунке 6.



(/images/stories/foto_sobitij/Gerber_obespe4enie_promisla/ris_2.png)

В настоящее время во многих традиционных районах промысла происходят крупномасштабные гидроклиматические изменения, колебания в состоянии эксплуатируемых запасов рыб. Это усложняет работы по научному обеспечению отечественного промысла, но, с другой стороны, делает их особенно нужными и интересными.






Рисунок 3 – Распределение плотности льда в Антарктической части Тихого океана (район промысла клыкача)




(/images/stories/foto_sobitij/Gerber_obespe4enie_promisla/ris_4.jpg)

Рисунок 4 – Примеры представления промыслово-статистической информации



(/images/stories/foto_sobitij/Gerber_obespe4enie_promisla/ris_5.png)

Рисунок 5 – Атлас «Океанологические карты районов промысла»



[\(/index.php\)](#)

[\(/images/stories/foto_sobitij/Gerber_obespe4enie_promisla/ohvat_rabot.png\)](#)

Рисунок 6 – Основные районы, по которым ведется мониторинг и информационное обеспечение промысла

Обзор подготовил Е.М. Гербер, начальник отдела научно-промысловой разведки Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»).

ПОДРОБНЕЕ ... [\(/INDEX.PHP/NOVOSTI2/ITEM/824-OPERATIVNOE-NAUCHNO-INFORMATSIONNOE-OBESPECHENIE-PROMYSLA-V-MIROVOM-OKEANE\)](#)

В начало [\(/index.php/otdel-spetsissledovaniy/laboratoriya-promyshlennogo-rybolovstva/itemlist/user/221-superuser?utm_source=perplexity&limitstart=0\)](#)

Назад [\(/index.php/otdel-spetsissledovaniy/laboratoriya-promyshlennogo-rybolovstva/itemlist/user/221-superuser?utm_source=perplexity&start=350\)](#)

32

[\(/index.php/otdel-spetsissledovaniy/laboratoriya-promyshlennogo-rybolovstva/itemlist/user/221-superuser?utm_source=perplexity&start=310\)](#) 33 [\(/index.php/otdel-spetsissledovaniy/laboratoriya-promyshlennogo-rybolovstva/itemlist/user/221-superuser?utm_source=perplexity&start=320\)](#) 34 [\(/index.php/otdel-spetsissledovaniy/laboratoriya-promyshlennogo-rybolovstva/itemlist/user/221-superuser?utm_source=perplexity&start=330\)](#) 35 [\(/index.php/otdel-spetsissledovaniy/laboratoriya-promyshlennogo-rybolovstva/itemlist/user/221-superuser?utm_source=perplexity&start=340\)](#) 36 [\(/index.php/otdel-spetsissledovaniy/laboratoriya-promyshlennogo-rybolovstva/itemlist/user/221-superuser?utm_source=perplexity&start=350\)](#) 37 38 [\(/index.php/otdel-spetsissledovaniy/laboratoriya-promyshlennogo-rybolovstva/itemlist/user/221-superuser?utm_source=perplexity&start=370\)](#) 39 [\(/index.php/otdel-spetsissledovaniy/laboratoriya-promyshlennogo-rybolovstva/itemlist/user/221-superuser?utm_source=perplexity&start=380\)](#) 40 [\(/index.php/otdel-spetsissledovaniy/laboratoriya-promyshlennogo-rybolovstva/itemlist/user/221-superuser?utm_source=perplexity&start=390\)](#) 41 [\(/index.php/otdel-spetsissledovaniy/laboratoriya-promyshlennogo-rybolovstva/itemlist/user/221-superuser?utm_source=perplexity&start=400\)](#)

Вперед [\(/index.php/otdel-spetsissledovaniy/laboratoriya-promyshlennogo-rybolovstva/itemlist/user/221-superuser?utm_source=perplexity&start=370\)](#)

В конец [\(/index.php/otdel-spetsissledovaniy/laboratoriya-promyshlennogo-rybolovstva/itemlist/user/221-superuser?utm_source=perplexity&start=1000\)](#)