



Дисплазия тазобедренных суставов (ТБС): симптомы, диагностика, лечение



Дисплазия тазобедренных суставов (ТБС) — это врожденное или приобретенное состояние, при котором нарушается формирование суставных поверхностей тазобедренного сустава. Это приводит к неполной или неправильной фиксации головки бедренной кости в вертлужной впадине. В результате может возникать нестабильность сустава, боли, ограничение движений и в тяжелых случаях — развитие остеоартрита.

Классификация заболевания и стадии развития:

1. **Предвывих** — ранняя стадия заболевания, при которой суставная головка легко смещается из своего нормального положения, но остается в пределах вертлужной впадины;
2. **Подвывих** — вторая стадия, при которой головка бедренной кости частично выходит за пределы вертлужной впадины, что приводит к нарушению стабильности сустава;
3. **Вывих** — последняя стадия дисплазии, при которой головка бедренной кости полностью выходит за пределы вертлужной впадины, нарушая



медицинский центр
БИОМЕХАНИКА

ОНЛАЙН



+7 (423) 20
Народный пр-кт, 11А
Народный пр-кт, 11Б

сустадов и затруднением движений. В этот период очень важно раннее выявление для своевременного начала лечения.

2. **Младенцы и дети до 3 лет:** симптомы могут включать задержку в развитии движений (например, позднее начало ходьбы), перекос таза и хромоту. Суставы могут быть нестабильными, что легко определяется при физическом осмотре.
3. **Дети старшего возраста и подростки:** при отсутствии лечения дисплазия может привести к хронической боли в области тазобедренного сустава, ограничению подвижности и даже к развитию остеоартрита.
4. **Взрослые:** у взрослых дисплазия может быть врожденной, если заболевание не было выявлено и вылечено в детстве, или приобретенной — из-за травм или других причин. Симптомы у взрослых включают боль, ограничение движений, хромоту и постепенное развитие остеоартрита. При запущенных формах сустава может потребоваться операция - замена сустава (эндопротезирование).

Причины возникновения дисплазии ТБС

Основными причинами являются генетическая предрасположенность и механическое воздействие во время внутриутробного развития (например, неправильное положение плода). Также факторами риска являются:

- Первый ребенок, женский пол (у первых детей и девочек дисплазия встречается чаще);
- Наследственность (если у одного из родителей была дисплазия);
- Сдавливание в утробе (многоплодная беременность);
- Тазовое предлежание плода.

Методы диагностики заболевания



медицинский центр
БИОМЕХАНИКА

ОНЛАЙН

ЗАПИСЬ



+7 (423) 20
Народный пр-кт, 11А
Народный пр-кт, 11Б
для детей и взрослых для оценки

формы и положения суставов;

4. **МРТ или КТ** — для детального исследования суставных поверхностей и окружающих тканей в сложных случаях.

Симптомы дисплазии ТБС у детей и взрослых:

- асимметрия кожных складок на бедрах;
- ограничение движений в тазобедренных суставах;
- хромота или позднее начало ходьбы у детей;
- боли в области тазобедренных суставов;
- у взрослых — боли при движении, хромота, ограничение подвижности.

Лечение дисплазии тазобедренных суставов

1. **Врач Травматолог-ортопед** — своевременное обращение к специалисту позволяет избежать тяжелых последствий. Чем раньше выявляется дисплазия, тем выше вероятность успешного консервативного лечения;
2. **Ортопедические изделия** — для новорожденных и младенцев используются специальные устройства, такие как шина Павлика или стремена, которые фиксируют ножки ребенка в правильном положении и способствуют правильному развитию сустава. Взрослым могут быть назначены другие ортезы;
3. **Физиотерапия и лечебная физкультура** — укрепляют мышцы, улучшают кровообращение и подвижность суставов;
4. **Лечебный массаж** — способствует нормализации мышечного тонуса и улучшению кровоснабжения области тазобедренных суставов;
5. **Оперативное лечение** — необходимо в случаях, когда консервативное лечение не дает результата или болезнь диагностируется на поздней стадии. Это может включать открытую репозицию вывиха, остеотомию или эндопротезирование тазобедренного сустава.



медицинский центр
БИОМЕХАНИКА

ОНЛАЙН



+7 (423) 20
Народный пр-кт, 11А
Народный пр-кт, 11Б

- хромота,

ЗАПИСЬ

- хроническая боль в области сустава;
- ограничение подвижности;
- развитие остеоартрита;
- нестабильность сустава, что повышает риск травм.
- оперативное лечение для замены сустава с долгой и сложной реабилитацией.

Родителям, чьи дети имеют диагноз дисплазии тазобедренных суставов, важно немедленно обратиться к детскому ортопеду для начала лечения. Чем раньше начнется терапия, тем выше шансы на полное выздоровление без операции.

Взрослым с врожденной или приобретенной дисплазией также следует обратиться к травматологу-ортопеду для диагностики и подбора адекватного лечения, чтобы избежать осложнений в будущем.

Есть вопросы? Ответим!

Имя

Ваш вопрос

Телефон

Нажимая кнопку "Отправить" вы **соглашаетесь** с **Политикой обработки персональных данных**

☒ **Согласен** получать информационные сообщения и иную рекламную информацию







медицинский центр
БИОМЕХАНИКА

ОНЛАЙН



+7 (423) 20
Народный пр-кт, 11А
Народный пр-кт, 11Б



[Возврат к списку](#)



медицинский центр
БИОМЕХАНИКА

Центр реабилитации. Корпус А. Народный проспект 11А.

Медицинский центр. Корпус Б. Народный проспект 11Б.

ООО "БиоМедЭксперт"

Политика обработки персональных данных

Лицензия Ло41-01023-25/01382399 от 10.09.2024

ИНН 2543183103

ОГРН 1242500006671

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ

Взрослым
Детям
Реабилитация и ЛФК
Врачи
Видео
Пациентам
Отзывы
Цены
Акции
Статьи
Карта сайта

+7 (423) 2000 148



Режим работы:

08.00 - 22.00 будние дни
08.30 - 20.00 суббота
09.00 - 20.00 воскресенье



© 2026 ООО "БиоМедЭксперт"



Услуги
Р

Цены



Задать вопрос



Онлайн запись