

Подпишитесь сейчас. [Этот контент доступен подписчикам](#). У вас уже есть аккаунт? [Войти](#).

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

f X in ✉ 🦋

Овепорекстон, селективный агонист рецепторов орексина 2-го типа для перорального применения, при нарколепсии 1-го типа

Авторы: Ив Dauvilliers, М. Д., Джузеппе Plazzi, д. м. н., Эммануэль Миньо, М. Д., Герт Ян Ламмерс, д. м. н., Рафаэль - дель-Рио Виллегас, доктор медицины, доктор философии , Рамин Хатами, М. Д., Mitsutaka Танигучи, м. д., ⁺¹⁴, и Тина Олсон, доктор философии [Информация об авторе и аффилированных Лицах](#)

Опубликовано 14 мая 2025 г. N Engl J Med 2025;392:1905-1916 DOI: 10.1056/NEJMoa2405847 **TOM 392 HOMEP 19**

Авторские права © 2025

🔖 © 📄 ” CME

☰ ⓘ ↗ 👁 🔗 🖼 📅 ➦

Абстрактный

ПРЕДЫСТОРИЯ

Нарколепсия 1-го типа — это расстройство, сопровождающееся гиперсомнией, вызванное гибелью орексиновых нейронов, что приводит к снижению уровня орексина в мозге.

МЕТОДЫ

В этом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании 2-й фазы участники с нарколепсией 1-го типа получали оверорекстон (ТАК-861), селективный агонист рецепторов орексина 2-го типа, перорально 1 или 2 раза в день или плацебо. Основной конечной точкой было среднее изменение средней продолжительности сна (времени, необходимого для засыпания) по сравнению с исходным уровнем на 8-й неделе по результатам теста на поддержание бодрствования (Maintenance of Wakefulness Test, MWT) (диапазон от 0 до 40 минут; норма ≥ 20 минут). Второстепенные конечные точки включали изменение общего балла по шкале сонливости Эпворта (ESS) по сравнению с исходным уровнем к 8-й неделе (диапазон от 0 до 24; норма ≤ 10), частоту случаев катаплексии в неделю на 8-й неделе и возникновение нежелательных явлений.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Овепорекстон при нарколепсии 1-го типа



РЕЗУЛЬТАТЫ

Создайте учетную запись, чтобы получить бесплатный доступ к контенту только для подписчиков. [Получить бесплатный доступ сейчас](#).

показатель $P \leq 0,001$ для всех сравнений с плацебо). Средние изменения общего балла ESS на 8-й неделе составили -8,9, -13,8, -12,8, -11,3 и -2,5 соответственно (скорректированный $P \leq 0,004$ для всех сравнений с плацебо). Еженедельная частота возникновения катаплексии на 8-й неделе составила 4,24, 3,14, 2,48, 5,89 и 8,76 соответственно (скорректированный $P < 0,05$ для 2 мг два раза в день и 2 мг с последующим введением 5 мг в день по сравнению с плацебо). Наиболее распространенными побочными эффектами, связанными с применением овепоректона, были бессонница (у 48 % участников; в большинстве случаев проблема решалась в течение недели), urgentные позывы к мочеиспусканию (у 33 %) и учащенное мочеиспускание (у 32 %), при этом гепатотоксических эффектов выявлено не было.

ВЫВОДЫ

В ходе второй фазы исследования с участием пациентов с нарколепсией 1-го типа овепорекстон значительно улучшил показатели бодрствования, сонливости и катаплексии за 8 недель. (Исследование финансировалось Центром разработки компании Takeda в Северной и Южной Америке; номер TAK-861-2001 в ClinicalTrials.gov, [NCT05687903](#).)

БЫСТРЫЙ ДУБЛЬ



Пероральный агонист орексиновых рецепторов при нарколепсии 1-го типа

2 минуты 12 секунд

ДОКТОР ГЛАУКОМФЛЕККЕН ОБЪЯСНЯЕТ



Доктор Глаукомфлекскен объясняет: Овипорэкстон при нарколепсии 1-го типа

1 минута 12 секунд

[VIEW FULL TEXT](#)

Continue reading this article

SELECT AN OPTION BELOW:

Create your account for free access to subscriber-only content.

[GET FREE ACCESS NOW](#)

[SUBSCRIBE FOR FULL ACCESS](#)



Already have an account?

[SIGN IN](#)

[Print subscriber?](#)

Создайте учетную запись, чтобы получить бесплатный доступ к контенту только для подписчиков. Получить бесплатный доступ сейчас.



Are you a member of an institution such as a university or hospital?

[Learn more about Institutional Access](#)

NOTES

A [data sharing statement](#) provided by the authors is available with the full text of this article at NEJM.org.

Supported by Takeda Development Center Americas.

[Disclosure forms](#) provided by the authors are available with the full text of this article at NEJM.org.

We thank all the investigators who participated in the TAK-861-2001 trial; Dmitri Volfson, Ph.D., for his contribution to the manuscript; Lindsay Napier, Ph.D., C.M.P.P., and Alison Gagnon, Ph.D., employees of Excel Scientific Solutions, a member of the Envision Pharma Group, for writing assistance with an earlier version of this manuscript; and other employees of Excel Scientific Solutions for editorial assistance with an earlier version of the manuscript.

SUPPLEMENTARY MATERIAL

Protocol (nejmoa2405847_protocol.pdf)

[DOWNLOAD](#)

5.23 MB

Supplementary Appendix (nejmoa2405847_appendix.pdf)

[DOWNLOAD](#)

1.36 MB

Disclosure Forms (nejmoa2405847_disclosures.pdf)

[DOWNLOAD](#)

2.29 MB

Data Sharing Statement (nejmoa2405847_data-sharing.pdf)

[DOWNLOAD](#)

78.81 KB

RELATED ARTICLES

[EDITORIAL](#) | MAY 14, 2025

Targeting Orexin Receptors to Treat Narcolepsy

C.B. Saper



PHYSICIAN JOBS

August 15, 2026

Hematology / Oncology

[Hematologist/Oncologist - Texas Oncology Waco](#)
WACO, TEXAS

Chiefs / Directors / Dept. Heads

[Program Director, Hospice & Palliative Medicine](#)
[Fellowship Program](#)
NEW YORK CITY, NEW YORK

Создайте учетную запись, чтобы получить бесплатный доступ к контенту только для подписчиков. Получить бесплатный доступ сейчас.

Cardiology
Noninvasive Cardiologist
CONNECTICUT

Surgery, Neurological
Neurosurgeon - Connecticut Eastern Shoreline
NORWICH, CONNECTICUT

nejmcareercenter.org

PUBLIC HEALTH ALERTS

New from NEJM Evidence, in collaboration with CIDRAP

Know sooner, act earlier.
Trusted, evidence-based reports
from the frontlines of care.

NEJM
Evidence

FREE TO READ →

MORE ORIGINAL ARTICLES

→

ORIGINAL ARTICLE

AUG 13, 2026

CME

■

Selpercatinib in Early-Stage RET
Fusion–Positive Non–Small-Cell Lung
Cancer

Y.-L. Wu and Others

ORIGINAL ARTICLE

AUG 13, 2026

CME

Phase 3 Trial of Secukinumab in
Polymyalgia Rheumatica

J.H. Stone and Others

ORIGINAL ARTICLE

AUG 13, 2026

■

Talquetamab–Daratumumab in
Relapsed or Refractory Myeloma

R. Mina and Others

[View full text](#)

|

[Download PDF](#)

MORE FROM VOL. 392 NO. 19

→

ORIGINAL ARTICLE

MAY 15, 2025

■

FREE

Second-Line Antiretroviral Therapy for Children Living with HIV in Africa

V. Musiime and Others

ORIGINAL ARTICLE

MAY 15, 2025

CME

■

Создайте учетную запись, чтобы получить бесплатный доступ к контенту только для подписчиков. Получить бесплатный доступ сейчас.

Brief Report: Xenotransplantation of a Porcine Kidney for End-Stage Kidney Disease

T. Kawai and Others

ARTICLE CATEGORIES

- Research
- Reviews
- Clinical Cases
- Perspective
- Commentary
- Other
- Browse all Articles
- Current Issue
- Issue Index

RESOURCES

- Authors & Reviewers
- Submit a Manuscript
- Subscribers
- Institutional Administrators
- Media
- Advertisers
- Agents
- Permissions & Licensing
- Reprints
- NEJM CareerCenter

ABOUT US

- About NEJM
- NEJM Group
- Products & Services
- Editors & Publishers
- Advertising Policies
- Contact Us
- Accessibility
- FAQs
- Help
- Site Feedback

SUBSCRIPTIONS

- Subscribe
- Renew
- Activate Subscription
- Create Account
- Manage Account
- Pay Bill
- Institutional Sales
- Special Content

STAY CONNECTED

- Email Alerts
- Create Account
- Apps
- NEJM CareerCenter
- Podcasts
- RSS Feed
- Remote Access

FOLLOW US

-  Facebook
-  X
-  Instagram
-  Youtube
-  LinkedIn
-  Bluesky
-  TikTok
-  Threads

Создайте учетную запись, чтобы получить бесплатный доступ к контенту только для подписчиков. Получить бесплатный доступ сейчас.

[NEJM Evidence](#)

[NEJM AI](#)

[NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery](#)

[NEJM Voices](#)

Copyright © 2026 [Massachusetts Medical Society](#). All rights reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies. Electronic ISSN 1533-4406. Print ISSN 0028-4793. The content of this site is intended for health care professionals.

[Copyright](#) | [Terms](#) | [Privacy Policy](#) | [Cookie Preferences](#)



Создайте учетную запись, чтобы получить бесплатный доступ к контенту только для подписчиков. Получить бесплатный доступ сейчас.