

КРОТ — НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД

Нередко первое же весеннее посещение приусадебного участка подвергает огородника в панику: участок пестрит кучками выброшенной земли. Виновник этого, скорее всего, крот. Чтобы убедиться в этом, раскопайте несколько кучек, посмотрите, как они сформированы. У крота подземный ход начинается в центре выброса и как бы приплюснут сверху, в отличие от водяной крысы, которая тоже может быть причастна к выбросам почвы. Но ее ходы имеют высокоовальную форму.

Крот европейский — насекомоядное млекопитающее с вытянутой в хоботок передней частью головы. Тело длиной 12–15 см, массой 70–120 г, клинообразное, покрыто коротким бархатисто-черным мехом, позволяющим ему без труда двигаться внутри почвенного слоя. Передние лапы роющего типа, голые, с широко вывернутыми наружу ладонями и длинными плоскими 5-когтевыми пальцами; задние — маленькие, слабые.

У крота плохое зрение (глаза с маковое зернышко, недоразвиты, могут втягиваться), хорошее обоняние и отличный слух. Ведет подземный образ жизни. Очень прожорлив: за сутки (5–6 приемов пищи) съедает до 50–60 г и более корма — практически столько, сколько он весит. Этот стопроцентный хищник растениями не питается. Пожирает дождевых червей, слизней, многоножек, личинок почвообитающих насекомых — хрущей, бронзовок, щелкунов, медведок. Если в ходы кротов попадают мыши, ящерицы, змеи, лягушата, зверьки съедают и их. Крот может оставаться голодным не более 14–15 ч. До наступления сильных холодов делает запасы — «консервирует» дождевых червей, надкусывая их с головы (парализованные черви долго не портятся).

Крот предпочитает селиться на влажных уплотненных задерненных участках, а также в хорошо унавоженной почве, богатой дождевыми

червями и личинками насекомых. Кротовые ходы бывают поверхностными (кормовые) и постоянными. Поверхностные ходы прокладывают на кормовых участках на глубине 3–6 см. Землю здесь кроты не выбрасывают на поверхность, а вдавливают в стенки. Поэтому на поверхности почвы такие ходы малоразличимы, видны лишь еле заметные бугорки. Постоянные предназначены для длительного пользования всем кротовым семейством. Обычно их бывает 7–8 общей протяженностью до 250 м, прорыты они на глубине 14–20 см; стенки хорошо утрамбованные, гладкие. Зверьки расширяют их, обновляют, что можно заметить по свежим кротовинам — лентообразным холмикам свежих выбросов почвы. По цепи этих кротовин можно угадать направление глубинного хода. Более глубокие ходы (до 1 м) кроты делают при построении гнезда (выводковой камеры) под корнями деревьев, кустов или под большими камнями. Ранней весной (апрель–май) самка рождает обычно 4–5 детенышей (иногда до 9), голых и беспомощных, весом всего 2–3 г.



Крот европейский

Кроты активны весь год — днем и ночью, летом и зимой. В спячку не впадают, только под снегом ходы роют глубже. Проспит зверек в гнезде 4–5 ч, а проголодавшись, отправляется за пропитанием. Весной, после схода снега, и осенью, накануне промерзания верхнего почвенного слоя, активность зверька возрастает в несколько раз. Летом крот копает сравнительно мало, уделяя внимание «ремонту» уже прорытых галерей. Живут кроты 3–5 лет.

Кроты в какой-то мере полезны, поскольку потребляют вредных насекомых. Но все же правильнее было бы причислить их к нежелательным



Кротовины на дачном участке

На приусадебном участке

соседям на участке. При прокладке своих многочисленных «галерей» они неизбежно подрывают корни огородных растений, молодых саженцев. Оголенные корни повисают в коридорах кротовых ходов, где становятся доступны для мышевидных грызунов. Из-за высыхания и повреждения грызунами корневой системы, растения часто гибнут. И еще, кроты, поедая огромное количество дождевых червей, улучшающих структуру почвы, тем самым обедняют ее. Многочисленные кротовины, ленточные холмики с выбросами земли сильно портят рельеф наших огородов и лужаек, сенокосов и пастбищ.

Чего только не испробовали земледельцы, чтобы избавиться от нежелательных соседей. Бытует, например, мнение, что кроты обходят стороной места, где растут черные бобы и молочай чиновидный *Euphorbia latyris*. Но ведь этими растениями не засадишь весь участок.

Раскладка селедочных головок или тряпок, пропитанных пахучими веществами из нефтепродуктов, хлорной известью, нафталином, дегтем, в ходах кротов на какое-то время заставляет зверьков покинуть кормовой участок. Но как только почва просохнет, а запах выветрится, зверьки вновь возвратятся. Помещают в кротовые ходы шарики из свежего свиного навоза, измельченные и смешанные с навозом ветки крыжовника, луковицы лука и чеснока.

В литературе встречаются и такие рекомендации – обильно заливать тоннели кротов водой или смесью керосина с водой в соотношении 1:1000. Но в ответ на это кроты быстрее начинают осваивать соседнее пространство. В ответ на введение в ходы выхлопных газов от работающего автомобиля, кроты быстро и плотно закрывают загазованную секцию и также начинают освоение новых территорий.

Для отпугивания кротов устанавливают на участке пропеллеры (вертушки) или флюгеры всевозможных модификаций, различные шумовые и громохочущие устройства. Их раз-

мешают по периметру дачного участка через каждые 15–16 м. Звуки вибрации почвы от вращения вертушек неприятны зверькам, и они покидают этот кормовой участок. Но как только ветер утихает, вертушки не крутятся, кроты спокойно возвращаются на прежнее место.

В ходу и способы физического уничтожения зверьков. Поскольку их передвижение в поверхностных ходах на высокоплодородных, рыхлых почвах бывает заметным, их можно проколоть в земле частыми вилами или лопатой. При высокой плотности заселения, их вредоносность снижают активным отловом, используя кротовловки. Но на хорошо окультуренных обрабатываемых участках делать это неэффективно, так как по рыхлой почве кроты передвигаются медленно и, чувствуя посторонние предметы, легко их обходят.

Для отлова кротов используют ведра и глубокие кастрюли. Их закапывают в месте постоянных ходов так, чтобы верхние кромки были на уровне ходов. Вырытые ямы закрывают фанерой. Кроты в постоянных ходах передвигаются очень быстро и легко попадают во врытые емкости. Иногда за день в одно ведро мо-

жет попасть 3–4 зверька. Но это тоже трудоемкое занятие: нужно найти место с ровным прямым ходом и следить, чтобы в емкость не проникал свет.

Есть и химические средства борьбы. В продажу поступают зооциды, эффективные против кротов, – кротомет, кротовой, пугач и др. Например, препарат кротомет, гранулы, действует как отпугивающее средство на зверьков. Кротам неприятен запах репеллента, и они покидают места обитания. Между двумя выбросами земли (кротовинами) делают вертикальный вырез до глубины хода. В оба конца хода закладывают препарат по 5–7 г (1–2 столовые ложки), слегка смоченный водой. Сверху вырез закрывают дощечкой и присыпают землей. Через 2–3 дня проверяют наличие препарата в норе. Если препарат засыпан землей, нора разрезается в другом месте и операция повторяется.

Ни одно из перечисленных средств нельзя считать универсальным. Но будьте терпеливы, и ваша борьба с кротами увенчается успехом.

А.М. ЛАЗАРЕВ,
старший научный сотрудник ВИЗР

Вопросы и ответы

– На кустах черной смородины цветки из бело-желтых стали фиолетовыми, как бы прозрачными, махровыми; листья узкие, мелкие, с небольшим количеством жилок, из-за чего они кажутся морщинистыми. В чем причина таких изменений?

А.П. АНТОНОВ (Ленинградская область)

– Это типичные симптомы опаснейшего заболевания – махровости, которая в отдельные годы на северо-западе страны «выкашивает» практически все культивируемые сорта черной смородины. Иногда махровость именуют «реверсией»: болезнь не проявляется год-два («маскируется»), а затем снова возвращается (реверсируется). Возбудитель распространяется с посадочным материалом; переносчик микоплазмы – почковый смородинный клещ.

Во время обнаружения и в начале выдвигания цветочных кистей, когда закладываемые почки уже разбухнут и разрыхлятся, но до начала миграции клещей, вздутые почки полезно выщипнуть, собрать и уничтожить. Обрезка растений под корень (под «пенек») до распускания почек может дать положительный эффект против смородинного клеща, но не спасает уже зараженный куст от махровости. Сильно пораженные растения надо выкорчевывать и сжигать. Новые кусты рекомендуют не сажать в ту же яму, а отступать хотя бы на метр либо занимать эту площадь другой культурой.