

绝密 \* 启用前

2019 年全国硕士研究生入学统一考试  
森哥五套卷之数学（三）试卷（模拟二）

考生注意: 本试卷共二十三题, 满分 150 分, 考试时间为 3 小时.

得分	评卷人

一、选择题: 1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一个符合要求, 把所选项前的字母填在题后的括号里.

(1) 设  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+1} - x}{x^{2n} + 1} \sin^2 \frac{1}{x(x-1)}$ , 则 ( ).

- (A)  $x=0$  及  $x=1$  都是  $f(x)$  的第一类间断点  
 (B)  $x=0$  及  $x=1$  都是  $f(x)$  的第二类间断点  
 (C)  $x=0$  是  $f(x)$  的第一类间断点,  $x=1$  是  $f(x)$  的第二类间断点  
 (D)  $x=0$  是  $f(x)$  的第二类间断点,  $x=1$  是  $f(x)$  的第一类间断点

(2) 对于广义积分  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin^p x \cos^q x} (p > 0, q > 0)$ , 下列结论正确的是 ( ).

- (A)  $0 < p < 1, 0 < q < 1$  时收敛. (B)  $0 < p < 1, q \geq 1$  时收敛.  
 (C)  $p \geq 1, 0 < q < 1$  时收敛. (D)  $p \geq 1, q \geq 1$  时收敛.

(3) 设  $f(x, y) = \begin{cases} (x+y) \arctan \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ , 则  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  处 ( ).

- (A) 偏导数  $f'_x(x, y)$  与  $f'_y(x, y)$  均连续  
 (B) 偏导数  $f'_x(x, y)$  与  $f'_y(x, y)$  均不连续但可微  
 (C) 不可微但偏导数  $f'_x(0, 0)$  与  $f'_y(0, 0)$  均存在  
 (D) 连续但偏导数  $f'_x(0, 0)$  与  $f'_y(0, 0)$  均不存在

(4) 已知微分方程  $y'' + ay' + by = xe^{\lambda x}$  的通解形式是  $y = c_1 e^{-x} + c_2 x e^{-x} + (Ax + B) e^{\lambda x}$ , 其中  $c_1, c_2$  是任意常数, 则必有 ( ).

- (A)  $a = 2, b = 1, \lambda = -1$  (B)  $a = 2, b = 1, \lambda \neq -1$   
 (C)  $a = -2, b = 1, \lambda = -1$  (D)  $a = -2, b = 1, \lambda \neq -1$

(5) 已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$  与  $B = \begin{pmatrix} 3 & a & 0 \\ a & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  合同但不相似, 则  $a$  的取值为 ( ).

(A)  $a=3$

(B)  $-9 < a < 0, 0 < a < 9$

(C)  $-3 < a < 0, 0 < a < 3$

(D)  $a=-3$

(6) 已知  $5 \times 4$  矩阵  $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ , 若  $\eta_1 = (2, 1, -2, 1)^T$ ,  $\eta_2 = (0, 1, 0, 1)^T$  是齐次线性方程组  $Ax = 0$  的基础解系, 那么下列命题

①  $\alpha_1, \alpha_3$  线性无关; ②  $\alpha_1$  可由  $\alpha_2, \alpha_3$  线性表示;

③  $\alpha_3, \alpha_4$  线性无关; ④  $r(\alpha_1, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_3 + \alpha_4) = 3$

其中正确的是 ( ).

(A) ①③

(B) ②④

(C) ②③

(D) ①④

(7) 设随机变量  $(X, Y)$  在由  $(0, 0), (0, 1), (1, 1)$  为顶点的三角形区域内服从均匀分布, 则当  $0 < y \leq x$  且  $y \leq 1$  时,  $(X, Y)$  的联合分布函数  $F(x, y) = ( )$ .

(A)  $2xy - x^2$

(B)  $y^2$

(C)  $2x - x^2$

(D) 1

(8) 设  $X \sim N(0, 1)$ ,  $P\{X > U_\alpha\} = \alpha$ ;  $Y \sim \chi^2(1)$ ,  $P\{Y > \chi_\alpha^2(1)\} = \alpha$ ;

$Z \sim t(n)$ ,  $P\{Z > t_\alpha(n)\} = \alpha$ ;  $W \sim F(1, n)$ ,  $P\{W > F_\alpha(1, n)\} = \alpha$ ,

其中  $0 < \alpha < 1$ , 现有如下四个命题:

①  $\chi_\alpha^2(1) = U_{\frac{\alpha}{2}}^2$ ; ②  $F_\alpha(1, n) = t_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ ; ③  $F_\alpha(1, n)F_{1-\alpha}(1, n) = 1$ ; ④  $t_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)F_{1-\alpha}(n, 1) = 1$

其中正确的个数为 ( ).

(A) 0

(A) 1

(C) 2

(D) 3

得分	评卷人

二、填空题: 9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分. 把答案填在题中的横线上.

(9)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt[n]{n}})^{\frac{1}{n}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(10)  $\int_0^2 \sqrt{x^3 - 2x^2 + x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

(11) 设  $e^z = (x^2 - 1)z + x(2 + y) - 1$  确定了  $z = z(x, y)$ , 则  $dz|_{(1,0)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(12) 曲线  $y = \frac{x^2 + 1}{x + 1} e^{\frac{1}{x-1}}$  的斜渐近线是  $\underline{\hspace{2cm}}.$

(13) 设矩阵  $A$  和  $B$  满足  $A^*BA = 2BA - 8E$ , 其中  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $A^*$  是  $A$  的伴随矩阵, 则矩阵

$B =$  \_\_\_\_\_.

(14) 一射手对一目标独立重复地射击 4 次, 若至少命中一次的概率为  $\frac{80}{81}$ , 则他第四次射击恰好是第二次命中的概率为\_\_\_\_\_.

三、解答题:15~23 小题, 共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

得分	评卷人

(15) (本题满分 10 分) 设  $x \rightarrow 0$  时, 函数  $a + bx - (1 + c \tan x)\sqrt{1+x}$  与  $kx^3$  是等价无穷小, 求常数  $a, b, c, k$  的值.

得分	评卷人

( 16 ) ( 本 题 满 分 10 分 ) 求 函 数  $z = f(x, y) = (x^2 + y - 1)e^{-2x-y}$  在 区 域

$D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, 2x + y \leq 4\}$  上的最大值及最小值.

关注微信公众号【考研成长笔记】  
点滴记录，用心成长

得分	评卷人

(17) (本题满分 10 分) 计算  $I = \iint_D xy dx dy$ , 其中  $D$  由直线  $y = 0, y = 2, x = -2$ , 及曲线  $x = -\sqrt{2y - y^2}$  所围成.

得分	评卷人

(18) (本题满分 10 分) 过抛物线  $y = x^2$  上一点  $(a, a^2)$  作切线, 其中  $0 < a < 1$ , 切线与抛物线及  $x$  轴所围图形面积为  $S_1$ , 切线与抛物线及  $y = 1$  所围图形面积为  $S_2$ ,

$S = S_1 + S_2$ , (I) 问  $a$  为何值时,  $S$  最小. (II) 当  $S$  最小时, 求  $S_1$  绕  $x$  轴旋转所得立体体积.

关注微信公众号【考研成长笔记】  
点滴记录, 用心成长

得分	评卷人

(19) (本题满分 10 分) 设  $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ , 证明:

$$(I) \frac{\sin x}{\cos^{\frac{1}{3}} x} > x; \quad (II) \csc^2 x < \frac{1}{x^2} + 1 - \frac{4}{\pi^2}.$$

得分	评卷人

(20)(本题满分 11 分) 设  $A$  是 3 阶方阵, 矩阵  $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ , 其中  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  是

3 维列向量,  $\alpha_1 \neq 0$ , 且满足  $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3)$ , 证明: (I) 齐次

线性方程组  $Bx = 0$  仅有零解; (II) 求  $A$  的特征值及特征向量.

关注微信公众号【考研成长笔记】  
点滴记录, 用心成长



得分	评卷人

(21) (本题满分 11 分) 已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & 0 \\ 0 & a & 6 \end{pmatrix}$  有三个线性无关的特征向量,

(I) 求参数  $a$  ; (II) 求正交变换  $x = Qy$  化二次型  $f(x) = x^T Ax$  为标准形.

得分	评卷人

(22) (本题满分 11 分) 设随机变量  $X$  的概率密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} 6x(1-x), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

在  $X = x$  ( $0 < x < 1$ ) 的条件下,  $Y$  在  $(x, 1)$  上服从均匀分布.

(I) 求随机变量  $(X, Y)$  的联合概率密度函数  $f(x, y)$ ; (II) 求  $P\{X + Y \leq 1\}$ ;

(III) 求  $D(X - Y)$ .

得分	评卷人

(23) (本题满分 11 分) 设总体  $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \theta^2 & 2\theta(1-\theta) & (1-\theta)^2 \end{pmatrix}$ , 其中  $\theta$  ( $0 < \theta < 1$ ) 为

未知参数, 利用总体  $X$  的如下样本值

1, 2, 3, 1, 3

(I) 求  $\theta$  的矩估计值  $\hat{\theta}_M$ ; (II) 求  $\theta$  的最大似然估计值  $\hat{\theta}_L$ ; (III)  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为来自总体  $X$  的简单随机样本,  $N$  表示样本 2 出现的次数, 在  $\theta = \hat{\theta}_L$  时, 求  $E(N)$ .