

绝密 * 启用前

2019 年全国硕士研究生入学统一考试

森哥五套卷之数学(一) 试卷答案解析 (模拟二)

考生注意: 本试卷共二十三题, 满分 150 分, 考试时间为 3 小时.

得分	评卷人

一、选择题: 1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一个符合要求, 把所选项前的字母填在题后的括号里.

(1) 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+1} - x}{x^{2n} + 1} \sin^2 \frac{1}{x(x-1)}$, 则 ().

- (A) $x=0$ 及 $x=1$ 都是 $f(x)$ 的第一类间断点
 (B) $x=0$ 及 $x=1$ 都是 $f(x)$ 的第二类间断点
 (C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点, $x=1$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点
 (D) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点, $x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点

【答案】(C).

【解】 $f(x) = \begin{cases} x \sin^2 \frac{1}{x(x-1)}, & |x| > 1, \\ 0, & x = -1, \\ -x \sin^2 \frac{1}{x(x-1)}, & 0 < |x| < 1, \end{cases}$ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x \sin^2 \frac{1}{x(x-1)}$ 与

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} [-x \sin^2 \frac{1}{x(x-1)}]$ 均不存在, 所以应选答案 (C).

(2) 对于广义积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin^p x \cos^q x} (p > 0, q > 0)$, 下列结论正确的是 ().

- (A) $0 < p < 1, 0 < q < 1$ 时收敛. (B) $0 < p < 1, q \geq 1$ 时收敛.
 (C) $p \geq 1, 0 < q < 1$ 时收敛. (D) $p \geq 1, q \geq 1$ 时收敛.

【答案】(A).

【解】由于 $x=0, \frac{\pi}{2}$ 都是被积函数的瑕点, 因此,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin^p x \cos^q x} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\sin^p x \cos^q x} + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin^p x \cos^q x}$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^p \frac{1}{\sin^p x \cos^q x} = 1$, 而 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{x^p} dx$ 当 $p \geq 1$ 时发散, 当 $0 < p < 1$ 时收敛, 所以 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\sin^p x \cos^q x}$ 当

$0 < p < 1$ 时收敛; 同时由于 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\frac{\pi}{2} - x)^q \frac{1}{\sin^p x \cos^q x} = 1$, 可知 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin^p x \cos^q x}$ 当 $0 < q < 1$ 收敛, $q \geq 1$

发散, 故选择 (A) .

$$(3) \text{ 设 } f(x, y) = \begin{cases} (x+y) \arctan \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}, \text{ 则 } f(x, y) \text{ 在点 } (0, 0) \text{ 处 } ().$$

(A) 偏导数 $f'_x(x, y)$ 与 $f'_y(x, y)$ 均连续

(B) 偏导数 $f'_x(x, y)$ 与 $f'_y(x, y)$ 均不连续但可微

(C) 不可微但偏导数 $f'_x(0, 0)$ 与 $f'_y(0, 0)$ 均存在

(D) 连续但偏导数 $f'_x(0, 0)$ 与 $f'_y(0, 0)$ 均不存在

【答案】(A) .

$$\text{【解】 } f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \arctan \frac{1}{x^2}}{x} = \frac{\pi}{2}, f'_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y \arctan \frac{1}{y^2}}{y} = \frac{\pi}{2},$$

$$\text{由 } f'_x(x, y) = \begin{cases} \arctan \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2x(x+y)}{1 + (x^2 + y^2)^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ \frac{\pi}{2}, & \text{其他.} \end{cases} \quad \text{可知偏导数 } f'_x(x, y) \text{ 在点 } (0, 0) \text{ 处连续, 同理}$$

$f'_y(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处也连续. 答案为 (A) .

(4) 已知 $y = c_1 + c_2 \sin x + xe^{-x}$ (其中 c_1, c_2 为任意常数) 是某二阶微分方程的通解, 则该方程是 ().

(A) $\sin x \cdot y'' + \cos x \cdot y' = [(2-x)\sin x + (x-1)\cos x]e^{-x}$

(B) $\sin x \cdot y'' + \cos x \cdot y' = [(x-2)\sin x + (1-x)\cos x]e^{-x}$

(C) $\cos x \cdot y'' + \sin x \cdot y' = [(2-x)\sin x + (x-1)\cos x]e^{-x}$

(D) $\cos x \cdot y'' + \sin x \cdot y' = [(x-2)\cos x + (1-x)\sin x]e^{-x}$

【答案】(D) .

【解】 $y = \sin x$ 所满足的齐次微分方程为 $\cos x \cdot y'' + \sin x \cdot y' = 0$, 因此答案应该在 (C) 或者 (D) 中

选取, 又函数 $y = xe^{-x}$ 满足方程 (D), 因此答案为 (D) .

(5) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 3 & a & 0 \\ a & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 合同但不相似, 则 a 的取值为 ().

(A) $a=3$

(B) $-9 < a < 0, 0 < a < 9$

(C) $-3 < a < 0, 0 < a < 3$

(D) $a=-3$

【答案】(C).

【解】矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值为 $3, 3, 0$;

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & a & 0 \\ a & 3-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(\lambda^2 - 6\lambda + 9 - a^2),$$

要使矩阵 A, B 合同但是不相似, 则 $\lambda^2 - 6\lambda + 9 - a^2 = 0$ 有两个正根且不都是 3, 则

$$9 - a^2 > 0 \Rightarrow -3 < a < 0, 0 < a < 3.$$

(6) 已知 5×4 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 若 $\eta_1 = (2, 1, -2, 1)^T$, $\eta_2 = (0, 1, 0, 1)^T$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 那么下列命题

① α_1, α_3 线性无关; ② α_1 可由 α_2, α_3 线性表出;

③ α_3, α_4 线性无关; ④ $r(\alpha_1, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_3 + \alpha_4) = 3$

其中正确的是 ().

(A) ①③

(B) ②④

(C) ②③

(D) ①④

【答案】(C).

【解】 $\eta_1 = (2, 1, -2, 1)^T$, $\eta_2 = (0, 1, 0, 1)^T$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系可知 $\begin{cases} 4 - r(A) = 2, \\ \alpha_1 - \alpha_3 = 0, \text{ 所以 } ② \\ \alpha_2 + \alpha_4 = 0. \end{cases}$

③正确, $r(\alpha_1, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_3 + \alpha_4) = r(\alpha_1, -\alpha_2, \alpha_3 + \alpha_4) = r(\alpha_1, -\alpha_2, 0) = 2$.

(7) 设随机变量 (X, Y) 在由 $(0, 0), (0, 1), (1, 1)$ 为顶点的三角形区域内服从均匀分布, 则当 $0 < y \leq x$ 且 $y \leq 1$ 时, (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y) = ()$.

(A) $2xy - x^2$

(B) y^2

(C) $2x - x^2$

(D) 1

【答案】(B).

【解】当 $0 < y \leq x$ 且 $y \leq 1$ 时, $F(x, y) = \int_0^y dv \int_0^v 2du = y^2$, 选 (B).(8) 设 $X \sim N(0, 1)$, $P\{X > U_\alpha\} = \alpha$; $Y \sim \chi^2(1)$, $P\{Y > \chi_\alpha^2(1)\} = \alpha$; $Z \sim t(n)$, $P\{Z > t_\alpha(n)\} = \alpha$; $W \sim F(1, n)$, $P\{W > F_\alpha(1, n)\} = \alpha$,其中 $0 < \alpha < 1$, 现有如下四个命题:① $\chi_\alpha^2(1) = U_{\frac{\alpha}{2}}^2$; ② $F_\alpha(1, n) = t_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$; ③ $F_\alpha(1, n)F_{1-\alpha}(1, n) = 1$; ④ $t_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)F_{1-\alpha}(n, 1) = 1$

其中正确的个数为 ().

(A) 0

(A) 1

(C) 2

(D) 3

【答案】(D).

【解】由于 $X \sim N(0, 1)$, $X^2 \sim \chi^2(1)$, $P\{Y > \chi_\alpha^2(1)\} = \alpha \Rightarrow P\{X^2 > \chi_\alpha^2(1)\} = \alpha$

$$\Rightarrow P\{|X| > \sqrt{\chi_\alpha^2(1)}\} = 2P\{X > \sqrt{\chi_\alpha^2(1)}\} = \alpha \Rightarrow P\{X > \sqrt{\chi_\alpha^2(1)}\} = \frac{\alpha}{2},$$

$$\Rightarrow \sqrt{\chi_\alpha^2(1)} = U_{\frac{\alpha}{2}} \Rightarrow \chi_\alpha^2(1) = U_{\frac{\alpha}{2}}^2, \text{ ①正确;}$$

由于 $Z \sim t(n)$, $Z^2 \sim F(1, n)$, 同理② $F_\alpha(1, n) = t_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 正确;

$$\text{若 } W \sim F(1, n), \text{ 则 } \frac{1}{W} \sim F(n, 1), P\{W > F_\alpha(1, n)\} = \alpha \Rightarrow P\left\{\frac{1}{W} < \frac{1}{F_\alpha(1, n)}\right\} = \alpha,$$

$$\Rightarrow 1 - P\left\{\frac{1}{W} \geq \frac{1}{F_\alpha(1, n)}\right\} = \alpha \Rightarrow P\left\{\frac{1}{W} > \frac{1}{F_\alpha(1, n)}\right\} = 1 - \alpha, \text{ 又 } P\left\{\frac{1}{W} > F_{1-\alpha}(n, 1)\right\} = 1 - \alpha, \text{ 所以}$$

$$F_{1-\alpha}(n, 1) = \frac{1}{F_\alpha(1, n)}; \text{ ①, ②, ④正确. 选 (D).}$$

得分	评卷人

二、填空题: 9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分. 把答案填在题中的横线上.

$$(9) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt[n]{n}}\right)^{\frac{1}{n}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【答案】1.

$$\text{【解】 } 1 < \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt[n]{n}}\right)^{\frac{1}{n}} < n^{\frac{1}{n}},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = 1, \text{ 由夹逼准则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt[n]{n}}\right)^{\frac{1}{n}} = 1.$$

$$(10) \int_0^2 \sqrt{x^3 - 2x^2 + x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$\text{【答案】 } \frac{4}{15}(2 + \sqrt{2}).$$

【解】 $\int_0^2 \sqrt{x^3 - 2x^2 + x} dx = \int_0^2 \sqrt{x} |x-1| dx = \int_0^1 \sqrt{x}(1-x) dx + \int_1^2 \sqrt{x}(x-1) dx = \frac{4}{15}(2 + \sqrt{2})$.

(11) 设 $e^z = (x^2 - 1)z + x(2 + y) - 1$ 确定了 $z = z(x, y)$, 则 $dz|_{(1,0)} =$ _____.

【答案】 $2dx + dy$.

【解】 由题设知 $x=1, y=0$ 时 $z=0$, 等式两边同时求微分可得,

$e^z dz = 2xz dx + (x^2 - 1)dz + (2 + y)dx + xdy$, 把 $x=1, y=0, z=0$ 代入可得

$$dz|_{(1,0)} = 2dx + dy.$$

(12) $I = \oint_{\Gamma} \frac{(x+2)^2 + (y-3)^2 + z^2}{x^2 + y^2 + z^2} ds =$ _____. 其中 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x + y = 0, \end{cases} (a > 0)$.

【答案】 $2\pi a + \frac{26\pi}{a}$.

【解】 利用曲线方程化简, 有 $I = \frac{1}{a^2} \oint_{\Gamma} [(x+2)^2 + (y-3)^2 + z^2] ds$, 由于 Γ 关于 x, y 轮换对称, 则有

$$\oint_{\Gamma} x^2 ds = \oint_{\Gamma} y^2 ds, \quad \oint_{\Gamma} x ds = \oint_{\Gamma} y ds = \frac{1}{2} \oint_{\Gamma} (x + y) ds = 0.$$

$$\text{从而 } I = \frac{1}{a^2} \oint_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y + 13) ds$$

$$= \frac{1}{a^2} \oint_{\Gamma} (a^2 + 13) ds = \frac{a^2 + 13}{a^2} \cdot 2\pi a = 2\pi a + \frac{26\pi}{a}.$$

(13) 设矩阵 A 和 B 满足 $A^*BA = 2BA - 8E$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则矩阵

$B =$ _____.

【答案】 $\begin{pmatrix} 2 & 4 & -6 \\ 0 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

【解】 关系式 $A^*BA = 2BA - 8E$ 两边左乘 A , 右乘 A^{-1} , 得

$$-2B = 2AB - 8E, \text{ 即 } AB + B = 4E$$

$$B = 4(E + A)^{-1} = 4 \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -6 \\ 0 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(14) 一射手对一目标独立重复地射击 4 次, 若至少命中一次的概率为 $\frac{80}{81}$, 则他第四次射击恰好是第二次命中的概率为_____.

【答案】 $\frac{4}{27}$.

【解】 设每次命中目标的概率为 p , 由题意知 $1 - (1 - p)^4 = \frac{80}{81}$, 则 $p = \frac{2}{3}$.

则他第四次射击恰好是第二次命中的概率为 $C_3^1 \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \frac{2}{3} = \frac{4}{27}$.

三、解答题:15~23 小题,共 94 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

得分	评卷人

(15) (本题满分 10 分) 设 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $a+bx-(1+c \tan x)\sqrt{1+x}$ 与 kx^3 是等价无穷小, 求常数 a, b, c, k 的值.

【解法一】由题设有 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a+bx-(1+c \tan x)\sqrt{1+x}}{x^3} = k$, 所以有

$$\lim_{x \rightarrow 0} [a+bx-(1+c \tan x)\sqrt{1+x}] = 0, \text{ 因此有 } a-1=0, a=1, \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} \text{左式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+bx-(1+c \tan x)\sqrt{1+x}}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{b-c\sqrt{1+x} \sec^2 x - \frac{1+c \tan x}{2\sqrt{1+x}}}{3x^2}, \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2b\sqrt{1+x} - 2c(1+x) \sec^2 x - 1 - c \tan x}{6x^2}, \text{ 因此有 } 2b-2c-1=0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{左式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{b}{\sqrt{1+x}} - 4c(1+x) \sec^2 x \tan x - 3c \sec^2 x}{12x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{b - 4c(1+x)^{\frac{3}{2}} \sec^2 x \tan x - 3c\sqrt{1+x} \sec^2 x}{12x\sqrt{1+x}} \end{aligned}$$

由此可得 $b=3c$, 再由 $2b-2c-1=0$ 可得 $b=\frac{3}{4}, c=\frac{1}{4}$ \dots\dots 6 分

$$\begin{aligned} \text{因而有 } k &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{4} - (1+x)^{\frac{3}{2}} \sec^2 x \tan x - \frac{3}{4}\sqrt{1+x} \sec^2 x}{12x\sqrt{1+x}} \\ &= \frac{3}{48} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1+x} \sec^2 x}{x\sqrt{1+x}} - \frac{1}{12} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{3}{2}} \sec^2 x \tan x}{x\sqrt{1+x}} \\ &= \frac{3}{48} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2\sqrt{1+x} \sec^2 x \tan x - \frac{\sec^2 x}{2\sqrt{1+x}}}{1} - \frac{1}{12} = -\frac{11}{96}. \quad \dots\dots 10 \text{ 分} \end{aligned}$$

【解法二】

$$\begin{aligned} &a+bx-(1+c \tan x)\sqrt{1+x} \\ &= a+bx-[1+cx+\frac{cx^3}{3}+o(x^3)][1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\frac{1}{16}x^3+o(x^3)] \\ &= a-1+(b-c-\frac{1}{2})x-(\frac{c}{2}-\frac{1}{8})x^2-(\frac{1}{16}-\frac{c}{8}+\frac{c}{3})x^3+o(x^3), \quad \dots\dots 6 \text{ 分} \end{aligned}$$

$= kx^3 + o(x^3)$, 因此有

$$a-1=0, b-c-\frac{1}{2}=0, \frac{c}{2}-\frac{1}{8}=0, -(\frac{1}{16}-\frac{c}{8}+\frac{c}{3})=k, \text{ 解得}$$

$$a=1, b=\frac{3}{4}, c=\frac{1}{4}, k=-\frac{11}{96}. \quad \dots\dots 10 \text{ 分}$$

得分	评卷人

(16) (本题满分 10 分) 求函数 $z = f(x, y) = (x^2 + y - 1)e^{-2x-y}$ 在区域

$D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, 2x + y \leq 4\}$ 上的最大值及最小值.

【解】令 $\begin{cases} f'_x(x, y) = [2x - 2(x^2 + y - 1)]e^{-2x-y} = 0, \\ f'_y(x, y) = [1 - (x^2 + y - 1)]e^{-2x-y} = 0, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = 1, \\ y = 1. \end{cases}$ 因此函数 $f(x, y)$ 在区域 D 内有唯一的一个驻点, 且有 $z = f(1, 1) = e^{-3}$.

个驻点, 且有 $z = f(1, 1) = e^{-3}$.

如图所示 D 的边界由三条线段组成.

记 $l_1: y = 0, 0 \leq x \leq 2$, 当 $(x, y) \in l_1$ 时,

$$z = f(x, 0) = (x^2 - 1)e^{-2x}, \frac{dz}{dx} = 2(1 + x - x^2)e^{-2x},$$

令 $\frac{dz}{dx} = 0$, 解得 $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 或者 $x = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ (舍去),

$$f(0, 0) = -1, f\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}, 0\right) = \frac{1+\sqrt{5}}{2}e^{-(1+\sqrt{5})}, f(2, 0) = 3e^{-4} > f(0, 0), \text{ 因 } x \in \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}, 2\right) \text{ 时 } \frac{dz}{dx} < 0, \text{ 因此}$$

$$z = f(x, y) \text{ 在 } l_1 \text{ 取到的最大值为 } f\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}, 0\right) = \frac{1+\sqrt{5}}{2}e^{-(1+\sqrt{5})}, \text{ 最小值为 } f(0, 0) = -1; \dots\dots 4 \text{ 分}$$

记 $l_2: x = 0, 0 \leq y \leq 4$, 当 $(x, y) \in l_2$ 时, $z = f(0, y) = (y - 1)e^{-y}$, $\frac{dz}{dy} = (2 - y)e^{-y}$, 令 $\frac{dz}{dy} = 0$, 解得 $y = 2$,

$$f(0, 0) = -1, f(0, 2) = e^{-2}, f(0, 4) = 3e^{-4} > f(0, 0), \text{ 因 } y \in (2, 4) \text{ 时 } \frac{dz}{dy} < 0, \text{ 因此 } z = f(x, y) \text{ 在 } l_2 \text{ 取到}$$

的最大值为 $f(0, 2) = e^{-2}$, 最小值为 $f(0, 0) = -1$;

$\dots\dots 6 \text{ 分}$

记 $l_3: y = 4 - 2x, 0 \leq x \leq 2$, 当 $(x, y) \in l_3$ 时,

$$z = f(x, 4 - 2x) = (x^2 - 2x + 3)e^{-4} = [(x - 1)^2 + 2]e^{-4},$$

因此 $z = f(x, y)$ 在 l_3 取到的最大值为 $f(0, 4) = f(2, 0) = 3e^{-4}$, 最小值为 $f(1, 2) = 2e^{-4}$. $\dots\dots 8 \text{ 分}$

综合上述, $z = f(x, y) = (x^2 + y - 1)e^{-2x-y}$ 在区域 $D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, 2x + y \leq 4\}$ 上的最大值

最大值为 $f(0, 2) = e^{-2}$, 最小值为 $f(0, 0) = -1$.

$\dots\dots 10 \text{ 分}$

得分	评卷人

(17) (本题满分 10 分) 计算 $I = \iint_D xy dx dy$, 其中 D 由直线 $y = 0, y = 2, x = -2$, 及

曲线 $x = -\sqrt{2y - y^2}$ 所围成.

【解】记半圆形区域为 D_1 , 则 $I = \iint_D xy dx dy = \iint_{D+D_1} xy dx dy - \iint_{D_1} xy dx dy$, 2 分

其中 $\iint_{D+D_1} xy dx dy = \int_{-2}^0 dx \int_0^2 xy dy = \left(\frac{1}{2}x^2\right)\Big|_{-2}^0 \cdot \left(\frac{1}{2}y^2\right)\Big|_0^2 = -4$, 4 分

$$\begin{aligned} \iint_{D_1} xy dx dy &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^{2\sin\theta} (r \cos \theta)(r \sin \theta) r dr \\ &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{1}{4} r^4 \Big|_0^{2\sin\theta} \cdot \sin \theta \cos \theta d\theta = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{1}{4} \cdot 16 \sin^5 \theta \cos \theta d\theta = 4 \cdot \frac{1}{6} \sin^6 \theta \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = -\frac{2}{3}, \dots\dots 8 \text{ 分} \end{aligned}$$

因此, 原式 $I = -4 + \frac{2}{3} = -\frac{10}{3}$ 10 分

得分	评卷人

(18) (本题满分 10 分) 过抛物线 $y = x^2$ 上一点 (a, a^2) 作切线, 其中 $0 < a < 1$, 切线与抛物线及 x 轴所围图形面积为 S_1 , 切线与抛物线及 $y = 1$ 所围图形面积为 S_2 ,

$S = S_1 + S_2$, (I) 问 a 为何值时, S 最小. (II) 当 S 最小时, 求 S_1 绕 x 轴旋转所得立体体积.

【解】在点 (a, a^2) 处的切线方程为 $Y - a^2 = 2a(X - a)$, 即 $Y = 2aX - a^2$,

在 x 轴的截距为 $\frac{a}{2}$, 则 $S(a) = \int_0^1 \left(\frac{1}{2a}(y + a^2) - \sqrt{y}\right) dy = \frac{1}{4a} + \frac{a}{2} - \frac{2}{3}$, 2 分

(I) $S'(a) = -\frac{1}{4a^2} + \frac{1}{2}$, 令 $S'(a) = 0$ 得惟一驻点 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 且 $S''(\frac{\sqrt{2}}{2}) = \sqrt{2} > 0$, $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, S 最小,

最小值 $S(\frac{\sqrt{2}}{2}) = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{2}{3}$ 6 分

(II) $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $V_x = \pi \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} x^4 dx - \pi \int_{\frac{\sqrt{2}}{4}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} (\sqrt{2}x - \frac{1}{2})^2 dx = \frac{\pi}{5} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^5 - \pi \frac{1}{3\sqrt{2}} \left(\sqrt{2}x - \frac{1}{2}\right)^3 \Big|_{\frac{\sqrt{2}}{4}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\pi}{120\sqrt{2}}$.

..... 10 分

得分	评卷人

(19) (本题满分 10 分) 设 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 证明:

(I) $\frac{\sin x}{\cos^{\frac{1}{3}} x} > x$; (II) $\csc^2 x < \frac{1}{x^2} + 1 - \frac{4}{\pi^2}$.

【证明】(I) 原不等式等价于 $\frac{\sin x}{\cos^{\frac{1}{3}} x} - x > 0$, 令 $f(x) = \frac{\sin x}{\cos^{\frac{1}{3}} x} - x, x \in [0, \frac{\pi}{2})$, 1 分

$$f'(x) = \cos^{\frac{2}{3}} x + \frac{1}{3} \sin^2 x \cos^{-\frac{4}{3}} x - 1 = \frac{2}{3} \cos^{\frac{2}{3}} x + \frac{1}{3} \cos^{-\frac{4}{3}} x - 1,$$

$$f''(x) = -\frac{4}{9} \sin x \cos^{\frac{1}{3}} x + \frac{4}{9} \sin x \cos^{\frac{7}{3}} x = \frac{4 \sin x (1 - \cos^2 x)}{9 \cos^{\frac{7}{3}} x}, \quad \dots\dots 3 \text{ 分}$$

$x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $f''(x) > 0$, 因此 $f'(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2})$ 上单增, 又 $f'(0)=0$, 因此当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时有 $f'(x) > 0$,

由此可得 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2})$ 上单增, 因而 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时有 $f(x) = \frac{\sin x}{\cos^{\frac{1}{3}} x} - x > f(0) = 0$, 即

$$\frac{\sin x}{x} > \cos^{\frac{1}{3}} x; \quad \dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$(II) \text{ 令 } g(x) = \csc^2 x - \frac{1}{x^2} (x \in (0, \frac{\pi}{2}]), \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$g'(x) = -2 \csc^2 x \cot x + \frac{2}{x^3} = \frac{2(\sin^3 x - x^3 \cos x)}{x^3 \sin^3 x}, \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

由(I)的结论知 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时有 $\sin x > x \cos^{\frac{1}{3}} x$, 即 $\sin^3 x - x^3 \cos x > 0$, 所以 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时有 $g'(x) > 0$,

因而函数 $g(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2}]$ 上单增, 由此可得 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时有 $g(x) = \csc^2 x - \frac{1}{x^2} < g(\frac{\pi}{2}) = 1 - \frac{4}{\pi^2}$, 即

$$\csc^2 x < \frac{1}{x^2} + 1 - \frac{4}{\pi^2}. \quad \dots\dots 10 \text{ 分}$$

得分	评卷人

(20) (本题满分 11 分) 设 A 是 3 阶方阵, 矩阵 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是

3 维列向量, $\alpha_1 \neq 0$, 且满足 $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3)$, 证明: (I) 齐次

线性方程组 $Bx = 0$ 仅有零解; (II) 求 A 的特征值及特征向量.

【证】(I) 因为 $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3)$, 所以

$$A\alpha_1 = \alpha_1, \quad A\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3, \quad \dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{即 } (A-E)\alpha_1 = 0, \quad (A-E)\alpha_2 = \alpha_1, \quad (A-E)\alpha_3 = \alpha_2.$$

设存在一组数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3 = 0, \quad (*)$$

用 $A-E$ 左乘 (*) 两次, 得 $k_3 \alpha_1 = 0$, 因为 $\alpha_1 \neq 0$, 所以 $k_3 = 0$. 再用 $A-E$ 左乘 (*) 一次, 得 $k_2 \alpha_1 = 0$,

因为 $\alpha_1 \neq 0$, 所以 $k_2 = 0$. 此时 (*) 为 $k_1 \alpha_1 = 0$, 因为 $\alpha_1 \neq 0$, 所以 $k_1 = 0$. 故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无

关, 于是 $B = (\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3)$ 列满秩, 因此齐次线性方程组 $Bx = 0$ 仅有零解. $\dots\dots 5 \text{ 分}$

$$(II) \quad A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3),$$

则 $B^{-1}AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = C, B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3),$ 7 分

又 $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1,$ 9 分

$B^{-1}(E-A)B = E-C, r(E-A) = r(E-C) = 2,$ 因此属于 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的线性无关的特征向量个数

为 $3 - r(E-A) = 1,$ 属于特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的所有特征向量为 $k\alpha_1 (k \neq 0).$ 11 分

得分	评卷人

(21) (本题满分 11 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & 0 \\ 0 & a & 6 \end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量,

(I) 求参数 a 的值; (II) 求正交变换 $x = Qy$ 化二次型 $f(x) = x^T Ax$ 为标准形.

【解】(I) $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & 0 \\ -8 & \lambda-2 & 0 \\ 0 & -a & \lambda-6 \end{vmatrix} = (\lambda-6)^2(\lambda+2), \lambda_1 = \lambda_2 = 6, \lambda_3 = -2.$ 2 分

由已知 A 可对角化, 故 $\lambda_1 = \lambda_2 = 6$ 必有 2 个线性无关的特征向量,

由 $r(6E - A) = r \begin{pmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -8 & 4 & 0 \\ 0 & -a & 0 \end{pmatrix} = 1$ 知 $a = 0,$ 因此 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix};$ 4 分

(II) $x^T Ax = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 6x_3^2 + 10x_1x_2,$ 该二次型矩阵 $A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 5 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix},$ 6 分

由 $|\lambda E - A_1| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & -5 & 0 \\ -5 & \lambda-2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-6 \end{vmatrix} = (\lambda-6)(\lambda-7)(\lambda+3), \lambda_1 = 6, \lambda_2 = 7, \lambda_3 = -3,$ 8 分

对 $\lambda_1 = 6,$ 解 $(6E - A_1)x = 0,$ 得 $\alpha_1 = (0, 0, 1)^T,$

对 $\lambda_2 = 7,$ 解 $(7E - A_1)x = 0,$ 得 $\alpha_2 = (1, 1, 0)^T,$

对 $\lambda_3 = -3,$ 解 $(-3E - A_1)x = 0,$ 得 $\alpha_3 = (1, -1, 0)^T,$

$$\text{单位化得 } \beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \beta_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{令 } Q = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, x = Qy \text{ 化二次型为 } 6y_1^2 + 7y_2^2 - 3y_3^2. \quad \dots\dots 11 \text{ 分}$$

得分	评卷人

(22) (本题满分 11 分) 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} 6x(1-x), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

在 $X = x (0 < x < 1)$ 的条件下, Y 在 $(x, 1)$ 上服从均匀分布.

(I) 求随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数 $f(x, y)$;

(II) 求 $P\{X + Y \leq 1\}$;

(III) 求 $D(X - Y)$.

【解】(I) $0 < x < 1$ 时, $f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \dots\dots 1 \text{ 分}$

所以 $f(x, y) = f_{Y|X}(y|x)f_X(x) = \begin{cases} 6x, & 0 < x < 1, x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \dots\dots 3 \text{ 分}$

(II) $P\{X + Y \leq 1\} = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} 6x dy = \frac{1}{4}. \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$

(III) $D(X - Y) = E(X - Y)^2 - [E(X - Y)]^2 \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$

$$\begin{aligned} &= \int_0^1 dy \int_0^y 6x(x-y)^2 dx - \left[\int_0^1 dy \int_0^y 6x(x-y) dx \right]^2 \\ &= \frac{1}{10} - \left(-\frac{1}{4} \right)^2 = \frac{3}{80}. \quad \dots\dots 11 \text{ 分} \end{aligned}$$

得分	评卷人

(23) (本题满分 11 分) 设总体 $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \theta^2 & 2\theta(1-\theta) & (1-\theta)^2 \end{pmatrix}$, 其中 $\theta (0 < \theta < 1)$ 为

未知参数, 利用总体 X 的如下样本值

1, 2, 3, 1, 3

(I) 求 θ 的矩估计值 $\hat{\theta}_M$;(II) 求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}_L$;(III) X_1, X_2, \dots, X_n 为来自总体 X 的简单随机样本, N 表示样本 2 出现的次数, 在 $\theta = \hat{\theta}_L$ 时, 求 $E(N)$.

【解】(I) $\bar{x} = \frac{1+2+3+1+3}{5} = 2, EX = 1 \times \theta^2 + 2 \times 2\theta(1-\theta) + 3 \times (1-\theta)^2 = -2\theta + 3,$

令 $\bar{x} = EX, 2 = -2\theta + 3 \Rightarrow \hat{\theta}_M = \frac{1}{2}. \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$

(II) 似然函数 $L(\theta) = P\{X_1=1, X_2=2, X_3=3, X_4=1, X_5=3\}$

$$= (\theta^2)^2 \times 2\theta(1-\theta) \times [(1-\theta)^2]^2$$

$$= 2\theta^5(1-\theta)^5, \quad \dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$\ln L(\theta) = \ln 2 + 5 \ln \theta + 5 \ln(1-\theta),$$

令 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{5}{\theta} - \frac{5}{1-\theta} = 0$, 得 $\hat{\theta}_L = \frac{1}{2}. \quad \dots\dots 9 \text{ 分}$

(III) 由题意 $N \sim B(n, \frac{1}{2}), EN = \frac{n}{2}. \quad \dots\dots 11 \text{ 分}$