

# Обобщенные линейные модели с нормальным распределением остатков

Линейные модели...

Марина Варфоломеева, Вадим Хайтов

Кафедра Зоологии беспозвоночных, Биологический факультет, СПбГУ




# Общая линейная модель — удобный инструмент описания связей

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i} + \varepsilon_i,$$

где  $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma)$ .

Предикторы в такой модели могут быть дискретными и непрерывными.



## Применимость общих линейных моделей ограничена

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i} + \varepsilon_i,$$

где  $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma)$ .

Т.е. на самом деле мы имеем ввиду, что переменная-отклик подчиняется нормальному распределению:

$$y_i \sim N(\mu_i, \sigma)$$

$$E(y_i) = \mu_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i}$$

Если отклик подчиняется другому распределению, такие модели не годятся.

Последний из двух вариантов записи модели (распределение отклика и линейный предиктор) мы будем использовать дальше.

# Обобщенные линейные модели

Обобщенные линейные модели (Generalized Linear Models, GLM, GLZ, GLIM) позволяют моделировать зависимости не только для нормально-распределенных величин, но и для других распределений.

Не путайте обобщенные линейные модели с общими (General Linear Models, тоже сокращаются как GLM).

# Важнейшие распределения из семейства экспоненциальных


Для непрерывных величин

- ▶ Нормальное распределение
- ▶ Гамма распределение

Для дискретных величин

- ▶ Биномиальное распределение
- ▶ Распределение Пуассона
- ▶ Отрицательное биномиальное распределение

# Нормальное распределение



$$f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(y-\mu)^2}$$


Параметры:

- ▶  $\mu$  – среднее
- ▶  $\sigma$  – стандартное отклонение

Свойства:

- ▶  $E(y) = \mu$  – мат.ожидание
- ▶  $var(y) = 1$  – функция дисперсии (variance function)
- ▶  $-\infty \leq y \leq +\infty, y \in \mathbb{R}$  – диапазон значений

# Гамма-распределение



$$f(y) = \frac{1}{\Gamma(\nu)} \cdot \left(\frac{\nu}{\mu}\right)^\nu \cdot y^{\nu-1} \cdot e^{-\frac{y \cdot \nu}{\mu}}$$


Параметры:

- ▶  $\mu$  – среднее
- ▶  $\nu$  – определяет степень избыточности дисперсии

Свойства:

- ▶  $E(y) = \mu$  – мат.ожидание
- ▶  $var(y) = \frac{\mu^2}{\nu}$  – функция дисперсии
- ▶  $0 < y \leq +\infty, y \in \mathbb{R}$  – диапазон значений

# Биномиальное распределение



$$f(y) = \frac{n!}{y! \cdot (n - y)!} \cdot \pi^y \cdot (1 - \pi)^{n-y}$$

Параметры:


- ▶  $n$  – число объектов в испытании
- ▶  $\pi$  – вероятность того, что  $y = 1$

Свойства:

- ▶  $E(y) = n \cdot \pi$  – мат.ожидание
- ▶  $var(y) = n \cdot \pi \cdot (1 - \pi)$  – функция дисперсии
- ▶  $0 \leq y \leq +\infty, y \in \mathbb{N}$  – диапазон значений



# Распределение Пуассона



$$f(y) = \frac{\mu^y \cdot e^{-\mu}}{y!}$$


Параметр:

- ▶  $\mu$  — задает среднее и дисперсию

Свойства:

- ▶  $E(y) = \mu$  — мат.ожидание
- ▶  $var(y) = \mu$  — функция дисперсии
- ▶  $0 \leq y \leq +\infty, y \in \mathbb{N}$  — диапазон значений

# Отрицательное биномиальное распределение



$$f(y) = \frac{\Gamma(y + k)}{\Gamma(k) \cdot \Gamma(y + 1)} \cdot \left(\frac{k}{\mu + k}\right)^k \cdot \left(1 - \frac{k}{\mu + k}\right)^y$$

Параметры:

- ▶  $\mu$  – среднее
- ▶  $k$  – определяет степень избыточности дисперсии

Свойства:

- ▶  $E(y) = \mu$  – мат.ожидание
- ▶  $var(y) = \mu + \frac{\mu^2}{k}$  – функция дисперсии
- ▶  $0 \leq y \leq +\infty, y \in \mathbb{N}$  – диапазон значений

# Обобщенные линейные модели (Generalized Linear Models)

Обобщенные линейные модели (Nelder, Wedderburn, 1972)

- ▶ Позволяют моделировать не только величины, подчиняющиеся нормальному распределению, но и другим распределениям из семейства экспоненциальных.
- ▶ Подбор коэффициентов делается методом максимального правдоподобия.

# Чем отличается обобщенная линейная модель от общей?

На примере нормального распределения  $f(y_i|\theta) = N(\mu_i, \sigma)$

Общая линейная модель состоит из двух компонентов

$$y_i \sim f(y_i|\theta)$$

$$E(y_i) = \mu_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i}$$

# Чем отличается обобщенная линейная модель от общей?

На примере нормального распределения  $f(y_i|\theta) = N(\mu_i, \sigma)$

Общая линейная модель состоит из двух компонентов

$$y_i \sim f(y_i|\theta)$$

$$E(y_i) = \mu_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i}$$

Обобщенная линейная модель состоит из трех компонентов

$$y_i \sim f(y_i|\theta)$$

$$E(y_i) = \mu_i = g^{-1}(\beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i})$$

$$g(\mu_i) = \eta_i$$

$$\eta_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i}$$

- ▶ Случайная часть —  $y_i \sim f(y_i|\theta)$  — распределение из семейства экспоненциальных с параметрами  $\theta$ .
- ▶ Фиксированная часть.

Компонент, который появляется в GLM:

- ▶  $g()$  — функция связи, которая трансформирует мат. ожидание отклика в линейный предиктор (обратная функция обозначается  $g^{-1}()$ ).

# Функция связи

$$y_i \sim f(y_i|\theta)$$

$$E(y_i) = \mu_i = g^{-1}(\beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i})$$

$$g(\mu_i) = \eta_i$$

$$\eta_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i}$$

Функция связи  $g(\mu)$  используется разная в зависимости от распределения  $f(y_i|\theta)$ .

# Функция связи

$$y_i \sim f(y_i|\theta)$$

$$E(y_i) = \mu_i = g^{-1}(\beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i})$$

$$g(\mu_i) = \eta_i$$

$$\eta_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i}$$

Функция связи  $g(\mu)$  используется разная в зависимости от распределения  $f(y_i|\theta)$ .

Например:

## Идентичность:

$$E(y_i) = \mu_i$$

$$\mu_i = \eta_i$$

$$\eta_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i}$$

# Функция связи

$$y_i \sim f(y_i|\theta)$$

$$E(y_i) = \mu_i = g^{-1}(\beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i})$$

$$g(\mu_i) = \eta_i$$

$$\eta_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i}$$

Функция связи  $g(\mu)$  используется разная в зависимости от распределения  $f(y_i|\theta)$ .

Например:

**Идентичность:**

$$E(y_i) = \mu_i$$

$$\mu_i = \eta_i$$

$$\eta_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i}$$

**Логарифм:**

$$E(y_i) = e^{\beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i}}$$

$$\ln(\mu_i) = \eta_i$$

$$\eta_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i}$$



# Функция связи

$$y_i \sim f(y_i|\theta)$$

$$E(y_i) = \mu_i = g^{-1}(\beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i})$$

$$g(\mu_i) = \eta_i$$

$$\eta_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i}$$

Функция связи  $g(\mu)$  используется разная в зависимости от распределения  $f(y_i|\theta)$ .

Например:

## Идентичность:

$$E(y_i) = \mu_i$$

$$\mu_i = \eta_i$$

$$\eta_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i}$$

## Логарифм:

$$E(y_i) = e^{\beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i}}$$

$$\ln(\mu_i) = \eta_i$$

$$\eta_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i}$$

## Логит:


$$E(y_i) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i}}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i}}}$$

$$\ln\left(\frac{\mu_i}{1 - \mu_i}\right) = \eta_i$$

$$\eta_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i}$$

# Параметры обобщенных линейных моделей подбирают методом максимального правдоподобия

Правдоподобие (likelihood) — измеряет соответствие реально наблюдаемых данных тем, что можно получить из модели при определенных значениях параметров.



Это произведение вероятностей получения каждой из точек данных:

$$L(\theta|\text{data}) = \prod_{i=1}^n f(\text{data}|\theta)$$

►  $f(\text{data}|\theta)$  — функция распределения с параметрами  $\theta$

Нужно найти параметры  $\theta$ , которые максимизируют правдоподобие:

$$L(\theta|\text{data}) \rightarrow \max$$

Вычислительно проще работать с логарифмами правдоподобий (loglikelihood):

$$\ln L(\theta|\text{data}) \rightarrow \max$$

Редко можно решить аналитически, обычно используются численные решения.

## Пример – энергетическая ценность икры

Один из показателей, связанных с жизнеспособностью икры – доля сухого вещества. Она пропорциональна количеству запасенной энергии.

Отличается ли энергетическая ценность икры большой озерной форели в сентябре и ноябре?

Данные: Lantry et al., 2008

Источник: пакет Stat2Data

# Открываем данные

```
library(Stat2Data)
data(FishEggs)
```

Все ли правильно открылось?

```
str(FishEggs)
```

```
# 'data.frame': 35 obs. of  4 variables:
# $ Age   : int  7 8 8 9 9 9 9 10 10 11 ...
# $ PctDM: num  37.4 38 37.5 39 37.9 ...
# $ Month: Factor w/ 2 levels "Nov","Sep": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
# $ Sept  : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
```

Нет ли пропущенных значений?

```
colSums(is.na(FishEggs))
```

```
#   Age PctDM Month  Sept
#     0     0     0     0
```

# Меняем порядок уровней факторов

Уровни факторов в исходных данных:

```
levels(FishEggs$Month)
```

```
# [1] "Nov" "Sep"
```

Делаем базовым уровнем сентябрь.

```
FishEggs$Month <- relevel(FishEggs$Month, ref = 'Sep')
```

Теперь уровни в хронологическом порядке:

```
levels(FishEggs$Month)
```

```
# [1] "Sep" "Nov"
```

# Объемы выборки

```
table(FishEggs$Month)
```



```
#
```

```
# Sep Nov
```

```
# 14 21
```

# Ищем выбросы

```
library(cowplot)
library(ggplot2)
theme_set(theme_bw())
gg_dot <- ggplot(FishEggs, aes(y = 1:nrow(FishEggs))) + geom_point()
plot_grid(gg_dot + aes(x = Age),
          gg_dot + aes(x = PctDM), nrow = 1)
```



# Модель для описания питательной ценности икры

## GLM с нормальным распределением отклика

$$y_i \sim N(\mu_i, \sigma)$$

$$E(y_i) = \mu_i$$

$\mu_i = \eta_i$  — функция связи “идентичность” (identity)

$$\eta_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i}$$

## Модель зависимости в примере

Как зависит питательная ценность икры от месяца вылова рыбы (сентябрь или ноябрь) с учетом ковариаты (возраста рыбы) и их взаимодействия.

$$PctDM_i \sim N(\mu_i, \sigma)$$

$$E(PctDM_i) = \mu_i$$

$$\mu_i = \eta_i$$

$$\eta_i = \beta_0 + \beta_1 Age_i + \beta_2 Month_{Nov i} + \beta_3 Age_i Month_{Nov i}$$

- ▶  $PctDM_i$  – содержание сухого вещества в икре
- ▶  $Age_i$  – возраст рыбы
- ▶  $Month_{Nov i}$  – переменная-индикатор для уровня  $Month_{Nov i} = 1$



# Подбираем модель

```
mod <- glm(PctDM ~ Age * Month, data = FishEggs)
mod
```

```
#
# Call:  glm(formula = PctDM ~ Age * Month, data = FishEggs)
#
# Coefficients:
# (Intercept)          Age      MonthNov  Age:MonthNov
#    38.12111    -0.23965     1.27623     0.02144
#
# Degrees of Freedom: 34 Total (i.e. Null);  31 Residual
# Null Deviance:      83.96
# Residual Deviance: 47.83  AIC: 120.3
```

```
# Чтобы записать модель, нужна еще сигма.
sigma(mod)
```

```
# [1] 1.242124
```

$$PctDM_i \sim N(\mu_i, 1.24)$$

$$E(PctDM_i) = \mu_i$$

$$\mu_i = \eta_i$$

$$\eta_i = 38.12 - 0.24Age_i + 1.28Month_{Nov\ i} + 0.02Age_iMonth_{Nov\ i}$$

# Диагностика модели

# Разновидности остатков в GLM

## Остатки в масштабе отклика (response residuals)

$$e_i = y_i - E(y_i)$$

- Это разница между наблюдаемым и предсказанным значениями.

► Аналог “сырых” остатков в простой линейной регрессии.

```
resid(mod, type = 'response')[1:5]
```

#	1	2	3	4	5
#	-0.5198421	0.3983712	-0.2016288	1.5165844	0.4665844

# Разновидности остатков в GLM

## Остатки в масштабе отклика (response residuals)

$$e_i = y_i - E(y_i)$$

- Это разница между наблюдаемым и предсказанным значениями.

► Аналог “сырых” остатков в простой линейной регрессии.

```
resid(mod, type = 'response')[1:5]
```

#	1	2	3	4	5
#	-0.5198421	0.3983712	-0.2016288	1.5165844	0.4665844

## Пирсоновские остатки (Pearson's residuals)

$$r_{pi} = \frac{y_i - E(y_i)}{\sqrt{var(y_i)}}$$

► Это обычные остатки, деленные на стандартную ошибку предсказанного значения.

► Аналог стандартизованных остатков в простой линейной регрессии.

```
resid(mod, type = 'pearson')[1:5]
```

#	1	2	3	4	5
#	-0.5198421	0.3983712	-0.2016288	1.5165844	0.4665844

Для GLM с нормальным распределением отклика оба типа остатков одинаковы.

# Условия применимости GLM с нормальным распределением отклика

- ▶ Случайность и независимость наблюдений внутри групп.
- ▶ Нормальное распределение остатков.
- ▶ Гомогенность дисперсий остатков.
- ▶ Отсутствие коллинеарности предикторов.

# Проверка на коллинеарность

```
vif(update(mod, . ~ . - Age:Month))
```

```
#      Age      Month  
# 1.006666 1.006666
```

Коллинеарности нет.


## Данные для анализа остатков

```
mod_diag <- fortify(mod) # функция из пакета ggplot2
head(mod_diag)
```

```
#   PctDM Age Month      .hat    .sigma    .cooks    .fitted    .resid
# 1 37.35   7   Nov 0.15819348 1.258412 0.0097750037 37.86984 -0.5198421
# 2 38.05   8   Nov 0.11549852 1.260286 0.0037963407 37.65163  0.3983712
# 3 37.45   8   Nov 0.11549852 1.262050 0.0009725112 37.65163 -0.2016288
# 4 38.95   9   Nov 0.08316881 1.229097 0.0368743995 37.43342  1.5165844
# 5 37.90   9   Nov 0.08316881 1.259518 0.0034902153 37.43342  0.4665844
# 6 36.45   9   Nov 0.08316881 1.248655 0.0155047929 37.43342 -0.9834156
#   .stdresid
# 1 -0.4561423
# 2  0.3410151
# 3 -0.1725990
# 4  1.2751372
# 5  0.3923020
# 6 -0.8268513
```

# График расстояния Кука

```
ggplot(mod_diag, aes(x = 1:nrow(mod_diag), y = .cooks)) +  
  geom_bar(stat = 'identity') +  
  geom_hline(yintercept = 1, linetype = 2)
```




Влиятельных наблюдений нет.



## График остатков от предсказанных значений



```
gg_resid <- ggplot(data = mod_diag, aes(x = .fitted, y = .stdresid)) +  
  geom_point() + geom_hline(yintercept = 0)  
gg_resid
```



Влиятельных наблюдений нет

# График зависимости остатков от предикторов в модели

```
ggplot(data = mod_diag, aes(x = Age, y = .stdresid)) +  
  geom_point() + geom_hline(yintercept = 0)  
ggplot(data = mod_diag, aes(x = Month, y = .stdresid)) +  
  geom_boxplot() + geom_hline(yintercept = 0)
```



Гетерогенности дисперсий нет.

# Тестирование значимости коэффициентов

# Тест Вальда для коэффициентов GLM

$$H_0 : \beta_k = 0$$

$$H_A : \beta_k \neq 0$$

$$\frac{b_k - \beta_k}{SE_{b_k}} = \frac{b_k}{SE_{b_k}} \sim N(0, 1)$$

►  $b_k$  — оценка коэффициента GLM.

Хорошо работает только на больших выборках.

Если приходится оценивать  $\sigma$ , то  $\frac{b_k}{SE_{b_k}} \sim t_{(df=n-p)}$

►  $n$  — объем выборки.

►  $p$  — число параметров модели.

## В summary() записаны результаты теста Вальда

```
summary(mod)
```

```
#
# Call:
# glm(formula = PctDM ~ Age * Month, data = FishEggs)
#
# Deviance Residuals:
#      Min       1Q   Median       3Q      Max
# -2.9559  -0.5576   0.2305   0.7522   2.5029
#
# Coefficients:
#              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
# (Intercept)  38.12111    1.06436  35.816  <2e-16 ***
# Age          -0.23965    0.09134  -2.624   0.0134 *
# MonthNov      1.27623    1.51190   0.844   0.4051
# Age:MonthNov  0.02144    0.12782   0.168   0.8679
# ---
# Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
#
# (Dispersion parameter for gaussian family taken to be 1.542872)
#
#      Null deviance: 83.962  on 34  degrees of freedom
# Residual deviance: 47.829  on 31  degrees of freedom
# AIC: 120.26
#
# Number of Fisher Scoring iterations: 2
```

## В summary() записаны результаты теста Вальда

```
summary(mod)
```

```
#
# Call:
# glm(formula = PctDM ~ Age * Month, data = FishEggs)
#
# Deviance Residuals:
#      Min       1Q   Median       3Q      Max
# -2.9559  -0.5576   0.2305   0.7522   2.5029
#
# Coefficients:
#              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
# (Intercept)  38.12111    1.06436  35.816  <2e-16 ***
# Age          -0.23965    0.09134  -2.624   0.0134 *
# MonthNov     1.27623    1.51190   0.844   0.4051
# Age:MonthNov  0.02144    0.12782   0.168   0.8679
# ---
# Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
#
# (Dispersion parameter for gaussian family taken to be 1.542872)
#
#      Null deviance: 83.962  on 34  degrees of freedom
# Residual deviance: 47.829  on 31  degrees of freedom
# AIC: 120.26
#
# Number of Fisher Scoring iterations: 2
```

С увеличением возраста рыбы на год процент сухого вещества в икре снижается на 0.24 % (тест Вальда,  $t_{df=31} = -2.62$ ,  $p = 0.013$ ). Это происходит одинаково в сентябре и ноябре. Энергетическая ценность икры в сентябре и ноябре не различается.



# Насыщенная и нулевая модели задают шкалу для сравнений с предложенной

**Насыщенная модель** – каждое уникальное наблюдение (сочетание значений предикторов) описывается одним из  $n$  параметров.

$$\ln L_{\text{saturated}} = 0$$

$$df_{\text{saturated}} = n - p_{\text{saturated}} = n - n = 0$$

**Предложенная модель** – модель, подобранная в данном анализе

$$\hat{y}_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_{p-1} x_{p-1i}$$

$$\ln L_{\text{model}} \neq 0$$

$$df_{\text{model}} = n - p_{\text{model}}$$

**Нулевая модель** – все наблюдения описываются одним параметром (средним)

$$\hat{y}_i = \beta_0$$

$$\ln L_{\text{null}} \neq 0$$

$$df_{\text{null}} = n - p_{\text{null}} = n - 1$$



# Девianza

Это мера различия правдоподобий двух моделей (оценка разницы логарифмов правдоподобий).

## Остаточная девианса

$$d_{residual} = 2(\ln L_{saturated} - \ln L_{model}) = -2\ln L_{model}$$

## Нулевая девианса

$$d_{null} = 2(\ln L_{saturated} - \ln L_{null}) = -2\ln L_{null}$$

Сравнение нулевой и остаточной девианс позволяет судить о статистической значимости модели в целом (при помощи теста отношения правдоподобий).

$$d_{null} - d_{residual} = -2(\ln L_{null} - \ln L_{model}) = 2(\ln L_{model} - \ln L_{null})$$

# Тест отношения правдоподобий (Likelihood Ratio Test)

Используется для сравнения правдоподобий

$$LRT = 2\ln\left(\frac{L_{M_1}}{L_{M_2}}\right) = 2(\ln L_{M_1} - \ln L_{M_2})$$

- ▶  $M_1$  и  $M_2$  — вложенные модели ( $M_1$  — более полная,  $M_2$  — уменьшенная),
- ▶  $L_{M_1}, L_{M_2}$  - правдоподобия,
- ▶  $\ln L_{M_1}, \ln L_{M_2}$  - логарифмы правдоподобий.

Разница логарифмов правдоподобий имеет распределение, которое можно аппроксимировать распределением  $\chi^2$  с числом степеней свободы  $df = df_{M_2} - df_{M_1}$ .

# LRT используется для сравнения моделей

Для тестирования значимости модели целиком:

$$LRT = 2\ln\left(\frac{L_{model}}{L_{null}}\right) = 2(\ln L_{model} - \ln L_{null}) = d_{null} - d_{residual}$$

$$df = df_{null} - df_{model} = (n - 1) - (n - p_{model}) = p_{model} - 1$$

Для тестирования значимости предикторов:

$$LRT = 2\ln\left(\frac{L_{model}}{L_{reduced}}\right) = 2(\ln L_{model} - \ln L_{reduced})$$

$$df = df_{reduced} - df_{model} = (n - p_{reduced}) - (n - p_{model}) = p_{model} - p_{reduced}$$

# Тестируем значимость модели целиком при помощи LRT

```
null_model <- glm(PctDM ~ 1, data = FishEggs)
anova(null_model, mod, test = 'Chi')
```

```
# Analysis of Deviance Table
```

```
#
```

```
# Model 1: PctDM ~ 1
```

```
# Model 2: PctDM ~ Age * Month
```

```
#   Resid. Df Resid. Dev Df Deviance    Pr(>Chi)
```

```
# 1          34      83.962
```

```
# 2          31      47.829  3   36.133 0.00003302 ***
```

```
# ---
```

```
# Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

# Тестируем значимость предикторов при помощи LRT

Используем II тип тестов ("II тип сумм квадратов"):

## 1. Тестируем значимость взаимодействия

```
drop1(mod, test = 'Chi')

# Single term deletions
#
# Model:
# PctDM ~ Age * Month
#           Df Deviance    AIC scaled dev. Pr(>Chi)
# <none>          47.829 120.26
# Age:Month   1    47.872 118.29    0.031735    0.8586
```

## 2. Тестируем значимость предикторов, когда взаимодействие удалено

```
mod_no_int <- update(mod, . ~ . -Age:Month)
drop1(mod_no_int, test = 'Chi')

# Single term deletions
#
# Model:
# PctDM ~ Age + Month
#           Df Deviance    AIC scaled dev. Pr(>Chi)
# <none>          47.872 118.29
# Age      1    67.638 128.38    12.097 0.0005051 ***
# Month    1    67.133 128.12    11.835 0.0005813 ***
# ---
# Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

## Запись результатов

Содержание сухого вещества в икре зависит от возраста рыбы и месяца ( $p < 0.01$ , тест отношения правдоподобий, табл. 1). Характер зависимости энергетической ценности икры от возраста одинаков в сентябре и ноябре.

Table 1: Анализ девиансы для модели зависимости энергетической ценности икры от возраста рыбы, месяца и их взаимодействия. Тесты II типа.  $df$  — число степеней свободы,  $D$  — девианса,  $p$  — уровень значимости.

Предиктор	df	D	p
-		47.829	
Возраст:Месяц	1	47.872	0.86
Возраст	1	67.638	<0.01
Месяц	1	67.133	<0.01

# Доля объясненной девиансы

## Остаточная девианса

$$d_{residual} = 2(\ln L_{saturated} - \ln L_{model}) = -2\ln L_{model}$$

## Нулевая девианса

$$d_{null} = 2(\ln L_{saturated} - \ln L_{null}) = -2\ln L_{null}$$

## Доля объясненной девиансы

$$\frac{d_{null} - d_{residual}}{d_{null}}$$

Долю объясненной девиансы легко вычислить

```
(mod$null.deviance - mod$deviance) / mod$null.deviance
```

```
# [1] 0.4303481
```

Модель объясняет 43% общей девиансы.

# Данные для графика предсказаний

```
library(dplyr)
New_Data <- FishEggs %>% group_by(Month) %>%
  do(data.frame(Age = seq(min(.$Age), max(.$Age), length.out = 100)))
head(New_Data)
```

```
# # A tibble: 6 x 2
# # Groups:   Month [1]
#   Month   Age
#   <fct> <dbl>
# 1 Sep     7
# 2 Sep    7.11
# 3 Sep    7.22
# 4 Sep    7.33
# 5 Sep    7.44
# 6 Sep    7.56
```



## Предсказания при помощи predict()

```
Predictions <- predict(mod, newdata = New_Data, se.fit = TRUE)
New_Data$fit <- Predictions$fit # Предсказанные значения
New_Data$se <- Predictions$se.fit # Стандартные ошибки
t_crit <- qt(0.975, df = nrow(FishEggs) - length(coef(mod))) # t для дов. инт.
New_Data$lwr <- New_Data$fit - t_crit * New_Data$se
New_Data$upr <- New_Data$fit + t_crit * New_Data$se

head(New_Data)
```

```
# # A tibble: 6 x 6
# # Groups:   Month [1]
#   Month   Age   fit   se   lwr   upr
#   <fct> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
# 1 Sep    7     36.4 0.499  35.4  37.5
# 2 Sep   7.11  36.4 0.491  35.4  37.4
# 3 Sep   7.22  36.4 0.484  35.4  37.4
# 4 Sep   7.33  36.4 0.476  35.4  37.3
# 5 Sep   7.44  36.3 0.469  35.4  37.3
# 6 Sep   7.56  36.3 0.462  35.4  37.3
```

## Данные для графика вручную


```
X <- model.matrix(~ Age * Month, data = New_Data) # Модельная матрица
betas <- coef(mod) # Коэффициенты
New_Data$fit <- X %*% betas # Предсказанные значения
New_Data$se <- sqrt(diag(X %*% vcov(mod) %*% t(X))) # Стандартные ошибки
t_crit <- qt(0.975, df = nrow(FishEggs) - length(coef(mod))) # t для дов. инт.
New_Data$lwr <- New_Data$fit - t_crit * New_Data$se
New_Data$upr <- New_Data$fit + t_crit * New_Data$se
```

```
head(New_Data)
```

```
# # A tibble: 6 x 6
# # Groups:   Month [1]
#   Month   Age   fit   se   lwr   upr
#   <fct> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
# 1 Sep     7    36.4 0.499  35.4  37.5
# 2 Sep    7.11  36.4 0.491  35.4  37.4
# 3 Sep    7.22  36.4 0.484  35.4  37.4
# 4 Sep    7.33  36.4 0.476  35.4  37.3
# 5 Sep    7.44  36.3 0.469  35.4  37.3
# 6 Sep    7.56  36.3 0.462  35.4  37.3
```

# График предсказаний модели

```
Plot_egg <- ggplot(New_Data, aes(x = Age, y = fit)) +  
  geom_ribbon(alpha = 0.2, aes(ymin = lwr, ymax = upr, group = Month)) +  
  geom_line(aes(colour = Month), size = 1) +  
  geom_point(data = FishEggs, aes(x = Age, y = PctDM, colour = Month))  
Plot_egg
```



# Take-home messages

- ▶ Обобщенные линейные модели (Generalized Linear Models, GLM) позволяют моделировать зависимости для откликов с распределением из семейства экспоненциальных
- ▶ Для тестирования предикторов в GLM используются:
  - ▶ Тесты Вальда для коэффициентов (плохо на малых выборках).
  - ▶ Тесты отношения правдоподобий вложенных моделей (более точно).
- ▶ Доля объясненной девиансы оценивает качество подгонки GLM

# Что почитать

- ▶ Zuur, A.F. and Ieno, E.N., 2016. A protocol for conducting and presenting results of regression-type analyses. *Methods in Ecology and Evolution*, 7(6), pp.636-645.
- ▶ Кабаков Р.И. R в действии. Анализ и визуализация данных на языке R. М.: ДМК Пресс, 2014
- ▶ Zuur, A., Ieno, E.N. and Smith, G.M., 2007. *Analyzing ecological data*. Springer Science & Business Media.
- ▶ Quinn G.P., Keough M.J. 2002. *Experimental design and data analysis for biologists*
- ▶ Logan M. 2010. *Biostatistical Design and Analysis Using R. A Practical Guide*