

Componenti chimici della materia vivente

Alcune proteine esistono in stato di costante disordine non ripiegato come... . Le proteine nel momento del ripiegamento possono andare incontro ad un ripiegamento incompleto che porta ad agglomerati, un esempio è anche la **proteina prionica** che può passare da alfa-elica a beta-foglietto, quest'ultima struttura è più compatta e causa la malattia della mucca pazza; una proteina prionica malata può "infettare" quelle sane.

I proteoglicani sono proteine complesse coniugate a glicosamminoglicani (gruppi prostetici), costituiscono il collagene. Accumuli di queste macromolecole causano mucopolisaccaridosi, un fattore di rischio è la mancanza genetica di enzimi nei lisosomi volti all'idrolisi dei mucopolisaccaridi.

Il **liquido extracellulare** funge da sito di appoggio per le cellule, le divide in tessuti diversi, le ciba immagazzinando fattori di crescita e permette di inviare stimoli (pressori) alle cellule.

I **mediatori chimici** che sfruttano i lipidi sfruttano ad esempio la separazione di acido arachidonico dalla membrana cellulare nel momento in cui entra in contatto con un segnale esterno come i raggi ultravioletti, questo porta alla produzione di prostaglandine che attivano il processo infiammatorio. Una produzione eccessiva di prostaglandine può causare melanomi.

La cellula

È possibile visualizzare i componenti degli organelli cellulari attraverso il microscopio crioelettronico (4nm), mentre quelli ottici permettono di evidenziare solo l'interno della cellula. Sfruttando anticorpi con flurotrofi si possono evidenziare specifiche proteine come quelle del nucleo.

Procariote "prima del nucleo", organismi che compongono il microbiota e che possono provocare patologie in caso di produzione eccessiva di metaboliti e scompensi.

Nelle cellule eucariote troviamo barriere lipidiche che mantengono compatte e sezionate le varie componenti, il nucleolo è l'unico che non è delimitato ma è contenuto all'interno del nucleo stesso.

All'interno delle cellule la densità delle macromolecole è molto alta, solo il poro nucleare è composto da più di 450 proteine.

L'origine degli organuli è avvenuta per invaginazione della membrana plasmatica nel caso del RE e fagocitosi di un altro microrganismo per il mitocondrio.

Nucleo Organello eucariote protetto da una doppia membrana tappezzata da pori nucleari che permettono all'mRNA e altre molecole di passare. Per evidenziare le 2 lamine nucleari sono stati usati fluorometri con la ricostruzione di ogni anello.

All'interno si trova il nucleoplasma (simile al citosol) in cui sono immersi nucleolo e cromatina. L'eucromatina si condensa a formare l'eterocromatina per

formare i cromosomi a ridosso della membrana e del nucleolo, l'informazione viene presa solo dall'eucromatina rilassata.

Il **nucleolo** si occupa della produzione di rRNA per produrre la subunità maggiore e minore dei ribosomi grazie a proteine ribosomali esterne che entrano nel nucleo, una volta prodotte le subunità queste escono dal nucleo per unirsi.

Ribosomi Si possono trovare liberi nei citosol dove producono proteine usate da perossisomi, nucleo e mitocondri; mentre quelli legati alla parete del reticolo endoplasmatico producono proteine che vengono passate all'apparato del golgi dove vengono fatte maturare per essere inviate alla membrana, vescicole...

Reticolo endoplasmatico Si divide in liscio e rugoso, quest'ultimo si appoggia al nucleo e si chiama così perché presenta su di esso i ribosomi, al suo interno le proteine diventano glicoproteine grazie alla glicosilazione. Se la proteina non si ripiega correttamente non viene rilasciata con vescicole (generata per gemmazione) ma viene riconosciuta e degradata dal proteasoma. Il RE liscio si occupa della sintesi di lipidi e soprattutto di steroidi, contribuisce al metabolismo del glucosio nel fegato, detossifica sostanze tossiche e immagazzina Ca^{2+} .

Apparato del Golgi Accoglie nelle cisterne cis le vescicole del RE e successivamente vengono modificate nelle cisterne mediali e trans per essere poi inviate da qui alla membrana o all'esterno. Le vescicole del golgi sono usate per unirsi a vescicole esterne formando lisosomi.

Lisosomi Ambiente acido (pH 5) per attivare le idrolasi acide che obbliga le proteine interne ad essere particolarmente glicosilate. Si formano da lisosoma primario (trans golgi) e fagosoma (interno o esterno). Nel sistema immunitario digeriscono agenti patogeni grazie ai fagosomi che si fondono, una volta fagocitati agenti esterni, con i lisosomi formando autofagolisosomi.

Perossisomi Si occupano di beta e alfa ossidazione di acidi grassi e della produzione di sfingolipidi.

Mitocondri Usati nella produzione di energia. I mitocondri si dividono per scissione e se sono danneggiati vengono digeriti da fagolisosomi nel processo selettivo di mitofagia.

Citoscheletro È fatto da microtubuli, microfilamenti e filamenti intermedi. I **microtubuli** sono formati nel centrosoma da alfa e beta-tubulina disposti in cilindretti, sono polarizzati in maniera dinamica per aggiungere tubulina da una parte e perderla dall'altra. Compongono il fuso mitotico e sono la base di appoggio di chinesine (movimento anterogrado) e dineine (movimento retrogrado).

I **microfilamenti** sono formati da actina monoglobulare e danno sostegno alle cellule grazie alla sua organizzazione in fibre da stress, inoltre modificano la forma della cellula con lamellipodi e filopodi per aiutare il movimento.

I **filamenti intermedi** sono solo negli organismi pluricellulari e sono costituiti da molecole diverse a seconda della sua posizione nell'organismo (cheratine o neurofilamenti). Sono presenti sotto la membrana nucleare formando le 2 lamine nucleari che sostengono le membrane e danno forma al nucleo.

Matrice extracellulare Dona la forma alle cellule causando la morte cellulare nel caso si staccassero da questa. Può indurre segnali meccanici provocando rilassamento o contrazione dei filamenti d'actina nella cellula.

Membrana plasmatica Modello a mosaico fluido composto da proteine, fosfolipidi anfipatici e glicolipidi. Ogni membrana in base alla sua locazione ha una composizione diversa, anche le lunghezze dei singoli acidi grassi modifica la composizione, più sono lunghi più aa saranno necessari per comporre proteine transmembrana.

Trasporto

Il trasporto di sostanze più grandi richiede l'uso di vescicole le quali sono prodotte grazie all'associazione di filamenti di clatrina, una proteina che si unisce tra simili disponendosi a nido d'ape nella formazione delle vescicole. La clatrina è richiamata sulla membrana da — che si possono concentrare in un punto per ragioni differenti come un'elevata concentrazione di recettori nel lato esterno.

Sintesi proteica

Sintesi proteica e espressione genetica vengono modificate attraverso modifiche chimiche sugli istoni che vengono metilati e acetilati.

Nel caso della metilazione viene repressa l'espressione di un determinato gene, con la duplicazione del DNA la metilazione torna al suo stato originale interessando solo l'epigenetica e il fenotipo, mentre l'ereditarietà riguarda le mutazioni e le modifiche alla base del DNA.

L'acetilazione degli istoni aumenta la sintesi proteica, mentre la metilazione aumenta la condensazione in etero(?)cromatina. La metilazione avviene maggiormente fuori dalle CpG Island (zone concentrate di legami citosina-guanina), nel caso di cellule tumorali la metilazione avviene nelle CpG Island producendo fattori pro-oncogeni e impedendo una corretta modulazione del gene.

La sintesi proteica è regolata in particolare da miRNA, siRNA e altri sRNA, i miRNA si trovano nel sangue, latte materno e liquido cefalorachidiano. La SRP-RNA è una sequenza segnale che si appaia alle proteine per trasportare il ribosoma al RE.

Trascrizione

A monte del gene si trovano gli elementi distali di controllo della trascrizione composte da silencer e enhancer, mentre nei pressi del gene da trascrivere si trova il promotore e la TATA box (riconosciuta dalla RNA-polimerasi). Una proteina d'attivazione si lega all'enhancer che si lega al mediatore grazie ad un piegamento del segmento, il quale permette di formare un complesso di pre-inizio.

mRNA Una volta formato si circularizza a formare un complesso di ribosomi che traducono la stessa sequenza chiamata poliribosoma grazie a delle proteine che riconoscono cappuccio e coda del mRNA. Gli introni non codificanti vengono rimossi dallo **splicing** grazie agli spliceosomi composti(?) da snRNA che si occupa di riconoscere le estremità dell'introne dove tagliare per formare un cappio che viene rimosso. Lo splicing alternativo modifica la composizione degli esoni del mRNA producendo proteine diverse.

Traduzione

tRNA Il codone di stop è trasportato da un fattore di rilascio e non un tRNA idrolizzando il legame tra tRNA nel P e il polipeptide. Gli chaperone molecolari impediscono l'aggregazione tra catene polipeptidiche nel poliribosoma.