

Classificazione microrganismi

Saprofiti come miceti che decompongono materiale organico rendendolo disponibile alle piante.

Simbionti come microrganismi che risiedono nel rumine dei ruminanti, gli azotofissatori delle leguminose e i licheni sulle alghe fotosintetiche/cianobatterio.

Commensali come microbiota intestinale e possono essere opportunisti (candida).

Parassiti come Colera (vibrione flagellato).

Elminti come vermi e tenie.

Malattie infettive

L'**infezione** avviene principalmente sulle mucose del corpo (naso, bocca, ano, occhi).

L'**infestazione** è l'invasione in un organismo di parassiti e/o animali (pidocchi, elminti, scabbia).

Dose Infettante 50% (DI50) è la quantità di microrganismi infettanti necessari a infettare il 50% delle cavia.

DL50 è la quantità di microrganismi infettanti necessari a uccidere il 50% delle cavia.

Malattia di Lyme Causata da una spirocheta portata da una zecca che succhia il sangue dai cervi o roditori, solamente le femmine sono ematofaghe perché aiuta con la produzione di uova. Provoca eritemi e può aggravare con il tempo con artrite e carditi fino a demielinizzazione neuronale con AD o sclerosi multipla. Grazie al loro pungiglione le zecche usano un movimento rotatorio quindi devono essere rimosse con un movimento contrario, inoltre si deve evitare i disinfettanti perché causa il rigurgito della zecca.

Legionellosi Causata dalla Legionella pneumophila (gram- opportunist) ha un'incidenza maggiore negli anziani e si riproduce negli ambienti acquatici che risale attraverso tubature e aria condizionata dove forma biofilm, non ha trasmissione persona per persona. La Legionella previene il killing intracellulare lidendo il fagolisosoma dopo essersi riprodotta all'interno.

Un trattamento di antibiotici o chemio/radioterapici può causare una disbiosi intestinale portando a una rottura dell'equilibrio dell'ecosistema e favorendo lo sviluppo di candidosi.

Le peritoniti possono essere causate da un varco nell'intestino dovuto ad appendiciti che permette ai microrganismi intestinali a infiammare il peritoneo.

Le **zoonosi** possono fare un salto di specie diretto oppure usare un ospite intermedio

che entrando in contatto con un virus umano e di un'altra specie animale genera un virus ibrido. L'HIV è una zoonosi (spill-over) e nasce come virus delle scimmie.

La trasmissione di tubercolosi è dovuta all'epettorato e non semplice saliva, mentre altri microrganismi vengono trasmessi con **microgocce di Flugge**, le quali raggiungono dimensioni di 1-4 micron che gli permette di viaggiare in aria per molto tempo con al loro interno anche più di un solo microrganismo.

Il Treponema pallidum (sifilide) e la Neisseria gonorrhoeae (gonorrea) sono esclusivamente a trasmissione sessuale perché non sopravvivono facilmente all'esterno e usano il contatto tra mucose per trasmettersi.

L'infezione subclinica è un'infezione asintomatica come portatore sano.

Cellule M??

Microbiota

Arriva ad un peso complessivo di circa 2kg con un rapporto 10:1 rispetto alle cellule. Si trovano principalmente in cute, mucose e apparato digerente, in quest'ultimo prolifera nella bocca e nel colon piuttosto che nello stomaco dove si trovano solo lattobacilli e elicobacter pilori. Nella cute la distribuzione è concentrata nelle zone più umide.

Sono molto utili perché sintetizzano vitamina K e B, competono con microrganismi esterni e stimolano il sistema immunitario.

La composizione del microbiota è influenzato da età (sterili alla nascita e dopo un anno si stabilizza), dieta, ambiente e antibiotici (causando disbiosi).

Sulla cute troviamo lo stafilococco epidermidis (biofilm), nella bocca lo streptococcus mutans (carie).

Interferenza batterica Il microbiota occupa i recettori, concorre nell'uso di sostanze nutritive, produce batteriocine (collicine dai E.Coli) e abbassano pH.

Il **lactobacillus acidophilus** prolifera nell'ambiente vaginale producendo acido lattico dal glicogeno abbassando il pH e proteggendo la vagina.

Disbiosi Analisi su topi germ-free hanno evidenziato che l'assenza di microbiota porta una diminuzione di cellule staminali nell'intestino, vasi nei villi e del sistema immunitario, inoltre soffrono di stati di ansia e capacità relazionale ridotta (analizzato con dark light box), questo comportamento alterato si può ripristinare trapiantando microbiota fecale di una popolazione normale nei germ-free solo giovani. I batteri gram- bacteroides e i gram+ firmicutes sono in equilibrio per il fisiologico, mentre nelle persone obese aumenta per il 20% il numero di firmicutes che si occupano di liberare energia dagli alimenti.

Alcuni microrganismi producono acidi grassi a corta catena che hanno effetto anoressizzante nel cervello diminuendo la fame. Mentre l'iniezione di Campylobacter provoca stati d'ansia nei topi.

Probiotici Nei primi del '900 si è notata una vita longeva in coloro che avevano una dieta a prevalenza di yogurt e altri latticini che aiuta la proliferazione batterica e abbassa il pH impedendo lo sviluppo di batteri proteolitici (che producono fenoli e ammoniaca); da questo sono stati definiti i **probiotici** come microrganismi vivi che se assunti in adeguate quantità garantiscono benefici. I probiotici devono essere di origine umana e devono resistere ad acidità gastrica e bile per raggiungere la mucosa intestinale, tra questi lactobacillus, bifidobacterio, streptococcus e saccharomyces boulardii (l'unico lievito). Non devono essere presi in quantità eccessive e soprattutto non in condizioni di salute perché possono causare un disequilibrio intestinale. Similmente i **prebiotici** sono sostanze alimentari che aumentano l'attività e la crescita di specifici microrganismi.

Il **trapianto di feci** può essere usato per patologie acute agendo con molta efficacia ma per breve periodo rispetto all'uso di antibiotici, un attecchimento più elevato avviene nel caso il trapianto provenga da consanguinei che possiedono mucose simili.

Difese immunitarie

Psiconeuroendocrinoimmunologia Lo stato psicologico dell'individuo influenza il sistema immunitario grazie all'interconnessione con il sistema endocrino.

Fagociti professionali

La **fagocitosi** avviene tramite prolungamenti della membrana, gli pseudopodi, che permettono di portare all'interno l'estraneo e formare il fagosoma, quest'ultimo si fonde al lisosoma formando fagolisosoma dove viene digerito. Nel caso di tubercolosi e legionella il batterio inibisce il killing nei fagosomi e il soggetto è infettato latentemente finché non si abbassano le difese, momento in cui il batterio si replica e causa malattia.

Il **killing** avviene con meccanismi Ossigeno indipendenti (lisozima e protelatici), se il microrganismo sopravvive si usano quelli Ossigeno dipendenti che usano NADPH ossidasi per la produzione di anione superossido che è altamente citocida, chi è affetto da malattia granulomatosa cronica non presenta NADPH ossidasi. Alcuni batteri possiedono il superossido dismutasi che produce ossigeno e acqua ossigenata, per eliminare l'acqua ossigenata usano catalasi.

Per resistere alla fagocitosi può essere prodotta una capsula, si può uccidere il fagocita e resistere al fagosoma crescendo al suo interno.

I **polimorfonucleati** o neutrofili hanno un nucleo polilobato e sono i leucociti dominanti nel sangue, prendono energia dalla glicolisi anaerobia agendo in tessuti profondi dove c'è ipossia, sono ricchi di lisosomi e vivono circa 24h senza dividersi. Si occupano di microrganismi extracellulari piogeni (produttori di pus). I **macrofagi** originano dai monociti che circolano e raggiungono endoteli o con-

nettivi dove si differenziano, hanno una vita di 4/8gg se attivi o anche anni da inattivi e agiscono in condizione di aerobiosi. Si trovano soprattutto in fegato (Kupfer), polmone (elimina corpuscolati del fumo), encefalo (microglia), milza e linfonodi, rene. Colpiscono microrganismi intracellulari come salmonelle e legionelle.

La **difesa immediata** anatomica (cute e mucose) o chimiche (NK, fagociti e lisozima) non hanno memoria immunologica e si attivano in massimo 4h.

La **difesa innata** si basa sulla presenza di PAMP, profili molecolari associati al patogeno, che vengono riconosciuti dai recettori (PRR) di PMN, macrofagi e cellule dendritiche, è abbastanza veloce ma non ha memoria immunologica. I PRR o Toll-like receptors (TLR) sono proteine transmembrana che all'interno liberano un fattore di trascrizione (NF-κB) quando riconoscono PAMP o anche DAMP, segnali di stress endogeno come acido urico e ATP rilasciate per un danno ai tessuti; la cellula produce citochine (attivano infiammazione) e molecole costimolatorie nelle cellule fagocitiche presentanti antigene. Ogni TLR (13 in totale) ha una specificità abbastanza ridotta per strutture diverse: il TLR-4 agisce sui gram- (lipopolisaccaride), TLR-3 su RNA a doppia catena (virus), TLR-5 sui flagelli.

La **difesa adattiva** è molto più lenta ma attiva i linfociti B e T per la produzione di memoria immunologica.

Le cellule **natural killer** agiscono sui tumori avvicinandosi alla cellula e liberando perforine e granzimi che creano pori sulla membrana e inducono l'apoptosi. Possiedono sulla membrana recettori che legano l'MHC 1 (istocompatibilità) nelle cellule normali, se non è presente si attiva, i virus possono deprimere l'espressione di MHC 1.

Complemento Componenti proteici (da C1 a C9) del siero labili al calore che formano il MAC, complesso di attacco alla membrana formando pori nell'estremità. Le componenti sono prodotti da fegato, cervello, polmone.

L'attivazione per **via classica** (scoperta prima) avviene dopo la formazione dell'immunocomplesso che attiva il C1, questo scinde C4 e C2 in C4a-b e C2a-b, il C4b e il C2a si associano a formare C3 convertasi che scinde il C3 per far associare il C3b all'enzima, questo forma la C5 convertasi producendo C5b che si deposita sul microrganismo che attira C6,7,8 e molti C9 che portano alla lisi dell'estremità.

Nella **via alternativa** non è necessario l'immunocomplesso rientrando quindi nelle difese innate. Il C3b lega al Fattore B, quest'ultimo viene scisso dal Fattore D producendo C3b-Bb convertasi, un complesso instabile che si degrada se non sono presenti estranei, si stabilizza e attiva con componenti microbici riprendendo il percorso della via classica dalla formazione del C3 convertasi.

Tutti i componenti scissi non usati si solubilizzano nel siero come molecole **chemiotattiche** che guidano i PMN con chemiotassi sui microrganismi estranei.

Difesa immunitaria

La risposta immunitaria è specifica per i diversi antigeni presenti, sono così tanti i linfociti presenti diversi tra loro (10^{14}) che presentano recettori per antigeni presenti su microrganismi mai incontrati dall'individuo. La memoria è fondamentale perché rende più efficiente la risposta di un'infezione già avvenuta, inoltre si autolimita mettendo fine alla risposta dopo un po' di tempo ma non sempre avviene correttamente. Infine è in grado di discernere il self dal non self grazie alla tolleranza immunitaria, cosa che non avviene nelle autoimmuni.