

---

# Distribuzioni di probabilità per v.c. discrete

Paolo Sciattella

## Distribuzione Uniforme discreta

## Distribuzione Uniforme discreta

**Definizione:** una v.c. Uniforme discreta, indicata con  $X \sim Ud(a, s)$ , è una v.c. che può assumere solo i valori interi compresi in un certo intervallo. Sia  $s$  il numero dei possibili valori e  $a$  il più piccolo valore assumibile; la funzione di probabilità Uniforme è definita come:

$$P(x) = \frac{1}{s}$$

per  $x = \underbrace{a, a + 1, a + 2, \dots, a + s - 1}_{s \text{ - valori}}$

**Esempio:**  $s = 5, a = 2$ ;

I possibili valori di  $X \sim Ud(2, 5)$ , sono  $x = 2, 3, 4, 5, 6$

dove  $6 = a + s - 1 = 2 + 5 - 1$

## Distribuzione Uniforme discreta

Sono v. c. uniformi discrete le seguenti prove:

- **Lancio di un dado regolare**
  - Valori possibili: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  - $P(x) = \frac{1}{6}$
- **Estrazione di un numero al lotto**
  - Valori possibili: 1, 2, 3, ..., 90
  - $P(x) = \frac{1}{90}$

## Distribuzione Uniforme discreta

La media e la varianza di una v.c. Uniforme discreta sono date da:

$$E(x) = a + \frac{s-1}{2} \quad \text{e} \quad V(x) = \frac{s^2-1}{12}$$

Dimostrazione del valore atteso:

$$E(X) = \sum_{i=a}^{a+s-1} x_i P(x_i) = \frac{1}{s} \sum_{i=a}^{a+s-1} x_i$$

In generale, la somma dei primi  $s$  numeri interi è data da:

$$\sum_{i=1}^s x_i = \frac{s(s+1)}{2}$$

## Distribuzione Uniforme discreta

Nella formula generale della somma dei primi  $s$  elementi:

$$\sum_{i=1}^s x_i = \frac{s(s+1)}{2}$$

$a = 1$  e l'ultimo valore è pari a:  $a + s - 1 = s$

In generale, la formula della somma di  $s$  numeri interi consecutivi è:

$$\sum_{i=a}^{a+s-1} x_i = \frac{s(a + s - 1 + a)}{2} = \frac{s}{2} \cdot (2a + s - 1)$$

## Distribuzione Uniforme discreta

Quindi per dimostrare che  $E(X) = a + \frac{s-1}{2}$  utilizziamo le formule appena introdotte:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{i=a}^{a+s-1} x_i P(x_i) = \frac{1}{s} \sum_{i=a}^{a+s-1} x_i = \frac{1}{s} \cdot \frac{s}{2} \cdot (a + a + s - 1) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot (2a + s - 1) = \frac{2}{2}a + \frac{s-1}{2} = a + \frac{s-1}{2} \end{aligned}$$

## Distribuzione Uniforme discreta


**Esempio:** Consideriamo la prova consistente nell'estrazione casuale di una pallina da un'urna contenente 8 palline numerate, dal n. 1 al n. 8. La v. c. Uniforme  $X \sim N$  della pallina estratta, può assumere, con eguale probabilità, tutti i valori interi compresi tra 1 e 8.

Si ha quindi  $P(X) = 1/8$



## Distribuzione Uniforme discreta

**Esempio:** consideriamo la prova consistente nell'estrazione casuale di una pallina da un'urna contenente 8 palline numerate, dal n. 1 al n. 8. La funzione di probabilità è rappresentata nella figura seguente:



## Distribuzione Uniforme discreta

Il valore atteso di  $X$  è dato da:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{i=1}^8 x_i P(x_i) \\ &= \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 x_i = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8}{8} = \frac{8(8 + 1)/2}{8} = \frac{36}{8} = 4,5 \end{aligned}$$

Utilizzando la formula del valore atteso di  $X \sim Ud(a, s)$  con  $a = 1$  e  $s = 8$  si ottiene:

$$E(x) = a + \frac{s - 1}{2} = 1 + \frac{8 - 1}{2} = 1 + 3,5 = 4,5$$

## Distribuzione Uniforme discreta

La varianza di  $X$  è data da:

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$= \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 x_i^2 = \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 + 7^2 + 8^2}{8} - 4,5^2 = \frac{204}{8} - 20,25$$

$$= 25,5 - 20,25 = 5,25$$

Applicando la formula della varianza di  $X$  con  $a = 1$  e  $s = 8$  si ottiene:

$$V(X) = \frac{s^2 - 1}{12} = \frac{8^2 - 1}{12} = \frac{64 - 1}{12} = 5,25$$



## Distribuzione di Bernoulli

## Distribuzione di Bernoulli

- Consideriamo una prova nella quale ha interesse solo verificare se un certo evento si è o meno verificato.
- La v. c. generata da tale prova assumerà, per convenzione, il valore 1 se l'evento si è verificato e il valore 0 in caso contrario.
- Tale variabile casuale viene detta **v. c. di Bernoulli**.

## Distribuzione di Bernoulli

Tutte le prove che producono **solo due possibili risultati** generano v. c. di Bernoulli:

- il lancio di una moneta, il sesso di un nascituro, il superamento o meno di un esame universitario, il verificarsi di un “doppio 6” nel lancio di due dadi, la presenza/assenza di una certa caratteristica e così via.

## Distribuzione di Bernoulli

**Definizione:** Una variabile casuale di Bernoulli, indicata con  $X \sim \text{Bernoulli}(\pi)$ , può assumere il valore 1 con probabilità  $\pi$  e il valore 0 con probabilità  $1 - \pi$ ; la sua funzione di probabilità può essere espressa come:

$$P(X = x) = \pi^x \cdot (1 - \pi)^{1-x}$$

per  $x = 0, 1$

## Distribuzione di Bernoulli

La media e la varianza di una v.c. di Bernoulli sono date da:

$$E(x) = \pi \quad \text{e} \quad V(x) = \pi \cdot (1 - \pi)$$

Dimostrazione del valore atteso:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_i x_i P(x_i) = 1 \cdot P(1) + 0 \cdot P(0) = \\ &= 1 \cdot \pi + 0 \cdot (1 - \pi) = \pi \end{aligned}$$



## Distribuzione di Bernoulli

Dimostrazione della varianza:

$$\begin{aligned} V(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 = \sum_i x_i^2 P(x_i) - \pi^2 = \\ &= 1^2 \cdot \pi + 0^2 \cdot (1 - \pi) - \pi^2 = \pi - \pi^2 = \\ &\quad \pi \cdot (1 - \pi) \end{aligned}$$

## Distribuzione di Bernoulli: esempio

## Distribuzione di Bernoulli: esempio

- Un'azienda farmaceutica ha sviluppato un nuovo test rapido per diagnosticare una malattia.
- Il test ha una probabilità del 90% di identificare correttamente un paziente malato (positivo al test) e una probabilità del 10% di non identificare correttamente il paziente malato (falso negativo).

## Distribuzione di Bernoulli: esempio

Se selezioniamo casualmente un paziente **che sappiamo essere malato** e lo sottoponiamo al test, definiamo la variabile aleatoria  $X \sim \text{Bernoulli}(\pi)$ , come:

$$X = \begin{cases} 1 & \text{se il test rileva la malattia (vero positivo)} \\ 0 & \text{se il test non rileva la malattia (falso negativo)} \end{cases}$$

## Distribuzione di Bernoulli: esempio

Calcoliamo:

1. *la probabilità che il test dia un risultato positivo*
2. *la probabilità che dia un risultato negativo*
3. *il valore atteso  $E(X)$*
4. *La varianza  $V(X)$*

## Distribuzione di Bernoulli: esempio

Svolgimento:

**1. Qual è la probabilità che il test dia un risultato positivo?**

Sappiamo che il test ha una probabilità del 90% di identificare correttamente un paziente malato, quindi deduciamo che la probabilità che il test dia un risultato positivo  $\pi = 0,9$

**2. Qual è la probabilità che dia un risultato negativo?**

La probabilità che il test dia un risultato negativo è pari a

$$1 - \pi = 1 - 0,9 = 0,1$$

## Distribuzione di Bernoulli: esempio

### **3. Il valore atteso $E(X)$**

Il valore atteso  $E(X) = \pi = 0,9$

### **2. La varianza $V(X)$**

La varianza  $V(X) = \pi(1 - \pi) = 0,9 \cdot (1 - 0,9) =$   
 $= 0,9 \cdot 0,1 = 0,09$