


Cameroun

Agriculture et gestion de l'eau

Applications proposées pour Evergreen et EcoSorb



Maïs dans les collines de Boyo, Cameroun. Alangi Derick, CC BY-SA 4.0.

Le Cameroun réunit des bassins agricoles aux contraintes très différentes. Ce dossier propose de cibler les usages où une meilleure disponibilité de l'eau près des racines peut être mesurée et rémunérée : maraîchage, pépinières, plantations et cultures pluviales sélectionnées.

Données publiques, photographies locales et protocole de terrain

Édition française | 7 octobre 2026 | 18 pages

Document de travail pour producteurs, partenaires et responsables publics

LECTURE DÉCISIONNELLE

Une entrée ciblée sur le marché camerounais

Commencer par des exploitations capables de mesurer leur eau, leur récolte et leurs coûts. La preuve commerciale doit se construire sur une campagne complète, puis être confirmée dans un autre contexte agricole.

Repère	Valeur documentée	Lecture pratique
Valeur ajoutée agricole au sens large	18,5 % du PIB en 2024	Agriculture, sylviculture et pêche réunies ; indicateur Banque mondiale.
Diversité des milieux	5 zones agroécologiques	La sélection du site doit précéder celle du protocole.
Cacao commercialisé	247 914 tonnes en 2025/26	Baisse proche de 20 % sur un an selon l'ONCC.
Sécurité alimentaire	Plus de 2,8 millions de personnes	Projection CH phase 3 ou plus pour juin-août 2026, rapportée par la FAO en avril 2026.

Le maraîchage de contre-saison constitue une première piste : l'irrigation y est observable et les récoltes commercialisées permettent d'évaluer la qualité. Les pépinières offrent un deuxième terrain de démonstration, avec un suivi du nombre de plants survivants et des heures d'arrosage.

Pour le maïs, le sorgho et le soja, retenir d'abord des sites accessibles où les producteurs maîtrisent déjà le semis et la fertilisation. Sur les cultures de grande surface, le coût du produit et de sa localisation dans le sol devra être comparé au revenu additionnel effectivement encaissé.

Position proposée

Organiser une validation indépendante, facturer une solution complète et n'étendre la distribution qu'après une marge positive pour l'agriculteur. Aucun résultat camerounais propre à Evergreen ou EcoSorb n'est établi par les documents examinés.

TERRITOIRES ET CULTURES

Cinq milieux agricoles à traiter séparément

Zone	Territoires indicatifs	Applications à examiner
Soudano-sahélienne	Nord et Extrême-Nord	Oignon, maraîchage, maïs et sorgho sur sites accessibles.
Hautes savanes guinéennes	Adamaoua	Maïs, soja, plants et cultures fourragères pilotes.
Hauts plateaux de l'Ouest	Ouest et Nord-Ouest	Pomme de terre, légumes, maïs et pépinières.
Forêt à pluies monomodales	Littoral et Sud-Ouest	Pépinières, cultures de plantation, parcelles bien drainées.
Forêt à pluies bimodales	Centre, Sud et Est	Cacao, plantain, manioc et horticulture ciblée.




Maïs dans les collines de Boyo. Photographie de contexte, sans lien avec un essai Evergreen. Alangi Derick, CC BY-SA 4.0.

Le choix d'une zone ne suffit pas. Un sol sableux, un bas-fond argileux et une pente cultivée appellent des interventions différentes, même dans une même commune. La réserve utile, le drainage et l'accès à une eau de qualité guideront l'installation du premier essai.

Dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, l'accès sécurisé aux parcelles et la continuité du suivi doivent être vérifiés avant engagement. Les risques de conflit signalés par la FAO peuvent interrompre les travaux agricoles et fausser une comparaison de traitements.

EAU ET SAISONNALITÉ

La pluie annuelle ne décrit pas toute la contrainte



Repères climatiques publiés, sans données annuelles 2026 : Waza et Bénoué, Kimbi-Fungom, zone forestière bimodale. Les plages représentent une variabilité spatiale ; elles ne sont pas des intervalles de confiance.


Une pluie abondante sur l'année peut coexister avec une interruption d'arrosage au repiquage. Le suivi doit porter sur le moment où l'eau manque, la profondeur exploitée par les racines et le temps nécessaire à la remise en eau. Les précipitations utiles se distinguent du ruissellement et des pertes par drainage.

Situation rencontrée	Action à privilégier avant application
Sécheresse ou panne de pompage	Quantifier la réserve d'eau, sécuriser l'approvisionnement et enregistrer les apports.
Pluies intenses et engorgement	Rétablir le drainage, choisir des planches surélevées si nécessaire, éviter les sites asphyxiants.
Sol à faible réserve utile	Tester une application localisée et comparer avec le paillage et la pratique courante.
Eau chargée en sels	Mesurer la conductivité, puis tester l'absorption du produit avec cette eau réelle.

Un hydorrétenteur stocke une partie de l'eau reçue. Il n'en crée pas. La durée d'une rupture de pluie compatible avec la survie d'une culture devra être mesurée localement ; aucune autonomie fixe n'est annoncée dans ce dossier.

ÉCONOMIE ET ACHETEURS

Un secteur agricole à relier aux débouchés



Agriculture, sylviculture et pêche : part de la valeur ajoutée dans le PIB. Cette série mesure une part économique, pas le rendement des exploitations ni le seul secteur des cultures.

La hausse de la part agricole entre 2023 et 2024 ne permet pas, à elle seule, de conclure à une amélioration de la productivité. Les prix, la production et l'évolution des autres secteurs interviennent dans ce ratio. Pour un distributeur, la décision doit rester attachée à une parcelle et à un acheteur solvable.


La cible initiale proposée est une exploitation disposant d'un carnet de vente, d'une source d'eau identifiable et d'un responsable technique. Les coopératives peuvent mutualiser les mesures et l'achat, à condition que les parcelles témoins soient conservées et que les résultats de chaque site restent accessibles.

Segment	Valeur à démontrer	Condition commerciale
Maraîchers	Plus de produit commercialisable par m ³ d'irrigation	Débouché et prix net suivis à chaque récolte.
Pépinieristes	Réduction du coût par plant vendu	Reprise, qualité et durée en pépinière enregistrées.
Coopératives céréalières	Marge supplémentaire par hectare	Coût complet du produit et de l'application maîtrisé.

Le FIDA soutient les filières riz et oignon à travers le PADFA II. Cette présence institutionnelle peut orienter la prospection technique. Elle ne constitue ni un financement accordé à Green Solutions ni un partenariat existant.

CULTURES ANNUELLES

Maïs sorgho et soja sous surveillance hydrique



Répartition des surfaces de céréales et légumineuses en 2022. « Autres » est le complément calculé à 100 %. Les tubercules, le cacao et les autres cultures sont exclus de ce dénominateur.



Parcelle en polyculture au Cameroun. Loicebode, CC BY-SA 4.0. Illustration du contexte cultural ; aucune parcelle de démonstration Evergreen n'est représentée.

Pour le maïs, l'essai doit suivre la levée, la floraison et le remplissage des grains. La comparaison portera sur des surfaces récoltées identiques et une humidité du grain harmonisée. Une culture plus haute n'est pas, à elle seule, une preuve de rendement commercial.

Le sorgho mérite un protocole distinct : son calendrier et ses modes de culture ne se confondent pas avec ceux du maïs. Dans les systèmes de décrue ou de saison sèche, la profondeur des racines et l'humidité initiale du sol devront être décrites avant de choisir l'emplacement du produit.

Le soja peut compléter la sélection en Adamaoua si un opérateur garantit le suivi et le débouché. Conserver la variété, la densité et la fertilisation dans tous les traitements. Les résultats d'essais étrangers sur soja peuvent aider à formuler une hypothèse, sans fixer une dose camerounaise.

PRODUCTION À FORTE VALEUR

Maraîchage et pépinières pour une première preuve



Culture de légumes en contre-saison dans l'Extrême-Nord, avril 2025. HAMIDOU KAOU 6767, CC BY-SA 4.0. Photographie de contexte.

L'oignon et les légumes irrigués permettent de comparer la consommation d'eau avec la quantité vendable, récolte après récolte. Le premier objectif sera de préserver le calibre et la qualité tout en réduisant les apports, si l'état hydrique de la culture le permet.


Culture ou usage	Mesures de décision
Tomate et poivron	Eau appliquée, kg commercialisables, fruits déclassés, marge et état sanitaire.
Oignon	Poids commercial, calibre, pertes après stockage et coût d'irrigation.
Plants en pépinière	Survie, croissance homogène, fréquence d'arrosage et coût du plant vendu.

Séparer les essais de fertilisation des essais hydriques. Une réduction d'eau combinée à un changement d'engrais et de variété rendrait l'interprétation difficile. La pompe, les canalisations et les arroseurs seront contrôlés pour que les volumes comparés correspondent aux apports effectifs.

En pépinière, commencer à petite échelle avec des substrats identiques et un témoin permanent. Vérifier l'aération du mélange après gonflement. Une fréquence d'arrosage plus faible doit être décidée sur mesure, puis confirmée par la qualité du plant au moment de sa vente.

PÉRIMÈTRES ET GESTION DE L'EAU

Riz et irrigation avec une approche différenciée



Répartition historique des 25 654 hectares équipés pour l'irrigation, année 2000. Ce graphique éclaire la typologie documentée ; il ne mesure ni les surfaces actuelles ni les hectares réellement irrigués en 2026.

Les filières riz et oignon sont déjà concernées par le PADFA II dans le Nord, l'Extrême-Nord, l'Ouest et le Nord-Ouest. Pour un programme Evergreen, le riz doit être traité selon le système utilisé : pluvial, bas-fond aménagé ou irrigation avec maîtrise de l'eau.


Une rizière maintenue sous eau offre un contexte différent d'un maraîchage soumis à des ruptures d'irrigation. L'intérêt d'un produit de rétention y reste à démontrer. La priorité sera d'abord la mesure des débits, la qualité du nivellement et le pilotage des apports, avec l'opérateur du périmètre.

Système	Position proposée
Riz pluvial	Étudier les interruptions de pluie et l'établissement des plants, sur sol caractérisé.
Bas-fond ou riz irrigué	Ne pas engager de réduction d'eau sans protocole propre au système et accord technique local.
Canaux et distribution	Mesurer les pertes de transport séparément des volumes apportés à la parcelle.


Le programme devra actualiser l'inventaire des équipements dans ses seuls sites pilotes. Les statistiques historiques de la FAO ne peuvent servir à dimensionner un stock commercial national aujourd'hui.

CULTURES PÉRENNES

Le cacao pour les plants et la reprise en plantation



Production nationale de cacao commercialisée selon l'ONCC. La baisse 2025/26 ne peut être attribuée au seul climat à partir de cette série.



Plantation de cacao au Cameroun (Barada-nikto) et cabosses à Tayap (Eric Freyssinge). CC BY-SA 4.0. Photographies de contexte, sans lien avec les produits.

La piste la plus mesurable est celle des pépinières et de la reprise après plantation. Les plants peuvent être suivis individuellement ; le coût de remplacement et les interventions d'arrosage se calculent. La maturité d'une cacaoyère demande un suivi beaucoup plus long.

Proposer des lots comparables de plants, répartis entre témoin et traitement, avec le même ombrage et la même fertilisation. Après plantation, noter la mortalité et la croissance à dates fixes. Les pertes liées aux animaux, maladies ou accidents seront distinguées des symptômes de manque d'eau.

Sur plantation adulte, un essai ne doit pas annoncer une hausse rapide de production. La densité, l'âge des arbres, la taille, l'ombrage et la pression sanitaire influencent la récolte. L'application sera étudiée sans endommager les racines et sans ouverture de nouvelles parcelles forestières.

DIVERSIFICATION DES USAGES

Manioc plantain et fruits pour les marchés locaux



Champ d'ananas à Awaé, région du Centre. Franco237, CC BY-SA 4.0. Photographie de contexte agricole.

Les cultures vivrières et fruitières élargissent la prospection, à condition de retenir un problème précis. Pour le manioc, mesurer l'établissement des boutures, puis la récolte de racines. Pour le plantain, examiner la reprise et la régularité du développement sur des parcelles où le drainage est assuré.

Filière	Question à tester	Indicateur final
Manioc	La phase d'installation bénéficie-t-elle d'une meilleure humidité racinaire ?	Rendement racines et marge au terme du cycle.
Plantain	La reprise est-elle améliorée après plantation ?	Plants survivants et poids de régimes à maturité.
Ananas et fruitiers	L'irrigation d'appoint peut-elle être mieux utilisée ?	Qualité vendable et recette nette.

Une hausse de biomasse ou une reprise plus rapide sera suivie jusqu'au produit vendu. Les cycles longs exigent un engagement de suivi au-delà d'une saison ; sans cela, le coût initial pourrait être comparé à un bénéfice incomplet.

Le premier déploiement restera sur des parcelles cultivées et des sites de pépinière existants. La conservation des sols, la couverture végétale et l'entretien des ouvrages d'eau devront accompagner toute solution de rétention.

EVERGREEN ET ECOSORB

Positionner les produits sur un besoin mesurable

Les documents fournis présentent Evergreen et EcoSorb comme des hydrorétenteurs placés dans le sol au voisinage des racines. Le principe consiste à absorber de l'eau reçue, puis à en restituer une partie selon les conditions du milieu. La dose, la localisation et la qualité de l'eau modifient la réponse.

Point technique	Ce qu'il faut obtenir avant le pilote
Formulation et lot	Fiche technique, composition, granulométrie, numéro de lot et fiche de sécurité.
Absorption et restitution	Essai avec l'eau du site, sous contrainte de sol ; éviter de déduire une réserve utile du seul gonflement en eau pure.
Usage agricole	Dose et mode d'application écrits, compatibles avec la culture, le matériel et l'aération du sol.
Environnement et certification	Analyses des résidus, documentation de dégradation, certificat en cours et périmètre exact de tout label annoncé.
Conditions camerounaises	Classification du produit, exigences d'importation et de mise sur le marché à confirmer auprès des services compétents.

La présentation commerciale contient des annonces de fortes économies d'eau et de dégradation dans le sol. Le présent dossier ne les reprend pas comme des garanties. Aucun certificat Ecocert actuel ni dossier réglementaire camerounais propre au produit n'a été vérifié ici.


Les fertilisants, les solutions de traitement de l'eau et les autres produits de la gamme nécessitent des essais séparés. Leur cumul dans la première démonstration empêcherait de déterminer la contribution de chaque intervention.

Règle opérationnelle

Un produit, une eau, un sol et un protocole documentés. Le fabricant et l'agronome local valident ensemble la dose ; aucune posologie universelle n'est proposée.

DONNÉES FOURNIES PAR GREEN SOLUTIONS

Une démonstration internationale à lire avec méthode



Démonstration de la solution intégrée D.I.S. / Green Solutions en Turquie. Les résultats ne sont pas camerounais et ne mesurent pas l'effet isolé du seul hydrorétenteur.

Le rapport décrit quatre zones de récolte de 1 764 m² : un témoin et des traitements à 39, 51 et 74 kg/ha. Le produit était localisé sous la ligne de semis, avec un pilotage agronomique et une irrigation volontairement réduite. Le traitement à 74 kg/ha est retenu pour les deux graphiques.


Calcul à partir des valeurs du rapport	Résultat
Réduction de l'irrigation : $(864 - 528) / 864$	38,9 %
Hausse du rendement : $(12\ 060 - 10\ 300) / 10\ 300$	17,1 %
Rendement / volume d'irrigation du témoin	1,19 kg/m ³ , soit 10 300 / 8 640
Rendement / volume d'irrigation du traitement	2,28 kg/m ³ , soit 12 060 / 5 280

La conversion est de 10 m³/ha pour 1 mm d'eau. Ces ratios concernent l'irrigation appliquée ; ils n'intègrent pas toute la pluie ou l'évapotranspiration. Le résumé du rapport comporte un écart d'un facteur dix sur les valeurs absolues de productivité de l'eau, corrigé dans le tableau ci-dessus.

Une seule zone par modalité est décrite. Sans répétitions indépendantes ni analyse de variabilité exploitable ici, les différences ne constituent pas une garantie statistique transférable. Le Cameroun devra confirmer la réponse avec des parcelles répétées et un témoin permanent.

PREUVE SCIENTIFIQUE INDÉPENDANTE

La recherche soutient le principe et ses limites



Étude expérimentale publiée en 2022 : eau disponible dans un sol sableux, sans hydrogel et à 0,33 % en masse. Données de laboratoire ; les doses ne sont pas des recommandations à l'hectare.

Dans l'étude sur les propriétés du sol et le maïs, l'eau disponible passe de 15,7 à 23,4 % entre le témoin et le traitement à 0,33 %. Le protocole combine des mesures de laboratoire et un essai en pots sous serre. Il porte sur un hydrogel de polyacrylate de potassium, pas sur une démonstration camerounaise d'Evergreen.

Le passage d'un pourcentage massique de laboratoire à une application au champ exige de connaître la masse de sol réellement traitée. Une incorporation générale et une injection localisée ne sont donc pas interchangeables. Copier directement la concentration d'un pot conduirait à une prescription sans base locale.

Limite à prendre en compte	Conséquence pour le terrain
Texture et contrainte mécanique	Comparer la réponse du produit sous les sols réels, pas uniquement en eau libre.
Sels de l'eau et des engrais	Vérifier la capacité de rétention avec le mélange utilisé sur l'exploitation.
Durée et répétitions	Suivre la réponse sur plusieurs dates et confirmer sur une seconde campagne.

L'étude sur la salinité confirme que l'environnement ionique doit entrer dans l'évaluation. Les recherches examinées justifient un essai agronomique ciblé. Elles ne permettent pas d'annoncer un pourcentage uniforme d'économie d'eau, de rendement ou de durée de vie dans tous les sols.

PROTOCOLE PROPOSÉ

Un pilote camerounais conçu pour décider

Retenir deux sites contrastés mais accessibles : un site maraîcher irrigué et un site de maïs. Chaque site conserve sa propre analyse. Le pilote démarre après diagnostic du sol, contrôle de l'eau et validation de la dose avec le fabricant.

Modalité	Produit	Irrigation
A, pratique témoin	Sans hydorrétenteur	Pratique habituelle mesurée.
B, effet du produit	Dose locale validée	Même régime que le témoin.
C, contrainte hydrique	Sans hydorrétenteur	Réduction pilotée et définie avant essai.
D, solution combinée	Même dose que B	Même régime réduit que C.

Ce dispositif sépare la réponse au produit de la réponse à la réduction d'eau. Prévoir au moins quatre blocs par site, chacun contenant les quatre modalités dans un ordre tiré au sort : seize parcelles par site, soit trente-deux pour les deux sites. Ce minimum ne remplace pas un calcul de puissance adapté à la variabilité attendue.


Les zones d'irrigation seront indépendantes et les bordures exclues de la récolte mesurée. Conserver la même variété, la densité, la fertilisation et les traitements sanitaires à l'intérieur d'un site. Une application défectueuse ou un apport accidentel doit être enregistré, sans suppression discrète d'une parcelle.

À relever	Unité ou méthode
Eau et pluie	m ³ par parcelle et mm, avec dates et compteurs vérifiés.
Humidité et état de culture	Mesures à profondeurs définies, observations datées et photographies fixes.
Récolte et vente	kg, humidité du grain ou catégorie commerciale, prix net et déclassement.
Coûts	FCFA/ha pour produit, pose, énergie, travail, transport et suivi.

L'IRAD ou une équipe universitaire pourra être sollicité pour superviser la randomisation et l'analyse. Aucun partenariat n'est présumé. Publier les moyennes, la dispersion et les pertes de parcelles, puis renouveler la comparaison sur une deuxième campagne.

ÉCONOMIE À L'HECTARE

Le rendement doit payer le coût de la solution



Sensibilité de la marge supplémentaire à un gain de rendement et à un prix de vente hypothétiques. Rendement témoin supposé : 4 000 kg/ha ; économies d'irrigation : 30 000 FCFA/ha ; surcoût total : 120 000 FCFA/ha.

La décision se calcule sur la récolte vendable. Dans ce scénario, la marge supplémentaire est égale au revenu du rendement additionnel, augmenté de l'économie d'irrigation, puis diminué du coût complet de la solution. Les pertes et les déclassements devront être retranchés si le prix retenu ne les intègre pas.


Exemple avec un prix net de 150 FCFA/kg	Calcul par hectare
Gain de rendement nul	$0 + 30\,000 - 120\,000 = -90\,000$ FCFA
Gain de rendement de 10 %	$400\text{ kg} \times 150 + 30\,000 - 120\,000 = -30\,000$ FCFA
Gain de rendement de 15 %	$600\text{ kg} \times 150 + 30\,000 - 120\,000 = 0$ FCFA
Gain de rendement de 20 %	$800\text{ kg} \times 150 + 30\,000 - 120\,000 = +30\,000$ FCFA

Le seuil de couverture est ici de 600 kg additionnels, soit 15 % du rendement supposé. À prix différent, il change. Une baisse du volume pompé produit une économie financière seulement si l'énergie, le travail ou l'achat d'eau diminuent réellement.

Pour une culture pérenne, répartir les coûts sur la période observée et actualiser les flux si l'analyse couvre plusieurs années. Ne pas amortir le produit sur une durée annoncée sans mesure de son efficacité résiduelle dans le site concerné.

PROGRAMME PROPOSÉ SUR DOUZE MOIS

Du pilote à une distribution maîtrisée



Planning indicatif. Les mois devront être déplacés selon le calendrier local de pluie, la culture retenue et la disponibilité des sites ; les cultures pérennes exigent un suivi plus long.

Les deux premiers mois servent à choisir les exploitations, établir les coûts de référence et vérifier la conformité des produits. L'installation doit précéder la fenêtre de semis ou de repiquage. La distribution à plus grande échelle intervient après une analyse des résultats, puis une confirmation sur une autre campagne.

Acteur à mobiliser	Contribution proposée
Producteur ou coopérative	Accès au site, pratique témoin, eau et registre de récolte.
IRAD ou université	Protocole, observations et analyse indépendante, après accord.
Services du MINADER	Clarification des exigences applicables et relais technique local.
Opérateur ou distributeur	Traçabilité des lots, formation, stockage et service après application.
Filières cacao ou PADFA II	Échange technique exploratoire ; aucune affiliation revendiquée.

La décision de poursuite repose sur la marge, la qualité de la récolte et la possibilité de reproduire l'application. Un site sans bénéfice économique doit être documenté. Il peut conduire à modifier l'usage, à réduire le coût ou à renoncer à ce segment.

Prochaine action concrète

Identifier un opérateur maraîcher disposant de compteurs et un producteur de maïs acceptant des témoins. Faire valider les fiches de site avant de commander les lots du pilote.

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES

Sources et traçabilité des chiffres

[1] Banque mondiale, World Development Indicators

NV.AGR.TOTL.ZS, Cameroun, 2020-2024. API mise à jour le 13 juillet 2026. Valeurs : 17,50 ; 16,96 ; 16,55 ; 17,10 ; 18,46 %. Consulter la source.

[2] IRAD, Centres de recherche agricole

Cinq centres : Maroua, Wakwa, Bambui, Ekona et Mbalmayo. Site institutionnel. Consulter la source.

[3] ONCC, Bilan chiffré de la campagne cacaoyère 2025-2026

Production commercialisée, rubrique H et série sur six campagnes. PDF officiel consulté. Consulter la source.

[4] FAO, GIEWS Country Brief Cameroon

7 avril 2026. Calendrier cultural, conflits, prix et projection CH juin-août 2026. Consulter la source.

[5] Fonds pour l'adaptation et FIDA, Proposition Cameroun

AFB/PPRC.26.a-26.b/30, 15 juin 2020. Zones, climat et pluviométrie, pages PDF 33 et 38-44. Consulter la source.

[6] Frontiers in Sustainable Food Systems, recherche de terrain

Climate, agroecology, and farm returns, 2024. Section 4.1 : hauts plateaux et forêt bimodale. Consulter la source.

[7] FIDA, Projet PADFA II

Filières riz et oignon, quatre régions. Objectifs du projet et documents de supervision. Consulter la source.

[8] TASAI, Rapport Cameroun 2024

Évaluation du secteur semencier, publiée en novembre 2025, hébergée par le MINADER. Introduction, données de surface FAOSTAT 2022. Consulter la source.

[9] MINADER, fiches techniques des cultures

Documentation et fiches de production des filières prioritaires. Consulter la source.

[10] FAO AQUASTAT, irrigation au Cameroun

Surface équipée de 25 654 ha, référence 2000. Donnée historique, non actualisée dans ce dossier. Consulter la source.

[11] Evergreen et EcoSorb, présentation fournisseur

PRESENTATION EVERGREEN & ECOSORB fr.pdf, 40 pages, document fourni. Propriétés commerciales à vérifier pour le lot et l'usage local.

[12] Étude expérimentale sur hydrogel et maïs

Effect of hydrogel on corn growth, water use efficiency, and soil properties in a semi-arid region, 2022. Consulter la source.

[13] Étude expérimentale sur hydrogel et salinité

Hydrogel composed of potassium acrylate, acrylamide, and mineral as soil conditioner under saline conditions, 2022. Consulter la source.

[14] D.I.S. et Green Solutions, démonstration maïs

Rapport Maïs Turquie DIS Green Solutions.pdf, 17 pages, document fourni. Gözlü, TIGEM/Konya, campagne 2025.

CRÉDITS ET MÉTHODE


Photographies et conditions de lecture



Maïs dans les collines de Boyo
Alangi Derick | CC BY-SA 4.0
[Fichier original et attribution](#)




Légumes de contre-saison dans l'Extrême-Nord
HAMIDOU KAOU 6767 | CC BY-SA 4.0
[Fichier original et attribution](#)




Parcelle en polyculture au Cameroun
Loicebode | CC BY-SA 4.0
[Fichier original et attribution](#)



Ananas à Awaé
Franco237 | CC BY-SA 4.0
[Fichier original et attribution](#)



Plantation de cacao au Cameroun
Barada-nikto | CC BY-SA 4.0
[Fichier original et attribution](#)



Cabosses à Tayap
Eric Freyssinge | CC BY-SA 4.0
[Fichier original et attribution](#)

Les images sont reproduites sans modification visuelle, avec mise à l'échelle et proportions conservées. Elles illustrent les cultures et les territoires ; elles ne représentent pas des essais des produits. Les fichiers originaux restent accessibles par les liens ci-dessus.

Licence CC BY-SA 4.0 : attribution et conditions de réutilisation de chaque photographie concernée. Le texte du dossier reste distinct des licences des images.

Les graphiques ont été reconstruits à partir des valeurs identifiées dans leurs légendes. Les scénarios économiques et le calendrier sont des propositions, sans prévision de rendement. Les statistiques n'ont pas toutes la même année de référence ; aucune comparaison entre périodes différentes n'est présentée comme une preuve de causalité.