

# Égypte

## Agriculture et gestion de l'eau

Applications proposées pour Evergreen et EcoSorb



Paysage agricole et fluvial en Nubie, Égypte. Myousry6666, CC BY-SA 4.0.

Une agriculture irriguée, des terres sableuses et une eau dont la qualité varie selon les sites. Ce dossier propose une méthode de sélection des exploitations, de mesure des résultats et de déploiement commercial fondée sur la marge du producteur.

Données publiques, photographies locales et protocole de terrain

Édition française | 9 octobre 2026 | 18 pages

Pour producteurs, partenaires techniques et responsables publics

## LECTURE DÉCISIONNELLE

# Cibler les exploitations où le résultat se mesure

Le premier investissement doit financer une preuve agricole lisible : volumes d'irrigation, récolte vendable, coût complet. Une exploitation horticole équipée de compteurs offrira une démonstration plus solide qu'une vaste opération sans parcelles témoins.

| Repère                    | Valeur et période                     | Conséquence pour le projet                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Agriculture au sens large | 13,7 % du PIB, 2024                   | Agriculture, sylviculture et pêche : série Banque mondiale.                  |
| Prélèvements agricoles    | 79,2 % du total, 2022                 | Le champ constitue un lieu de mesure prioritaire.                            |
| Stress hydrique national  | 141,2 %, 2022                         | Indicateur FAO diffusé par la Banque mondiale ; pas une dose d'irrigation.   |
| Blé produit               | 10 millions de tonnes, prévision 2026 | Contexte de sécurité alimentaire ; pas une récolte définitivement constatée. |

L'entrée proposée associe un site horticole à sol léger et une pépinière ou un jeune verger. Le delta offre un contexte différent, où la qualité de l'eau et le drainage devront être évalués avant toute réduction des apports.

Un partenaire commercial devra pouvoir accompagner la pose, conserver un lot identifié et organiser les mesures pendant toute la campagne. La vente du seul sac de produit laisse au cultivateur la charge des décisions qui déterminent le résultat.

## Décision proposée

Valider EcoSorb avec l'eau et le sol de chaque exploitation. Aucun gain garanti, aucune réduction nationale de consommation et aucune performance égyptienne propre à ce produit ne sont établis dans ce dossier.

## CHOIX DES SITES

# Des territoires agricoles aux contraintes distinctes

| Territoire                   | Point à vérifier                                                   | Usage pilote proposé                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Delta du Nil                 | Texture, drainage, salinité et rotation d'accès à l'eau            | Légumes, pépinières et parcelles instrumentées. |
| Vallée du Nil                | Distribution de l'eau, chaleur et coût de pompage                  | Horticulture ou plants avec suivi d'irrigation. |
| Nouvelles terres désertiques | Faible réserve du sol, qualité du forage, uniformité des goutteurs | Tomate, agrumes ou jeunes vergers.              |
| Oasis et sites isolés        | Salinité, drainage, énergie et continuité d'approvisionnement      | Jeunes plantations après diagnostic.            |




Palmeraie de Siwa. Michael Hermann, CC BY-SA 4.0. Illustration du territoire, sans relation avec un essai EcoSorb.

La commune peut servir à organiser la prospection. La décision agronomique se prendra à la parcelle : profondeur racinaire, réserve utile, eau disponible et débouché. Deux exploitations voisines peuvent exiger des protocoles différents si elles ne pompent pas dans la même ressource.

Écarter, pour la première démonstration, les sites où plusieurs changements sont prévus simultanément. Une nouvelle variété, une nouvelle fertilisation et un nouvel amendement appliqués ensemble rendent l'origine du résultat difficile à identifier.

## EAU ET USAGES

# Près de quatre cinquièmes des prélèvements sont agricoles



Agriculture : 79,2 % ; autres usages réunis : 20,8 %. Le graphique décrit des prélèvements, et non la seule consommation nette de l'eau.

Le volume envoyé au champ doit être distingué de l'eau consommée par la culture. Une part peut rejoindre une nappe ou un drain et être réutilisée. Réduire le compteur d'une exploitation ne donne donc pas automatiquement une économie équivalente à l'échelle du bassin.

| Niveau de mesure  | Indicateur à retenir                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Parcelle          | m <sup>3</sup> apportés, kg commercialisables et kg/m <sup>3</sup> . |
| Exploitation      | Pompage, énergie, pertes de distribution et drainage.                |
| Périmètre irrigué | Retours d'eau et effet sur les autres usagers.                       |
| Programme public  | Bilan hydrologique validé avant annonce d'un volume économisé.       |


Le pilote proposé doit relever les compteurs avant et après chaque irrigation, avec une feuille de suivi signée. Un débit supposé multiplié par des heures de fonctionnement peut servir de contrôle secondaire, après étalonnage ; il ne remplace pas un compteur fiable.

#### Argument commercial à retenir

Présenter la variation mesurée des apports et de la production vendable. Réserver toute affirmation d'économie de ressource à un bilan qui tient compte des retours d'eau.

## STRESS HYDRIQUE

# Un indicateur national élevé, une décision toujours locale



Stress hydrique : environ 141,2 % en 2020, 2021 et 2022 dans l'extraction. Les données 2023 et 2024 sont manquantes ; aucune valeur 2026 n'est extrapolée.


Le ratio rapporte les prélèvements aux ressources renouvelables disponibles après prise en compte des besoins environnementaux. Un dépassement de 100 % signale une pression élevée selon cette définition. Il ne mesure ni la salinité d'un puits ni le nombre de jours entre deux irrigations.

Les valeurs identiques de cette courte série ne prouvent pas une stabilité récente des conditions de culture. Pour qualifier un prospect, demander le calendrier réel d'accès à l'eau, l'historique des pannes et le relevé des analyses. La contrainte vécue par le producteur peut changer sans apparaître dans un indicateur national.

| Question de qualification               | Pièce attendue                                             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Combien d'eau arrive effectivement ?    | Compte-rendu des apports ou relevés de compteur.           |
| À quel moment surviennent les manques ? | Journal de campagne, dates et stades culturaux.            |
| Quelle est la qualité de cette eau ?    | Analyse récente et contrôle à chaque changement de source. |
| Quel est le coût d'une irrigation ?     | Énergie, main-d'œuvre et entretien du réseau.              |

MARCHÉ ET REVENUS

# Une activité agricole à apprécier dans son contexte économique



Part de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche dans le PIB. 2024 : 13,7 %. Ce ratio ne correspond pas à la rentabilité des cultures.

La variation d’une part du PIB combine les changements de prix, de volumes et des autres secteurs. Elle ne permet pas de déduire un rendement ou un prix de vente. Le dossier commercial d’un producteur doit s’appuyer sur ses propres factures et ses quantités commercialisées.


| Acheteur à prospecter | Preuve attendue          | Condition de réussite                                   |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Maraîcher équipé      | Récolte vendable par m³  | Récoltes pesées et critères de qualité constants.       |
| Pépinieriste          | Plants vendables par lot | Suivi du rebut, de la survie et du travail.             |
| Jeune verger          | Reprise et croissance    | Parcelles comparables suivies au-delà de la plantation. |
| Distributeur agricole | Marge après assistance   | Stock, formation et traçabilité du lot.                 |

Le paiement d’un démonstrateur doit couvrir une prestation définie. Éviter une promesse générale de rendement : la valeur d’une solution tient au résultat encaissé par le client, après produit, application, mesures et coût de financement.

Source [1], NV.AGR.TOTL.ZS, extraction Banque mondiale du 9 octobre 2026, données 2019-2024.

## FILIÈRES ALIMENTAIRES

# Céréales : un besoin de production, une rentabilité à prouver



Blé produit : prévision 2026. Importations de blé et de maïs : besoins prévus en 2026/27 (juillet-juin). Production et importations ne doivent pas être additionnées comme un taux d'autosuffisance.

La FAO prévoit 10 millions de tonnes de blé en 2026, et des besoins d'importation de 13,5 millions de tonnes de blé et 15,5 millions de tonnes de maïs pour 2026/27. Ces estimations éclairent le marché ; elles ne démontrent aucun effet d'un hydorrétenteur.

| Culture          | Évaluation proposée                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Blé              | Eau apportée, rendement grain, qualité et coût total par hectare.                    |
| Maïs             | Production récoltée, débouché et réponse selon le stade de manque d'eau.             |
| Riz              | Protocole spécifique : ne pas transposer un résultat obtenu sur culture non inondée. |
| Grandes surfaces | Coût d'application mécanisée et marge additionnelle avant extension.                 |

Les céréales peuvent accueillir un deuxième cycle de validation. Pour démarrer, une culture à plus forte valeur par hectare rend souvent plus facile le financement des mesures. Ce choix est une recommandation de prospection, à confirmer avec les prix et les charges de l'exploitation.

## HORTICULTURE ET IRRIGATION

# Tomate et légumes : mesurer la récolte qui se vend

La tomate offre plusieurs récoltes et permet de suivre rapidement le poids vendable. Le protocole doit pourtant compter les fruits rejetés, les calibres et les prix de chaque cueillette. Un supplément de masse sans débouché ne rembourse pas le traitement.

| Étape           | Travail attendu                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Avant repiquage | Analyser eau et sol ; vérifier pression, débit et uniformité.               |
| Installation    | Localiser le produit selon une dose validée ; conserver un témoin.          |
| Suivi           | Enregistrer irrigation, fertilisation, croissance et incident par parcelle. |
| Récolte         | Peser par classe commerciale et suivre le prix net réellement obtenu.       |
| Décision        | Comparer marge, kg/m <sup>3</sup> et stabilité de la qualité.               |

Selon la méthode FAO, le besoin climatique de la culture repose sur  $ET_c = K_c \times ET_o$ . Le coefficient cultural varie avec le stade et doit être adapté aux conditions locales. Exemple pédagogique :  $ET_o$  de 6 mm/jour et  $K_c$  de 1 donnent  $ET_c$  de 6 mm/jour ; ce calcul n'est pas une observation climatique égyptienne.


## Conversion utile

1 mm sur 1 hectare représente 10 m<sup>3</sup>. Un apport brut de 6 mm correspond à 60 m<sup>3</sup>/ha, avant prise en compte de la pluie utile, de la réserve du sol, de l'efficacité et d'un éventuel besoin de lessivage.

Commencer une réduction d'apports après vérification de la reprise, puis surveiller les signes de stress. Le protocole doit prévoir une irrigation de secours enregistrée ; perdre une culture pour maintenir artificiellement une consigne invaliderait la démonstration.

## SALINITÉ ET INFILTRATION

# La qualité de l'eau précède le choix de la dose



Repères ECw : moins de 0,7 dS/m, restriction de salinité non signalée ; 0,7 à 3, restriction faible à modérée ; plus de 3, sévère. L'axe s'arrête à 5 pour la lecture, sans limite physique.

La conductivité mesure la charge saline globale. Elle ne décrit pas tous les risques. Le sodium, les chlorures, le bore et la combinaison ECw-SAR demandent une interprétation agronomique. ECw désigne l'eau ; ECe désigne l'extrait de pâte saturée du sol. Les deux ne sont pas interchangeables.

| Analyse                           | Usage dans le projet                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ECw et pH                         | Qualifier chaque ressource et contrôler les mélanges. |
| Sodium, calcium, magnésium et SAR | Examiner le risque d'infiltration et de sodicité.     |
| Chlorures et bore                 | Vérifier les contraintes liées à la culture choisie.  |
| ECe du sol et drainage            | Suivre l'accumulation de sels dans la zone racinaire. |


Tester le gonflement du produit avec l'eau réellement pompée et avec la solution de fertigation. Une capacité mesurée dans l'eau pure ne suffit pas à fixer une dose agricole. Répéter les mesures si le forage, la composition de l'engrais ou le mélange d'eaux change.

## Point d'arrêt

Si le site exige une remise en état du drainage ou une gestion des sels, résoudre ce problème avant de chercher à réduire l'irrigation. Un hydorétenteur ne dessale pas l'eau.

## CHOIX CULTURAL

# Toutes les cultures ne tolèrent pas les mêmes sels



Repères ECe : oignon 1,2 ; orange 1,7 ; tomate 2,5 ; blé 6,0 ; orge 8,0 dS/m. Variété, climat, conduite et méthode de mesure influencent la réponse réelle.

Le classement aide à choisir une culture pour une étude ; il ne garantit pas un rendement. Une orange et une céréale ne répondent pas de la même manière à un même extrait de sol. La variété, le porte-greffe et la distribution des sels autour du goutteur peuvent modifier la situation.

La réduction d'irrigation sera évaluée avec un suivi de l'ECe, sans supprimer l'eau de lessivage jugée nécessaire par l'agronome. Les apports conservés pour gérer les sels doivent figurer dans le bilan. Une économie apparente obtenue en repoussant un problème à la campagne suivante serait un mauvais résultat commercial.

| Situation                     | Conséquence pour le pilote                                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Eau peu saline, sol drainant  | Comparaison des apports et de la récolte avec surveillance du sol. |
| Salinité élevée ou fluctuante | Analyse détaillée, tests du produit et suivi renforcé.             |
| Drainage déficient            | Réhabilitation à traiter avant démonstration d'économie d'eau.     |

## ARBORICULTURE ET REPRISE

# Pépinières et jeunes vergers : compter les plants vendables



Cultures de palmiers dans le Sinaï (Mmelouk) et paysage du delta (LBM1948). CC BY-SA 4.0. Photographies indépendantes de Green Solutions.

La pépinière permet de comparer des lots homogènes. Mesurer le nombre de plants vendables, le temps d'arrosage et les volumes consommés ; conserver les plants morts dans le calcul. Un taux de survie présenté après exclusion des pertes masque le coût réel.


| Indicateur | Mesure proposée                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Reprise    | Plants vivants / plants initialement installés, à dates fixes.    |
| Qualité    | Critères définis avant essai : taille, état sanitaire et calibre. |
| Travail    | Temps d'arrosage et de manipulation, relevé par lot.              |
| Vergers    | Croissance, homogénéité et coût par arbre établi.                 |

Chez les agrumes et autres plantations, le diagnostic doit intégrer le porte-greffe, la profondeur du trou et l'emplacement des goutteurs. La dose issue d'un pot ne se transpose pas directement à un arbre. Vérifier le volume de sol traité et la place laissée au gonflement du matériau.

Pour les palmeraies, prévoir un suivi plus long que pour un légume annuel. Le premier objectif peut porter sur la reprise de jeunes sujets et la régularité d'arrosage. Une hausse de production fruitière exigerait une étude adaptée à l'âge des arbres et aux campagnes successives.

RECHERCHE ET NIVEAU DE PREUVE

# Une étude égyptienne utile, avec un périmètre précis



Sols de l'étude : eau disponible initiale de 21,40 %, 9,18 % et 13,10 %. Valeurs avant traitement ; ce graphique ne mesure pas un gain dû à l'hydrogel.

L'étude a été réalisée à Nagrig, dans le gouvernorat d'El-Gharbia, sur laitue en pots placés en plein air, durant 2022 et 2023. Elle compare trois textures, quatre niveaux d'irrigation et quatre concentrations d'hydrogel, avec 144 pots au total.

Les auteurs rapportent qu'une concentration de 0,3 % et une irrigation à 85 % des besoins ont donné la meilleure efficacité sans baisse significative du rendement dans les conditions examinées. Le matériau étudié n'est pas identifié ici comme EcoSorb. Cette publication justifie un essai local ; elle ne valide ni une dose commerciale ni une performance de ce produit.

| Niveau de preuve         | Ce que le dossier retient                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Publication indépendante | Une piste expérimentale liée à un matériau et des conditions déterminés. |
| Validation du produit    | Composition, absorption avec l'eau du site et dose à vérifier.           |
| Essai de plein champ     | Mesurer récolte, irrigation, sels et marge avec témoins.                 |
| Usage commercial         | Publier le résultat complet, y compris les sites sans bénéfice.          |

## PRODUIT, EAU ET SOL

# Préparer une application contrôlée d'EcoSorb

Le dossier technique du lot doit précéder l'installation. Obtenir sa composition, sa fiche de sécurité, les recommandations d'emploi et les résultats d'essais disponibles. Une référence à la famille des hydrogels ne permet pas de qualifier chaque formulation.

| Contrôle avant achat      | Résultat attendu                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification            | Fabricant, référence, numéro de lot, date et conditions de stockage.                |
| Compatibilité avec l'eau  | Comparaison de gonflement dans l'eau réelle et la solution fertilisante.            |
| Compatibilité avec le sol | Essai de mélange : infiltration, aération et humidité racinaire.                    |
| Dose et localisation      | Masse par plant ou zone traitée et profondeur documentées.                          |
| Conformité                | Documents requis pour importation et usage vérifiés avec les autorités compétentes. |

La littérature signale que la concentration en ions peut réduire le gonflement de certains hydrogels. Tester plusieurs cycles d'absorption et de restitution, avec une quantité connue de matériau. Le classement des doses devra s'appuyer sur les mesures obtenues plutôt que sur une capacité maximale annoncée dans l'eau pure.


Pour la première comparaison, garder une fertilisation identique dans les témoins et les parcelles traitées. Ecofert, Napema ou un traitement de l'eau peuvent faire l'objet d'un essai distinct. Les intégrer d'emblée empêcherait d'isoler l'apport d'EcoSorb.

## Document commercial

Toute certification ou admissibilité en agriculture biologique doit être rattachée à un produit précis et à un document valide. Ce dossier ne vaut ni homologation égyptienne ni certificat.

## PROTOCOLE DE PLEIN CHAMP

# Un essai qui distingue le produit du réglage d'irrigation



Quatre modalités : témoin et produit, chacune à 100 % et 85 % de la référence locale. La diminution des apports est un facteur expérimental ; le rendement reste à mesurer.


Installer les quatre modalités dans chaque bloc de terrain, avec au moins quatre blocs proposés pour démarrer. La taille des parcelles et le nombre de répétitions seront ajustés à la variabilité et à la puissance statistique attendue. Tirer au sort les traitements et prévoir des bordures.

| Condition         | Règle proposée                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Sol et plantation | Même variété, date, densité et fertilisation.                     |
| Irrigation        | Comptage séparé, réseau contrôlé et consigne locale explicite.    |
| Dose du produit   | Dose retenue après test ; masse et méthode de pose enregistrées.  |
| Incidents         | Panne, pluie, maladie ou secours notés sans retrait opportuniste. |
| Analyse           | Comparaison des effets produit, irrigation et interaction.        |

Une réduction de 15 % ne constitue pas l'objectif commercial imposé à toutes les cultures. Le responsable agronomique peut retenir un autre déficit ou reporter sa mise en place. La survie et la qualité de la culture restent des conditions du protocole, avec règles de secours définies avant semis.

## ÉCONOMIE DU PRODUCTEUR

# Le résultat doit payer le produit et son application



Hypothèses : 40 000 kg/ha vendables au témoin, charge additionnelle 24 000 EGP/ha, économies de charges 6 000 EGP/ha. Prix et gains varient sur le graphique ; aucune de ces valeurs n'est un devis.


Marge supplémentaire = récolte vendable additionnelle × prix net + charges évitées – charges nouvelles. Les kilogrammes rejetés ne sont pas valorisés au prix du premier choix. La main-d'œuvre, le matériel de pose et les mesures doivent être comptés, même lorsqu'ils sont subventionnés pendant le pilote.

Dans ce scénario, au prix net de 5 EGP/kg, le gain de récolte permettant de couvrir la charge nette de 18 000 EGP est de 9 %. Avec 10 % de gain, la marge supplémentaire atteint 2 000 EGP/ha. À rendement inchangé, elle reste négative de 18 000 EGP/ha.

| Variable à remplacer          | Source chez le producteur                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Prix net et qualité           | Factures de vente, commissions et transport déduits. |
| Récolte vendable de référence | Pesées de la parcelle témoin sur la campagne.        |
| Charges additionnelles        | Devis du produit, pose, mesures et financement.      |
| Charges évitées               | Énergie et travail réellement économisés.            |

## PROGRAMME ET PARTENAIRES

# Déployer après deux campagnes documentées



Programme indicatif de douze mois. Une plantation pérenne peut nécessiter un suivi plus long ; deux campagnes ne signifient pas deux récoltes fruitières.

| Intervenant                     | Responsabilité attendue                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Exploitant                      | Accès au terrain, conduite identique et transparence des ventes. |
| Agronome indépendant            | Protocole, vérification des mesures et analyse des résultats.    |
| Laboratoire                     | Analyses eau-sol, méthodes et unités comparables.                |
| Green Solutions et distributeur | Traçabilité, formation de pose, logistique et coût complet.      |

Le contrat du pilote précisera la propriété des données, les droits de publication et le traitement des échecs. Le cultivateur doit connaître les interventions prévues et les frais qui resteront à sa charge. Un organisme de recherche sera sollicité sans présenter son nom comme partenaire avant son accord.

## Passage à la distribution

Retenir les usages qui montrent une marge positive, une qualité préservée et une mesure d'eau reproductible. Préparer ensuite une fiche locale avec culture, sol, eau, dose, témoins et limites du résultat.

## SOURCES DOCUMENTAIRES

# Références et accès aux données

[1] Banque mondiale. Agriculture, sylviculture et pêche : valeur ajoutée (% du PIB), Égypte. NV.AGR.TOTL.ZS, 2019-2024.

[Consulter la source](#)

[2] Banque mondiale / FAO AQUASTAT. Prélèvements d'eau douce pour l'agriculture (% du total), ER.H2O.FWAG.ZS. Donnée 2022.

[Consulter la source](#)

[3] Banque mondiale / FAO AQUASTAT. Niveau de stress hydrique, ER.H2O.FWST.ZS. Données 2020-2022.

[Consulter la source](#)

[4] FAO GIEWS. Egypt Country Brief, 30 juin 2026 : prévisions de production et d'importation de céréales.

[Consulter la source](#)

[5] Banque mondiale. Egypt: Climate action can strengthen long-term growth, novembre 2022, présentation du CCDR.

[Consulter la source](#)

[6] Ayers et Westcot, FAO. Water Quality for Agriculture, Paper 29, chapitre 1, tableau 1 : qualité de l'eau d'irrigation.

[Consulter la source](#)

[7] FAO. Water Quality for Agriculture, chapitre 2, tableau 4 : tolérance des cultures à la salinité.

[Consulter la source](#)

[8] Allen et al., FAO. Crop Evapotranspiration, Paper 56, chapitre 6 : calcul de ETc à partir de ETo et Kc.

[Consulter la source](#)

[9] Abdelghafar et al. Effect of super absorbent hydrogel on hydro-physical properties of soil under deficit irrigation. Scientific Reports, 2024.

[Consulter la source](#)

[10] Hydrogel-Enabled Delivery Systems for Agricultural Resilience: Controlled Release, Soil Interactions and Performance Constraints: A Review. Gels, 2026, 12(9), 785.

[Consulter la source](#)

Les choix de segments, le protocole et les simulations économiques sont des propositions du présent dossier. Les graphiques de données publiques ne représentent aucun essai de Green Solutions. Les données manquantes ne sont pas remplacées par des estimations non documentées.



Paysage agricole et fluvial en Nubie, Égypte. Myousry6666, CC BY-SA 4.0. Illustration de contexte.

## IMAGES ET CONTACT

# Crédits photographiques et préparation du premier site

Agricultural Farmland (1).jpg

Myousry6666. Licence CC BY-SA 4.0. Redimensionnement et compression pour le document, sans modification du sujet. Fichier et métadonnées. Licence.

Agricultural Farmland (4).jpg

Myousry6666. Licence CC BY-SA 4.0. Redimensionnement et compression pour le document, sans modification du sujet. Fichier et métadonnées. Licence.

Siwa date palm orchards 01.JPG

Michael Hermann. Licence CC BY-SA 4.0. Redimensionnement et compression pour le document, sans modification du sujet. Fichier et métadonnées. Licence.

Sinai palm dates farming.jpg

Mmelouk. Licence CC BY-SA 4.0. Redimensionnement et compression pour le document, sans modification du sujet. Fichier et métadonnées. Licence.

Delta del Nilo 1999 11.jpg

LBM1948. Licence CC BY-SA 4.0. Redimensionnement et compression pour le document, sans modification du sujet. Fichier et métadonnées. Licence.

Transmettre, pour sélectionner le premier démonstrateur, la localisation de l'exploitation, la culture, la texture du sol, une analyse de l'eau et le calendrier de campagne. Joindre le système d'irrigation, les volumes habituels, les ventes et les charges de pompage.

| Document de départ                        | Utilité                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Analyse eau-sol et plan des parcelles     | Qualifier le terrain et organiser les témoins. |
| Relevés d'irrigation et factures de vente | Fixer une référence économique vérifiable.     |
| Fiche du produit et devis                 | Évaluer une dose et un coût complet.           |

Green Solutions Groupe AIM SA

46, route de la Condémine, 1475 Forel, Suisse

contact@green-solutions-group.com

Une parcelle témoin, un compteur fiable et un carnet de récolte peuvent constituer le point de départ du premier partenariat égyptien.