



RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR



Antananarivo · 2026

Riz des Hautes Terres, cultures vivrières du Grand Sud et filières de valeur exposées à des chocs climatiques très contrastés. Ce que la rétention d'eau change quand la moyenne nationale masque les crises locales.

EVERGREEN® · ECOSORB® · WATER VITAL® · ECOFERT® · NAPEMA®



Une agriculture pluviale, vitale et très exposée

31,2 M

d'habitants

1,7 M

de personnes en forte insécurité
alimentaire aiguë

11,3 %

de stress hydrique national en
2022

≈ 40 %

des enfants touchés par la
malnutrition chronique

Le stress hydrique national reste inférieur aux seuils élevés, mais cette moyenne ne décrit ni les sécheresses récurrentes du Sud, ni les déficits saisonniers, ni la dépendance d'une grande partie des exploitations aux pluies. Les chiffres alimentaires sont ceux du Programme alimentaire mondial ; l'indicateur d'eau vient de la Banque mondiale et de FAO AQUASTAT.


Trop peu d'eau au Sud, parfois trop d'eau à l'Est

- Le Sud est régulièrement touché par la sécheresse, tandis que le Sud-Est subit cyclones et inondations récurrents : le même pays doit gérer le manque et l'excès d'eau.
- Une grande part de la production dépend directement de la pluie ; une rupture au semis ou à la floraison devient rapidement une perte de récolte.
- Sur les Hautes Terres, les rizières retiennent l'eau mais les cultures de contre-saison et les pépinières restent exposées aux tours d'eau irréguliers.
- Dans le Grand Sud, sols pauvres, vent et évaporation réduisent la réserve utile autour des racines.
- L'enjeu n'est pas de remplacer l'irrigation : il est de sécuriser la zone racinaire et de mesurer l'effet sur une parcelle témoin conduite à l'identique.



Travail du sol dans une exploitation malgache

La pression augmente, mais le risque se lit localement




Deux indicateurs, pas un raccourci

À l'échelle mondiale, le nombre et la durée des sécheresses ont augmenté de 29 % depuis 2000 par rapport aux deux décennies précédentes.

Le stress hydrique mesure autre chose : les prélèvements rapportés aux ressources renouvelables disponibles après les besoins environnementaux. Ce signal mondial n'est donc pas une prévision nationale ; il doit être confronté aux pluies, aux nappes, aux saisons et aux usages locaux.

Une moyenne nationale basse peut cacher un risque local fort



Ce que cela implique

L'indicateur ODD 6.4.2 place Madagascar sous 25 % au niveau national. Il ne mesure toutefois ni la répartition géographique, ni la saison, ni une sécheresse météorologique.

Les essais doivent donc être ciblés par bassin, culture et calendrier, en priorité là où les racines manquent réellement d'eau.

La résilience agricole est un enjeu économique immédiat

31,2 M

d'habitants

1,7 M

de personnes en forte insécurité
alimentaire aiguë

102 000

petits producteurs accompagnés
par le PAM

57

sites communautaires
nutritionnels soutenus par le
PAM

Le Programme alimentaire mondial relie l'insécurité alimentaire à la dépendance aux pluies, à la faible diversification et à l'intensification des chocs climatiques. L'opportunité commerciale doit donc être construite avec un protocole abordable et une preuve économique locale.

Riz : sécuriser les stades sensibles, pas promettre l'impossible

- Le riz structure les paysages, l'alimentation et le revenu de nombreuses exploitations des Hautes Terres.
- L'hydro-rétention n'a pas vocation à remplacer la submersion d'une rizière correctement alimentée.
- Les cibles pertinentes sont les pépinières, le repiquage, les bordures drainantes et les cultures de contre-saison.
- Le protocole doit séparer survie des plants, fréquence d'arrosage, rendement et coût de main-d'œuvre.
- Une belle parcelle ne suffit pas : seule la comparaison avec un témoin permet de conclure.



Grand Sud : protéger la levée et la réserve racinaire



- Maïs, manioc et légumineuses subissent les pauses de pluie et des sols à faible réserve utile.
- Le premier objectif d'essai est la régularité de levée et la survie jusqu'à l'enracinement.
- EVERGREEN® ou ECOSORB® sont évalués avec WATER VITAL®, ECOFERT® et NAPEMA® seulement si le diagnostic le justifie.
- La synergie attendue doit être décomposée : eau, nutrition, protection sanitaire et coût total.
- Le prix et la rentabilité restent des champs ouverts, à compléter avec les équipes et les producteurs.

Une combinaison à tester, pas une promesse isolée

EVERGREEN® / ECOSORB® — retenir près des racines

- Hydro-rétenteur à base de potassium placé dans la zone racinaire au semis, à la plantation ou au repiquage.
- Capte une partie de la pluie ou de l'irrigation et la restitue progressivement pendant les intervalles secs.
- WATER VITAL® intervient sur la qualité et la disponibilité de l'eau lorsque l'analyse du site le justifie.
- Le protocole compare toujours une parcelle traitée et une parcelle témoin conduites avec la même eau et le même calendrier.

ECOFERT® / NAPEMA® — nourrir et protéger

- ECOFERT® apporte une nutrition en microdose, sans présenter l'effet de l'hydro-rétenteur comme un substitut à la fertilité.
- NAPEMA® complète le dispositif lorsque ravageurs ou maladies limitent le potentiel de la culture.
- L'intérêt recherché est synergique : eau disponible, nutrition adaptée et protection cohérente au même stade cultural.
- Le rendement, la consommation d'eau et la marge sont mesurés séparément avant toute généralisation.

Le choix des produits et leur dosage restent conditionnés par l'analyse de sol, la qualité de l'eau, la culture et un essai local. Aucun gain de rendement ou d'économie n'est garanti avant mesure sur le terrain.

Protéger les cultures, fixer les sols

NAPEMA® — protéger sans résidu

- Lutte contre maladies, parasites, champignons et ravageurs, sans molécule de synthèse.
- Pulvérisation foliaire et racinaire, à effet préventif comme curatif.
- Aucun résidu dans le sol, la plante ou l'air : pollinisateurs et auxiliaires préservés.
- Formulé sur mesure pour un problème précis : cochenille, HLB des agrumes, nématodes.

Paulownia ALTIFOLIA® — l'arbre des régions chaudes

- 13 à 15 m en six à huit ans, avec un tronc de gros diamètre.
- Associé à 100 g d'EVERGREEN® par plant, l'irrigation nécessaire diminue de 50 %.
- Résiste de -25 °C à +45 °C ; son bois ne s'enflamme qu'à partir de 426 °C.
- Brise-vent, protection des sols contre l'érosion, 400 à 700 kg de miel par hectare.

Plants livrés en pot (25 à 30 cm), certifiés indemnes de maladies et remplacés sous garantie en cas de perte. Première coupe à la fin de la sixième année, bois valorisé autour de 400 à 450 € le m³.

Où engager les premiers essais comparatifs



Hautes Terres

Riz et contre-saison

- Rizières en terrasses autour d'Antananarivo et d'Antsirabe.
- Cibler pépinières, repiquage et cultures de contre-saison plutôt que promettre un gain sur riz submergé.
- Mesurer reprise, fréquence des tours d'eau et rendement marchand.



Grand Sud

Maïs, manioc, légumineuses

- Sécheresses récurrentes et forte dépendance à une saison des pluies courte.
- Priorité à la levée et à l'enracinement, avec témoin et suivi de l'humidité du sol.
- Associer l'essai à une conduite réaliste pour les petits producteurs.



Nord-Est et SAVA

Vanille et cultures de valeur

- Forte valeur à l'hectare, mais alternance d'excès d'eau, d'érosion et de périodes sèches.
- Tester sur jeunes plants et pépinières, là où une perte de plant coûte le plus.
- Intégrer drainage, ombrage et protection sanitaire au protocole.

Un essai local, mesuré avant toute extension

1

Diagnostic

Sol, eau, pluie, culture et pratiques de la parcelle sont documentés.

2

Témoin

Une parcelle traitée et une parcelle témoin sont conduites à l'identique.

3

Mesure

Humidité, reprise, eau apportée, rendement marchand et coûts sont relevés.

4

Décision

La solution n'est étendue que si l'écart technique et économique est net.

Le prix produit, la main-d'œuvre, l'eau et la valeur de la récolte restent des champs de calcul ouverts jusqu'à validation par les équipes locales.

Un partenaire local pour Madagascar

1

Distribution

Exclusivité territoriale et stock de lancement pour la première saison commerciale.

2

Formation

Formation technique des équipes, protocoles de dosage et mises à jour à chaque saison.

3

Essais conjoints

Parcelles de démonstration avec témoin, résultats partagés avec les producteurs.

4

Institutions

Dialogue avec le ministère de l'Agriculture et les programmes de sécurité alimentaire.

Le cadre s'adapte au territoire : un importateur, un distributeur d'intrants ou un groupement de producteurs peut porter le partenariat.

Risques identifiés et réponses

Risques

- Résultats très variables entre Hautes Terres, côte humide et Grand Sud.
- Confusion possible entre sécheresse, manque d'irrigation et stress hydrique national.
- Coût d'accès aux parcelles, petites superficies et suivi de mesure irrégulier.
- Pression cyclonique et excès d'eau dans l'Est, où la rétention n'est pas toujours la priorité.

Nos réponses

- Segmenter les essais par bassin, sol et culture, sans extrapoler une moyenne nationale.
- Mesurer l'humidité, l'eau réellement apportée et la récolte commercialisable.
- Travailler avec une organisation locale capable de tenir le protocole jusqu'à la récolte.
- Exclure les parcelles mal drainées et adapter la combinaison de solutions au diagnostic.

Les éléments réglementaires, certificats et fiches techniques doivent être revus avec l'importateur et les autorités malgaches avant commercialisation.

Sources et hypothèses de travail

Sources principales

- Programme alimentaire mondial, page pays Madagascar : population, insécurité alimentaire, chocs climatiques et actions de résilience.
- Banque mondiale, World Development Indicators, ER.H2O.FWST.ZS : stress hydrique à Madagascar, 2022.
- FAO AQUASTAT et ONU-Eau : indicateur ODD 6.4.2 et limites d'interprétation à l'échelle nationale.
- UNCCD, Drought in Numbers 2022 : nombre et durée des sécheresses, +29 % depuis 2000 par rapport à 1980-1999.

Hypothèses de travail

- Les chiffres sont des ordres de grandeur arrondis, tirés des dernières données publiques disponibles.
- Les gains d'eau et de rendement sont indicatifs et varient selon le sol, le climat et la culture.
- Document de travail commercial : chiffres à actualiser avant toute soumission officielle.

Rapports d'essais, certificats (SOHISCERT, analyses Polymex et SGS) et fiches techniques : disponibles sur demande.

Zigomar (CC BY-SA 3.0), Cactus0625 (CC BY-SA 4.0), Rod Waddington (CC BY-SA 2.0) — via Wikimedia Commons.

Choisissons une parcelle pilote

Culture, type de sol, calendrier des pluies, accès à l'eau, coût de l'irrigation et prix de vente. À partir de ces données, nous préparons un protocole simple avec témoin, critères de réussite et budget à compléter par l'équipe locale.

Une première étude n'engage pas à un déploiement.

contact@evergreen-ecosorb.com • Green Solutions Groupe AIM SA, 46, route de la Condémine, 1475 Forel, Suisse

