

Análisis Espectral del Operador Multiplicación en Espacios de Sobolev

1. Preliminares y Definiciones Geométricas

Consideramos el espacio de polinomios $\mathbb{P}[z]$ equipado con el siguiente producto interno de Sobolev discreto:

$$\langle p, q \rangle_S = \int_{S_R} p(z) \overline{q(z)} d\mu(z) + \sum_{k=1}^N p'(c_k) \overline{q'(c_k)}, \quad (1)$$

donde μ es la medida de Lebesgue soportada en la circunferencia $S_R = \{z \in \mathbb{C} : |z| = R\}$ y $\mathcal{A} = \{c_1, \dots, c_N\} \subset \mathbb{C}$ es el conjunto finito de puntos en las derivadas.

Definición 1 (Espacio de Hilbert Sobolev). Denotamos por $\mathcal{H}$ a la completación del espacio de polinomios $\mathbb{P}[z]$ respecto a la norma inducida $\|p\|_S = \sqrt{\langle p, p \rangle_S}$. Es decir, $\mathcal{H} = \overline{\mathbb{P}[z]}^{\|\cdot\|_S}$.

Para estudiar el operador de multiplicación sobre subespacios definidos mediante condiciones de anulación en los puntos, es necesario distinguir entre la estructura algebraica del espacio de polinomios y la topología del espacio de Hilbert. A tal efecto, se definen las evaluaciones puntuales en el espacio de polinomios y se considera su clausura topológica, siguiendo la metodología estándar en el análisis de operadores no acotados.

Definición 2 (Funcionales de Evaluación Algebraicos). Para cualquier $\xi \in \mathbb{C}$, definimos el funcional de evaluación lineal sobre el espacio de polinomios $\delta_\xi : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{C}$ como $\delta_\xi(p) = p(\xi)$. Análogamente, definimos la evaluación de la derivada como $\delta'_\xi(p) = p'(\xi)$.

Basándonos en la geometría de los puntos respecto al soporte continuo, clasificamos el conjunto de índices $\mathcal{I} = \{1, \dots, N\}$ en dos categorías:

- **Puntos Interiores** (I_{in}): $\{k \in \mathcal{I} : |c_k| < R\}$.
- **Puntos Exteriores** (I_{out}): $\{k \in \mathcal{I} : |c_k| \geq R\}$. Sea $m = |I_{out}|$.

Proposición 1 (Acotación y Extensión Continua en el Interior). *Para los puntos interiores ($k \in I_{in}$), el funcional de evaluación δ_{c_k} es continuo respecto a la norma de Sobolev $\|\cdot\|_S$. En consecuencia, puede extenderse de forma única a un funcional lineal acotado en todo el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$, y su núcleo es un subespacio cerrado.*

Demostración. Para cualquier polinomio $p \in \mathbb{P}[z]$ y un punto c_k con $|c_k| < R$, podemos aplicar la Fórmula Integral de Cauchy sobre la circunferencia S_R :

$$p(c_k) = \frac{1}{2\pi i} \int_{S_R} \frac{p(z)}{z - c_k} dz.$$

Tomando valores absolutos y aplicando la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$|p(c_k)|^2 \leq \left(\frac{1}{2\pi} \int_{S_R} \frac{1}{|z - c_k|^2} |dz| \right) \left(\int_{S_R} |p(z)|^2 |dz| \right).$$

Puesto que $|c_k| < R$, la distancia al borde de la circunferencia está estrictamente acotada por abajo, luego la primera integral es una constante finita $M_{c_k} > 0$. Además, la segunda integral está dominada por la parte continua de la norma de Sobolev (salvo una constante de proporcionalidad dependiente de la medida de Lebesgue). Por tanto:

$$|p(c_k)|^2 \leq \tilde{M}_{c_k} \|p\|_{L^2(\mu)}^2 \leq \tilde{M}_{c_k} \|p\|_S^2.$$

Esto demuestra que el funcional está acotado en $\mathbb{P}[z]$. Por el Teorema de Extensión de Operadores Lineales Acotados en espacios densos [9], el funcional se extiende de manera continua y única a todo $\mathcal{H}$. Al ser continuo, su núcleo es la preimagen de un conjunto cerrado (el $\{0\}$), por lo que es un subespacio cerrado. $\square$

Lema 1 (Continuidad del funcional derivada para puntos ABPE). *Sea μ la medida de Lebesgue (o una medida que satisfaga la condición de Szegő) soportada en la circunferencia $\mathbb{T}_R = \{z \in \mathbb{C} : |z| = R\}$. Si $c \in \mathbb{C}$ es un punto de evaluación acotada (BPE) para la norma $L^2(\mu)$, y se encuentra en el interior de la curva ($|c| < R$), entonces c es un punto de Evaluación Analítica Acotada (ABPE). En consecuencia, el funcional evaluación de la derivada, $\delta'_c(p) = p'(c)$, es un funcional lineal continuo.*

Demostración. Al ser c un punto BPE situado en el interior de la región acotada por el soporte de la medida, la teoría clásica de espacios de Hardy y polinomios ortogonales garantiza que c es, de hecho, un punto ABPE. Esto implica que existe un entorno abierto $\mathcal{U}$ de c contenido en el disco $|z| < R$ donde la evaluación puntual es uniformemente acotada.

Sea $r > 0$ suficientemente pequeño tal que la circunferencia cerrada $\gamma_r = \{z \in \mathbb{C} : |z - c| = r\}$ esté contenida en $\mathcal{U}$. Dado que los polinomios son funciones enteras, podemos aplicar la Fórmula Integral de Cauchy para la derivada:

$$p'(c) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_r} \frac{p(z)}{(z - c)^2} dz$$

Tomando valor absoluto y acotando la integral por el máximo de la función en la curva:

$$|p'(c)| \leq \frac{1}{2\pi} (2\pi r) \frac{\max_{z \in \gamma_r} |p(z)|}{r^2} = \frac{1}{r} \max_{z \in \gamma_r} |p(z)|$$

Como todos los puntos $z \in \gamma_r$ son BPEs, existe una constante $M > 0$ tal que $|p(z)| \leq M\|p\|_{L^2(\mu)}$ para todo $z \in \gamma_r$. Sustituyendo esta cota obtenemos:

$$|p'(c)| \leq \frac{M}{r} \|p\|_{L^2(\mu)} \leq \frac{M}{r} \|p\|_S$$

Lo que demuestra que existe una constante $C = M/r < \infty$ tal que $|\delta'_c(p)| \leq C\|p\|_S$, probando así que la evaluación de la derivada es un funcional lineal continuo. $\square$

Definición 3 (Subespacio Estable V). Definimos el subespacio estable algebraico V_0 como el conjunto de polinomios que se anulan en los puntos exteriores:

$$V_0 = \{p \in \mathbb{P}[z] : p(c_k) = 0, \forall k \in I_{out}\}. \quad (2)$$

El subespacio estable $V \subset \mathcal{H}$ se define como la clausura topológica de V_0 respecto a la norma de Sobolev: $V = \overline{V_0}^{\|\cdot\|_S}$.

Definición 4 (Subespacio Totalmente Restringido V'). Definimos el subespacio algebraico V'_0 imponiendo restricciones nulas en la totalidad de los puntos:

$$V'_0 = \{p \in \mathbb{P}[z] : p(c_k) = 0, \forall k \in \{1, \dots, N\}\}. \quad (3)$$

Y definimos el subespacio de Hilbert correspondiente como su clausura: $V' = \overline{V'_0}^{\|\cdot\|_S}$.

Definición 5 (Codimensión). Sea M un subespacio vectorial de un espacio de Banach X . La codimensión de M en X , denotada por $\text{codim}(M)$, se define como la dimensión algebraica del espacio vectorial cociente X/M :

$$\text{codim}(M) = \dim(X/M).$$

En el caso particular de que X sea un espacio de Hilbert y M sea un subespacio cerrado, esta definición coincide con la dimensión del complemento ortogonal $M^\perp$ [8].

Dado que nuestra medida μ es la medida de Lebesgue en la circunferencia unidad S_1 , la componente continua de nuestro espacio de Sobolev está ligada al espacio de Hardy[5].

Definición 6 (Espacio de Hardy $H^2(\mathbb{D})$). El espacio de Hardy $H^2(\mathbb{D})$ se define como el espacio de funciones holomorfas f en el disco unidad abierto $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ tales que sus medias cuadráticas sobre circunferencias concéntricas permanecen acotadas:

$$\sup_{0 \leq r < 1} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta < \infty.$$

Existe un isomorfismo isométrico natural entre $H^2(\mathbb{D})$ y el subespacio cerrado de $L^2(S_1)$ formado por funciones cuyos coeficientes de Fourier de índice negativo son nulos. En nuestro contexto de aproximación polinómica, podemos caracterizar H^2 de manera equivalente como la clausura del espacio de polinomios $\mathbb{P}[z]$ bajo la norma L^2 estándar en la frontera:

$$H^2 \cong \overline{\mathbb{P}[z]}^{L^2(S_1)}.$$

Esta identificación es fundamental, ya que nos permite utilizar la estructura de *Reproducing Kernel Hilbert Space* (RKHS) de H^2 . En particular, para cualquier $c \in \mathbb{D}$, el núcleo reproductor de Szegő viene dado por $K_c(z) = (1 - \bar{c}z)^{-1}$.

Observación 1 (Puntos Exteriores). Para los puntos exteriores o en la frontera ($k \in I_{out}$), el funcional de evaluación δ_{c_k} no es continuo respecto a la norma L^2 inducida en el espacio de Hardy [5], donde se demuestra que los funcionales de evaluación puntual solo son acotados en el interior del dominio. En consecuencia, su núcleo algebraico no es necesariamente cerrado en $\mathcal{H}$. Por este motivo, los subespacios asociados a condiciones de anulación en puntos exteriores se definen de forma algebraica y se considera su clausura topológica. En consecuencia, su núcleo algebraico V_0 es denso en $\mathcal{H}$, por lo que su clausura topológica resulta ser todo el espacio ($\overline{V_0} = \mathcal{H}$). Por este motivo, el estudio espectral para puntos exteriores exige trabajar estrictamente sobre el subespacio algebraico $V_0 \subset \mathbb{P}[z]$ sin tomar su clausura topológica, aplicando el Principio Min-Max sobre dominios densos para aprovechar su codimensión algebraica estricta.

Observación 2 (Codimensión Algebraica y el Primer Teorema de Isomorfía). Dado que para los puntos exteriores el funcional de evaluación Ψ no es continuo respecto a la norma del espacio de Hilbert subyacente, su núcleo $V_0 = \ker(\Psi)$ es topológicamente denso en

$\mathcal{H}$, lo que implica que su codimensión topológica es nula ($\overline{V_0} = \mathcal{H}$). Por este motivo, nuestro análisis espectral y la aplicación del Principio Min-Max deben fundamentarse estrictamente en la *codimensión algebraica* sobre el dominio denso $\mathbb{P}[z]$.

La validez de trabajar con este concepto en dimensión infinita se apoya en el Primer Teorema de Isomorfía para espacios vectoriales. Si $\Psi : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{C}^m$ es el funcional lineal sobreyectivo que evalúa las m condiciones singulares, el teorema garantiza que el espacio cociente es isomorfo a la imagen del funcional:

$$\mathbb{P}[z]/\ker(\Psi) \cong \text{Im}(\Psi) = \mathbb{C}^m$$

Por definición, la codimensión algebraica de un subespacio es la dimensión de su espacio cociente. Tomando dimensiones a ambos lados del isomorfismo, obtenemos:

$$\text{codim}_{alg}(V_0) = \dim(\mathbb{P}[z]/V_0) = \dim(\mathbb{C}^m) = m$$

Cabe destacar que este es un resultado de álgebra lineal abstracta y opera al margen de cualquier estructura métrica o topológica ([11, 9]). Además, es totalmente consistente con la formulación mediante bases de Hamel: afirmar que $\text{codim}_{alg}(V_0) = m$ equivale a que cualquier base de Hamel de V_0 requiere exactamente m vectores (polinomios) adicionales linealmente independientes para generar todo el espacio $\mathbb{P}[z]$.

Observación 3 (Conexión con la Física Matemática y Extensiones de Operadores). La metodología de olvidar la topología de la norma Sobolev para operar sobre la restricción algebraica a un subespacio de codimensión finita (V_0) es una técnica usada en el análisis de operadores no acotados. La necesidad de evaluar funcionales que son densos pero no acotados sobre un dominio “bueno” ($\mathbb{P}[z]$) es análoga a la construcción de los Tripletes de Gelfand (Rigged Hilbert Spaces) introducidos por Gelfand y Vilenkin [6], los cuales legitiman el uso de funcionales singulares como la Delta de Dirac en mecánica cuántica.

De manera similar, el hecho de “apagar” la singularidad restringiendo el operador a un subespacio de codimensión algebraica finita coincide con los procedimientos empleados en la teoría de extensiones de Von Neumann (Reed y Simon [10]) para aislar perturbaciones de rango finito o potenciales de contacto (*Point Interactions* [1]). Esto demuestra que la convergencia de nuestros σ_k filtrando la singularidad responde a un comportamiento estructural bien documentado en la teoría espectral de operadores autoadjuntos.

2. Acotación del Operador Multiplicación

Teorema 1 (Acotación Condicionada). *Sea $D : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{P}[z]$ el operador de multiplicación definido por $D(p)(z) = zp(z)$. La restricción de este operador al subespacio estable V , denotada como $D|_V : V \rightarrow \mathcal{H}$, es un operador acotado. Es decir, existe una constante $K < \infty$ tal que:*

$$\|Dp\|_S \leq K \|p\|_S, \quad \forall p \in V.$$

Demostración. Sea $p \in V$. Examinamos el cuadrado de la norma de la imagen $\|Dp\|_S^2$ descomponiéndola en su parte integral y su parte discreta:

$$\|Dp\|_S^2 = \int_{S_R} |zp(z)|^2 d\mu(z) + \sum_{k=1}^N |(zp)'(c_k)|^2.$$

1. Acotación de la parte integral: Dado que el soporte de la medida μ es la circunferencia S_R , tenemos $|z| = R$ en todo el dominio de integración. Por tanto:

$$\int_{S_R} |zp(z)|^2 d\mu(z) = R^2 \int_{S_R} |p(z)|^2 d\mu(z) \leq R^2 \|p\|_S^2.$$

2. Acotación de la parte discreta: Utilizamos la regla de la derivada del producto $(zp)'(z) = p(z) + zp'(z)$. Dividimos la suma de puntos en los conjuntos I_{in} (interiores) e I_{out} (exteriores).

Caso A: Puntos Exteriores ($k \in I_{out}$). Por definición del subespacio estable V , si $p \in V$, entonces $p(c_k) = 0$ para todo $k \in I_{out}$. La expresión evaluada se reduce a:

$$|p(c_k) + c_k p'(c_k)|^2 = |0 + c_k p'(c_k)|^2 = |c_k|^2 |p'(c_k)|^2.$$

Caso B: Puntos Interiores ($k \in I_{in}$). En este caso no podemos asumir que $p(c_k)$ se anule. Utilizamos la desigualdad triangular $(a + b)^2 \leq 2a^2 + 2b^2$:

$$|p(c_k) + c_k p'(c_k)|^2 \leq 2|p(c_k)|^2 + 2|c_k|^2 |p'(c_k)|^2.$$

Por la Proposición de Evaluación Puntual (ver Preliminares), sabemos que la evaluación es un funcional acotado. Existe una constante $M_k > 0$ tal que $|p(c_k)|^2 \leq M_k \|p\|_S^2$.

3. Combinación de cotas: Sustituyendo las cotas obtenidas en la expresión de la norma total:

$$\begin{aligned} \|Dp\|_S^2 &\leq R^2 \|p\|_S^2 + \sum_{k \in I_{out}} |c_k|^2 |p'(c_k)|^2 + \sum_{k \in I_{in}} \left(2M_k \|p\|_S^2 + 2|c_k|^2 |p'(c_k)|^2 \right) \\ &\leq \left(R^2 + \max_{k \in I_{out}} |c_k|^2 + 2 \sum_{k \in I_{in}} M_k + 2 \max_{k \in I_{in}} |c_k|^2 \right) \|p\|_S^2. \end{aligned}$$

Nótese que hemos usado que $|p'(c_k)|^2 \leq \|p\|_S^2$ por definición de la norma Sobolev. Si definimos K como la raíz cuadrada del término entre paréntesis (que es una constante finita dependiente solo de R y los puntos), concluimos que $\|Dp\|_S \leq K \|p\|_S$. $\square$

Corolario 1 (Acotación del Espectro Remanente). *Como consecuencia directa de la acotación del operador en V , el $(m + 1)$ -ésimo valor singular asintótico del operador de multiplicación, denotado como σ_{m+1} , está acotado superiormente por la norma de la restricción:*

$$\sigma_{m+1} \leq \|\mathcal{D}|_V\| < \infty \quad (4)$$

Demostración. Utilizamos la caracterización variacional de los valores singulares dada por el Principio Min-Max. El $(m + 1)$ -ésimo valor singular se define como el ínfimo de la norma del operador sobre todos los subespacios posibles de codimensión m :

$$\sigma_{m+1} = \inf\{\|\mathcal{D}|_V\| : V \subset \mathcal{H}, \text{codim}(V) = m\}$$

En la Definición del subespacio estable, establecimos que V tiene precisamente codimensión m (al ser intersección de núcleos de funcionales linealmente independientes en un espacio de Hilbert). Por lo tanto, V pertenece al conjunto de subespacios sobre los que se toma el ínfimo. Por la propiedad fundamental del ínfimo, el valor evaluado en un elemento específico del conjunto (V) siempre es una cota superior del ínfimo global:

$$\sigma_{m+1} \leq \|\mathcal{D}|_V\|$$

Dado que el Teorema de Acotación Condicionada demuestra que $\|\mathcal{D}|_V\|$ es finito, concluimos que σ_{m+1} es finito. $\square$

3. Divergencia de los Valores Singulares Inestables

Los puntos situados fuera del disco soporte de la medida continua generan un comportamiento singular en el operador. A diferencia del caso acotado, estos puntos inducen valores singulares infinitos.

3.1. Persistencia de la Codimensión

El siguiente resultado establece que la imposición de restricciones lineales continuas sobre el subespacio denso $\mathbb{P}[z]$ preserva la codimensión tras tomar la clausura en el espacio de Hilbert.

Proposición 2 (Codimensión de la clausura del ideal para un átomo BPE). *Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert tal que el espacio de polinomios $\mathbb{P}[z]$ es denso en $\mathcal{H}$. Sea $a \in \mathbb{C}$ un punto de evaluación acotada (BPE) respecto a la norma de $\mathcal{H}$. Entonces, el ideal algebraico $Y_a = \{p \in \mathbb{P}[z] : p(a) = 0\}$ en $\mathcal{H}$, es un subespacio cerrado de codimensión topológica exactamente 1.*

Demostración. Consideremos el ideal $Y_a = (z - a)\mathbb{P}[z]$. Queremos probar que tiene codimensión 1.

Dado que a es un punto de evaluación continua (BPE), el funcional lineal $\Phi_a : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{C}$ dado por $\Phi_a(p) = p(a)$ es acotado. Por el Teorema de Extensión, Φ_a se extiende de manera única y continua a todo $\mathcal{H}$. Al ser continuo, su núcleo $\ker(\Phi_a)$ es un subespacio cerrado de $\mathcal{H}$.

Por otro lado, cualquier polinomio $p \in \mathbb{P}[z]$ admite la siguiente descomposición algebraica trivial:

$$p(z) = (p(z) - p(a)) + p(a) \cdot 1$$

El primer término pertenece a Y_a y el segundo al subespacio generado por el polinomio constante $\mathbf{1}$. Por tanto, $\mathbb{P}[z] = Y_a \oplus \text{span}\{\mathbf{1}\}$.

Tomando clausuras en $\mathcal{H}$, y sabiendo que $\mathcal{P}$ es denso en $\mathcal{H}$, obtenemos:

$$\mathcal{H} = \overline{\mathbb{P}[z]} = \overline{Y_a \oplus \text{span}\{\mathbf{1}\}}$$

Como el funcional es continuo y $\Phi_a(\mathbf{1}) = 1 \neq 0$, sabemos que $\mathbf{1} \notin V$. Por lo tanto, la suma directa se preserva en la clausura:

$$\mathcal{H} = Y_a \oplus \text{span}\{\mathbf{1}\}$$

Lo que demuestra que $\text{codim}(V) = \dim(\text{span}\{\mathbf{1}\}) = 1$. □

Proposición 3 (Codimensión de la clausura para múltiples átomos BPE). *Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert donde $\mathbb{P}[z]$ es denso. Sea $\mathcal{A} = \{a_1, \dots, a_N\} \subset \mathbb{C}$ un conjunto de N puntos distintos que son de evaluación acotada (BPE) respecto a la norma de $\mathcal{H}$. Si consideramos el subespacio de polinomios que se anulan simultáneamente en dichos puntos, $Y_{\mathcal{A}} = \{p \in \mathbb{P}[z] : p(a_k) = 0 \text{ para } k = 1, \dots, N\}$, es un subespacio cerrado de codimensión topológica exactamente N .*

Demostración. Consideremos el funcional vectorial continuo $\vec{\Phi} : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{C}^N$ dado por $\vec{\Phi}(p) = (p(a_1), \dots, p(a_N))$. Por definición, el subespacio algebraico es su núcleo: $Y_{\mathcal{A}} = \ker(\vec{\Phi})$ que es cerrado por ser $\vec{\Phi}$ continuo.

Sean $L_1(z), \dots, L_N(z)$ los polinomios fundamentales de interpolación de Lagrange asociados al conjunto de puntos $\mathcal{A}$, los cuales satisfacen $L_i(a_j) = \delta_{ij}$. Cualquier polinomio $p \in \mathbb{P}[z]$ se puede descomponer unívocamente como:

$$p(z) = \underbrace{\left(p(z) - \sum_{k=1}^N p(a_k) L_k(z) \right)}_{\in Y_{\mathcal{A}}} + \underbrace{\sum_{k=1}^N p(a_k) L_k(z)}_{\in \text{span}\{L_1, \dots, L_N\}}$$

El primer término pertenece a $Y_{\mathcal{A}}$ puesto que, por la propiedad de los polinomios de Lagrange, se anula exactamente en todos los puntos $a_j \in \mathcal{A}$. Esto demuestra la descomposición en suma directa algebraica:

$$\mathbb{P}[z] = Y_{\mathcal{A}} \oplus \text{span}\{L_1, \dots, L_N\}$$

Como los N puntos son BPE, las evaluaciones puntuales son funcionales acotados. Por tanto, el funcional vectorial $\vec{\Phi}$ se extiende de manera continua a $\mathcal{H}$. Esto implica que $Y_{\mathcal{A}}$ sigue contenida en el núcleo de la extensión, por lo que no interseca el espacio generado por los polinomios de Lagrange (salvo en el vector nulo).

Tomando clausuras en la descomposición anterior y apoyándonos en la densidad de los polinomios ($\overline{\mathbb{P}[z]} = \mathcal{H}$):

$$\mathcal{H} = \overline{Y_{\mathcal{A}} \oplus \text{span}\{L_1, \dots, L_N\}}$$

De donde se concluye inmediatamente que el complemento directo tiene dimensión N , y por lo tanto $\text{codim}(Y_{\mathcal{A}}) = N$. $\square$

Teorema 2 (Dicotomía de la Codimensión). *Sea $\mathcal{H}$ la clausura de $\mathbb{P}[z]$ respecto a una norma de Hilbert y sea $a \in \mathbb{C}$. Sea $V = \overline{\{p \in \mathbb{P}[z] : p(a) = 0\}}$. Entonces, solo existen dos posibilidades:*

1. *Si a es un punto de evaluación acotada (BPE), entonces V es un hiperplano cerrado y $\text{codim}(V) = 1$.*
2. *Si a no es un BPE, entonces V es denso en $\mathcal{H}$ y $\text{codim}(V) = 0$.*

Demostración. El caso 1 se sigue del Teorema de Riesz (existencia del núcleo reproductor ortogonal). Si el funcional de evaluación $\delta_a : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{C}$ definido por $\delta_a(p) = p(a)$ no es acotado respecto a la norma del espacio $\|\cdot\|_{\mathcal{H}}$, demostraremos que su núcleo algebraico $Y_a = \{p \in \mathbb{P}[z] : p(a) = 0\}$ es denso en $\mathcal{H}$.

Por definición de operador no acotado, para todo $n \in \mathbb{N}$, existe un polinomio $h_n \in \mathbb{P}[z]$ tal que:

$$|h_n(a)| > n \|h_n\|_{\mathcal{H}}.$$

Podemos normalizar estos polinomios para fijar su valor en el punto. Definimos la sucesión:

$$q_n(z) = \frac{h_n(z)}{h_n(a)}.$$

Por construcción, se cumple que $q_n(a) = 1$ para todo n . Además, su norma decae asintóticamente a cero:

$$\|q_n\|_{\mathcal{H}} = \frac{\|h_n\|_{\mathcal{H}}}{|h_n(a)|} < \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Consideremos ahora la función constante $1 \in \mathbb{P}[z]$. Construimos la sucesión de polinomios:

$$p_n(z) = 1 - q_n(z).$$

Evaluable en el punto a , tenemos $p_n(a) = 1 - q_n(a) = 1 - 1 = 0$. Esto implica que cada término de la sucesión $p_n \in Y_a \quad \forall n$.

Calculamos la distancia entre la constante 1 y esta sucesión:

$$\|1 - p_n\|_{\mathcal{H}} = \|1 - (1 - q_n)\|_{\mathcal{H}} = \|q_n\|_{\mathcal{H}} < \frac{1}{n}.$$

Esto demuestra que la función constante 1 pertenece a la clausura del subespacio: $1 \in \overline{Y_a}$.

Dado que $\overline{Y_a}$ es un subespacio vectorial cerrado que contiene a la función constante 1, y sabiendo que algebraicamente cualquier polinomio $P(z)$ se puede escribir como:

$$P(z) = P(a) \cdot 1 + (z - a)Q(z),$$

donde el término $(z - a)Q(z)$ pertenece trivialmente a $Y_a \subset \overline{Y_a}$, concluimos por linealidad que $P \in \overline{Y_a}$ para todo $P \in \mathbb{P}[z]$.

Finalmente, como $\mathbb{P}[z]$ es denso en el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ (por definición de la completación), y hemos probado que $\mathbb{P}[z] \subseteq \overline{Y_a}$, se sigue necesariamente que:

$$\overline{Y_a} = \mathcal{H}.$$

Concluimos que el complemento ortogonal es el subespacio nulo, $V^\perp = \{0\}$, y por tanto $\text{codim}(V) = 0$. $\square$

Prueba Geométrica (Corrección mediante Proyección). Sea $V = \overline{(z - a)\mathbb{P}[z]}$ el subespacio cerrado generado por los polinomios que se anulan en a . Queremos determinar la dimensión de su complemento ortogonal $V^\perp$.

Consideremos la función constante $u(z) = 1$. Por el Teorema de la Proyección Ortogonal en espacios de Hilbert, existe una descomposición única:

$$1 = P_V(1) + h,$$

donde $P_V(1) \in V$ es la proyección ortogonal de la unidad sobre el subespacio, y $h \in V^\perp$ es el vector residual.

Distinguimos dos casos para el vector $h = 1 - P_V(1)$:

1. **Si $h = 0$:** Entonces $1 \in V$. Como V es un ideal (cerrado bajo multiplicación por polinomios), esto implicaría que $\mathbb{P}[z] \subset V$, y por tanto $V = \mathcal{H}$. Esto corresponde al caso donde la evaluación no es acotada (codimensión 0).
2. **Si $h \neq 0$:** Entonces hemos encontrado un vector no nulo $h \in V^\perp$. Para ver que este vector genera *todo* el complemento ortogonal, tomemos cualquier otro $g \in V^\perp$. Cualquier polinomio p se escribe como $p(z) = p(a) + q(z)$ con $q \in V$. Esto implica que el espacio total es la suma directa (no necesariamente ortogonal todavía) de las constantes y V :

$$\mathcal{H} = \text{span}\{1\} + V.$$

Como $1 = P_V(1) + h$, podemos reescribir esto como:

$$\mathcal{H} = \text{span}\{P_V(1) + h\} + V = \text{span}\{h\} + V.$$

(El término $P_V(1)$ se absorbe en V).

Dado que $h \perp V$, esta suma es ortogonal:

$$\mathcal{H} = \text{span}\{h\} \oplus V.$$

Concluimos que $V^\perp = \text{span}\{h\}$, y como $h \neq 0$, la dimensión es exactamente 1.

□

en la segunda prueba no necesitas considerar otro g porque no lo usas en la demostración. La prueba está bien de hecho $h = 1 - P_V(a1) \in V^\perp$

Corolario 2. Si los puntos $\{c_k\}_{k=1}^N$ son puntos de evaluación acotada (BPE), el subespacio $V = \overline{\{p \in \mathbb{P}[z] : (zp)'(c_k) = 0\}}$ tiene codimensión exactamente N en $\mathcal{H}$.

Proposición 4 (Divergencia de s -números). [7] Sea D el operador de multiplicación por z . Sea $m = |I_{out}|$ el número de puntos inestables. Entonces, los primeros m valores singulares (números de aproximación) del operador son infinitos:

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \cdots = \sigma_m = \infty. \quad (5)$$

Demostración. Utilizamos la caracterización variacional de los valores singulares (Principio Min-Max). El m -ésimo valor singular está dado por:

$$\sigma_m = \inf\{\|D|_V\|_S : V \subset \mathcal{H}, \text{codim}(V) = m - 1\}.$$

Para demostrar que $\sigma_m = \infty$, probaremos que para cualquier subespacio V de codimensión $m - 1$, el operador es no acotado sobre V .

Sea $V \subset \mathcal{H}$ un subespacio arbitrario con $\text{codim}(V) = m - 1$. Consideremos el subespacio estable V definido en la sección anterior, el cual anula los m puntos inestables. Sabemos que $\text{codim}(V) = m$. Por razones de dimensionalidad (propiedades de los complementos ortogonales en espacios de Hilbert), es imposible que V esté contenido en V , ya que $\text{codim}(V) < \text{codim}(V)$.

Esto implica que existe al menos un punto inestable $c^* \in I_{out}$ tal que el funcional de evaluación δ_{c^*} no se anula idénticamente sobre V . En consecuencia, el operador actúa sobre V de forma no acotada, ya que el módulo del punto c^* es estrictamente mayor que R .

Para formalizar la divergencia, construimos la sucesión de polinomios prueba $\{Q_n\}_{n \geq 1}$ definida por:

$$Q_n(z) = (n+1)c^*z^n - nz^{n+1}.$$

Esta sucesión está diseñada para anular la derivada en el punto crítico, $Q'_n(c^*) = 0$, minimizando la norma de entrada, mientras maximiza el valor de la función $Q_n(c^*) = (c^*)^{n+1}$.

Analizamos el cociente de Rayleigh asintótico $\frac{\|DQ_n\|_S}{\|Q_n\|_S}$:

1. Norma de entrada ($\|Q_n\|_S$): Dado que $Q'_n(c^*) = 0$, la parte discreta en c^* se anula. La norma está dominada por la parte integral (L^2):

$$\|Q_n\|_S^2 \approx \int_{S_R} |(n+1)c^*z^n - nz^{n+1}|^2 d\mu \approx C \cdot n^2 R^{2n}.$$

2. Norma de salida ($\|DQ_n\|_S$): La derivada de la imagen es $(zQ_n)'(c^*) = Q_n(c^*) + c^*Q_n'(c^*) = (c^*)^{n+1}$. La contribución de este término atómico a la norma es:

$$|(zQ_n)'(c^*)|^2 = |c^*|^{2n+2}.$$

3. Divergencia del cociente: Comparando los órdenes de magnitud cuando $n \rightarrow \infty$:

$$\frac{\|DQ_n\|_S^2}{\|Q_n\|_S^2} \approx \frac{|c^*|^{2n+2}}{n^2 R^{2n}} = \frac{|c^*|^2}{n^2} \left(\frac{|c^*|}{R} \right)^{2n}.$$

Puesto que $c^* \in I_{out}$, tenemos $|c^*| > R$. El término exponencial $(|c^*|/R)^{2n}$ domina sobre el factor polinomial n^{-2} , haciendo que el cociente tienda a infinito.

Dado que la restricción $\delta_{c^*}|_V$ es no trivial, existen elementos en V cuyo comportamiento bajo D reproduce la singularidad en c^* . En particular, los polinomios $\{Q_n\}$ pueden aproximarse mediante elementos de V , de donde se concluye que $\sup_{p \in V} \frac{\|Dp\|_S}{\|p\|_S} = \infty$. Por tanto, $\sigma_m = \infty$. $\square$

Proposición 5 (Dominancia del Soporte). *Sea V' el subespacio totalmente restringido, definido como la clausura en $\mathcal{H}$ del conjunto de polinomios que se anulan en todos los puntos $\{c_1, \dots, c_N\}$ (véase la Sección 1). Sea $\mathcal{D}$ el operador de multiplicación por z , definido como $\mathcal{D}(p) = zp(z)$. La norma de la restricción de este operador al subespacio V' , denotada como $\mathcal{D}|_{V'} : V' \rightarrow \mathcal{H}$, es:*

$$\|\mathcal{D}p\|_S \leq \max \left(R, \max_{k=1, \dots, N} |c_k| \right) \|p\|_S \quad \forall p \in V' \quad (6)$$

Demostración. Sea $p \in V'$. Evaluamos la norma al cuadrado de la imagen $\|zp\|_S^2$. Para la parte continua tenemos:

$$\int_{|z|=R} |zp(z)|^2 d\mu \leq R^2 \int_{|z|=R} |p(z)|^2 d\mu = R^2 \|p\|_{L^2}^2.$$

La condición $p \in V'$ implica $p(c_k) = 0$ para todo k (por construcción de la clausura y continuidad de la evaluación en los puntos). Al evaluar la derivada de la imagen $(zp)'$ en los puntos, el término libre desaparece:

$$(zp)'(c_k) = p(c_k) + c_k p'(c_k) = c_k p'(c_k)$$

Al sumar sobre todos los puntos, se acota la contribución utilizando el módulo del punto de mayor módulo:

$$\sum_{k \in \mathcal{I}} |c_k|^2 |p'(c_k)|^2 \leq \left(\max_{k \in \mathcal{I}} |c_k|^2 \right) \sum_{k \in \mathcal{I}} |p'(c_k)|^2.$$

Dado que la suma parcial de las derivadas ponderadas es menor o igual que la norma total $\|p\|_S^2$, este término queda acotado. Definimos la constante K como:

$$K = \max \left(R, \max_{k \in \mathcal{I}} |c_k| \right).$$

Sustituyendo esta cota en el numerador, observamos que tanto el coeficiente de la parte integral (R^2) como el coeficiente de la parte atómica ($\max |c_k|^2$) son menores o iguales a K^2 :

$$\begin{aligned} \frac{\|\mathcal{D}p\|_S^2}{\|p\|_S^2} &\leq \frac{K^2\|p\|_{L^2}^2 + K^2 \sum_{k \in \mathcal{I}} |p'(c_k)|^2}{\|p\|_S^2} \\ &= \frac{K^2 (\|p\|_{L^2}^2 + \sum_{k \in \mathcal{I}} |p'(c_k)|^2)}{\|p\|_S^2} \\ &= \frac{K^2\|p\|_S^2}{\|p\|_S^2} = K^2. \end{aligned}$$

Tomando la raíz cuadrada, concluimos que la norma del operador restringido satisface la desigualdad:

$$\|\mathcal{D}|_{V'}\| \leq K = \max \left(R, \max_{k=1, \dots, N} |c_k| \right).$$

Esto demuestra que el operador restringido es acotado, con cota determinada por el máximo entre el radio del soporte continuo y el módulo del punto más alejado del origen. $\square$

Corolario 3 (Acotación del Espectro Restringido). *Como consecuencia directa de la acotación del operador en V' , el $(N+1)$ -ésimo valor singular asintótico del operador de multiplicación, denotado como σ_{N+1} , está acotado superiormente por la norma de la restricción:*

$$\sigma_{N+1} \leq \|\mathcal{D}'|_V\| \leq \max \left(R, \max_{k=1, \dots, N} |c_k| \right) < \infty \quad (7)$$

4. Análisis Espectral: El Caso de un Único Punto

Con el fin de analizar el impacto que las derivadas discretas tienen sobre la estructura espectral del operador de multiplicación $D(p) = zp$, se estudia en primer lugar el caso particular de un único punto en la derivada. Específicamente, se considera la perturbación de la medida continua, soportada en la circunferencia unidad S_1 , mediante la adición de un único término discreto en la derivada, evaluado en un punto $c_1 \in \mathbb{C}$.

En el marco de la teoría de ideales de operadores, los números de Gelfand constituyen la herramienta natural para cuantificar el comportamiento espectral direccional de un operador acotado. Para un operador $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$, el m -ésimo número de Gelfand se define como:

$$c_m(T) = \inf \{ \|T|_V\|_S : V \subset \mathcal{H}, \text{codim}(V) < m \} \quad (8)$$

A lo largo de esta sección, se asume que el punto c_1 constituye una *Bounded Point Evaluation* (BPE). Como se estableció en la sección de preliminares, esta hipótesis es necesaria para garantizar que el operador D sea globalmente acotado en $\mathcal{H}$.

4.1. El Primer Número de Gelfand: La Norma Global

Por definición, el primer número de Gelfand, $c_1(D)$, corresponde al ínfimo sobre subespacios de codimensión estrictamente menor que 1. El único subespacio que cumple esta condición es el espacio total $\mathcal{H}$. Por consiguiente:

$$c_1(D) = \|D\|_S$$

Este primer número refleja el comportamiento global del operador. Analíticamente, se verifica que $c_1(D)$ depende de la posición del punto c_1 : cuanto mayor es la contribución del término discreto a la norma de Sobolev, mayor es la dilatación de $c_1(D)$ respecto al radio de la circunferencia.

4.2. Un ejemplo ilustrativo: El punto en el origen

Consideremos el espacio de polinomios $\mathbb{P}[z]$ dotado de la medida de Lebesgue normalizada en la circunferencia unidad S_1 y un único punto en la derivada situado en el origen ($c_1 = 0$). El producto interno de Sobolev toma la forma:

$$\langle p, q \rangle_S = \int_{S_1} p(z) \overline{q(z)} \frac{|dz|}{2\pi} + p'(0) \overline{q'(0)}. \quad (9)$$

Sea $p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ un polinomio arbitrario. Gracias a la ortonormalidad de la base de monomios $\{z^k\}$ respecto a la medida de Lebesgue, la parte continua de la norma es simplemente la suma de los módulos al cuadrado de sus coeficientes. Por otro lado, la derivada evaluada en el origen es exactamente el coeficiente de grado uno: $p'(0) = a_1$. Por lo tanto, el cuadrado de la norma de Sobolev de entrada es:

$$\|p\|_S^2 = \sum_{k=0}^n |a_k|^2 + |p'(0)|^2 = \sum_{k=0}^n |a_k|^2 + |a_1|^2 = |a_0|^2 + 2|a_1|^2 + \sum_{k=2}^n |a_k|^2. \quad (10)$$

Veamos ahora el efecto del operador de multiplicación $\mathcal{D}(p)(z) = zp(z)$. El polinomio resultante es $\mathcal{D}p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^{k+1}$. Su derivada en el origen, por inspección directa del coeficiente de grado uno del polinomio resultante, es $(\mathcal{D}p)'(0) = p(0) = a_0$. El cuadrado de la norma de salida resulta ser:

$$\|\mathcal{D}p\|_S^2 = \sum_{k=0}^n |a_k|^2 + |(\mathcal{D}p)'(0)|^2 = \sum_{k=0}^n |a_k|^2 + |a_0|^2 = 2|a_0|^2 + |a_1|^2 + \sum_{k=2}^n |a_k|^2. \quad (11)$$

En la teoría de ideales de operadores, la norma global del operador coincide con su primer número de Gelfand, $c_1(\mathcal{D})$, definido como el supremo del cociente de Rayleigh. Utilizando (10) y (11):

$$c_1(\mathcal{D})^2 = \sup_{p \neq 0} \frac{\|\mathcal{D}p\|_S^2}{\|p\|_S^2} = \sup_{a_k} \frac{2|a_0|^2 + |a_1|^2 + \sum_{k \geq 2} |a_k|^2}{|a_0|^2 + 2|a_1|^2 + \sum_{k \geq 2} |a_k|^2}. \quad (12)$$

Para determinar el supremo de este cociente, se reescribe el numerador en función del denominador. Denotando $S = \|p\|_S^2 = |a_0|^2 + 2|a_1|^2 + \sum_{k \geq 2} |a_k|^2$, se expresa el numerador como:

$$\begin{aligned} 2|a_0|^2 + |a_1|^2 + \sum_{k \geq 2} |a_k|^2 &= 2 \left(|a_0|^2 + 2|a_1|^2 + \sum_{k \geq 2} |a_k|^2 \right) - 3|a_1|^2 - \sum_{k \geq 2} |a_k|^2 \\ &= 2S - 3|a_1|^2 - \sum_{k \geq 2} |a_k|^2. \end{aligned}$$

Sustituyendo esta expresión algebraica en el cociente de Rayleigh, obtenemos:

$$\frac{\|\mathcal{D}p\|_S^2}{\|p\|_S^2} = \frac{2S - 3|a_1|^2 - \sum_{k \geq 2} |a_k|^2}{S} = 2 - \frac{3|a_1|^2 + \sum_{k \geq 2} |a_k|^2}{\|p\|_S^2}. \quad (13)$$

Dado que los módulos al cuadrado son siempre cantidades no negativas y $\|p\|_S^2 > 0$ (para cualquier $p \neq 0$), el término fraccionario que se resta al 2 es siempre mayor o igual a cero. Esto establece la siguiente cota superior para el cociente:

$$\frac{\|\mathcal{D}p\|_S^2}{\|p\|_S^2} \leq 2.$$

El supremo (y en este caso, el máximo) se alcanza si y solo si el término sustractivo es exactamente nulo. Esto exige matemáticamente que $a_1 = 0$ y $a_k = 0$ para todo $k \geq 2$. La única variable que queda libre es $a_0 \neq 0$, lo que implica que el subespacio de polinomios que maximizan la acción del operador está formado exclusivamente por las funciones constantes, como por ejemplo $p(z) = 1$.

Verificamos la igualdad evaluando el cociente en esta función constante:

$$\frac{\|\mathcal{D}(1)\|_S^2}{\|1\|_S^2} = 2.$$

Concluimos formalmente que la norma global del operador es $c_1(\mathcal{D}) = \sqrt{2}$.

4.3. Un ejemplo ilustrativo: El punto en el origen y radio R

Consideremos el espacio de polinomios $\mathbb{P}[z]$ dotado de la medida de Lebesgue normalizada en la circunferencia S_R de radio R y un único punto en la derivada situado en el origen ($c_1 = 0$). El producto interno de Sobolev toma la forma:

$$\langle p, q \rangle_S = \int_{S_R} p(z) \overline{q(z)} \frac{|dz|}{2\pi R} + p'(0) \overline{q'(0)}. \quad (14)$$

Sea $p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ un polinomio arbitrario. Gracias a la ortogonalidad de la base de monomios $\{z^k\}$ respecto a la medida de Lebesgue en S_R , la norma al cuadrado de cada monomio es $\int_{S_R} |z|^{2k} \frac{|dz|}{2\pi R} = R^{2k}$. Por lo tanto, la parte continua de la norma es la suma ponderada de los módulos al cuadrado de sus coeficientes. Por otro lado, la derivada evaluada en el origen es exactamente el coeficiente de grado uno: $p'(0) = a_1$. Por lo tanto, el cuadrado de la norma de Sobolev de entrada es:

$$\|p\|_S^2 = \sum_{k=0}^n |a_k|^2 R^{2k} + |p'(0)|^2 = \sum_{k=0}^n |a_k|^2 R^{2k} + |a_1|^2 = |a_0|^2 + (R^2 + 1) |a_1|^2 + \sum_{k=2}^n |a_k|^2 R^{2k}. \quad (15)$$

Veamos ahora el efecto del operador de multiplicación $\mathcal{D}(p)(z) = zp(z)$. El polinomio resultante es $\mathcal{D}p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^{k+1}$. Su derivada en el origen, por inspección directa del coeficiente de grado uno del polinomio resultante, es $(\mathcal{D}p)'(0) = p(0) = a_0$. El cuadrado de la norma de salida resulta ser:

$$\|\mathcal{D}p\|_S^2 = \sum_{k=0}^n |a_k|^2 R^{2(k+1)} + |(\mathcal{D}p)'(0)|^2 = \sum_{k=0}^n |a_k|^2 R^{2k+2} + |a_0|^2 = (R^2 + 1) |a_0|^2 + R^4 |a_1|^2 + \sum_{k=2}^n |a_k|^2 R^{2k+2}. \quad (16)$$

En la teoría de ideales de operadores, la norma global del operador coincide con su primer número de Gelfand, $c_1(\mathcal{D})$, definido como el supremo del cociente de Rayleigh. Utilizando (15) y (16):

$$c_1(\mathcal{D})^2 = \sup_{p \neq 0} \frac{\|\mathcal{D}p\|_S^2}{\|p\|_S^2} = \sup_{a_k} \frac{(R^2 + 1) |a_0|^2 + R^4 |a_1|^2 + \sum_{k \geq 2} |a_k|^2 R^{2k+2}}{|a_0|^2 + (R^2 + 1) |a_1|^2 + \sum_{k \geq 2} |a_k|^2 R^{2k}}. \quad (17)$$

Para determinar el supremo de este cociente, se reescribe el numerador en función del denominador. Denotando $S = \|p\|_S^2 = |a_0|^2 + (R^2 + 1)|a_1|^2 + \sum_{k \geq 2} |a_k|^2 R^{2k}$, multiplicamos por $(R^2 + 1)$ para buscar la semejanza y expresamos el numerador como:

$$\begin{aligned} (R^2 + 1)|a_0|^2 + R^4|a_1|^2 + \sum_{k \geq 2} |a_k|^2 R^{2k+2} &= (R^2 + 1) \left(|a_0|^2 + (R^2 + 1)|a_1|^2 + \sum_{k \geq 2} |a_k|^2 R^{2k} \right) \\ &\quad - [(R^2 + 1)^2 - R^4]|a_1|^2 - \sum_{k \geq 2} |a_k|^2 R^{2k} [(R^2 + 1) - R^2] \\ &= (R^2 + 1)S - (2R^2 + 1)|a_1|^2 - \sum_{k \geq 2} |a_k|^2 R^{2k}. \end{aligned}$$

Sustituyendo esta expresión algebraica en el cociente de Rayleigh, obtenemos:

$$\frac{\|\mathcal{D}p\|_S^2}{\|p\|_S^2} = \frac{(R^2 + 1)S - (2R^2 + 1)|a_1|^2 - \sum_{k \geq 2} |a_k|^2 R^{2k}}{S} = (R^2 + 1) - \frac{(2R^2 + 1)|a_1|^2 + \sum_{k \geq 2} |a_k|^2 R^{2k}}{\|p\|_S^2}. \quad (18)$$

Dado que los módulos al cuadrado son siempre cantidades no negativas, $R > 0$ y $\|p\|_S^2 > 0$ (para cualquier $p \neq 0$), el término fraccionario que se resta a $(R^2 + 1)$ es siempre mayor o igual a cero. Esto establece la siguiente cota superior para el cociente:

$$\frac{\|\mathcal{D}p\|_S^2}{\|p\|_S^2} \leq R^2 + 1.$$

El supremo (y en este caso, el máximo) se alcanza si y solo si el término sustractivo es exactamente nulo. Esto exige matemáticamente que $a_1 = 0$ y $a_k = 0$ para todo $k \geq 2$. La única variable que queda libre es $a_0 \neq 0$, lo que implica que el subespacio de polinomios que maximizan la acción del operador está formado exclusivamente por las funciones constantes, como por ejemplo $p(z) = 1$.

Verificamos la igualdad evaluando el cociente en esta función constante:

$$\frac{\|\mathcal{D}(1)\|_S^2}{\|1\|_S^2} = \frac{\|z\|_S^2}{\|1\|_S^2} = \frac{R^2 + |1|^2}{1 + |0|^2} = R^2 + 1.$$

Concluimos formalmente que la norma global del operador, para una circunferencia de radio R y un átomo en la derivada en el origen, es exactamente $c_1(\mathcal{D}) = \sqrt{R^2 + 1}$.

4.4. Dependencia de la Posición: El caso de un punto arbitrario

El caso $c = 0$ produce una norma global $c_1(\mathcal{D}) = \sqrt{2}$, alcanzada por los polinomios constantes. A continuación se analiza el caso de un punto interior arbitrario $c \neq 0$. Este análisis requiere consideraciones adicionales, ya que los núcleos reproductores del espacio de Hardy H^2 no coinciden con la base de monomios cuando el punto de evaluación no es el origen.

Sea $c \in \mathbb{C}$ un punto interior con $0 < |c| < 1$. Para aplicar la caracterización matricial del primer número de Gelfand, necesitamos los representantes de Riesz de la evaluación funcional y de la derivada en el punto c . Para la medida de Lebesgue en la circunferencia, estos son los conocidos núcleos de Szegő:

$$K_0(z) = \frac{1}{1 - \bar{c}z}, \quad K_1(z) = \frac{\partial}{\partial \bar{c}} K_0(z) = \frac{z}{(1 - \bar{c}z)^2}. \quad (19)$$

El cálculo exacto de $c_1(\mathcal{D})$ se reduce a resolver el problema de autovalores generalizados para las matrices de Gram de estos núcleos. No obstante, es posible obtener cotas inferiores evaluando el cociente de Rayleigh en polinomios específicos.

Evaluamos el cociente de Rayleigh en dos polinomios naturales: la función constante y la función identidad.

1. El candidato constante ($p_0(z) = 1$): Como se demostró anteriormente, $\|1\|_S^2 = 1$ y $\|\mathcal{D}(1)\|_S^2 = 2$. El cociente de Rayleigh permanece invariante respecto a la posición del punto:

$$\mathcal{R}(1) = \frac{\|\mathcal{D}(1)\|_S^2}{\|1\|_S^2} = 2.$$

2. El candidato lineal ($p_1(z) = z$): Calculamos las normas involucradas para este polinomio cuando $c \neq 0$:

- Derivada en el punto: $p_1'(c) = 1$.
- Derivada de la imagen: $(\mathcal{D}p_1)'(c) = (z^2)'(c) = 2c$.
- Norma de entrada: $\|z\|_S^2 = \|z\|_{L^2}^2 + |1|^2 = 1 + 1 = 2$.
- Norma de salida: $\|z^2\|_S^2 = \|z^2\|_{L^2}^2 + |2c|^2 = 1 + 4|c|^2$.

El cociente de Rayleigh para el polinomio lineal es:

$$\mathcal{R}(z) = \frac{1 + 4|c|^2}{2} = \frac{1}{2} + 2|c|^2.$$

La comparación de ambos candidatos revela un cambio cualitativo en el comportamiento del supremo.

- Si $|c|$ es pequeño, el término $\frac{1}{2} + 2|c|^2$ es menor que 2, por lo que el supremo se alcanza en el polinomio constante.
- Sin embargo, existe un punto crítico cuando $\frac{1}{2} + 2|c|^2 = 2$, es decir, cuando $|c| = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866$.

Para puntos situados cerca de la frontera ($|c| > \sqrt{3}/2$), el polinomio $p(z) = z$ sufre una dilatación mayor que el polinomio constante. Esto demuestra rigurosamente que:

$$c_1(\mathcal{D}) \geq \max \left(\sqrt{2}, \sqrt{\frac{1}{2} + 2|c|^2} \right). \quad (20)$$

Este resultado tiene la siguiente interpretación geométrica: a medida que el punto se acerca a la frontera ($|c| \rightarrow 1$), el primer número de Gelfand crece, y la dirección que alcanza la norma pasa de las funciones constantes a funciones con mayor dependencia en z , alineándose con la singularidad del núcleo $K_1(z)$.

4.5. Caracterización Exacta del Primer Número de Gelfand

Hemos establecido que $c_1(D) = \|D\|_S$. Si bien el cálculo de la norma de un operador en un espacio de dimensión infinita es, en general, un problema de difícil resolución, la estructura del producto de Sobolev y la hipótesis BPE permiten reducir este cálculo a un problema de optimización en dimensión finita.

El cálculo de la norma global equivale a encontrar el supremo del cociente de Rayleigh:

$$c_1(D)^2 = \sup_{p \in \mathbb{P}[z], p \neq 0} \frac{\|Dp\|_S^2}{\|p\|_S^2} = \sup_{p \neq 0} \frac{\|p\|_{L^2(\mu)}^2 + |p(c_1) + c_1 p'(c_1)|^2}{\|p\|_{L^2(\mu)}^2 + |p'(c_1)|^2}. \quad (21)$$

Nótese que hemos utilizado el hecho de que, sobre la circunferencia S_1 , la norma L^2 es invariante bajo la multiplicación por z , es decir, $\|zp\|_{L^2(\mu)} = \|p\|_{L^2(\mu)}$.

Dado que c_1 es un punto de evaluación acotada (BPE) para una medida soportada en la circunferencia, este se encuentra necesariamente en el interior del disco unidad ($|c_1| < 1$). Esto confiere a c_1 la estructura de un punto de *evaluación analítica acotada (ABPE)* [4, 2], lo que significa que existe un entorno abierto alrededor de c_1 donde todos los puntos son BPE.

Al ser c_1 un ABPE, existe un radio $r > 0$ y una constante $M > 0$ tal que, para cualquier punto z en la circunferencia $\gamma_r = \{z \in \mathbb{C} : |z - c_1| = r\}$, la evaluación puntual está uniformemente acotada por $|p(z)| \leq M\|p\|_{L^2(\mu)}$ para todo polinomio p .

Utilizando la fórmula integral de Cauchy para la primera derivada:

$$p'(c_1) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_r} \frac{p(z)}{(z - c_1)^2} dz \quad (22)$$

Podemos acotar su módulo tomando el máximo sobre la curva:

$$|p'(c_1)| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot (2\pi r) \cdot \frac{\max_{z \in \gamma_r} |p(z)|}{r^2} = \frac{1}{r} \max_{z \in \gamma_r} |p(z)| \quad (23)$$

Sustituyendo la cota uniforme de los BPEs en γ_r , obtenemos finalmente la acotación explícita para la derivada:

$$|p'(c_1)| \leq \frac{M}{r} \|p\|_{L^2(\mu)} \quad (24)$$

Como M y r son constantes estrictamente positivas e independientes del polinomio p , $\delta'_{c_1}(p) = p'(c_1)$ es un funcional lineal continuo acotado por la norma del espacio. Por lo tanto, el supremo en la Ecuación (21) está bien definido y es finito en la completación $H^2(\mu)$.

Por el Teorema de Representación de Riesz, existen dos núcleos reproductores $K_0, K_1 \in H^2(\mu)$ tales que, para todo polinomio p :

$$\begin{aligned} p(c_1) &= \langle p, K_0 \rangle_{L^2(\mu)}, \\ p'(c_1) &= \langle p, K_1 \rangle_{L^2(\mu)}. \end{aligned}$$

Definimos el subespacio bidimensional generado por estos representadores, $V_K = \text{span}\{K_0, K_1\}$. Por el Teorema de Proyección Ortogonal, cualquier polinomio p se puede descomponer de forma única como:

$$p(z) = \underbrace{\alpha K_0(z) + \beta K_1(z)}_{p_K \in V_K} + \underbrace{p_\perp(z)}_{p_\perp \perp V_K},$$

donde $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. La ortogonalidad de $p_\perp$ respecto a K_0 y K_1 implica que se anula al ser evaluado: $p_\perp(c_1) = 0$ y $p'_\perp(c_1) = 0$.

Sustituyendo esta descomposición en el cociente de Rayleigh (21), observamos que la parte ortogonal $p_\perp$ no contribuye en absoluto a la parte discreta (evaluaciones), pero contribuye a la norma L^2 :

$$\frac{\|Dp\|_S^2}{\|p\|_S^2} = \frac{\|p_K\|_{L^2(\mu)}^2 + |p_K(c_1) + c_1 p'_K(c_1)|^2 + \|p_\perp\|_{L^2(\mu)}^2}{\|p_K\|_{L^2(\mu)}^2 + |p'_K(c_1)|^2 + \|p_\perp\|_{L^2(\mu)}^2}.$$

Sea N_0 el numerador evaluado en p_K y D_0 el denominador evaluado en p_K . Si denotamos $x = \|p_\perp\|_{L^2(\mu)}^2 \geq 0$, estamos estudiando la función $f(x) = \frac{N_0+x}{D_0+x}$. Sabemos que el operador es expansivo para el primer valor singular, es decir, el supremo del cociente es estrictamente mayor que 1 (lo cual implica que existe p_K donde $N_0 > D_0$). Bajo esta condición, la derivada $f'(x) = \frac{D_0-N_0}{(D_0+x)^2}$ es estrictamente negativa. Esto significa que para maximizar el cociente, debemos minimizar x . El máximo absoluto se alcanza necesariamente cuando $x = 0$, es decir, cuando $p_\perp = 0$.

Por lo tanto, la búsqueda en dimensión infinita colapsa a una optimización en el subespacio de dimensión dos V_K . Identificando p_K con el vector de coeficientes $v = (\alpha, \beta)^T \in \mathbb{C}^2$, las normas se expresan como formas cuadráticas:

$$\begin{aligned}\|p_K\|_S^2 &= v^* A v, \\ \|Dp_K\|_S^2 &= v^* B v,\end{aligned}$$

donde A y B son matrices hermíticas de orden 2×2 cuyas entradas dependen exclusivamente de los productos escalares $\langle K_i, K_j \rangle_{L^2}$ y las evaluaciones de los núcleos en el punto c_1 .

El cálculo de $c_1(D)^2$ se reduce entonces a encontrar el mayor autovalor generalizado del haz de matrices (B, A) , es decir, la mayor raíz λ de la ecuación característica bidimensional:

$$\det(B - \lambda A) = 0. \quad (25)$$

Esta reducción justifica rigurosamente por qué el primer número de Gelfand es computable y finito bajo la hipótesis BPE, dependiendo únicamente de la geometría local en el punto y de la función de Christoffel-Darboux (o núcleo de Szegő) asociada a la medida continua.

Cabe preguntarse si, al neutralizar esta fuente de perturbación mediante la restricción a un subespacio adecuado, es posible determinar el valor del número de Gelfand residual.

4.6. Cálculo Exacto: La Solución Matricial General

Para obtener un valor explícito del primer número de Gelfand $c_1(\mathcal{D})$ para cualquier posición del punto $c \in \mathbb{D}$, debemos resolver el problema de autovalores generalizados asociado al subespacio óptimo.

Como el supremo se alcanza en el subespacio generado por los núcleos reproductores del espacio de Hardy H^2 , denotemos la base por $\mathcal{B} = \{K_0, K_1\}$, donde:

$$K_0(z) = \frac{1}{1 - \bar{c}z}, \quad K_1(z) = \frac{z}{(1 - \bar{c}z)^2}. \quad (26)$$

Cualquier polinomio candidato se escribe como $p = uK_0 + vK_1$. El problema de maximización de la norma $\|\mathcal{D}p\|_S^2 / \|p\|_S^2$ equivale a encontrar la mayor raíz λ de la ecuación característica $\det(\mathbf{B} - \lambda \mathbf{A}) = 0$.

Las entradas de estas matrices se calculan utilizando las propiedades de reproducción $\langle f, K_0 \rangle_{L^2} = f(c)$ y $\langle f, K_1 \rangle_{L^2} = f'(c)$.

1. Matriz de Norma de Entrada (A): La norma de entrada es $\|p\|_S^2 = \|p\|_{L^2}^2 + |p'(c)|^2$. Los elementos de la matriz $\mathbf{A} = (A_{ij})$ son:

$$A_{ij} = \langle K_j, K_i \rangle_{L^2} + K_j'(c) \overline{K_i'(c)}.$$

Usando la notación $k_{ij} = K_i^{(j)}(c)$ para las derivadas de los núcleos evaluadas en c :

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} k_{00} + |k_{01}|^2 & \overline{k_{01}} + k_{11} \overline{k_{01}} \\ k_{01} + \overline{k_{11}} k_{01} & k_{11} + |k_{11}|^2 \end{pmatrix}. \quad (27)$$

2. Matriz de Norma de Salida (B): La norma de salida es $\|\mathcal{D}p\|_S^2 = \|p\|_{L^2}^2 + |(\mathcal{D}p)'(c)|^2$. Observamos que $(\mathcal{D}p)'(c) = p(c) + cp'(c)$. Por tanto, la matriz $\mathbf{B}$ es una perturbación de rango 1 de la parte continua:

$$B_{ij} = \langle K_j, K_i \rangle_{L^2} + [K_j(c) + cK_j'(c)] \overline{[K_i(c) + cK_i'(c)]}.$$

4.6.1. Ejemplo Numérico: Punto en $c = 0.5$

Particularicemos para un punto real en $c = 1/2$. Los valores de los núcleos y sus derivadas son:

$$\begin{aligned} k_{00} &= \frac{4}{3}, & k_{01} &= \frac{8}{9}, \\ k_{11} &= \frac{1 + (1/2)^2}{(1 - (1/2)^2)^3} = \frac{1.25}{0.421875} = \frac{80}{27} \approx 2.963. \end{aligned}$$

Construimos las matrices $\mathbf{A}$ (norma de entrada) y $\mathbf{B}$ (norma de salida) utilizando las fórmulas derivadas:

$$\mathbf{A} \approx \begin{pmatrix} 2.123 & 3.522 \\ 3.522 & 11.742 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} \approx \begin{pmatrix} 4.493 & 5.101 \\ 5.101 & 8.581 \end{pmatrix}. \quad (28)$$

El primer número de Gelfand se obtiene de la mayor raíz de la ecuación característica $\det(\mathbf{B} - \lambda \mathbf{A}) = 0$. Al desarrollar el determinante, encontramos una propiedad notable: $\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{B})$, lo que resulta en una ecuación polinómica simétrica (los autovalores son recíprocos, $\lambda_1 \lambda_2 = 1$):

$$12.52\lambda^2 - 35.04\lambda + 12.52 = 0. \quad (29)$$

Resolviendo para la mayor raíz:

$$\lambda_{max} = \frac{35.04 + \sqrt{35.04^2 - 4(12.52)^2}}{2(12.52)} \approx 2.377.$$

Por lo tanto, la norma del operador con un punto en $c = 0.5$ es:

$$c_1(\mathcal{D}) = \sqrt{\lambda_{max}} \approx \sqrt{2.377} \approx 1.5417. \quad (30)$$

Este valor es consistente con las simulaciones numéricas de secciones finitas, las cuales convergen geométricamente a este límite. Observamos que $1.5417 > \sqrt{2} \approx 1.414$, confirmando que el desplazamiento del punto hacia la frontera incrementa la norma.

4.7. El Segundo Número de Gelfand: Recuperando la Circunferencia

A continuación se calcula $c_2(D)$, el ínfimo de la norma del operador sobre todos los subespacios de codimensión 1.

El siguiente teorema establece que, independientemente de la posición exacta del punto BPE, al restringir el espacio una sola dimensión, la norma del operador coincide exactamente con el radio de la circunferencia.

Teorema 3 (Valor exacto de c_2 para un punto). *Sea $\mathcal{H}$ el espacio de Sobolev con medida continua soportada en S_1 y un único punto BPE c_1 en la derivada. El segundo número de Gelfand del operador de multiplicación $D(p) = zp$ es exactamente el radio de la circunferencia:*

$$c_2(D) = 1$$

Demostración. La demostración se estructura en dos partes: en primer lugar, se exhibe un subespacio de codimensión 1 donde la norma del operador restringido es igual a 1 (cota superior); en segundo lugar, se demuestra que ningún subespacio de codimensión 1 permite reducir la norma del operador por debajo de este valor (cota inferior).

Parte I: Cota superior ($c_2(D) \leq 1$)

Buscamos un subespacio V de codimensión 1 que neutralice el efecto expansivo de la derivada. Motivados por la expresión de la norma de la imagen, definimos el subespacio óptimo V_{opt} imponiendo que la derivada de la imagen se anule en el punto:

$$V_{opt} = \{p \in \mathbb{P}[z] : (zp)'(c_1) = 0\}.$$

Esta condición es el núcleo del funcional lineal $\Psi(p) = p(c_1) + c_1 p'(c_1)$. Gracias a nuestra hipótesis BPE, las evaluaciones $p(c_1)$ y $p'(c_1)$ son continuas, lo que hace que $\Psi \in \mathcal{H}^*$. En consecuencia, $V_{opt} = \ker(\Psi)$ es un subespacio cerrado de codimensión 1 (o 0, si Ψ fuera trivial, lo cual también es admisible).

Si tomamos cualquier polinomio $p \in V_{opt}$, su norma de salida se reduce a:

$$\begin{aligned} \|Dp\|_S^2 &= \int_{S_1} |zp(z)|^2 d\mu + \underbrace{|(zp)'(c_1)|^2}_{=0 \text{ en } V_{opt}} \\ &= \int_{S_1} 1 \cdot |p(z)|^2 d\mu = \|p\|_{L^2(\mu)}^2. \end{aligned}$$

Dado que en nuestro producto de Sobolev siempre se cumple que la parte integral está acotada por la norma total ($\|p\|_{L^2(\mu)}^2 \leq \|p\|_S^2$), deducimos que $\|Dp\|_S^2 \leq \|p\|_S^2$. Por tanto, $\|D|_{V_{opt}}\|_S \leq 1$. Al ser V_{opt} un subespacio válido para el ínfimo, garantizamos que $c_2(D) \leq 1$.

Parte II: Cota inferior ($c_2(D) \geq 1$)

Procedemos por reducción al absurdo. Supóngase que $c_2(D) < 1$. Esto implicaría la existencia de un subespacio cerrado $V \subset \mathcal{H}$ de codimensión 1 (o 0), y un cierto $\epsilon > 0$, donde el operador fuera una contracción estricta:

$$\|Dp\|_S^2 \leq (1 - \epsilon) \|p\|_S^2, \quad \forall p \in V.$$

Desglosando esta hipótesis en sus componentes continua y discreta:

$$\|p\|_{L^2(\mu)}^2 + |(zp)'(c_1)|^2 \leq (1 - \epsilon) \left(\|p\|_{L^2(\mu)}^2 + |p'(c_1)|^2 \right).$$

El término $|(zp)'(c_1)|^2$ es siempre no negativo, por lo que si lo eliminamos del lado izquierdo, la desigualdad debe seguir siendo cierta:

$$\|p\|_{L^2(\mu)}^2 \leq (1 - \epsilon)\|p\|_{L^2(\mu)}^2 + (1 - \epsilon)|p'(c_1)|^2.$$

Reagrupando la norma L^2 , llegamos a la siguiente condición ineludible para todo $p \in V$:

$$\epsilon\|p\|_{L^2(\mu)}^2 \leq (1 - \epsilon)|p'(c_1)|^2. \quad (31)$$

Consideremos el funcional de evaluación de la derivada $E(p) = p'(c_1)$, restringido a nuestro subespacio V . Como E es un funcional lineal a valores escalares sobre un espacio de dimensión infinita (V), su núcleo, $\ker(E|_V)$, no puede ser trivial; de hecho, es de dimensión infinita.

Elegimos entonces un polinomio no nulo $q \in \ker(E|_V)$. Para este elemento particular, se cumple $q'(c_1) = 0$. Al introducir q en nuestra desigualdad (31), la parte discreta se desvanece:

$$\epsilon\|q\|_{L^2(\mu)}^2 \leq 0.$$

Puesto que $\epsilon > 0$, la única solución matemática es que $\|q\|_{L^2(\mu)} = 0$. Pero la medida μ reside en la circunferencia S_1 , la cual contiene infinitos puntos. Un polinomio que se anula en la circunferencia completa es idénticamente nulo ($q = 0$), lo que contradice la elección de $q \neq 0$.

La contradicción se obtiene al suponer que el operador podía ser acotado por debajo de 1 restringiendo una única dimensión. Por consiguiente, $c_2(D) \geq 1$.

Combinando las Partes I y II, se concluye que $c_2(D) = 1$. $\square$

5. Cálculo Exacto del Número de Gelfand Asintótico (Caso Acotado)

Aplicando la definición de los números de Gelfand introducida en la sección anterior, se extiende el análisis al caso general de N puntos.

Para poder aplicar esta teoría globalmente a nuestro operador de multiplicación $D(p) = zp$, es condición necesaria que D sea un operador acotado en $\mathcal{H}$. Como hemos demostrado en secciones anteriores, esto ocurre si y solo si las evaluaciones en los puntos no generan divergencias en la norma.

Lema 2 (Acotación Global bajo Hipótesis BPE). *Supongamos que los N puntos discretos $\{c_1, \dots, c_N\}$ asociados a las derivadas son Bounded Point Evaluations (BPE) en $\mathcal{H}$, y están situados en el disco unidad abierto ($|c_k| < 1$). Entonces, el operador D es globalmente acotado en $\mathcal{H}$, y sus números de Gelfand $c_m(D)$ están bien definidos para todo $m \geq 1$.*

Bajo esta premisa de acotación global, se demuestra que, independientemente de la posición exacta de los N puntos BPE dentro del disco, el $(N+1)$ -ésimo número de Gelfand está determinado por la parte continua de la medida.

Teorema 4 (Valor exacto de c_{N+1}). *Sea $\mathcal{H}$ el espacio de Sobolev con medida continua soportada en la circunferencia unidad S_1 ($R = 1$) y N puntos BPE en la derivada. Entonces, el $(N+1)$ -ésimo número de Gelfand del operador de multiplicación es exactamente el radio de la circunferencia:*

$$c_{N+1}(D) = 1$$

Demostración. Para demostrar esta igualdad, estableceremos independientemente una cota superior y una cota inferior para el ínfimo que define a $c_{N+1}(D)$, el cual evalúa subespacios de codimensión menor o igual a N .

Paso 1: Cota Superior ($c_{N+1}(D) \leq 1$)

Definimos el subespacio V_{opt} anulando la derivada de la imagen en los N puntos:

$$V_{opt} = \{p \in \mathcal{H} : (zp)'(c_k) = 0, \quad \forall k = 1, \dots, N\}.$$

Podemos expresar esta restricción mediante los funcionales $\Psi_k(p) = p(c_k) + c_k p'(c_k)$. Al ser los puntos BPE por hipótesis, las evaluaciones de la función y de su derivada son funcionales lineales continuos. Por tanto, $\Psi_k \in \mathcal{H}^*$. El subespacio $V_{opt} = \bigcap_{k=1}^N \ker(\Psi_k)$ es la intersección de N núcleos de funcionales continuos, lo que garantiza que es un subespacio cerrado con $\text{codim}(V_{opt}) \leq N$.

Evaluamos la norma de la imagen para cualquier $p \in V_{opt}$:

$$\begin{aligned} \|Dp\|_S^2 &= \int_{S_1} |zp(z)|^2 d\mu + \sum_{k=1}^N \underbrace{|(zp)'(c_k)|^2}_{=0 \text{ en } V_{opt}} \\ &= \int_{S_1} 1 \cdot |p(z)|^2 d\mu = \|p\|_{L^2(\mu)}^2. \end{aligned}$$

Por la definición del producto interno de Sobolev, es evidente que $\|p\|_{L^2(\mu)}^2 \leq \|p\|_S^2$. En consecuencia, $\|Dp\|_S \leq \|p\|_S$ para todo $p \in V_{opt}$, lo que significa que $\|D|_{V_{opt}}\|_S \leq 1$. Como V_{opt} es un candidato válido para el ínfimo (su codimensión no excede N), se sigue que:

$$c_{N+1}(D) \leq \|D|_{V_{opt}}\|_S \leq 1.$$

Paso 2: Cota Inferior ($c_{N+1}(D) \geq 1$)

Procederemos por reducción al absurdo. Supongamos que $c_{N+1}(D) < 1$. Por la definición de ínfimo, existiría un subespacio cerrado $V \subset \mathcal{H}$ con $\text{codim}(V) \leq N$ y un $\epsilon > 0$ tal que el operador se contrae estrictamente sobre V :

$$\|Dp\|_S^2 \leq (1 - \epsilon) \|p\|_S^2, \quad \forall p \in V.$$

Desarrollando las normas de Sobolev:

$$\|p\|_{L^2(\mu)}^2 + \sum_{k=1}^N |(zp)'(c_k)|^2 \leq (1 - \epsilon) \left(\|p\|_{L^2(\mu)}^2 + \sum_{k=1}^N |p'(c_k)|^2 \right).$$

Dado que el sumatorio de la izquierda es siempre no negativo, podemos omitirlo para obtener una desigualdad que debe seguir siendo cierta:

$$\|p\|_{L^2(\mu)}^2 \leq (1 - \epsilon) \|p\|_{L^2(\mu)}^2 + (1 - \epsilon) \sum_{k=1}^N |p'(c_k)|^2.$$

Reagrupando términos:

$$\epsilon \|p\|_{L^2(\mu)}^2 \leq (1 - \epsilon) \sum_{k=1}^N |p'(c_k)|^2, \quad \forall p \in V. \quad (32)$$

Consideremos la aplicación de evaluación de derivadas $E : V \rightarrow \mathbb{C}^N$ definida por $E(p) = (p'(c_1), \dots, p'(c_N))$. Por nuestra hipótesis, los puntos son *Bounded Point Evaluations* (BPE), lo que implica por definición que cada funcional de evaluación es continuo respecto a la norma de Sobolev. En consecuencia, el operador lineal E es continuo.

En Análisis Funcional, el núcleo de un operador lineal continuo es siempre un subespacio cerrado. Por tanto, $\ker(E|_V)$ es un subespacio cerrado de V . Además, dado que la imagen $\text{Im}(E|_V)$ está contenida en $\mathbb{C}^N$, es de dimensión finita (y por tanto cerrada).

Aplicando el Primer Teorema de Isomorfía Topológica para espacios de Banach (véase Conway [3]), tenemos el siguiente isomorfismo algebraico y topológico:

$$V/\ker(E|_V) \cong \text{Im}(E|_V) \subseteq \mathbb{C}^N$$

Dado que el espacio V es de dimensión infinita (por tener codimensión finita en $\mathcal{H}$) y el espacio cociente $V/\ker(E|_V)$ es de dimensión finita, se deduce que el núcleo $\ker(E|_V)$ debe ser un subespacio cerrado de dimensión infinita.

Tomemos cualquier polinomio no nulo $q \in \ker(E|_V)$ (cuya existencia está garantizada al ser de dimensión infinita). Para este polinomio se cumple $q'(c_k) = 0$ para todo $k = 1, \dots, N$. Sustituyendo q en la desigualdad (32) obtenemos:

$$\epsilon \|q\|_{L^2(\mu)}^2 \leq 0.$$

Como $\epsilon > 0$, concluimos que $\|q\|_{L^2(\mu)} = 0$. Al estar la medida μ soportada en la circunferencia S_1 (un conjunto con infinitos puntos), el único polinomio con norma L^2 nula es el polinomio idénticamente cero, lo cual contradice la elección de $q \neq 0$.

Esta contradicción demuestra que no existe ningún subespacio V de codimensión $\leq N$ capaz de reducir la norma del operador por debajo de 1. Por consiguiente:

$$c_{N+1}(D) \geq 1.$$

La combinación de la cota superior y la inferior concluye la demostración: $c_{N+1}(D) = 1$. □

5.1. Definición de Valores Singulares para Operadores No Acotados

Dado que nuestro operador de multiplicación puede no ser acotado en el caso de puntos exteriores o en la frontera (donde la evaluación no es un funcional continuo), la definición clásica de los números de Gelfand basada en la codimensión de subespacios cerrados presenta dificultades topológicas (el núcleo de la evaluación es denso).

Vamos a dar una definición robusta que cubra tanto el caso BPE como el no-BPE, adoptamos la definición variacional basada en el Principio Min-Max de Courant-Fischer para la raíz cuadrada del operador positivo D^*D .

Definición 7 (Valores Singulares Variacionales). Definimos el k -ésimo valor singular $\sigma_k(\mathcal{D})$ como:

$$\sigma_k(\mathcal{D}) = \inf_{\substack{S \subset \mathcal{H} \\ \dim(S) < k}} \left(\sup_{\substack{f \in S^\perp \cap \text{Dom}(\mathcal{D}) \\ f \neq 0}} \frac{\|\mathcal{D}f\|}{\|f\|} \right).$$

Esta definición nos permite interpretar rigurosamente los resultados numéricos:

- **Para σ_1 ($k = 1$):** El ínfimo se toma sobre el subespacio nulo ($\dim S = 0$). El supremo recorre todo el dominio. Si el punto no es BPE, este supremo es infinito ($\sigma_1 = \infty$).
- **Para σ_2 ($k = 2$):** Buscamos eliminar un subespacio unidimensional S . Si elegimos S alineado con la singularidad del punto, el supremo sobre el complemento ortogonal $S^\perp$ se estabiliza.

Experimentalmente, hemos comprobado que restringir el operador al subespacio algebraico $V_{alg} = \{p \in \mathbb{P}[z] : p(a) = 0\}$ equivale a eliminar la singularidad espectral, obteniendo una norma restringida finita (específicamente 1) incluso cuando la norma global diverge. Esto confirma que la divergencia de σ_1 es una propiedad de rango 1.

Ejemplo 1 (Justificación mediante el Triplete de Gelfand para $c = 2$). Para ilustrar la necesidad de desvincular la estructura algebraica de la topológica, consideremos nuestro modelo con un punto fuera de la circunferencia unidad, concretamente en $c = 2$. El espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ se dota de la norma de Sobolev:

$$\|p\|_S^2 = \|p\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 + |p'(2)|^2$$

Al aplicar el operador de multiplicación $\mathcal{D}p(z) = zp(z)$, la norma de la imagen introduce el funcional problemático $\Psi(p) = (zp)'(2) = p(2) + 2p'(2)$:

$$\|\mathcal{D}p\|_S^2 = \|p\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 + |p(2) + 2p'(2)|^2$$

Es evidente que el operador $\mathcal{D}$ es globalmente no acotado en $\mathcal{H}$, ya que el término cruzado $|p(2) + 2p'(2)|^2$ puede hacerse arbitrariamente grande en relación a $\|p\|_S^2$. Desde el punto de vista puramente topológico, el funcional de evaluación Ψ no está acotado.

Para dotar de rigor a nuestra restricción a un subespacio de codimensión finita, recurrimos a la formulación del **Triplete de Gelfand** (o *Rigged Hilbert Space*), introducido por Gelfand y Vilenkin [6]:

$$\Phi \subset \mathcal{H} \subset \Phi^*$$

- **El espacio de prueba (Φ):** Elegimos como espacio base el álgebra de polinomios $\Phi = \mathbb{P}[z]$, el cual es un subespacio denso en $\mathcal{H}$. En Φ , las funciones son algebraicamente perfectas (holomorfas en $\mathbb{C}$) y las evaluaciones puntuales o de derivadas están rigurosamente definidas.
- **El espacio dual (Φ^*):** En este espacio de distribuciones habitan los funcionales que, aun siendo no acotados respecto a la métrica de $\mathcal{H}$, están perfectamente definidos sobre el espacio de prueba. Nuestro funcional singular de evaluación de la derivada, asimilable a una distribución tipo Delta, vive de forma natural en Φ^* .

El formalismo de Gelfand nos legitima a definir nuestro subespacio restrictivo $V_0 = \{p \in \mathbb{P}[z] : p(2) + 2p'(2) = 0\}$ operando **estrictamente dentro del espacio de prueba** Φ . En este entorno algebraico, Ψ es un funcional lineal bien definido, por lo que V_0 posee exactamente una codimensión algebraica de 1. La teoría garantiza que es rigurosamente válido realizar el análisis espectral y aplicar el Principio Min-Max sobre la estructura algebraica del espacio Φ , sorteando así el hecho de que, al tomar la clausura en la topología de $\mathcal{H}$, la codimensión colapsaría debido a la densidad del núcleo.

Ejemplo 2 (Aislamiento de la singularidad en $c = 2$ mediante *Point Interactions*). Una vez legitimado el uso del funcional de evaluación a través del Triplete de Gelfand, es necesario justificar la técnica de restringir el dominio del operador $\mathcal{D}$ para estudiar su espectro. Este procedimiento encuentra su paralelismo exacto en la mecánica cuántica mediante la teoría de *Point Interactions* (interacciones puntuales), desarrollada exhaustivamente por Albeverio et al. [1].

En la física matemática, cuando un operador diferencial libre (como el Hamiltoniano $H_0 = -\Delta$) es perturbado por un potencial altamente singular soportado en un único punto (como una masa Delta de Dirac), el operador resultante se vuelve no acotado y explota. La metodología usada para estudiar este sistema consiste en aislar la singularidad restringiendo el operador a un subespacio denso formado por las funciones que se anulan en dicho punto.

Aplicando este mismo marco a nuestro caso de la circunferencia unidad con un átomo en $c = 2$:

- **El operador libre:** En nuestro contexto, el análogo al operador libre es el operador de desplazamiento clásico $\mathcal{D}_0 p(z) = zp(z)$ actuando únicamente sobre la medida de Lebesgue en la circunferencia S^1 . Sabemos que este operador es una isometría, por lo que su norma es exactamente 1.
- **Aislamiento de la perturbación:** La masa discreta en la derivada introduce la perturbación singular. Siguiendo el esquema de Albeverio, “apagamos” esta singularidad restringiendo intencionadamente nuestro operador $\mathcal{D}$ a aquellas funciones de prueba que evitan excitar el átomo. En la práctica, esto significa imponer la condición analítica sobre la imagen: $(zp)'(2) = 0$, lo que equivale a nuestro subespacio algebraico $V_0 = \{p \in \mathbb{P}[z] : p(2) + 2p'(2) = 0\}$.
- **Recuperación de la métrica base:** Al evaluar el cociente de Rayleigh restringiendo los polinomios estrictamente a V_0 , el término cruzado de la norma de Sobolev se aniquila por diseño:

$$\|\mathcal{D}p\|_S^2 = \|p\|_{L^2(S^1)}^2 + |(zp)'(2)|^2 = \|p\|_{L^2(S^1)}^2 + 0$$

Dentro de este subespacio, el operador $\mathcal{D}$ se comporta exactamente como el operador libre $\mathcal{D}_0$. Por lo tanto, el supremo del cociente de Rayleigh en V_0 recupera la cota natural de 1.

Esta fundamentación teórica valida de manera robusta nuestros experimentos numéricos. Cuando, en el entorno computacional, forzamos la matriz de Gram a evaluar el operador bajo la restricción de que el producto de la derivada sea nulo, el algoritmo está reproduciendo una interacción puntual: aísla la “partícula” en $c = 2$ y permite que la matriz revele el comportamiento espectral limpio de la circunferencia subyacente.

Ejemplo 3 (Explicación del desdoblamiento espectral mediante la Teoría de Extensiones de Von Neumann). Una vez comprendido cómo el subespacio restrictivo V_0 aísla la singularidad del átomo, queda por explicar analíticamente el fenómeno observado en nuestros experimentos computacionales: ¿por qué exactamente $\sigma_1 \rightarrow \infty$ mientras que σ_2 desciende bruscamente y converge a 1?

La respuesta a esta dicotomía espectral reside en la teoría de extensiones de operadores simétricos no acotados, desarrollada por J. von Neumann ([10]). En esta teoría, el “tamaño”

o impacto de una restricción en el dominio de un operador se cuantifica mediante los denominados **índices de defecto** (deficiency indices).

Al restringir el dominio del operador de multiplicación al subespacio $V_0 = \ker(\Psi)$, hemos “sustraído” a nuestro espacio de prueba $\mathbb{P}[z]$ exactamente una dimensión algebraica. Según la teoría de Von Neumann, esta restricción de codimensión 1 genera un operador simétrico con índices de defecto $(1, 1)$.

Desde la perspectiva de la teoría de perturbaciones, esto significa que la inclusión del átomo en la derivada actúa como una **perturbación de rango 1** (en el sentido de formas cuadráticas o resolventes) respecto al operador libre de la circunferencia continua. Esta identificación nos permite invocar el Teorema de Weyl para perturbaciones de rango finito:

- **Invarianza del espectro esencial:** El Teorema de Weyl establece que una perturbación de rango k solo puede extraer, a lo sumo, k valores propios o singulares del espectro continuo, dejando el espectro esencial (y su radio) absolutamente inalterado.
- **Consecuencia para nuestro modelo ($c = 2$):** Como nuestra perturbación tiene rango exactamente 1 (derivado de la codimensión 1 de V_0), la teoría exige que **exactamente un único valor singular** absorba toda la divergencia impuesta por el funcional no acotado. Este es el motivo por el cual $\sigma_1 \rightarrow \infty$.
- **Estabilización de σ_2 :** Al haberse agotado el rango de la perturbación con σ_1 , la perturbación singular ya no tiene “capacidad dimensional” para alterar el resto del espectro. Por aplicación directa del Principio Min-Max sobre el complemento ortogonal (o algebraico), el segundo valor singular variacional (σ_2) y todos los subsiguientes quedan anclados a la geometría de la parte no perturbada del operador, convergiendo a 1, el radio de la circunferencia unidad S^1 .

En conclusión, la convergencia $\sigma_2 \rightarrow 1$ obtenida mediante el truncamiento de matrices no es una casualidad numérica ni un artefacto del algoritmo, sino la manifestación discreta y exacta de una perturbación no acotada de rango uno sobre el espectro de un operador en dimensión infinita.

Referencias

- [1] Sergio Albeverio, Fritz Gesztesy, Raphael Høegh-Krohn, and Helge Holden. *Solvable Models in Quantum Mechanics*. Springer-Verlag, 1988.
- [2] Alexandru Aleman, Stefan Richter, and Carl Sundberg. Nontangential limits in $p^t(\mu)$ -spaces and the index of invariant subspaces. *Annals of Mathematics*, 169(2):449–490, 2009.
- [3] John B. Conway. *A Course in Functional Analysis*, volume 96 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, New York, 2 edition, 1990.
- [4] John B. Conway and Liming Yang. Approximation in the mean by rational functions, 2020.
- [5] Peter L. Duren. *Theory of H^p Spaces*, volume 38 of *Pure and Applied Mathematics*. Academic Press, New York, 1970.

- [6] I. M. Gel'fand and N. Ya. Vilenkin. *Generalized Functions, Volume 4: Applications of Harmonic Analysis*. Academic Press, 1964.
- [7] Israel C Gohberg and Mark G Krein. *Introduction to the Theory of Linear Nonselfadjoint Operators*. American Mathematical Society, Providence, RI, 1969. Referencia clásica para los s-números y el Principio Min-Max.
- [8] Paul R. Halmos. *A Hilbert Space Problem Book*, volume 19 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, New York, 2 edition, 1982.
- [9] Erwin Kreyszig. *Introductory Functional Analysis with Applications*. John Wiley & Sons, 1989.
- [10] Michael Reed and Barry Simon. *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. II: Fourier Analysis, Self-Adjointness*. Academic Press, 1975.
- [11] Steven Roman. *Advanced Linear Algebra*. Springer, 3 edition, 2007.