

Introduction au signal et bruit

Exercices

Gabriel Dauphin

November 27, 2025

Contents

1	Relations entrées-sorties sans effet mémoire	3
2	Signaux temps continu, fonction affine par morceaux	6
3	Définition et utilisation de la transformée de Fourier	10
4	Propriété de la transformée de Fourier	13
5	Diracs	19
6	Transformées de Fourier et dérivation	21
7	Équations différentielles	24
8	Filtres et effet mémoire	27

9	Description fréquentielle des filtres	30
10	Signaux périodiques	34
11	Filtres agissant sur des signaux périodiques	39
12	Échantillonnage d'un signal non-périodique	42
13	Modélisation stochastique du bruit	45
14	Autocorrélation et densité spectrale	49
15	Filtrage des processus aléatoires et application au bruit en $1/f$	53
16	Densité de probabilité et application au bruit de grenaille	56
A	Supplément pour faire les pseudo-programmes	59
A.1	Outils	59
A.1.1	Commandes générales	60

Chapter 1

Relations entrées-sorties sans effet mémoire




Figure 1.1: Relation entrée-sortie associée à un Relu (exercice [1](#))

Exercice 1 *Le graphique représente la relation entrée-sortie d'un Relu pour Rectified*

Linear Unit.

1. En utilisant la figure 1.1, combien valent les signaux en sortie lorsque respectivement, les signaux en entrées valent -3 et 3 ?
2. Combien valent les puissances de ces signaux ?
3. Proposez une formule utilisant la valeur absolue, l'addition et la multiplication pour modéliser cette relation ?
4. On considère le filtre $\mathcal{H}_1(x) = 0.5x$ et $\mathcal{H}_2(x) = |x|$, montrez comment en les associant on peut fabriquer le filtre **Relu**.
5. Écrire le pseudo-code permettant de générer la figure 1.1.




Figure 1.2: Schéma décrivant \mathcal{H} à partir de $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2, \mathcal{H}_3$ pour l'exercice 2.

Exercice 2 Les filtres $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ et \mathcal{H}_3 sont définis par

$$\mathcal{H}_1(x) = |x| \quad \mathcal{H}_2(x) = \min(1, x) \quad \mathcal{H}_3(x) = \max(0, x) \quad (1.1)$$

On appelle \mathcal{H} le filtre décrit par la figure 1.2 et défini par les filtres $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2, \mathcal{H}_3$. et associé à la relation transformant x en y .

1. Calculez les sorties y associées aux valeurs $-2, -1, 0, 1, 2$ pour x .
2. Écrivez la formule modélisant \mathcal{H} ?
3. Dessinez la relation associée à \mathcal{H} transformant x en y sur un graphe.

Chapter 2

Signaux temps continu, fonction affine par morceaux




Figure 2.1: Visualisation de $x(t)$ qui a la forme d'une maison avec son lampadaire (exercice 3).

Exercice 3 *On considère le signal $x(t)$ décrit par la figure 2.1.*

1. *Calculez les valeurs de $x(t)$ pour les valeurs de t $-2.5, 0.5, 1, 2.5$.*
2. *Écrivez une formule décrivant $x(t)$ au moyen de différents intervalles de temps.*
3. *Utilisez quelques unes des fonctions de base présentées en cours pour définir $x(t)$.*
4. *Utilisez le crochet d'Iverson pour décrire $x(t)$.*

Exercice 4 *On considère le signal $x(t)$ ainsi défini*

$$x(t) = (at + b) \llbracket t_1 \leq t \leq t_2 \rrbracket \quad (2.1)$$

1. *Représentez ce signal pour $a = 1$, $b = 0$ et $t_1 = 2$, $t_2 = 3$.*
2. *Représentez ce signal pour $a = -1$, $b = 1$ et $t_1 = 0$, $t_2 = 1$.*
3. *Montrez que pour $a = 0$, $x(t)$ peut se mettre sous la forme*

$$x(t) = \alpha \Pi(\gamma t + \delta) \quad (2.2)$$

4. Montrez que pour $a > 0$, $x(t)$ peut se mettre sous la forme

$$x(t) = \alpha \Pi(\gamma t + \delta) + \beta \mathbb{C}(\gamma t + \delta) \quad (2.3)$$

5. Donnez un pseudo-code permettant de visualiser de signal.

Chapter 3

Définition et utilisation de la transformée de Fourier

Exercice 5 *On cherche à déterminer la transformée de Fourier de $s(t) = e^{-|t|}$.*

- 1. Calculer la somme et l'énergie de ce signal.*
- 2. On note $s_1(t) = s(t)\mathbb{I}[t \geq 0](t)$. Calculez la transformée de Fourier de $s_1(t)$ notée $\widehat{S}_1(f)$.*
- 3. On note $s_2(t) = s(t)\mathbb{I}[t \leq 0](t)$. Calculez la transformée de Fourier de $s_2(t)$ notée $\widehat{S}_2(f)$.*
- 4. On remarque $s(t) = s_1(t) + s_2(t)$ pour $t \neq 0$. Que peut-on en déduire sur la relation entre $\widehat{S}(f)$ et $\widehat{S}_1(f)$ et $\widehat{S}_2(f)$.*

5. Déduisez $\widehat{S}(f)$.

6. En établissant le lien avec la première question, déterminez $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+4\pi^2 t^2} dt$.




Figure 3.1: Visualisation du signal $x(t)$ (exercice 6).

Exercice 6 On considère le signal noté $x(t)$ et décrit par la figure 3.1. Donnez un pseudo-algorithme permettant de calculer sa transformée de Fourier.

Exercice 7 On considère le signal $x(t) = e^{-|t|}$ dont la transformée de Fourier vaut $\widehat{X}(f) = \frac{2}{1+4\pi^2 f^2}$. On considère

$$y(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x(t-n)}{2^n} \quad (3.1)$$

Montrez que la transformée de Fourier de $y(t)$ est

$$\widehat{Y}(f) = \frac{2}{1 + 4\pi^2 f^2} \left(\frac{1}{1 - \frac{e^{-j2\pi f}}{2}} \right) \quad (3.2)$$

Chapter 4

Propriété de la transformée de Fourier

Exercice 8 *Cet exercice cherche à illustrer la notion de parité.*

1. *On considère le signal $s(t) = e^{-|t|}$. Montrez que la transformée de Fourier de ce signal est à valeurs réelles.*
2. *En considérant différentes fonctions de bases, proposez un algorithme montrant que la transformée de Fourier d'un signal pair est réel et que la transformée de Fourier d'un signal impair est imaginaire pur.*

Exercice 9 *On se donne des fonctions de bases et des tirages aléatoires. Montrez comment par simulation on peut confirmer que $TF\left[x\left(\frac{t}{a}\right)\right](f) = a\widehat{X}(af)$ pour $a > 0$.*




Figure 4.1: Figure associée à l'exercice 10.

Exercice 10 On considère le signal $x(t) = \mathbb{T}(t) = (1 - |t|)\mathbb{I}[-1 \leq t \leq 1](t)$

1. En s'inspirant de la figure 4.1, montrez que

$$2x\left(\frac{t}{2}\right) = 2x(t) + x(t-1) + x(t+1) \quad (4.1)$$

2. Montrez en utilisant l'équation (4.1) que

$$2\widehat{X}(2f) = \widehat{X}(f) \left(2 + e^{-2j\pi f} + e^{2j\pi f}\right) \quad (4.2)$$

3. On remarque que $2 + e^{-2j\pi f} + e^{2j\pi f} = (e^{-j\pi f} + e^{j\pi f})^2 = 4 \cos^2(\pi f)$. En déduire l'expression de $\frac{\widehat{X}(2f)}{\widehat{X}(f)}$
4. On sait par ailleurs que $\widehat{X}(f) = \frac{\sin(\pi f)}{\pi f}$, montrez que cette affirmation est compatible avec l'expression trouvée plus haut.




Figure 4.2: Graphe de $x(t)$ relatif à l'exercice 11.

Exercice 11 Le signal montré sur la figure 4.2 est noté $x(t)$. Sa transformée de Fourier est notée \widehat{X} .

1. *Donnez une expression de $x(t)$ sous la forme de sa description sur plusieurs intervalles.*
2. *Donnez une expression de $x(t)$ en fonction de $\llbracket \cdot \rrbracket$.*
3. *Calculez $x(0)$, $x(1)$, E_x .*
4. *Calculez $\widehat{X}(0)$ et $\widehat{X}(1)$.*
5. *Construire $y_1(t) = x\left(\frac{t}{2}\right)$*
6. *Construire $y_1(t) = x(t - 1)$*
7. *Construire $y_1(t) = \frac{1}{2}x(t)$*
8. *Construire $y_1(t) = x(t) - x(t - 2)$*




Figure 4.3: Graphe de $x(t)$ et de sa tangente pour l'exercice 12.

Exercice 12 *Le signal montré sur la figure 4.3 est noté $x(t)$. Sa transformée de Fourier est notée \widehat{X} . Ce signal est de la forme $x(t) = ae^{-bt}\mathbf{1}(t \geq 0)$.*

1. *Justifiez la valeur de a avec la courbe exponentielle sur la figure 4.3.*
2. *Justifiez la valeur de b avec la ligne tangente à la courbe exponentielle sur la figure 4.3.*
3. *Donnez une expression de $x(t)$ en fonction de $\llbracket \rrbracket$.*

4. Calculez $x(0)$, $x(1)$, E_x .
5. Calculez $\widehat{X}(0)$ et $\widehat{X}(1)$.
6. Construire $y_1(t) = x\left(\frac{t}{2}\right)$
7. Construire $y_1(t) = x(t - 1)$
8. Construire $y_1(t) = \frac{1}{2}x(t)$
9. Construire $y_1(t) = x(t) - x(t - 2)$

Chapter 5

Diracs

Exercice 13 *On considère le signal $x(t) = \Pi(t) = \llbracket -0.5 \leq t \leq 0.5 \rrbracket(t)$.*

1. *Calculez sa dérivée $y(t) = \frac{d}{dt}x(t)$.*
2. *Calculez $z(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$.*
3. *Calculez la transformée de Fourier de $y(t)$ notée $\widehat{Y}(f)$ et en déduire celle de $x(t)$ notée $\widehat{X}(f)$.*
4. *Représentez les signaux $x(t), y(t), z(t)$.*

Exercice 14 *On considère un oscillateur obtenu avec un comparateur (un amplificateur opérationnel monté en comparateur) et une capacité qui se charge et se décharge avec une résistance en fonction de la sortie du comparateur.*

1. *Proposez un montage électronique ou un schéma bloc.*
2. *Donnez les équations de charge et décharge du condensateur.*
3. *Donnez l'algorithme permettant de simuler le fonctionnement de cet oscillateur.*

Chapter 6

Transformées de Fourier et dérivation

Exercice 15 *On considère le signal $x(t) = e^{-t} \llbracket t \geq 0 \rrbracket(t)$ et on note $\widehat{X}(f)$ sa transformée de Fourier.*

1. *Calculez $\widehat{X}(f)$.*
2. *Vérifiez qu'à partir de $\widehat{X}(0) = 1$ vous retrouvez un résultat cohérent avec la définition de $x(t)$.*
3. *Un calcul mathématique ¹ montre que $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \pi$. Proposez un algorithme permettant de vérifier que ce résultat est correct.*

¹Ce calcul utilise un simple changement de variable $x = \tan(\theta)$.

4. Sachant que $x(t)$ est en fait réel, expliquez pourquoi

$$x(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{df}{1 + 4\pi^2 f^2} \quad (6.1)$$

5. En utilisant le résultat précédent calculez la valeur théorique de $x(0) = \frac{1}{2}$.

6. Expliquez pourquoi on ne trouve pas le résultat $x(0) = 1$.

Exercice 16 On considère l'équation différentielle

$$\tau_2 \frac{d}{dt} y(t) + y(t) = e^{-\frac{t}{\tau_1}} \llbracket t \geq 0 \rrbracket(t) \quad (6.2)$$

On note la transformée de Fourier de $y(t)$, $\widehat{Y}(f)$.

1. Calculez $\widehat{Y}(f)$

2. Montrez que $\widehat{Y}(f)$ se met sous la forme

$$\widehat{Y}(f) = \frac{a}{1 + j2\pi f\tau_1} + \frac{b}{1 + j2\pi f\tau_2} \quad (6.3)$$

Trouvez les valeurs de a et b .

3. Donnez un algorithme permettant de confirmer la façon dont a et b dépendent de τ_1 et τ_2 en tirant aléatoirement des valeurs de τ_1 et τ_2 .

4. *Donnez un algorithme permettant d'en déduire $y(t)$*

5. *Montrez que la solution de l'équation différentielle est*

$$y(t) = \frac{\tau_1}{\tau_2 - \tau_1} \left(e^{-\frac{t}{\tau_1}} - e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right) \llbracket t \geq 0 \rrbracket \quad (6.4)$$

Chapter 7

Équations différentielles




Figure 7.1: Visualisation de l'entrée $x(t)$ et de la sortie $y(t)$ illustrant l'exercice 17.

Exercice 17 *On considère un filtre défini par l'équation différentielle*

$$LC \frac{d^2}{dt^2} y(t) + RC \frac{d}{dt} y(t) + y(t) = RC \frac{d}{dt} x(t) \quad (7.1)$$

avec $R = 3$, $C = 0.5$, $L = 1$. On considère un signal en entrée défini par $x(t) = \mathbb{T}(t)$ et on cherche à simuler le signal de sortie $y(t)$ associé à ce filtre décrit par l'équation (7.1).

1. *Montrez que*

$$\frac{d}{dt} \mathbb{T}(t) = \int_{-\infty}^t [\delta(\tau - 1) - 2\delta(\tau) + \delta(\tau + 1)] d\tau \quad (7.2)$$

2. *On appelle $\tilde{y}(t)$ la solution de cette deuxième équation différentielle*

$$LC \frac{d^2}{dt^2} \tilde{y}(t) + RC \frac{d}{dt} \tilde{y}(t) + \tilde{y}(t) = \delta(t) \quad (7.3)$$

Exprimez $y(t)$ en fonction de $\tilde{y}(t)$.

- *Cela peut se faire en considérant $a(t) = \tilde{y}(t - 1)$, $b(t) = \tilde{y}(t + 1)$ et $c(t) = a(t) + b(t) - 2\tilde{y}(t)$ et en calculant $LC \frac{d^2}{dt^2} a(t) + RC \frac{d}{dt} a(t) + a(t)$, $LC \frac{d^2}{dt^2} b(t) + RC \frac{d}{dt} b(t) + b(t)$ et $LC \frac{d^2}{dt^2} c(t) + RC \frac{d}{dt} c(t) + c(t)$.*

- Cela peut se faire aussi en calculant d'une part $TF(\tilde{y}(t))(f)$ et d'autre part $TF(y(t))(f)$ à partir des équations différentielles puis en remarquant la ressemblance entre ces deux expressions, on peut calculer $\frac{TF(y(t))(f)}{TF(\tilde{y}(t))(f)}$, on peut trouver une relation entre $y(t)$ et $\tilde{y}(t)$.

3. En utilisant les fonctions `sol_eq_diff`, `deriver`, `integrer` et `retarder` de `seb`, donnez un pseudo-programme permettant de simuler $y(t)$.

Exercice 18 On considère l'équation différentielle associée à une relation entrée-sortie :

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 3\frac{d}{dt}y(t) + 2y(t) = \delta(t) \quad (7.4)$$

1. Écrivez le polynôme caractéristique.
2. Trouvez les solutions de ce polynôme.
3. En déduire la solution $y(t)$.
4. Calculez $\widehat{Y}(f)$ à partir de la solution trouvée
5. Comparez avec $\widehat{Y}(f)$ calculée à partir de l'équation différentielle.

Chapter 8

Filtres et effet mémoire

Exercice 19 *Dans cet exercice, on cherche à montrer par simulation que*

$$\Pi(t) * \Pi(t) = \mathbb{T}(t) \tag{8.1}$$

où $\Pi(t) = \mathbb{I}[|t| \leq 0.5](t)$ et $\mathbb{T}(t) = (1 - |t|)\mathbb{I}[|t| \leq 1](t)$.

1. Montrez que $TF[\Pi(t) * \Pi(t)](f) = \text{sinc}^2(f)$ où $\text{sinc}(f) = \frac{\sin(\pi f)}{\pi f}$.
2. Proposez un algorithme utilisant la transformée de Fourier pour montrer l'équation (8.1).
3. Donnez un autre algorithme utilisant le produit de convolution pour démontrer aussi l'équation (8.1).

Exercice 20 Dans cet exercice, on cherche à montrer par simulation que

$$\Pi(t) * \Pi(t) = \mathbb{T}(t) \quad (8.2)$$

où $\Pi(t) = \mathbb{I}[|t| \leq 0.5](t)$ et $\mathbb{T}(t) = (1 - |t|)\mathbb{I}[|t| \leq 1](t)$.

1. On note $s(t) = \Pi(t) * \Pi(t)$, donnez une expression intégrale à $s(t)$.
2. Montrez que pour $t < -1$, $s(t) = 0$.
3. Montrez que $s(-t) = s(t)$ et que donc $s(t)$ est un signal pair.
4. En déduire que pour $t > 1$, $s(t) = 0$.
5. Montrez que $s(0) = 1$.
6. Montrez que $s(t) = 1 - t$ pour $t \in [0, 1]$.
7. Déduisez que $s(t) = \mathbb{T}(t)$.

Exercice 21 On cherche à trouver la réponse impulsionnelle associée à

$$y(t) = \int_{t-3}^t x(\tau) d\tau \quad (8.3)$$

1. Montrez que l'équation (8.3) peut se mettre sous la forme

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbb{I}[t-3 \leq \tau \leq t](\tau) x(\tau) d\tau \quad (8.4)$$

Mathématiquement, voici la définition d'une intégrale de a à b de $f(t)$

$$\int_a^b f(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbb{I}[a \leq t \leq b](t) f(t) dt \quad (8.5)$$

2. *En s'appuyant sur l'équation (8.4), trouvez $h(t)$ tel que*

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t - \tau) x(\tau) d\tau \quad (8.6)$$

En déduire la réponse impulsionnelle $h(t)$.

3. *On suppose maintenant que $x(t) = \delta(t)$. Trouvez une nouvelle façon de déterminer la réponse impulsionnelle en considérant successivement $t < 0$, $t \in [0, 1]$ et $t > 1$.*

Exercice 22 *On considère l'équation différentielle associée à une relation entrée-sortie :*

$$\frac{d^2}{dt^2} y(t) + 3 \frac{d}{dt} y(t) + 2y(t) = x(t) \quad (8.7)$$

1. *Donnez la réponse fréquentielle.*
2. *Donnez un algorithme donnant la réponse impulsionnelle.*
3. *Écrivez le polynôme caractéristique.*
4. *Trouvez les solutions de ce polynôme.*
5. *En déduire la réponse impulsionnelle.*

Chapter 9

Description fréquentielle des filtres

Exercice 23 *On considère un filtre de réponse impulsionnelle*

$$h(t) = \cos(2\pi t)e^{-t}\mathbb{I}[t \geq 0](t) \quad (9.1)$$

Ce filtre est un passe-haut. Donnez un algorithme permettant de trouver les deux fréquences de coupure et sa bande passante.

Exercice 24 *On considère un filtre de réponse impulsionnelle*

$$h(t) = \cos(2\pi t)e^{-|t|} \quad (9.2)$$

1. Montrer que la réponse fréquentielle de ce filtre est

$$\widehat{H}(f) = \frac{1}{1 + 4\pi^2(f - 1)^2} + \frac{1}{1 + 4\pi^2(f + 1)^2} \quad (9.3)$$

Pour cela vous pouvez utiliser le fait que $\cos(2\pi t) = \frac{1}{2}e^{-j2\pi t} + \frac{1}{2}e^{j2\pi t}$ et que quand z est un complexe,

$$\frac{1}{z} + \frac{1}{\bar{z}} = \frac{2\Re(z)}{|z|^2}$$

2. Pourquoi en observant $h(t)$, on pouvait savoir que $\widehat{H}(f) = |\widehat{H}(f)|$

3. En observant l'équation (9.3), montrez trouvez la valeur de $f > 0$ qui maximise $|\widehat{H}(f)|$.

4. On considère maintenant

$$|\widehat{H}_1(f)| = \frac{1}{1 + 16\pi^2} + \frac{1}{1 + 4\pi^2(f - 1)^2} \quad (9.4)$$

Montrez que $|\widehat{H}_1(f)|$ est une bonne approximation de $|\widehat{H}(f)|$ autour de $f = 1$.

5. En utilisant cette nouvelle approximation, calculez les deux fréquences de coupures et la bande passante.

Exercice 25 On considère un filtre défini par

$$y(t) = \int_{t-3}^t x(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} \llbracket t-3 \leq \tau \leq t \rrbracket(\tau) x(\tau) d\tau \quad (9.5)$$

La troisième expression étant une façon de donner un sens à la deuxième expression.

1. Calculez par rapport à τ , la dérivée de

$$z(\tau) = \llbracket t-3 \leq \tau \leq t \rrbracket(\tau) \quad (9.6)$$

t étant fixe dans ce calcul de dérivée.

2. Déduisez que

$$\frac{d}{dt}y(t) = x(t) - x(t-3) \quad (9.7)$$

3. Déduisez $\widehat{H}(f)$.

4. On suppose maintenant qu'on connaisse la réponse impulsionnelle de ce filtre $h(t)$ défini par $\llbracket 0 \leq t \leq 3 \rrbracket(t)$, déduisez-en un autre de calcul de $\widehat{H}(f)$.

Exercice 26 On considère un filtre dont la réponse fréquentielle vérifie

$$\widehat{H}(f) = \frac{j2\pi fRC}{1 - 4\pi^2 f^2 + 4jRC\pi f} \quad (9.8)$$

1. *Trouvez l'équation différentielle associée à la relation entrée-sortie ?*
2. *Trouvez l'équation différentielle associée à la réponse impulsionnelle ?*
3. *Proposez un algorithme permettant de calculer la réponse impulsionnelle.*

Chapter 10

Signaux périodiques

Exercice 27 On considère un signal non-périodique défini par $x(t) = e^{-t} \mathbb{I}[0 \leq t < 1](t)$ et un signal périodique obtenu en périodisant $x(t)$.

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(t - k) \quad (10.1)$$

1. Donnez l'algorithme permettant de tracer $y(t)$ pour $t \in [-3, 3]$.
2. Donnez l'algorithme permettant d'estimer M_y et P_y .
3. Donnez l'algorithme permettant de calculer la série de Fourier associée à $y(t)$.
4. Donnez un algorithme permettant de vérifier expérimentalement que $P_y = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |\widehat{Y}_k|^2$ et que $M_y = \widehat{Y}_0$ non pas seulement pour ce signal spécifiquement mais pour des signaux construits à partir de $x(t)$ et tirés aléatoirement.

Exercice 28 On considère un signal non-périodique défini par $x(t) = e^{-t} \mathbb{I}[0 \leq t < 1](t)$ et un signal périodique obtenu en périodisant $x(t)$.

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(t - k) \quad (10.2)$$

1. Représentez graphiquement $x(t)$ et $y(t)$ pour $t \in [-3, 3]$.
2. Calculez A_x et en déduire M_y .
3. Calculez E_x et en déduire P_y .
4. Montrez que les coefficients de la série de Fourier sont

$$\widehat{Y}_k = \frac{1 - e^{-1}}{1 + j2\pi k} \quad (10.3)$$

5. En utilisant le fait que

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1 + 4\pi^2 k^2} = \frac{1}{2} \frac{e + 1}{e - 1} \quad (10.4)$$

montrez qu'on retrouve le résultat précédent $P_y = \frac{1}{2} \frac{e^2 - 1}{e^2}$.

Exercice 29 On considère un signal $x(t) = \mathbb{I}[0 \leq t \leq 2](t)$. On définit deux autres signaux à partir de $x(t)$.

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(t - 3k) \text{ et } z(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(t - 4k) \quad (10.5)$$

1. $x(t), y(t), z(t)$ sont-ils périodiques et si oui, quelles sont leurs périodes ?
2. Calculez M_y et P_y la moyenne et la puissance de $y(t)$.
3. Calculez M_z et P_z la moyenne et la puissance de $z(t)$.

Exercice 30 On considère un signal $x(t) = \llbracket 0 \leq t \leq 2 \rrbracket(t)$ dont la transformée de Fourier est notée \widehat{X} . On définit un autre signal périodiques à partir de $x(t)$.

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(t - 3k) \quad (10.6)$$

Sa transformée de Fourier est notée \widehat{Y} . On utilise dans les questions suivantes que

$$TF[\llbracket -0.5 \leq t \leq 0.5 \rrbracket(t)](f) = \frac{\sin(\pi f)}{\pi f} \quad (10.7)$$

1. Calculez \widehat{X} .
2. Calculez \widehat{Y} .

Exercice 31 Le signal montré sur la figure 10.1 est noté $x(t)$. Sa transformée de Fourier est notée \widehat{X} . Ce signal est de la forme $x(t) = a \cos(bt + c)$.

1. $x(t)$ est-il un signal temps continu, temps discret, périodique, non-périodique, déterministe ou aléatoire.




Figure 10.1: Graphe de $x(t)$ relatif à l'exercice [31](#).

2. Justifiez la valeur de a en observant la valeur maximale et minimale sur la figure 10.1.
3. Justifiez la valeur de b en mesurant la période sur la figure 10.1.
4. Justifiez la valeur de c en interprétant cette courbe comme en retard (ou en avance) par rapport à $a \cos(bt)$ sur la figure 4.3.
5. Calculez $x(0)$, $x(1)$, P_x .
6. Calculez \widehat{X}_0 et \widehat{X}_1 .
7. Dessiner sur le graphe $y_1(t) = x\left(\frac{t}{2}\right)$
8. Dessiner sur le graphe $y_1(t) = x(t - 1)$
9. Dessiner sur le graphe $y_1(t) = \frac{1}{2}x(t)$
10. Dessiner sur le graphe $y_1(t) = x(t) - x(t - 2)$

Chapter 11

Filtres agissant sur des signaux périodiques

Exercice 32 *On considère un signal défini par*

$$x(t) = \Pi(t) - \frac{1}{2}\Pi\left(\frac{t}{3}\right) \quad (11.1)$$

On note $y(t)$ le signal périodisé en répétant l'intervalle $[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}]$. On considère le filtre défini par l'équation différentielle

$$\frac{d^2}{dt^2}z(t) + \frac{d}{dt}z(t) + y(t) = x(t) \quad (11.2)$$

On note $z(t)$ la sortie de ce filtre quand l'entrée est $y(t)$.

1. Représentez graphiquement $y(t)$ pour $t \in [-3, 3]$.
2. Montrez que $\widehat{X}(f) = \text{sinc}(f) - \frac{3}{2} \text{sinc}(3f)$.
3. En déduire que $\widehat{Y}_k = \frac{1}{3} \text{sinc}(\frac{k}{3}) - \frac{1}{2} \delta_k$, δ_k étant la suite nulle sauf en $k = 0$ ou elle vaut 1.
4. Calculez la réponse fréquentielle du filtre
5. En déduire la \widehat{Z}_k les coefficients de la série de Fourier de $z(t)$.
6. Proposez une approximation de $z(t)$.




Figure 11.1: Courbe $x(t)$ et $y(t)$ pour l'exercice [11.1](#).

Exercice 33 La figure 11.1 représente le signal $x(t)$. On considère le filtre $y(t) = \int_{t-0.5}^t x(\tau) d\tau$ de réponse fréquentielle $\widehat{H}(f) = \frac{\sin(\pi f/2)}{\pi f} e^{-j\pi f/2}$.

1. Donnez une définition de $x(t)$ avec des équations, vous pouvez utiliser le fait que $\widehat{X}_0 = \frac{4}{5}$.
2. Calculez les coefficients de la série de Fourier $\widehat{X}_{-1}, \widehat{X}_0, \widehat{X}_1$. À quelle fréquences ces coefficients correspondent.
3. Expliquez une approximation permettant de calculer $y(t)$ en utilisant $\widehat{X}_{-1}, \widehat{X}_0, \widehat{X}_1$.
4. Calculez $y(t)$ avec cette approximation.
5. Donnez un algorithme permettant de calculer $y(t)$ sans utiliser cette approximation.

Chapter 12

Échantillonnage d'un signal non-périodique

Exercice 34 *On considère le signal $x(t) = e^{-t} \llbracket t \geq 0 \rrbracket(t)$ et on souhaite illustrer la question du repliement spectral.*

- 1. Donnez un algorithme permettant de simuler y_n le signal $x(t)$ échantillonné à la fréquence f_e .*
- 2. Donnez un algorithme permettant de simuler $\widehat{Y}(f)$ la transformée de Fourier de y_n .*

3. Donnez un algorithme permettant de simuler $\widehat{Z}(f)$, défini par

$$\widehat{Z}(f) = \left| \frac{1}{f_e} \widehat{Y}(f) - \widehat{X}(f) - \widehat{X}(f - f_e) - \widehat{X}(f + f_e) \right| \quad (12.1)$$

$x(t)$ présente une discontinuité en $t = 0$, aussi il est nécessaire pour la valeur de $x(t)$ en $t = 0$ d'utiliser

$$\frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0^-} x(t) + \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0^+} x(t) = \frac{1}{2} \quad (12.2)$$

Exercice 35 On considère le signal $x(t) = e^{-t} \llbracket t \geq 0 \rrbracket(t)$ et on souhaite calculer la transformée de Fourier du signal échantillonné. On considère f_e une fréquence d'échantillonnage. On note y_n le signal $x(t)$ échantillonné à la fréquence f_e .

1. Montrez que $y_n = e^{-nT_e} - \frac{1}{2} \delta_n$

2. Montrez que

$$\widehat{Y}(f) = -0.5 + \frac{1}{1 - e^{-T_e - j2\pi f T_e}} \quad (12.3)$$

Exercice 36 Le signal étudié ici est $x(t) = t \llbracket t \in [0, 1] \rrbracket + (2 - t) \llbracket t \in [1, 2] \rrbracket$ On considère $y(t)$ obtenu en périodisant le signal $x(t)$ pour $t \in [0, 3]$.

1. $x(t)$ est-il un signal périodique ou non-périodique.

2. $y(t)$ est-il un signal périodique ou non-périodique.
3. Dessiner $x(t)$ pour $t \in [-1, 5]$ sur un graphe.
4. Dessiner $y(t)$ pour $t \in [-1, 5]$ sur le même graphe.
5. Calculez $x(0)$, $x(-2)$, E_x et P_x .
6. Calculez $y(0)$, $y(-2)$, E_y et P_y .
7. Calculez \widehat{X}_0 et \widehat{Y}_0 .
8. Calculez \widehat{X}_0 et \widehat{Y}_0 .
9. Dessiner sur le graphe $y_1(t) = y\left(\frac{t}{2}\right)$
10. Dessiner sur le graphe $y_2(t) = y(t - 1)$
11. Dessiner sur le graphe $y_3(t) = \frac{1}{2}y(t)$
12. Dessiner sur le graphe $y_4(t) = y(t) - y(t - 2)$

Chapter 13

Modélisation stochastique du bruit

Exercice 37 On considère $\overset{r}{X}_1$ et $\overset{r}{X}_2$ deux variables aléatoires gaussiennes indépendantes de moyenne μ et σ . On définit

$$\begin{cases} \overset{r}{X} = \overset{r}{X}_1 + \overset{r}{X}_2 \\ \overset{r}{Y} = \overset{r}{X}_1 - \overset{r}{X}_2 \end{cases} \quad (13.1)$$

1. Calculez $\mu_X, \sigma_X, \mu_Y, \sigma_Y$ les moyennes statistiques et les racine carrés des variance de $\overset{r}{X}$ et $\overset{r}{Y}$.
2. Montrez que $\overset{r}{X}$ et $\overset{r}{Y}$ sont indépendantes au second ordre

3. Donnez un algorithme permettant de tester que $\overset{r}{X}$ et $\overset{r}{Y}$ sont en fait indépendantes pas seulement au second ordre.

Exercice 38 On considère un bruit blanc gaussien $\overset{r}{B}(t)$ de moyenne μ et d'écart-type σ que l'on observe entre $t = 0$ et $t = 1$. On l'échantillonne à $f_e = 10\text{Hz}$ et l'on note les variables aléatoires ainsi obtenues $\overset{r}{X}_n$. C'est le même bruit blanc que l'on échantillonne à $f_e^y = 20\text{Hz}$ et l'on note les variables aléatoires obtenues $\overset{r}{Y}_n$.

1. Combien y a-t-il de variables aléatoires $\overset{r}{X}_n$ et $\overset{r}{Y}_n$. Lesquelles sont identiques ?
2. On définit $\overset{r}{Z}_n$ de la façon suivante

$$\left\{ \begin{array}{l} \overset{r}{Z}_0 = \overset{r}{Y}_0 \\ \overset{r}{Z}_1 = \overset{r}{Y}_1 + \overset{r}{Y}_2 \\ \overset{r}{Z}_2 = \overset{r}{Y}_3 + \overset{r}{Y}_4 \\ \vdots \end{array} \right. \quad (13.2)$$

Combien y a-t-il de variables aléatoires $\overset{r}{Z}_n$?

3. Calculez l'espérance et la variance de $\overset{r}{Z}_n$.
4. Calculez la corrélation entre $\overset{r}{Z}_n$ et $\overset{r}{X}_n$.

5. Calculez la corrélation entre $\overset{r}{Z}_n$ et $\overset{r}{Z}_{n-1}$.
6. Donnez l'algorithme permettant de répondre par simulation à ces trois dernières questions.

Exercice 39 On considère une variable aléatoire uniforme sur $[0, 2\pi]$, notée $\overset{r}{T}$. On note $\overset{r}{X}$ et $\overset{r}{Y}$ deux variables aléatoires construites à partir de $\overset{r}{T}$.

$$\overset{r}{X} = \cos(\overset{r}{T}) \text{ et } \overset{r}{Y} = \sin(\overset{r}{T}) \quad (13.3)$$

1. Donnez un algorithme permettant d'estimer la corrélation entre $\overset{r}{X}$ et $\overset{r}{Y}$ et aussi de vérifier si elles sont indépendantes.
2. Montrez que

$$E\left[\overset{r}{X}\overset{r}{Y}\right] = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(t) \sin(t) dt \quad (13.4)$$

En déduire que $\overset{r}{X}$ et $\overset{r}{Y}$ ne sont pas corrélées.

3. Montrez que

$$\begin{cases} P(\overset{r}{X} \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}) = \frac{1}{6} \\ P(\overset{r}{Y} \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}) = \frac{1}{3} \\ P(\overset{r}{X} \leq -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \overset{r}{Y} \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}) = 0 \end{cases} \quad (13.5)$$

*La dernière affirmation pourrait se montrer en utilisant le fait $\overset{r}{X}^2 + \overset{r}{Y}^2 = 1$.
En déduire que $\overset{r}{X}$ et $\overset{r}{Y}$ ne sont pas indépendantes.*

Chapter 14

Autocorrélation et densité spectrale

Exercice 40 On considère un signal $x(t) = e^{-t}\mathbb{I}[t \geq 0](t)$ et une troncature sur $[0, T]$ définie par $x_T(t) = e^{-t}\mathbb{I}[0 \leq t \leq T](t)$. On note $R_x(t)$ et $R_{x_T}(t)$ leurs autocorrélations.

1. Montrez que pour $\tau \geq 0$, $R_x(\tau) = e^{\tau} \int_{\tau}^{+\infty} e^{-2t} dt$
2. Montrez que $R_x(t) = 0.5e^{-|t|}$
3. Montrez que $R_{x_T}(0) = 0.5(1 - e^{-2T})$.
4. Montrez que sa densité spectrale $S_x(f) = \frac{1}{1+4\pi^2 f^2}$.
5. Donnez le pseudo-programme permettant de simuler $R_x(t)$ et $S_x(f)$.

Exercice 41 On considère une particule qui à intervalles de temps réguliers, T_e , a une probabilité r de passer d'un état A à un état B . On suppose qu'à $t = 0$, cette particule est dans un état A . On note $\overset{r}{S}_n$ la variable aléatoire qui décrit l'état de cette particule à l'instant $t = nT_e$, $\overset{r}{S}_n = 1$ si l'état est A et $\overset{r}{S}_n = -1$ sinon. On note $p_n = P(S_n = 1)$.

1. Montrez que $p_{n+1} = (1 - r)p_n + r(1 - p_n)$
2. On remarque que si $p_n = p_{n+1}$ alors $p_n = \frac{1}{2}$ et on pose alors $q_n = p_n - \frac{1}{2}$, montrez que $q_{n+1} = q_n(1 - 2r)$.
3. Montrez que $p_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1 - 2r)^n$
4. Montrez que $E[\overset{r}{S}_n] = 2p_n - 1$ et $\text{Var}[\overset{r}{S}_n] = 4p_n(1 - p_n)$.
5. Montrez que $E[\overset{r}{S}_n \overset{r}{S}_{n-1}] = 1 - 2r$.
6. Montrez que $E[\overset{r}{S}_n \overset{r}{S}_{n-2}] = (1 - 2r)^2$.
7. Donnez des algorithmes permettant de confirmer ces calculs.

Exercice 42 On considère le signal $x(t) = \cos(2\pi t)$.

1. Calculez sa transformée de Fourier en tant que signal déterministe périodique.

2. Calculez son autocorrélation en tant que processus aléatoire d'énergie infinie. Ce signal est déterministe, mais peut être vu comme un processus aléatoire dont l'espérance est donne le signal lui-même : $E[\overset{r}{X}(t)] = x(t) = \cos(2\pi t)$. Ce signal n'est pas centré, mais ici on considère la même définition de l'autocorrélation associée aux processus aléatoire d'énergie infinie et centrés.

3. Calculez sa densité spectrale en tant que processus aléatoire d'énergie infinie.

Pour la résolution de l'exercice, on pourra utiliser

$$\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} \cos(a + b) + \frac{1}{2} \cos(a - b) \quad (14.1)$$

1. Soit par identification avec la série de Fourier, soit parce que la transformée de Fourier inverse d'un Dirac est une exponentielle complexe,

$$\widehat{X}(f) = \frac{1}{2} \delta(f - 1) + \frac{1}{2} \delta(f + 1) \quad (14.2)$$

2. Le processus aléatoire $\overset{r}{X}(t)$ qui est en fait déterministe vérifie

$$E[\overset{r}{X}(t)] = \cos(2\pi t) \mathbb{I}[0 \leq t \leq T](t) \text{ et } \text{Var}[\overset{r}{X}(t)] = 0 \quad (14.3)$$

$$\begin{aligned} E[\overset{r}{X}(t) \overset{r}{X}(t - \tau)] &= \cos(2\pi t) \mathbb{I}[0 \leq t \leq T](t) \cos(2\pi(t - \tau)) \mathbb{I}[\tau \leq t \leq T + \tau](t) \\ &= \cos(2\pi t) \cos(2\pi(t - \tau)) \mathbb{I}[\tau \leq t \leq T](t) \end{aligned} \quad (14.4)$$

$$= \frac{1}{2} (\cos(4\pi t - 2\pi\tau) + \cos(2\pi\tau)) \mathbb{I}[\tau \leq t \leq T](t)$$

Quand $T \rightarrow +\infty$,

$$\frac{1}{T} \int_{\tau}^T \cos(2\pi t) \cos(2\pi(t - \tau)) dt = \frac{1}{T} \left[\frac{1}{2} \frac{\sin(4\pi t - 2\pi\tau)}{4\pi} \right]_{\tau}^T + \frac{1}{2} \cos(2\pi\tau) \frac{T - \tau}{T} \rightarrow \frac{1}{2} \cos(2\pi\tau)$$

Donc $R_x(\tau) = \frac{1}{2} \cos(2\pi\tau)$

3.

$$S_x(f) = \text{TF}[R_x(\tau)](f) = \frac{1}{4} \delta(f - 1) + \frac{1}{4} \delta(f + 1) \quad (14.6)$$

Chapter 15

Filtrage des processus aléatoires et application au bruit en $1/f$

Exercice 43 *On considère un processus aléatoire blanc $\overset{r}{X}(t)$ dont la puissance totale calculée entre la fréquence nulle et f_0 vaut P_x . On suppose qu'il est échantillonné à $f_e = 5f_0$ et alors notée $\overset{r}{X}_n$. On place $\overset{r}{X}_n$ entrée d'un filtre passe-bas de réponse fréquentielle $\frac{1}{1+j2\pi\frac{f}{f_1}}$ et on note $\overset{r}{Y}(t)$ le processus aléatoire résultant. On*

pourra utiliser

$$\int_0^x \frac{1}{1+\tau^2} d\tau = \arctan(x), \quad TF[e^{-|t|}](f) = \frac{2}{1+4\pi f^2}, \quad \text{et } TF[e^{-t}\mathbb{I}[t \geq 0]](f) = \frac{1}{1+j2\pi f} \quad (15.1)$$

1. *Quelle est l'autocorrélation $R_x[n]$?*
2. *Quelle est la densité spectrale $S_x(f)$?*
3. *Quelle est la densité spectrale $S_y(f)$?*
4. *Quelle la puissance P_y associée à \dot{Y} ?*
5. *Quelle est l'autocorrélation $R_y(t)$?*
6. *Donnez l'algorithme permettant de simuler $\dot{Y}(t)$.*
7. *Donnez l'algorithme permettant de vérifier la cohérence des calculs.*

Exercice 44 *On considère un processus aléatoire en $1/f$ et noté $\dot{X}(t)$ qui agit entre les fréquences f_0 et f_1 , sa puissance vaut P_x (i.e. c'est le bruit en $1/f$ du cours multiplié par une constante de façon à avoir la puissance souhaitée). On suppose qu'il est échantillonné à $f_e = 5f_1$ et alors notée \dot{X}_n . On place \dot{X}_n entrée d'un*

filtre passe-bas de réponse fréquentielle $\frac{1}{1+j2\pi\frac{f}{f_1}}$ et on note $\overset{r}{Y}(t)$ le processus aléatoire résultant. On pourra utiliser

$$\int_0^x \frac{1}{1+\tau^2} d\tau = \arctan(x), \quad TF[e^{-|t|}](f) = \frac{2}{1+4\pi f^2}, \quad \text{et} \quad TF[e^{-t}\mathbb{I}[t \geq 0]](f) = \frac{1}{1+j2\pi f} \quad (15.2)$$

1. Quelle est la densité spectrale $S_x(f)$?
2. Donnez un algorithme permettant d'estimer l'autocorrélation $R_x[n]$?
3. Quelle est la densité spectrale $S_y(f)$?
4. Donnez un algorithme permettant d'estimer P_y associée à $\overset{r}{Y}$?
5. Donnez l'algorithme permettant de simuler $\overset{r}{X}[n]$.
6. Donnez l'algorithme permettant de simuler $\overset{r}{Y}(t)$.
7. Donnez l'algorithme permettant de vérifier la cohérence des calculs.

Chapter 16

Densité de probabilité et application au bruit de grenaille

Exercice 45 *On considère un bruit blanc échantillonné $\overset{r}{B}_n$ qui a une probabilité 0.5 de valoir 1 et 0.5 de valoir -1 . Il est échantillonné à la fréquence $f_e = 1$. Et au moyen de $m(t) = \llbracket 0 \leq t < T_e/2 \rrbracket(t)$, il génère un bruit blanc avec forme.*

$$\overset{r}{X}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \overset{r}{B}_n m(t - nT_e) \quad (16.1)$$

On considère deux filtres définis par leurs réponses impulsionnelles $h_1(t)$ et $h_2(t)$.

$$h_1(t) = \frac{\delta(t) + \delta(t - 1/2)}{2} \text{ et } h_2(t) = \mathbb{I}[0 \leq t \leq 2](t) \quad (16.2)$$

On note $\overset{r}{Y}(t)$ et $\overset{r}{Z}(t)$ les sorties des deux filtres lorsque l'entrée est $\overset{r}{X}(t)$. On pourra utiliser le fait que

$$\Pi(t) * \Pi(t) = \mathbb{T}(t) \quad (16.3)$$

où $\Pi(t)$ est la porte entre -0.5 et 0.5 et \mathbb{T} est la fonction triangle entre -1 et 1 avec un sommet à 1 en $t = 0$.

1. Dessinez des trajectoires de $\overset{r}{X}(t)$.
2. Dessinez des trajectoires de $\overset{r}{Y}(t)$.
3. Dessinez des trajectoires de $\overset{r}{Z}(t)$.
4. Donnez un algorithme pour obtenir ces trajectoires
5. Calculez $S_m(f)$ à partir de $TF[m(t)](f)$ noté $\widehat{M}(f)$.
6. En déduire $R_m(t)$ en fonction de $\mathbb{T}(t)$ en utilisant que $TF[\mathbb{T}(t)](f) = |\Pi(f)|^2$.
7. Calculez $S_{h_1}(f)$ à partir de $TF[h_1(t)](f)$ noté $\widehat{H}_1(f)$.

8. En déduire $R_{h_1}(t)$ à partir de $S_{h_1}(f)$
9. Calculez $S_{h_2}(f)$ et $R_{h_2}(t)$ de la même façon que $S_m(f)$ et $R_m(t)$.
10. En déduire $R_z(t)$ sous la forme d'un produit de convolution de deux fonctions triangles et $S_z(f)$.
11. Donnez l'algorithme permettant de simuler ces notions.

Exercice 46 On considère deux variables aléatoires $\overset{r}{X}$ qui suit une loi uniforme sur $[0, 1]$ et $\overset{r}{Y}$ qui suit une loi gaussienne centrée d'écart-type 1.

1. On définit $F_1(\lambda) = P\left(\left|\overset{r}{X} - 0.5\right| \leq \lambda\right)$ Montrez que $F_1(\lambda) = \min(1, 2\lambda)\mathbb{I}[\lambda \geq 0]$.
2. On définit $F_2(\lambda) = P\left(\left|\overset{r}{Y}\right| \leq \lambda\right)$ Montrez que $F_2(\lambda) = \text{erf}\left(\frac{\lambda}{\sqrt{2}}\right)$.
3. En utilisant l'inégalité sur l'écart à la moyenne donnez une borne inférieure à $F_1(\lambda)$ et à $F_2(\lambda)$.
4. Représentez sur un graphe ces différentes courbes.
5. Donnez le pseudo-algorithme permettant de générer ces courbes et vérifier ces calculs.

Appendix A

Supplément pour faire les pseudo-programmes

A.1 Outils

Python :

Lignes à mettre en début de séance

Les deux premières servent à faire en sorte que les programmes dans `rep_prg` soient utilisables lorsqu'on est dans le répertoire `rep_tra`. `rep_tra` et `rep_prg` sont deux noms de répertoires et de leurs chemins absolues. On peut aussi utiliser des chemins relatifs mais dans ce cas il faut veiller à l'endroit où l'on se trouve.

```
import sys
sys.path.append('rep_prg')
import os
os.chdir('rep_tra')
import seb
plt,np=seb.debut()
```

Cas d'un fichier Python avec extension `.py.txt`

`seb.debut`

La fonction `debut` renvoie un tuple `(plt,np)`.

- `plt` sert pour faire des graphes et ses paramètres sont modifiés par `debut` de façon à rendre les graphes plus visibles.
- `np` correspond à `numpy`, c'est utile pour faire des calculs.

A.1.1 Commandes générales

- `help` suivi de parenthèses avec le nom de la fonction. Le contenu affiché est celui entre trois guillemets dans une fonction.
- `assert` provoque une erreur si ce qui suit n'est pas vrai.

- `len` suivi de parenthèses et le nom d'un vecteur ligne ou colonne, cela donne sa longueur.
- `1j` est le complexe imaginaire j .
- `round` qui fournit ¹ un entier à partir d'un nombre réel.
- `def` et `return` pour définir une fonction.
- `#` pour mettre une ligne en commentaire.
- `type` pour connaître le type d'une valeur ou d'une variable.
- `min` et `max`

Contenu susceptible d'être utilisé dans `np` pour `numpy`

- `linspace` permet de définir un ensemble de valeur régulièrement réparties en précisant la valeur initiale, la valeur finale et le nombre de ces valeurs. La dernière valeur est atteinte. Cette fonction n'entraîne pas en général que les valeurs soient des multiples d'un pas donné ce qui est contradictoire avec ce qui est contradictoire avec ce qu'on attend d'une échelle en temps ou en fréquence en traitement du signal. `seb.linspace` assure cette propriété.

¹La fonction `round` de `numpy` fournit un entier de type `float`.

- **arange** permet de définir un ensemble de valeur régulièrement réparties en précisant la valeur initiale, la valeur finale et l'espacement entre ces valeurs. La dernière valeur n'est jamais atteinte. Comme **linspace**, cette fonction n'est pas non plus conforme avec ce qu'on attend d'une échelle en temps ou en fréquence en traitement du signal. **seb.arange** assure cette propriété.
- **sqrt** pour racine carré
- **exp** pour exponentielle
- **array** suivi d'une liste entre crochets de valeurs espacées de virgules, pour définir un vecteur de type **numpy.ndarray**. On peut l'utiliser pour définir une matrice en utilisant deux séries de crochets.
- **real** suivi d'un complexe entre parenthèses pour prendre la partie réelle.
- **abs** suivi d'un complexe ou d'un réel entre parenthèses pour prendre le module ou la valeur absolue.
- **sinc** est la fonction sinus cardinal définie par $\frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$
- **concatenate**
- **zeros**, **ones**, **zeros_like** et **ones_like**. Pour les deux premières le premier paramètre est un entier ou un **tuple** indiquant soit la taille du vecteur soit le nombre

de lignes et de colonnes de la matrice à définir. Les deux dernières permettent de créer un vecteur ou une matrice ayant les mêmes dimension qu'un certain objet qu'on transmet en paramètre. Les valeurs de l'objet créés sont nulles si on utilise `zeros` ou `zeros_like` et 1 si on utilise `ones` ou `ones_like`.

Contenu susceptible d'être utilisé dans plt récupéré dans debut

- `subplots`
- `plot`
- `set_xlabel` et `set_ylabel`
- `set_legend`
- `tight_layout`
- `savefig`
- `show`

Contenu susceptible d'être utilisé dans seb

- Les fonctions pour définir un signal

- `fonction_H` est la fonction échelon $\llbracket t \geq 0 \rrbracket(t)$.
 - `fonction_P` est la fonction porte sur $[-0.5, 0.5]$.
 - `fonction_T` est la fonction triangle sur $[-1, 1]$.
 - `fonction_C` est la demi-fonction triangle croissante sur $[-0.5, 0.5]$.
 - `fonction_D` est la demi-fonction triangle décroissante sur $[-0.5, 0.5]$.
 - `gaussian(x,mu,sigma)` renvoie la fonction associée à la densité de probabilité de la Gaussienne de moyenne `mu` et d'écart-type `sigma`.
- Les fonctions pour calculer une transformée de Fourier
 - `TF` et `TFI` pour transformée de Fourier et transformée de Fourier inverse
 - `TFTD(t,x,f)` calcule la TFTD du signal temps discret défini par `t,x` en les fréquences `f`.
 - `TFTDI(f,X,t)` calcule la TFTD inverse du spectre complexe `X` définis pour les fréquences `f`. Le résultat est un signal temps discret pour les instants contenus dans `t`.
 - `TFD(t,s,T,bool)` calcule la TFD, `T` indique soit la période soit l'intervalle utilisé pour décrire le signal périodique `t,s` défini l'échelle de temps et le signal. `bool` vaut `True` si on veut une représentation centrée et `False` si on n'en veut pas. `f` est l'échelle de fréquence retournée. `S` est l'ensemble des coefficients associés `f,S=seb.TFD(t,s,T,bool)`

- `coef_serier_Fourier(t,x,T,k)` calcule les coefficients de la série de Fourier X_k T est soit la periode du signal soit un tuple indiquant un intervalle sur lequel est defini $x(t)$. Si T est une valeur alors l'intervalle considere est $[0, T]$ k est la liste des indices des fréquences calculées. Le programme retourne un tuple avec d'abord les fréquences et d'autre part les coefficients associés.
- Les fonctions relatives aux échelles
 - `synchroniser(t)` change l'échelle de temps de façon que le vecteur soit un multiple de la periode d'échantillonnage.
 - `linspace(start,stop,num,dtype)` et `arange(start,stop,step,dtype)` similaires à celles définies dans `numpy` mais qui assurent que les échelles sont bien constituées de multiples d'un certain pas et ainsi conforme au traitement du signal.
- Les fonctions pour transformer un signal
 - `retarder(t,x,tau)` retarde le signal $x(t)$ défini par t et x de τ lorsque τ est positif et avance de $-\tau$ si τ est négatif.
 - `periodiser_ech_t(t,T)` produit un vecteur de meme taille que t mais dont les valeurs sont entre 0 et T de facon a définir un signal periodique de période T . Si T est un intervalle alors c'est le motif entre $T[0]$ et $T[1]$ qui est répété.
- Les fonctions associées au produit de convolution

- `convolution(tx,x,th,h,ty)` Le programme fournit le produit de convolution de x par h aux instants demandés par ty . tx , th et ty sont les échelles de temps de x , h et y . x et tx doivent être de même taille, th et h doivent être de même taille. tx doit contenir au moins deux composantes. x et h sont supposés d'énergie finie.
- `correlation(tx,x,ty,y,tz)` calcule l'intercorrelation entre tx,x et ty,y en tz .
- Les fonctions associées aux équations différentielles et au fait de dériver et d'intégrer.
 - `sol_eq_diff(coef,t)` `coef` sont les coefficients devant les termes de l'équation différentielle définis comme un **tuple**. t est l'ensemble des instants dont on cherche à calculer $y(t)$. t est un vecteur avec des points régulièrement espacés.
 - `deriver(t,x)` dérive le signal défini par t,x en retournant la dérivée en tous les instants de t .
 - `integrer(t,x)` intègre le signal défini par t,x en retournant l'intégrale $\int_{-\infty}^t x(t) dt$ en tous les instants de t .
- Des fonctions pour trouver une valeur particulière dans un vecteur.
 - `find_nearest(array, value)` retourne la valeur de `array` la plus proche de `value`.

- `where_nearest(array, value)` retourne l'indice dans `array` correspondant à la valeur la plus proche de `value`.
- `erreur_quad(fun, intervalle)` est une fonction pour calculer l'erreur quadratique. Cette fonction utilise une variable aléatoire sur un support uniforme pour calculer une erreur quadratique. `intervalle` doit indiquer avec un tuple contenant deux valeurs. `fun` est une fonction à transmettre qui estime l'erreur pour une valeur particulière.
- Des fonctions pour aider à gérer les types en Python. Python distingue une liste contenant une unique valeur de la valeur elle-même et d'un tableau de type `numpy` contenant cette valeur.
 - `val(x)` vérifie si `x` est un `numpy array` contenant une seule valeur, si c'est une seule valeur ou autre chose. Si c'est autre chose, cette fonction déclenche une erreur. Sinon elle renvoie cette unique valeur.
 - `vect(x)` vérifie si `x` est un `numpy array` contenant une ou plusieurs valeurs, une seule valeur ou autre chose. Si c'est autre chose, elle prend le premier élément et vérifie que celui-ci est bien un `numpy array` et elle renvoie ce vecteur. Sinon une erreur est déclenchée.
 - `milieux(b_val)` renvoie un vecteur ayant une composante en moins que `b_val` et correspondant aux milieux des termes consécutifs de `b_val`. Cette fonction suppose que `b_val` est régulièrement réparti.

- Les fonctions pour enregistrer des données et pour les récupérer à nouveau.
 - `save(nom_fichier,list_nom_var,list_var)` sauvegarde sous format binaire la liste des variables indiquées dans `list_var` le fichier s'appelle `nom_fichier` les noms des variables doivent être mis avec des apostrophes autour.
 - `load(nom_fichier)` lit le fichier binaire et renvoie un dictionnaire dont les clés sont les noms des variables enregistrés.

Contenu susceptible d'être utilisé dans sympy

- `Symbol`
- `solve`
- `simplify`
- `matrices.Matrix`