

Aula 09

*DataPrev - Raciocínio Lógico - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

13 de Julho de 2026

Índice

1) Operações Básicas	3
2) MMC e MDC	23
3) Razão e Proporção	34
4) Regra de Três	47
5) Porcentagem	58
6) Questões Comentadas - Operações Básicas - FGV	65
7) Questões Comentadas - MMC e MDC - FGV	70
8) Questões Comentadas - Razão e Proporção - FGV	76
9) Questões Comentadas - Regra de Três - FGV	84
10) Questões Comentadas - Porcentagem - FGV	89
11) Lista de Questões - Operações Básicas - FGV	96
12) Lista de Questões - MMC e MDC - FGV	99
13) Lista de Questões - Razão e Proporção - FGV	102
14) Lista de Questões - Regra de Três - FGV	106
15) Lista de Questões - Porcentagem - FGV	109

PROBLEMAS ARITMÉTICOS

Operações Fundamentais

Introdução

Galera, vou ser sincero aqui. Se você tem facilidade com as operações básicas, sugiro pular diretamente para os exercícios ou ir para a parte da teoria que julgar que tem mais dificuldade. A proposta dessa parte inicial da teoria é abordar conceitos elementares. No entanto, caso queira revisar, sinta-se à vontade! Vamos lá?!

Acredito que todos nós, em algum momento da vida, já tivemos que utilizar as operações básicas algumas (muitas) vezes. Nos dias atuais, em que precisamos trabalhar com dinheiro constantemente, atos como **somar, subtrair, multiplicar e dividir** estão sempre presentes.

Imagine que você tem R\$ 100,00 na sua conta bancária e ganhou seu primeiro salário como **servidor**, no valor de **R\$ 3.000,00**. É capaz de, sem nem perceber, você realizar uma soma e concluir que ficou com o saldo de R\$ 3.100,00.


Com o seu primeiro salário, você vai no centro da cidade e decide comprar um novo celular. Entra em algumas lojas, acha aquele que tanto queria e consegue comprá-lo por R\$ 1.500,00. Observe que se você tinha R\$ 3.100,00 e gastou R\$ 1.500,00, agora ficou com **R\$ 1.600,00 de saldo**.

Quando chega em casa, seu pai lembra que você prometeu metade da quantia que sobrasse após a compra do celular, para ajudar nas despesas domésticas. Você pega e **divide R\$ 1.600,00 por 2** e entrega R\$ 800,00 para ele.

Observe que corriqueiramente estamos trabalhando com as operações básicas e nem nos damos conta. Acontece que nem sempre as "continhas" vão fluir assim. Por vezes, elas podem se tornar complexas e acabam exigindo o conhecimento de algumas regras. Vamos conhecer esse assunto um pouco melhor?

Soma

Em uma soma, nós pegamos dois ou mais números e os combinamos para formar um único número. **Essa combinação é feita adicionando (daí também o nome "adição") um número ao outro**. Particularmente, eu acho muito difícil entender a soma pensando apenas em números. Lembre-se que tudo se originou com **a necessidade de contar coisas**. Por exemplo, se você compra duas maçãs e ganha mais três de brinde. Com quantas maçãs você ficará?



Veja que você tinha duas maçãs (representamos a quantidade com o número "2") ganhou mais três ("3"), resultando em cinco ("5") maçãs. Portanto, $2 + 3 = 5$. O sinal que usamos para denotar a operação da soma é o "**mais**" (+). Sempre que a intenção for somar dois números, usaremos ele. Tudo bem?

Uma vez entendida essa noção elementar de soma, vamos fazer alguns exemplos para explicar o método que usamos para somar quaisquer dois números ou mais.

Exemplo 1) $45 + 7$

O primeiro passo é **colocar um número abaixo do outro**, lembrando que o algarismo da unidade fica abaixo do algarismo da unidade, o da dezena abaixo do da dezena e assim sucessivamente.

III - Esse número "1" veio do "12" que obtivemos na primeira soma. Vamos somá-lo com o 4, para obter o algarismo "5".

IV - O resultado ficará aqui. No caso, temos que .

$$\begin{array}{r} 145 \\ + 7 \\ \hline 52 \end{array}$$

I - Começamos somando os algarismos das unidades. Note que .

II - Abaixo da linha escrevemos o algarismo da unidade da soma de cima.

Caso não lembre bem quais são os algarismos das unidades, das dezenas, das centenas etc. segue abaixo **uma tabela que resume bem os principais grupos**.

Número	Unidade de milhão	Centena de milhar	Dezena de milhar	Unidade de milhar	Centena	Dezena	Unidade
145257	-	1	4	5	2	5	7
3520	-	-	-	3	5	2	0
256	-	-	-	-	2	5	6

Exemplo 2) $2450 + 731$

Mesma coisa aqui, pessoal! Colocaremos um abaixo do outro e somaremos algarismo por algarismo!

$$\begin{array}{r} 12450 \\ + \quad 731 \\ \hline 3181 \end{array}$$

Exemplo 3) $120 + 13,25$


E agora que temos vírgula? Prosseguiremos quase igual! Veja como ficaria:

$$\begin{array}{r} 120,00 \\ + \quad 13,25 \\ \hline 133,25 \end{array}$$

120 é um número inteiro. Sendo assim, para fazer o famoso "vírgula abaixo da vírgula", podemos completar com dois zeros à direita, tudo bem?

Subtração

A subtração vai ser o oposto da soma. Se ao somar, nós adicionamos determinada quantidade em outra; **na subtração, nós vamos retirar essa quantidade.** Mais uma vez, imagine que você tinha aquelas 5 maçãs. Aconteceu que, seu cachorro conseguiu comer 4 delas sem você ver. Ele foi lá e, sorrateiramente, devorou quase todas as suas maçãs. *Com quantas maçãs você ficou?*



Veja, portanto, que $5 - 4 = 1$. Representamos a subtração com o sinal de $(-)$ "**menos**". *Tem algum método para subtrair quaisquer dois números?* Tem e ele é muito parecido com o que já desenvolvemos na soma. Vamos continuar **escrevendo um algarismo abaixo do outro** (respeitando: unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena...) e sempre **começando a subtrair pelo algarismo mais à direita.**

Exemplo 4) $39 - 17$

II - Vamos fazendo a subtração "coluna por coluna" e o resultado colocamos abaixo da linha.

$$\begin{array}{r} 39 \\ - 17 \\ \hline 22 \end{array}$$

I - Começamos subtraindo os algarismos mais a direita. No caso,

Um detalhe da subtração é que os termos ganham nomes! O primeiro termo é chamado de "minuendo" (ou "diminuendo") e o **segundo termo de "subtraendo"**. Olhando para o nosso exemplo, o minuendo seria o 39, enquanto o subtraendo é o 17.

Exemplo 5) $152 - 35$

$$\begin{array}{r} 152 \\ - 35 \\ \hline \end{array}$$

Aqui iremos com mais calma. Quando olhamos para a coluna de algarismo mais à direita, temos que fazer a subtração $2 - 5$. Note que 2 é menor do que 5, e, portanto, o resultado seria um número negativo. Nessa situação, devemos "pegar emprestado" do vizinho, **para que o número não fique negativo**.

$$\begin{array}{r} 14\cancel{5}12 \\ - 35 \\ \hline 7 \end{array}$$

Veja que quando pegamos esse número "emprestado", o número que antes era 2, vira 12 e agora é possível efetuar a subtração: $12 - 5 = 7$. **Como pegamos um número do vizinho, o "5" acaba virando o 4 para efeitos da subtração**. Daí, fazemos $4 - 3 = 1$.

$$\begin{array}{r} 14\cancel{5}12 \\ - 35 \\ \hline 117 \end{array}$$

Portanto, $152 - 35 = 117$. Esse negócio de "pegar do vizinho" pode confundir muita gente, por isso tenha bastante atenção.

Multiplicação

Na prática, multiplicar é fazer a adição de um mesmo número repetidas vezes. Por exemplo,

$$2 \times 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 \quad \text{↪ 2 aparece 5 vezes} = 10$$

$$5 \times 7 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 \quad \text{↪ 5 aparece 7 vezes} = 35$$

É bem mais "compacto" expressar várias somas de um mesmo número na forma de uma multiplicação. Ao invés de escrever $5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35$, simplesmente dizemos

que $5 \times 7 = 35$. Para conseguirmos ir bem nessa parte da matéria, é muito importante que você tenha facilidade com a tabuada.

1	2	3	4	5
$1 \times 2 = 2$	$2 \times 1 = 2$	$3 \times 1 = 3$	$4 \times 1 = 4$	$5 \times 1 = 5$
$1 \times 3 = 3$	$2 \times 2 = 4$	$3 \times 2 = 6$	$4 \times 2 = 8$	$5 \times 2 = 10$
$1 \times 4 = 4$	$2 \times 3 = 6$	$3 \times 3 = 9$	$4 \times 3 = 12$	$5 \times 3 = 15$
$1 \times 5 = 5$	$2 \times 4 = 8$	$3 \times 4 = 12$	$4 \times 4 = 16$	$5 \times 4 = 20$
$1 \times 6 = 6$	$2 \times 5 = 10$	$3 \times 5 = 15$	$4 \times 5 = 20$	$5 \times 5 = 25$
$1 \times 7 = 7$	$2 \times 6 = 12$	$3 \times 6 = 18$	$4 \times 6 = 24$	$5 \times 6 = 30$
$1 \times 8 = 8$	$2 \times 7 = 14$	$3 \times 7 = 21$	$4 \times 7 = 28$	$5 \times 7 = 35$
$1 \times 9 = 9$	$2 \times 8 = 16$	$3 \times 8 = 24$	$4 \times 8 = 32$	$5 \times 8 = 40$
$1 \times 10 = 10$	$2 \times 9 = 18$	$3 \times 9 = 27$	$4 \times 9 = 36$	$5 \times 9 = 45$
	$2 \times 10 = 20$	$3 \times 10 = 30$	$4 \times 10 = 40$	$5 \times 10 = 50$
6	7	8	9	10
$6 \times 2 = 12$	$7 \times 1 = 7$	$8 \times 1 = 8$	$9 \times 1 = 9$	$10 \times 1 = 10$
$6 \times 3 = 18$	$7 \times 2 = 14$	$8 \times 2 = 16$	$9 \times 2 = 18$	$10 \times 2 = 20$
$6 \times 4 = 24$	$7 \times 3 = 21$	$8 \times 3 = 24$	$9 \times 3 = 27$	$10 \times 3 = 30$
$6 \times 5 = 30$	$7 \times 4 = 28$	$8 \times 4 = 32$	$9 \times 4 = 36$	$10 \times 4 = 40$
$6 \times 6 = 36$	$7 \times 5 = 35$	$8 \times 5 = 40$	$9 \times 5 = 45$	$10 \times 5 = 50$
$6 \times 7 = 42$	$7 \times 6 = 42$	$8 \times 6 = 48$	$9 \times 6 = 54$	$10 \times 6 = 60$
$6 \times 8 = 48$	$7 \times 7 = 49$	$8 \times 7 = 56$	$9 \times 7 = 63$	$10 \times 7 = 70$
$6 \times 9 = 54$	$7 \times 8 = 56$	$8 \times 8 = 64$	$9 \times 8 = 72$	$10 \times 8 = 80$
$6 \times 10 = 60$	$7 \times 9 = 63$	$8 \times 9 = 72$	$9 \times 9 = 81$	$10 \times 9 = 90$
	$7 \times 10 = 70$	$8 \times 10 = 80$	$9 \times 10 = 90$	$10 \times 10 = 100$

Assim como na soma e na subtração, também temos um método para calcular o produto de dois números. Quanto seria, por exemplo, 731×12 ? Note que **não é uma conta que normalmente temos na cabeça**. Como calculá-la, então?

$$\begin{array}{r} 731 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$$

Fazemos o esquema acima, pois **multiplicaremos algarismo por algarismo**. Com isso, transformamos nosso problema de multiplicar números "estranhos" em multiplicações da tabuada. Observe.

$$\begin{array}{r} 731 \\ \times 12 \\ \hline 2 \end{array}$$

Multiplicamos $2 \times 1 = 2$. Colocamos o resultado abaixo da linha. Depois, fazemos o seguinte:

$$\begin{array}{r} \\ \times 12 \\ \hline 62 \end{array}$$

Diferentemente da soma e da subtração, aqui não vamos coluna por coluna. O "2" multiplicará o algarismo das dezenas do número de cima. Assim, $3 \times 2 = 6$.

$$\begin{array}{r} \\ \times 12 \\ \hline 1462 \end{array}$$

Faremos a multiplicação do "2" pelo "7". O resultado é $2 \times 7 = 14$. Note que multiplicamos todos os algarismos de 731 por 2. Agora, vamos fazer a mesma coisa, mas multiplicando todos os algarismos de 731 por "1".

$$\begin{array}{r} \\ \times 12 \\ \hline 1462 \\ + 1 \\ \hline \end{array}$$

Nesse momento, temos mais novidades. Como vamos fazer novas multiplicações, **iniciamos uma nova linha** e colocamos o resultado da primeira multiplicação **deslocado de uma coluna para esquerda**. Essas duas linhas de resultado serão **somadas** ao final.

$$\begin{array}{r} \\ \times 12 \\ \hline 1462 \\ + 31 \\ \hline \end{array}$$

Dessa vez, fizemos $1 \times 3 = 3$.

$$\begin{array}{r} \\ \times 12 \\ \hline 1462 \\ + 731 \\ \hline \end{array}$$


Agora, vamos **somar as duas linhas de resultado**, coluna por coluna.

$$\begin{array}{r} 731 \\ \times 12 \\ \hline 1462 \\ + 731 \\ \hline 8772 \end{array}$$


Portanto, $731 \times 12 = 8772$.

Divisão

A grande maioria dos alunos tem algum problema com a divisão. Existem muitas regrinhas que podem dificultar a vida do concurseiro. Não se preocupe! Depois de hoje, garanto que não terá mais medo de enfrentar uma divisão. O primeiro passo nesse objetivo é ter uma **noção intuitiva do que significa dividir**. Imagine que você colheu 12 maçãs em sua fazenda.



Você resolve repartir, em quantidades iguais, as 12 maçãs para 4 amigos que foram te visitar. *Quantas maçãs cada amigo levará pra casa?*



Observe que, para fornecer a mesma quantidade para os amigos, **cada um deverá ficar com 3 maçãs**. Assim, escrevemos $12 \div 4 = 3$. O **símbolo " $\div$ "** é o que usamos para representar a divisão. As frações são usadas com esse objetivo também, mas teremos uma aula especial só para elas. Portanto, não se preocupe agora.

PRESTE MAIS ATENÇÃO!



Para resolver divisões, normalmente utilizamos um algoritmo específico. Podemos esquematizá-lo assim:

$$\begin{array}{r|l} D & d \\ R & Q \end{array}$$

- D : dividendo (é o número que será dividido);
- d : divisor (é o número que dividirá o dividendo);
- Q : quociente (é o resultado da divisão);
- R : resto (às vezes, não conseguimos dividir o número em partes inteiras iguais, forma-se, então, o "resto").

Existe uma expressão que relaciona essas quatro quantidades. É a "**Relação Fundamental da Divisão**".

$$D = Q \times d + R$$

ou

$$DIVIDENDO = DIVISOR \times QUOCIENTE + RESTO$$

Agora, vamos resolver algumas divisões para pegar o jeito.

Exemplo 6) $635 \div 5$

$$635 \overline{) 5}$$

Ao contrário do que vínhamos fazendo anteriormente, na divisão, **começaremos do algarismo mais à esquerda, ou seja, pelo "6"**. Vamos nos fazer a pergunta: *que número devemos multiplicar o 5 de modo que o resultado seja o mais próximo possível de 6 (sem ultrapassá-lo)?* É o número 1, pois $5 \times 1 = 5$.

$$\begin{array}{r} 635 \overline{) 5} \\ - 5 \\ \hline 1 \end{array}$$

Colocamos o "1" no quociente e o "5" abaixo do 6. Após esse passo, devemos efetuar a subtração dos elementos que estão na coluna. No caso $6 - 5 = 1$. Agora, descemos o próximo algarismo.

$$\begin{array}{r} 635 \overline{) 5} \\ - 5 \\ \hline 13 \end{array}$$

Como descemos um número, devemos nos perguntar novamente: *qual número devemos multiplicar o 5, de modo que o resultado seja o mais próximo possível de 13 (sem ultrapassá-lo)?* **Ora, é o 2!** Veja que $5 \times 2 = 10$. Assim, ficamos com:

$$\begin{array}{r} 635 \overline{) 5} \\ - 5 \\ \hline 13 \\ - 10 \\ \hline 3 \end{array}$$

Não podemos esquecer de fazer a subtração do resultado: $13 - 10 = 3$. Agora, vamos descer o "5".

$$\begin{array}{r} 635 \overline{) 5} \\ - 5 \\ \hline 13 \\ - 10 \\ \hline 35 \end{array}$$

Qual número que devemos multiplicar o 5, que vai resultar no número mais próximo de 35 (sem ultrapassá-lo)? **Ora, é o 7,** pois $5 \times 7 = 35$. O número pode ser igual, só não pode ser maior!!

$$\begin{array}{r} 635 \overline{) 5} \\ - 5 \\ \hline 13 \\ - 10 \\ \hline 35 \\ - 35 \\ \hline 0 \end{array}$$

Pronto, finalizamos nossa divisão. Veja que o resto deu 0. Nessas situações, dizemos que a divisão é exata. Já quando obtemos um resto diferente de zero, temos uma divisão não exata. Para finalizar, vamos fazer um exemplo com alguns detalhes diferentes.

Exemplo 6) $14563 \div 18$

$$14563 \overline{) 18}$$

Observe que, quando olhamos para os dois algarismos mais à esquerda, temos apenas "14", que é menor do que "18". Nesses casos, podemos pegar mais um algarismo, ou seja, considerar "145". Vamos fazer a pergunta: *qual número devemos multiplicar 18, que resulta no número mais próximo possível de 145?* Ora, é o número 8, pois, $18 \times 8 = 144$. Assim,

$$\begin{array}{r} 14563 \overline{) 18} \\ - 144 \\ \hline 1 \end{array}$$

Uma vez que fizemos a subtração, podemos descer o "6".

$$\begin{array}{r} 14563 \overline{) 18} \\ - 144 \\ \hline 16 \end{array}$$

Note que "16" é menor do que "18". Temos que baixar o próximo número. No entanto, para isso, devemos acrescentar um zero no quociente.

$$\begin{array}{r} 14563 \overline{) 18} \\ - 144 \\ \hline 163 \end{array}$$

Pronto. A pergunta da vez é: *que número multiplicamos o 18 que dará um resultado mais próximo de 163 (lembrando sempre que não pode ultrapassá-lo)?* É o 9! Veja que $18 \times 9 = 162$. Assim,

$$\begin{array}{r}
 14563 \overline{) 18} \\
 \underline{- 144} \\
 163 \\
 \underline{- 162} \\
 1
 \end{array}$$

Terminamos a divisão! Note que o resto foi diferente de zero. É o caso de uma divisão não exata. O quociente foi de 809. Observe que: $14563 = 18 \times 809 + 1$.

Potenciação e Radiciação

Você já deve ter ouvido falar da **potenciação e da radiciação**. Na potenciação, temos números que estão elevados a um outro número, como 2^3 , 2^{10} , 10^5 e 3^7 . Mas você sabe o que significa isso? Esse tipo de operação nada mais é do que uma multiplicação escrita de uma forma simplificada. Imagine que, por algum motivo, você se depare com a multiplicação $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$. Note que é uma notação extensa e tem o número 2 repetido 7 vezes.

Para evitar isso, **você pode condensar toda essa expressão em um único número: 2^7** . É um jeito melhor de representar, não concorda? Observe mais alguns exemplos.

- $3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$
- $2^{10} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 1024$
- $10^5 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 100000$
- $5^2 = 5 \times 5 = 25$

Muitas vezes vocês irão encontrar o termo **exponenciação**, que pode ser utilizado no lugar de potenciação. Eles significam exatamente a mesma coisa! De modo geral, nós podemos representar uma potência da seguinte forma:

$$b = a^n$$

Potência

Base

Expoente

E a radiciação? Vocês lembram da famosa raiz quadrada? Ela é um exemplo clássico dessa operação. Mas o que significa tirar a raiz de um número? Nós sabemos, por exemplo, que $9^2 = 9 \times 9 = 81$. Quando queremos calcular $\sqrt{81}$, estamos fazendo uma operação inversa da potenciação. Você deve se perguntar: qual número que multiplicado por ele mesmo dá 81? Ora, é o 9! Logo, $\sqrt{81} = \sqrt{9^2} = 9$.

Isso é válido se for uma raiz quadrada. No entanto, podemos ter raízes cúbicas, raízes quartas, etc. Acompanhe mais alguns exemplos.

- Para calcular $\sqrt[3]{8}$, você deve se perguntar: qual número que multiplicado por ele mesmo três vezes dá 8? Ora, é o 2! Veja: $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$. Com isso, $\sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{2^3} = 2$;
- Para calcular $\sqrt[4]{10000}$, você deve se perguntar: qual número que multiplicado por ele mesmo quatro vezes vai fornecer 10000? Veja: $10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10000$. Logo, $\sqrt[4]{10000} = \sqrt[4]{10^4} = 10$.

Note que, nos nossos exemplos, os resultados foram números inteiros. Acontece que, nem sempre isso ocorrerá. Por exemplo, a raiz quadrada de 2: $\sqrt{2}$. Qual número que multiplicado por ele mesmo fornece 2? A resposta para essa pergunta é um número irracional: 1,41421356237309504880168872420969... Isso significa que:

$$1,4142135623730950488016887242... \times 1,4142135623730950488016887242... = 2$$

O processo de determinar raízes não é trivial! O quadro a seguir traz as principais potências e raízes que você deve ter na ponta da língua. Galera, anatem esses valores em um papel e durmam com ele. Ter esses valores decorados vai fazer com que economizem muito tempo durante a prova. Além disso, tenha a certeza de que eles aparecerão!

ATENÇÃO, DECORE!



Resultados Importantes

Potências

Potências	Raízes
$2^2 = 4$	$\sqrt{4} = 2$
$3^2 = 9$	$\sqrt{9} = 3$
$4^2 = 16$	$\sqrt{16} = 4$
$5^2 = 25$	$\sqrt{25} = 5$
$6^2 = 36$	$\sqrt{36} = 6$
$7^2 = 49$	$\sqrt{49} = 7$
$8^2 = 64$	$\sqrt{64} = 8$
$9^2 = 81$	$\sqrt{81} = 9$
$10^2 = 100$	$\sqrt{100} = 10$
$11^2 = 121$	$\sqrt{121} = 11$
$12^2 = 144$	$\sqrt{144} = 12$
$13^2 = 169$	$\sqrt{169} = 13$
$14^2 = 196$	$\sqrt{196} = 14$
$15^2 = 225$	$\sqrt{225} = 15$

de 2
$2^0 = 1$
$2^1 = 2$
$2^2 = 4$
$2^3 = 8$
$2^4 = 16$
$2^5 = 32$
$2^6 = 64$
$2^7 = 128$
$2^8 = 256$
$2^9 = 512$
$2^{10} = 1024$
$2^{11} = 2048$
$2^{12} = 4096$
$2^{13} = 8192$

Propriedades da Potenciação

Agora que começamos a ter uma noção intuitiva do que é potenciação, é importante fazer algumas definições e mostrar algumas propriedades.

1) $a^0 = 1$

2) $a^n = a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a$ n vezes

Pessoal, lembre-se que qualquer número elevado a 0 é igual a 1! Isso é uma definição, não há demonstrações. *Quanto é 2^0 ? É 1! Quanto é 1000^0 ? É 1! Quanto é 1000000000000000^0 ? É 1! Não importa quão grande o número seja, se ele está elevado a zero, então essa potência vale 1!* E as propriedades, quais são?

P1) Quando multiplicamos duas potências de mesma base, **mantemos a base e somamos os expoentes**.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Exemplos:

$$2^2 \cdot 2^3 = 2^{2+3} = 2^5$$

$$3^4 \cdot 3^5 = 3^{4+5} = 3^9$$

P2) Quando dividimos duas potências de mesma base, **mantemos a base e subtraímos os expoentes**.

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Exemplos:

$$\frac{2^2}{2^3} = 2^{2-3} = 2^{-1}$$

$$\frac{3^{10}}{3^5} = 3^{10-5} = 3^5$$

P3) Quando calculamos uma potência de potência, **mantemos a base e multiplicamos os expoentes**.

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Exemplos:

$$(2^2)^3 = 2^{2 \cdot 3} = 2^6$$

$$(3^4)^5 = 3^{4 \cdot 5} = 3^{20}$$

P4) Quando queremos elevar a determinado expoente uma multiplicação, **o expoente entra em cada um dos fatores**.

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

Exemplos:

$$(2 \cdot 3)^3 = 2^3 \cdot 3^3$$

$$(5 \cdot 7)^5 = 5^5 \cdot 7^5$$

P5) Quando queremos elevar a determinado expoente uma divisão, **o expoente entra no denominador e no numerador normalmente**.

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Exemplos:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2^2}{3^2}$$

$$\left(\frac{7}{5}\right)^5 = \frac{7^5}{5^5}$$

Existem duas pequenas consequências do que vimos até aqui que vocês devem ter em mente:

- Ao elevar o número 0 a qualquer expoente, **o resultado será sempre zero!**

$$0^n = 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot \dots \cdot 0 \cdot 0_{\text{ } n \text{ vezes}} = 0$$

- Ao elevar o número 1 a qualquer expoente, **o resultado será sempre um!**

$$1^n = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1 \cdot 1_{\text{ } n \text{ vezes}} = 1$$

Para finalizarmos essa primeira parte, é importante fazermos mais algumas considerações. Até agora vimos **apenas potências com expoentes naturais**. O que acontece se o expoente for um número inteiro negativo? Lembre-se que a propriedade P2 diz o seguinte:

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Vamos fazer $m = 0$?

$$\frac{a^0}{a^n} = a^{0-n} \quad \Rightarrow \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Perceba, então, que **quando tivermos expoentes negativos, basta invertemos a potência!** Acompanhe.

$$\bullet \quad 2^{-4} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}$$

$$\bullet \quad 10^{-3} = \frac{1}{1000} = 0,001$$

$$\bullet \quad \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

$$\bullet \quad \left(\frac{4}{5}\right)^{-3} = \left(\frac{5}{4}\right)^3 = \frac{125}{64}$$

$$\bullet \quad \left(\frac{1}{10}\right)^{-5} = \left(\frac{10}{1}\right)^5 = 10^5 = 100.000$$

Todas as propriedades que vimos continuam válidas, independentemente se o expoente é um número positivo ou negativo.

HORA DE PRATICAR!



(PREF. QUARAÍ/2019) Todas as operações fundamentais possuem propriedades que facilitam o seu desenvolvimento e tornam o resultado mais confiável. Dentre todas as operações, a potenciação tem diversas propriedades que ajudam na resolução de suas operações. Sobre a resolução da operação $(2^3 \cdot 2^2)^2$, assinale a alternativa correta.

- A) Basta conservar a base e somar os expoentes.
- B) Basta conservar os expoentes e somar as bases.
- C) Deve-se conservar a base, multiplicar os expoentes de dentro dos parênteses e, então, somar com o de fora.
- D) Deve-se conservar a base, somar os expoentes de dentro dos parênteses e, então, multiplicar o resultado pelo expoente de fora dos parênteses.
- E) O resultado final, independentemente da forma de resolução, será 512.

Comentários:

Veja que temos que resolver a expressão $(2^3 \cdot 2^2)^2$. Para isso, utilizaremos as seguintes propriedades:

$$P1) a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$P3) (a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Iniciamos com a **multiplicação dentro dos parênteses**. Sabemos que, na multiplicação de potências de mesma base, mantemos a base e somamos os expoentes (P1). Logo,

$$(2^3 \cdot 2^2)^2 = (2^{3+2})^2 = (2^5)^2$$

Agora temos **uma potência de potência**. Nesse caso, devemos multiplicar os expoentes (P3).

$$(2^5)^2 = 2^{10}$$

Esse raciocínio que seguimos é o que está descrito exatamente na alternativa D.

Gabarito: Letra D.

Propriedades da Radiciação

Antes de entrarmos nas propriedades da radiciação, é fundamental definirmos alguns elementos das raízes.



Note que cada raiz possui dois elementos principais: o índice, que vai dizer se estamos lidando com uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, etc. e o radicando que é o número que está envolvido na operação em si. A raiz acima é lida da seguinte forma: **raiz enésima de a**.

P5) Toda raiz pode ser escrita na forma de uma potência, em que **o expoente é uma fração**.

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

Pessoal, essa é a propriedade mais importante em se tratando de raízes. Uma vez que a transformamos em uma potência, **todas as propriedades que vimos anteriormente também valem para ela**. Isso facilita muito a compreensão das próximas propriedades que veremos. Confira alguns exemplos.

- $\sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}$
- $\sqrt[3]{3^4} = 3^{\frac{4}{3}}$
- $\sqrt[5]{7^3} = 7^{\frac{3}{5}}$

- $\sqrt[10]{13^3} = 13^{\frac{3}{10}}$

P6) Na multiplicação de raízes com índices iguais, conservamos o índice e multiplicamos os radicandos.

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$$

- $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{2 \cdot 4} = \sqrt[3]{8} = 2$
- $\sqrt[2]{100} \cdot \sqrt[2]{10} = \sqrt[2]{100 \cdot 10} = \sqrt[2]{1000}$

P7) Na divisão de raízes com índices iguais, **conservamos o índice e dividimos os radicandos.**

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

- $\frac{\sqrt[3]{12}}{\sqrt[3]{3}} = \sqrt[3]{\frac{12}{3}} = \sqrt[3]{4}$
- $\frac{\sqrt[4]{100}}{\sqrt[4]{50}} = \sqrt[4]{\frac{100}{50}} = \sqrt[4]{2}$

P8) Na potência de raízes, **o expoente pode ser levado para o radicando**

$$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$$

- $(\sqrt{3})^5 = \sqrt{3^5} = \sqrt{243}$
- $(\sqrt[3]{5})^3 = \sqrt[3]{5^3} = \sqrt[3]{125} = 5$

P9) Quando precisamos tirar uma raiz de uma raiz, **mantemos o radical e multiplicamos os índices.**

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$$

- $\sqrt[3]{\sqrt{2}} = \sqrt[3 \cdot 2]{2} = \sqrt[6]{2}$
- $\sqrt[2]{\sqrt[5]{5}} = \sqrt[2 \cdot 5]{5} = \sqrt[10]{5}$

Detalhes Importantes

Vamos fazer algumas observações sobre aspectos da matéria que os alunos confundem bastante. Observe.

- $(2 + 3)^2 = 5^2 = 25$
- $2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$

Note que $(2 + 3)^2 \neq 2^2 + 3^2$. O expoente não entra **em cada membro da soma individualmente**. Primeiro **resolva o que está dentro do parênteses e, em seguida, resolva a potenciação**. O mesmo raciocínio vale para a subtração. Já quando estamos lidando com raízes, um erro comum entre os alunos é esse:

- $\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{2 + 3} = \sqrt{5}$

Galera, **isso está muito errado**. Observe que:

$$\sqrt{2} = 1,4142... \quad \sqrt{3} = 1,7320... \quad \sqrt{5} = 2,2360...$$

Com isso, veja que $\sqrt{2} + \sqrt{3} = 1,4142... + 1,7320... = 3,1462... \neq 2,2360...$

Não podemos cometer esse tipo de erro. **Quando somamos duas raízes que possuem índices iguais mais radicandos diferentes, não temos o que fazer**. Devemos deixar do jeito que está. Então, da próxima vez, por exemplo, que você chegar ao resultado $\sqrt{2} + \sqrt{3}$, esse será o resultado. Não há mais o que fazer, **você representará sua resposta como uma soma de duas raízes e estará correto!** Agora, você poderá somar duas raízes que são iguais.

- $\sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$
- $\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{5} = 3\sqrt[3]{5}$
- $\sqrt[7]{10} + \sqrt[7]{10} + \sqrt[7]{10} + \sqrt[7]{10} = 4\sqrt[7]{10}$

A racionalização de denominadores pode gerar um pouco de ansiedade nos alunos, apesar de ser simples. Galera, *o que seria racionalizar um denominador?* É apenas "tirar" a raiz da parte de baixo de uma fração. Mas não é tirar de qualquer jeito! Devemos obter uma fração equivalente.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Observe que multiplicamos a fração $\frac{1}{\sqrt{2}}$ por $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$, mas note que $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1$. Então, no fim, você multiplicou sua fração por 1! **Quando multiplicamos por 1, não alteramos o resultado**. Logo,

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Essa é a chamada racionalização de denominadores no seu caso mais simples. Acompanhe mais alguns racionalizações.

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\frac{10}{\sqrt{5}} = \frac{10}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{10\sqrt{5}}{5} = 2\sqrt{5}$$

$$\frac{5}{\sqrt{7}} = \frac{5}{\sqrt{7}} \cdot \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} = \frac{5\sqrt{7}}{7}$$

$$\frac{81}{\sqrt{27}} = \frac{81}{\sqrt{27}} \cdot \frac{\sqrt{27}}{\sqrt{27}} = \frac{81\sqrt{27}}{27} = 3\sqrt{27}$$

A racionalização que fizemos acima é para quando o denominador for uma raiz quadrada. E quando não for?

$$\frac{1}{\sqrt[3]{3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{3}} \cdot \frac{\sqrt[3]{3^2}}{\sqrt[3]{3^2}} = \frac{\sqrt[3]{9}}{\sqrt[3]{3 \cdot 3^2}} = \frac{\sqrt[3]{9}}{\sqrt[3]{3^3}} = \frac{\sqrt[3]{9}}{3}$$

Continue notando que $\sqrt[3]{3^2}/\sqrt[3]{3^2} = 1$. Ou seja, continuamos multiplicando a nossa fração pelo número 1. Veja que o radicando das raízes do numerador e denominador da fração equivalente a 1 possui o expoente 2. Isso acontece, pois, **precisamos obter o expoente 3 para cortar com o índice do radical e eliminar assim a raiz!** Acompanhe mais alguns exemplos para melhor entendimento.

$$\frac{1}{\sqrt[4]{2}} = \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \cdot \frac{\sqrt[4]{2^3}}{\sqrt[4]{2^3}} = \frac{\sqrt[4]{2^3}}{\sqrt[4]{2^4}} = \frac{\sqrt[4]{8}}{2}$$

$$\frac{7}{\sqrt[10]{2^2}} = \frac{7}{\sqrt[10]{2^2}} \cdot \frac{\sqrt[10]{2^8}}{\sqrt[10]{2^8}} = \frac{7\sqrt[10]{2^8}}{\sqrt[10]{2^{10}}} = \frac{7\sqrt[10]{256}}{2}$$

$$\frac{3}{\sqrt[5]{5}} = \frac{3}{\sqrt[5]{5}} \cdot \frac{\sqrt[5]{5^4}}{\sqrt[5]{5^4}} = \frac{3\sqrt[5]{5^4}}{\sqrt[5]{5^5}} = \frac{3\sqrt[5]{625}}{5}$$

$$\frac{10}{\sqrt[40]{7}} = \frac{10}{\sqrt[40]{7}} \cdot \frac{\sqrt[40]{7^{39}}}{\sqrt[40]{7^{39}}} = \frac{10\sqrt[40]{7^{39}}}{\sqrt[40]{7^{40}}} = \frac{10\sqrt[40]{7^{39}}}{7}$$

Mínimo Múltiplo Comum (MMC)

Uma primeira dúvida pode surgir assim que lemos o título dessa seção. *O que é o múltiplo de um número?* Bem, o múltiplo de um número x nada mais é do que **um número resultante da multiplicação de x por qualquer número natural**. Explico! Os múltiplos de 2 são: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... Agora, deixa eu escrever melhor:

Os múltiplos de 2 são: $0 \cdot 2$, $1 \cdot 2$, $2 \cdot 2$, $3 \cdot 2$, $4 \cdot 2$, $5 \cdot 2$, $6 \cdot 2$,

Conseguiu perceber? Para achar os múltiplos de um determinado número, basta multiplicá-lo por qualquer natural. Você lembra qual é **o conjunto dos números naturais**?

$$N = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$$

Quais são as consequências disso?

- O número zero (0) sempre será múltiplo de qualquer número, pois $0 \cdot x = 0$.
- O próprio número sempre será um **múltiplo de si mesmo**, pois $1 \cdot x = x$.
- **Existem infinitos múltiplos de um número**, uma vez que existem infinitos números naturais.

Formalmente, nós representamos os múltiplos de 2 da seguinte forma:

$$M(2) = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots\}$$

Você já consegue me dizer quais são os múltiplos de 3? Ou de 5?

$$M(3) = \{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, \dots\}$$

$$M(5) = \{0, 5, 10, 15, 20, 25, \dots\}$$

Antes de avançarmos, vale uma observação importante. Alguns professores **podem estender a definição de múltiplos para o conjunto dos números inteiros**. Dessa forma, você já pode ter visto em algum livro a seguinte notação:

$$M(2) = \{\dots, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots\}$$

Observe que, sob essa consideração, também existiriam múltiplos negativos. No entanto, vamos nos ater a definição que leva em conta **somente o conjunto dos números naturais** para a definição de múltiplos, tudo bem?! Vou pedir agora que você observe com atenção os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3.

$$M(2) = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots\}$$

$$M(3) = \{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, \dots\}$$

Qual o menor número positivo que é múltiplo de 2 e também de 3? Sei que você certamente disse 6!

$$M(2) = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots\}$$

$$M(3) = \{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, \dots\}$$

Pois é, você acabou de encontrar o MMC de 2 e 3! É o menor múltiplo positivo que é comum aos dois! Logo,

$$MMC(2, 3) = 6$$

Conseguiu entender conceitualmente o que é esse tal de MMC? Preste atenção nas seguintes observações, elas precisam estar bem claras:

- Todo número inteiro vai possuir múltiplos. Aqui, o múltiplo é calculado em relação a um único número, por exemplo, calculamos os múltiplos de 2, de 5, de 10, de 120, etc.
- Quando estamos falando de mínimo múltiplo comum, estamos envolvendo dois ou mais números. Não faz sentido calcular MMC de um único número! Tudo ok?!

Vamos calcular junto alguns MMCs!

- Calcule o MMC de 5 e 10.

Vamos listar os múltiplos de cada um desses números!

$$M(5) = \{0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, \dots\}$$

$$M(10) = \{0, 10, 20, 30, 40, 50, \dots\}$$

Veja que o menor múltiplo positivo que é comum a 5 e a 10, é o próprio número 10. Como vimos um pouco mais cedo, todo número é um múltiplo de si mesmo, pois $1 \cdot x = x$. Logo, não há problema algum que o mínimo múltiplo comum entre 5 e 10 seja o próprio número 10!

- Calcule o MMC de 12 e 25.

Vamos listar os múltiplos de cada um desses números!

$$M(12) = \{0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, \dots\}$$

204, 216, 228, 240, 252, 264, 276, 288, 300, 312, 324, 336, ...}

$M(25) = \{0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, \dots\}$

Ufa! Veja quantos números tivemos que listar para encontrar o mínimo múltiplo comum de 12 e 25. Obviamente, na hora da prova, **não precisamos ter essa trabalhadeira toda**, uma vez que há métodos de obtenção de MMC que fornecem esse resultado de uma forma mais imediata. Vamos aprendê-lo? Para começar, devemos lembrar o que é um número primo.

FIQUE ATENTO!



Número primo é todo número natural que é **divisível apenas por 1 e por ele mesmo**.

Números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ...

Um fato que você deve guardar: *o número 2 é o único número primo que é par!*

Agora que você relembrou o que é um número primo, vamos avançar! Entender o que é um número primo é importante para descobrir MMCs, pois, **precisaremos decompor um número em seus fatores primos**! Vamos primeiro ver alguns números que estão decompostos em seus fatores primos:

- $10 = 2^1 \cdot 5^1$
- $36 = 2^2 \cdot 3^2$
- $600 = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^2$

Quando estamos lidando com números naturais maiores do que 1, sempre poderemos fazer decomposições como essa. Esse fato é conhecido como **Teorema Fundamental da Aritmética**.

SE LIGA!



Teorema Fundamental da Aritmética

Todo número natural maior do que 1 pode ser escrito, de forma única, como um produto de números primos.

A demonstração do teorema acima *foge do escopo do nosso curso*, mas **vale a pena conhecer** e saber que alguém já dedicou um precioso tempo da vida para demonstrá-lo, de forma que **podemos usá-lo sem medo**. Vamos continuar e aprender como fazemos essas decomposições.

Minha primeira dica é: lembre-se quais são os números primos, principalmente os primeiros: **2, 3, 5, 7, 11, 13, ...**. Não adianta querer decompor em fatores primos se você não lembrar quais são os números primos! Anote **a definição e os primeiros números** em um algum canto de fácil visualização para sempre estar lembrando! Vamos usar seguinte procedimento para decompor um número em seus fatores primos:

1º) Desenhamos uma espécie de tabela, com o número na esquerda e uma linha central.

600	
-----	--

2º) Dividimos o número por 2 até não conseguirmos mais. Caso não consiga por 2, pular para o próximo número primo: 3. Se ainda não for divisível, pegar o próximo: 5 e assim sucessivamente. Vamos com calma.

600		2
300		

Veja que colocamos o número 2 na coluna da direita e o resultado da divisão de 600 por 2, logo abaixo dos 600. Continuamos fazendo isso até que o número na coluna da esquerda não seja mais divisível por 2.

600		2
300		2
150		2
75		

Veja que **75 não é divisível por 2**. Tentaremos então dividir por 3.

600		2
300		2
150		2
75		3

25 |

Conseguimos dividir por 3 apenas uma vez. Vamos para o próximo primo: 5.

600	2
300	2
150	2
75	3
25	5
5	5
1	

Conseguimos dividir por 5 duas vezes. Note que chegamos ao valor "1" na coluna da esquerda. **É nesse momento que devemos parar.** Com isso, olhamos para a coluna da esquerda

600	2
300	2
150	2
75	3
25	5
5	5
1	$2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$

Quando multiplicamos esses números, vamos ter exatamente o 600 "decomposto".

$$600 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$$

Tudo ok até aqui, galera? Estamos sabendo decompor um número? Vamos ver mais alguns exemplos.

1720	2	43 é
860	2	um
430	2	número
215	5	primo.
43	43	
1	$2^3 \cdot 5 \cdot 43$	

7700	2
3850	2
1925	5
385	5
77	7
11	11

3429	3	1	$2^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11$
1143	3		127 é um
381	3		número
127	127		primo.
1	$3^3 \cdot 127$		

Pessoal, veja que nem sempre teremos números primos dos pequenos (rsrs). Nos exemplos acima, **43 e 127 não são números primos "triviais"** e é preciso um certo esforço para verificá-los. O melhor jeito de reconhecer rapidamente é fazendo questões e tendo contato com eles na prática. Segue abaixo uma tabela com os *100 primeiros números primos* (a título de curiosidade e para primeiro contato, **não é para decorar**)



Os 100 primeiros números primos

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59,
61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113,
127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179,
181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239,
241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307,
311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373,
379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439,
443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503,
509, 521, 523, 541, 547.

Se chegamos até aqui, precisamos estar compreendendo os seguintes pontos:

- O que é o **múltiplo** de um número?
- O que é o **mínimo múltiplo comum**?
- O que é um número primo?
- **Como decompor** um número em seus fatores primos (fatoração)?

Se você consegue responder com confiança essas quatro perguntas, então podemos prosseguir. Nós falamos bastante de números primos e aprendemos um pouco sobre fatoração. Agora, poderemos descobrir o MMC de qualquer número com uma certa rapidez. O primeiro fato que quero que você anote aí é:

- O MMC de números primos é o produto entre os números.

Por exemplo, vimos que o **MMC de 2 e 3 é o número 6**. Observe que 2 e 3 são números primos e que 6 é igual a 2×3 . Agora, se eu te perguntar, *qual o MMC de 3 e 7?* Basta lembrar que os dois são números primos e você acertará se dizer que é 21 (7×3). Sabendo disso, calcular MMC começa a ficar mais fácil.

- $MMC(5, 7) = 7 \times 5 = 35$
- $MMC(11, 13) = 11 \times 13 = 143$

Professor, podemos calcular o MMC entre três números? Podemos calcular o MMC **entre dois ou mais números**. Se forem todos primos, usaremos o mesmo método para calcular, multiplicamos tudo!

- $MMC(11, 13, 17) = 11 \times 13 \times 17 = 2431$
- $MMC(5, 11, 23, 31) = 5 \times 11 \times 23 \times 31 = 39215$

No entanto, nem sempre os problemas serão assim, em que teremos números primos. Anteriormente, citamos que o MMC entre 5 e 10 é o próprio número 10. Note que não é possível apenas multiplicar os dois números para obter o MMC, pois 10 não é um número primo.

E nessas situações, como fazemos? **Vamos decompor os dois números ao mesmo tempo!** Como assim, professor? Siga a ordem de explicações no procedimento abaixo:

1º) Na primeira linha colocamos os números dos quais estamos procurando o MMC.	← 5 10	2 →	2º) Começamos com 2 pois é o primeiro primo que divide um dos dois números.
3º) Veja que o 5 não é divisível por 2, por esse motivo apenas repetimos ele. Já o 10 é divisível.	← 5 5	5 →	4º) Pulamos o 3, pois o 5 é divisível apenas por 1 por ele mesmo.
5º) Paramos quando ficamos com a última linha com apenas 1's.	← 1 1	10 →	6º) É o nosso MMC!

Moçada, uma observação importante é que **quando um dos números não for divisível pelo "primo da vez", nós devemos repeti-lo**. O MMC será igual ao produto de todos os primos que usamos para dividir. Vamos destrinchar esse método com mais alguns exemplos. O MMC de 12 e 15 ficaria assim:

1º) Na primeira linha colocamos os números dos quais estamos procurando o MMC.	← 15 12	2 →	2º) Começamos com 2 pois é o primeiro primo que divide um dos dois números.
3º) Veja que o 15 não é divisível por 2, por esse motivo, apenas repetimos ele. Já o 12 é divisível.	← 15 6	2 →	4º) Continuamos com 2, pois 6 ainda é divisível por 2.
5º) Veja que o 15 não é divisível por 2, por esse motivo apenas repetimos ele. O 6 é divisível.	← 15 3	3 →	6º) Nem 15 nem 3 são divisíveis por 2, por isso, pulamos para o próximo primo: 3.
7º) Agora sim, 15 é divisível por 3! Logo, vamos ficar com 5 e 1.	← 5 1	5 →	8º) Veja que ainda temos um 5 para dividir, por isso, estamos usando o 5 aqui.
9º) Terminamos dividindo o 5 que faltou. Precisamos obter na última linha apenas 1's.	← 1 1	60 →	10º) É o nosso MMC!

Agora, vou resolver com vocês mais três exemplos, sem detalhar tanto. Tentem fazer como exercício!

100	360	2
50	180	2
25	90	2
25	45	3
25	15	3
25	5	5
5	1	5
1	1	1800



250	300	620	2
125	150	310	2
125	75	155	3
125	25	155	5
25	5	31	5
5	1	31	5
1	1	31	31
1	1	1	46500



720	800	936	2
360	400	468	2
180	200	234	2
90	100	117	2
45	50	117	2
45	25	117	3
15	25	39	3
5	25	13	5
1	5	13	5
1	1	13	13

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad 1 \quad \overline{) 93600} \end{array}$$

Infelizmente (ou felizmente), a maioria das questões mais atuais de MMC **não são tão objetivas assim**. Hoje, temos questões bem mais elaboradas, na maioria das vezes, que envolvem **um certo grau de contextualização**. A boa notícia é que, apesar de contextualizadas, elas são facilmente identificadas e se repetem bastante.

Minha dica para você, caro aluno, é que fique atento as seguintes expressões nos enunciados: *"partiram naquele momento/quando voltarão a se encontrar"*, *"eles fizeram algo nesse instante/quando voltarão a fazer de novo"*... Elas certamente indicarão um problema que envolve o cálculo de MMC.

Máximo Divisor Comum (MDC)

Desenvolvemos uma grande base no estudo do mínimo múltiplo comum! Com essa base construída, nós avançaremos bem mais rapidamente, durante o estudo do MDC. Vamos nessa?! O primeiro ponto que devemos esclarecer é: *o que é um divisor?* Ora, um divisor, só pelo nome, parece ser um número que divide outro, correto? No entanto, esse número não vai dividir de qualquer jeito. O resultado dessa divisão deve ser um inteiro, **é a famosa "divisão exata"**. Tudo bem?

- 6 é um divisor de 12, pois $\frac{12}{6} = 2$.
- 5 não é um divisor de 12, pois $\frac{12}{5} = 2,4$. Note que 2,4 não é um número inteiro, por isso, mesmo que 5 esteja dividindo 12, ele não é um divisor de 12 pois o resultado dessa divisão não é um inteiro!

Lembre-se que **existem infinitos múltiplos de um número**, por esse motivo, falamos apenas de mínimo múltiplo comum. Aqui, teremos um **número finito de divisores** naturais associados a cada número. Como é uma quantidade finita, podemos falar de máximo divisor. Acompanhe.

- Os divisores de 12 são: 1, 2, 3, 4, 6 e 12.
- Os divisores de 20 são: 1, 2, 4, 5, 10 e 20.
- Os divisores de 48 são: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 48.

O que podemos perceber apenas olhando para essa pequena lista que fizemos?

- O número 1 é sempre divisor.
- Um número x é sempre divisor de si mesmo.

Imagine que você esteja procurando o Máximo Divisor Comum de 12 e 20. Olhe para a lista.

- Os divisores de 12 são: 1, 2, 3, 4, 6 e 12.
- Os divisores de 20 são: 1, 2, 4, 5, 10 e 20.

Veja que 4 é o maior número que divide ao mesmo tempo 12 e 20. Por esse motivo, chamamos ele de máximo divisor comum. Tudo certo?! Podemos calcular o MDC de dois ou mais números. Por exemplo, qual seria o MDC de 18, 30 e 48? Vamos para a lista!

- Os divisores de 18 são: 1, 2, 3, 6, 9 e 18.
- Os divisores de 30 são: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30.
- Os divisores de 48 são: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 48.

O 6 é o maior número que divide os 18, 30 e 48. Logo, o chamamos de MDC. Galera, só conseguiremos fazer essa lista quando o número for pequeno, pois conseguimos ir dividindo os valores na cabeça e vendo se é uma divisão exata ou não. No caso de número maiores, usaremos um procedimento específico, tudo bem?

Por exemplo, para listar os divisores de 18, uso todos os números entre 1 e 18 e divido o 18 por eles. Se o resultado da divisão for um inteiro, seleciono esse número para a lista de divisores! Note que nunca teremos divisores maior do que o próprio número! Isso acontece, pois, quando dividimos um inteiro por outro maior do que ele, o resultado será, invariavelmente, um número menor do que um.

É muito comum os alunos trocarem tudo e falarem, por exemplo, "máximo múltiplo comum" ou "mínimo divisor comum" (rsrs). Pessoal, os múltiplos são infinitos. Qual seria o máximo múltiplo, se eles são infinitos? Por sua vez, temos um conjunto bastante limitado de divisores, e, desse modo, podemos falar em máximo divisor, certo?

Beleza, professor! Mas na minha prova não vai vir essas questões! Nela, o examinador vai pedir o MDC de números supergrandes que não vou conseguir listar todos os divisores! Nessa situação, o que eu faço?

Se a tarefa de listar os divisores for inviável, faremos o mesmo procedimento que usamos para calcular o MMC! Igualzinho, não mudaremos nada! Você só deverá ficar atento a um detalhe. Vamos ver.

	15	12	2	
	15	6	2	
	15	3	3	
2º) Veja que essa linha é fruto divisão do 15 por 3 e do 3 por 3.	5	1	5	1º) 3 foi o único que dividiu os dois números ao mesmo tempo.
	1	1		

Sendo assim, nesse primeiro exemplo, 3 é o MDC de 15 e 12. Vamos aumentar esses números.

250	300	620	2	2 dividiu todos os números ao mesmo tempo.
125	150	310	2	
125	75	155	3	
125	25	155	5	5 também divide todos os números ao mesmo tempo.
25	5	31	5	
5	1	31	5	
1	1	31	31	
1	1	1		

Dessa vez, encontramos dois números que conseguem dividir todo mundo ao mesmo tempo: 2 e 5. O MDC será o produto deles dois.

$$MDC(250, 300, 620) = 2 \times 5 = 10$$

Vamos mais uma?!

100	360	2
50	180	2
25	90	2
25	45	3
25	15	3
25	5	5
5	1	5
1	1	

E agora? O 2 conseguiu dividir todo mundo duas vezes! Além disso, o 5 dividiu também os dois números uma vez. Galera, basta multiplicar esses números para encontrar o MDC.

$$MDC(100, 360) = 2 \times 2 \times 5 = 20$$

No cálculo do MMC, nós simplesmente vamos dividindo tudo, sem prestar atenção. Depois, pegávamos os números que estavam na coluna da direita e multiplicava tudo. Agora, no cálculo do MDC, devemos prestar atenção e selecionar aqueles números que conseguem dividir todos "na mesma hora". Se isso acontecer, selecionamos ele e prosseguimos com os cálculos. No final, para obter o Máximo Divisor Comum, faremos a multiplicação, NÃO DE TODOS, mas apenas daqueles que selecionamos.

A pergunta é: *por que esse procedimento funciona?* Quando você pega o número que divide os dois ao mesmo tempo, você está selecionando um divisor comum. Concorde? No entanto, queremos o Máximo Divisor Comum. Esse máximo é obtido quando multiplicamos todos esses divisores comuns (que também são fatores primos dos números em questão).

Se você chegou até aqui, quero que você verifique se está sabendo os seguintes pontos:

- O que é um **divisor** de um número?
- O que é o **Máximo Divisor Comum (MDC)**?
- Qual a diferença entre MDC e MMC?
- Como obtemos o MDC usando o mesmo procedimento do MMC? O que devo prestar atenção?

Se você responder isso com uma certa tranquilidade, vamos avançar. Caso não, volte um pouquinho no texto! Garanto que eventualmente tudo fará mais sentido! Assim como o MMC, a grande maioria das questões vão exigir uma aplicação mais contextualizada... Dessa forma, saber identificar uma questão de MDC é fundamental.

Aqui, também existem expressões que **sinalizam** que podemos estar lidando com uma questão de MDC. Por exemplo, *"dividir em grupos de mesmo tamanho/menor quantidade por grupo"* e coisas do gênero.

Razão

Sejam dois números A e B, com B diferente de zero. A **razão entre os números A e B** é a divisão de A por B, podendo ser expressa por:

- Razão entre A e B;
- Razão de A para B;
- A está para B;
- A:B;
- A/B ;
- $\frac{A}{B}$.

O conceito de razão nos permite fazer a comparação entre dois números. Se, por exemplo, tivermos em uma sala 10 adultos e 5 crianças, a razão entre o **número de adultos** e o **número de crianças** é:

$$\frac{\text{Número de adultos}}{\text{Número de crianças}} = \frac{10}{5} = 2$$

Note, portanto, que a razão entre o número de adultos e o número de crianças representa quantas vezes o número de adultos é maior do que o número de crianças. Para o exemplo em questão, representa quantas vezes o número 10 é maior do que o 5: duas vezes. Se quisermos a razão entre o **número de crianças** e o **número de adultos**, temos:

$$\frac{\text{Número de crianças}}{\text{Número de adultos}} = \frac{5}{10} = 0,5$$

Assim como ocorre em problemas envolvendo frações, um recurso importante para resolver exercícios envolvendo o conceito de razão consiste em **modelar o problema atribuindo uma incógnita a determinado valor que se desconhece**. Vejamos:

HORA DE PRATICAR!



(CBM AM/2022) Em um grupo de pessoas, o número de homens é igual ao número de mulheres. Seleccionam-se então $\frac{2}{5}$ dos homens $\frac{3}{4}$ das mulheres e forma-se um novo grupo.

Nesse novo grupo, em relação ao total de pessoas, as mulheres representam

- a) $\frac{2}{3}$
- b) $\frac{5}{9}$

c) $\frac{7}{20}$

d) $\frac{15}{23}$

e) $\frac{17}{25}$

Comentários:

Considere que originalmente o número de homens e o número de mulheres seja igual a X , totalizando $2X$ pessoas. No novo grupo, temos $\frac{2}{5}$ dos homens. O total de homens nesse novo grupo é:

$$\text{Homens}_{\text{novo grupo}} = \frac{2}{5} \text{ de } X = \frac{2}{5} \times X = \frac{2}{5}X$$

Ainda no novo grupo, temos $\frac{3}{4}$ das mulheres. O total de mulheres nesse novo grupo é:

$$\text{Mulheres}_{\text{novo grupo}} = \frac{3}{4} \text{ de } X = \frac{3}{4} \times X = \frac{3}{4}X$$

Nesse novo grupo, a razão entre o número de mulheres e o total de pessoas é:

$$\frac{\text{Mulheres}_{\text{novo grupo}}}{\text{Homens}_{\text{novo grupo}} + \text{Mulheres}_{\text{novo grupo}}} = \frac{\frac{3}{4}X}{\frac{2}{5}X + \frac{3}{4}X} = \frac{\frac{3}{4}X}{\frac{8X+15X}{20}} = \frac{\frac{3}{4}X}{\frac{23}{20}X}$$

Simplificando X , temos:

$$\frac{\frac{3}{4}}{\frac{23}{20}} = \frac{3}{4} \times \frac{20}{23} = \frac{15}{23}$$

Gabarito: Letra D.

Proporção

Conceito de proporção

Proporção é a igualdade entre duas ou mais razões. Sejam as razões A/B e C/D . A proporção é dada pela igualdade:

$$\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$$

Podemos representar uma proporção das seguintes formas:

- A está para B assim como C está para D;
- $A:B::C:D$;
- $A/B = C/D$;
- $\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$.

Em uma proporção $A/B = C/D$, diz-se que:

- A e D são os **extremos**; e
- B e C são os **meios**.

Multiplicação cruzada

A propriedade das proporções conhecida por “multiplicação cruzada” nos diz o seguinte:

TOME NOTA!



Em uma proporção, o **produto dos meios** é igual ao **produto dos extremos**.

Em outras palavras, dada a proporção $\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$, temos que $C \times B = A \times D$.

Considere, por exemplo, a proporção:

$$\frac{5}{10} = \frac{20}{40}$$

Note que o produto dos meios, 10×20 , é igual ao produto dos extremos, 5×40 , pois ambas as multiplicações nos retornam o resultado 200.

Outra forma de entender a “multiplicação cruzada” é perceber que podemos rearranjar os **meios** e os **extremos**. Para exemplificar esse conceito, considere a mesma proporção:

$$\frac{3(x-2)}{4} = \frac{9(x+1)}{20}$$

Os meios da proporção considerada são 4 e $9(x+1)$.

$$\frac{3(x-2)}{4} = \frac{9(x+1)}{20}$$

Podemos rearranjar os meios da proporção original da seguinte forma:

$$\frac{3(x-2)}{1} = \frac{4 \times 9(x+1)}{20}$$

Também podemos rearranjar os meios da proporção original assim:

$$\frac{3(x-2)}{4 \times 9(x+1)} = \frac{1}{20}$$

Outra possibilidade é trocar os meios de posição:

$$\frac{3(x-2)}{9(x+1)} = \frac{4}{20}$$

A mesma ideia vale para os extremos da proporção.

Os extremos da proporção considerada são $3(x - 2)$ e 20.

$$\frac{3(x-2)}{4} = \frac{9(x+1)}{20}$$

Podemos rearranjar os extremos das seguintes formas:

$$\frac{3(x-2) \times 20}{4} = \frac{9(x+1)}{1}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{9(x+1)}{3(x-2) \times 20}$$

$$\frac{20}{4} = \frac{9(x+1)}{3(x-2)}$$

Um ponto muito importante na resolução de problemas é **não confundir** a razão entre duas entidades com a razão entre uma entidade e a totalidade de casos do problema.

Propriedades fundamentais das proporções

A seguir, aprenderemos algumas propriedades aplicáveis às proporções.

Propriedade fundamental soma

Considerando a proporção $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, são válidas também as proporções $\frac{a}{b} = \frac{a+c}{b+d}$ e $\frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$. Em resumo:

$$\text{Considerando a proporção } \frac{a}{b} = \frac{c}{d}, \text{ temos } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$$

Isso também vale para uma proporção composta por **mais de duas razões**:

$$\text{Considerando a proporção } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f}, \text{ temos } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{a+c+e}{b+d+f}$$

Propriedade fundamental da subtração

Considerando a proporção $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, são válidas também as proporções $\frac{a}{b} = \frac{a-c}{b-d}$ e $\frac{c}{d} = \frac{a-c}{b-d}$. Em resumo:

$$\text{Considerando a proporção } \frac{a}{b} = \frac{c}{d}, \text{ temos } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a-c}{b-d}$$

Uso conjunto das propriedades da soma e da subtração

Em uma mesma proporção composta por duas ou mais razões, podemos utilizar as duas propriedades anteriores em conjunto. Por exemplo, se tivermos a proporção:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h}$$

Podemos somar e subtrair os numeradores e denominadores seguindo a mesma lógica:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h} = \frac{-a+c+e+g}{-b+d+f+h}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h} = \frac{a-c+e-g}{b-d+f-h}$$

Enfim, são diversas as possibilidades. O importante é não esquecer que, ao realizar uma operação (soma ou subtração) com o numerador de uma das razões, devemos realizar a mesma operação (soma ou subtração) com o denominador dessa razão. Vale ressaltar que não é estritamente necessário utilizar todas as razões apresentadas na proporção:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h} = \frac{a+c-e}{b+d-f}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h} = \frac{-c+e-g}{-d+f-h}$$

Grandezas diretamente proporcionais

Definição de grandezas diretamente proporcionais

Uma grandeza A é diretamente proporcional a uma grandeza B quando, **para todos os valores que podem ser assumidos simultaneamente pelas duas grandezas**, a razão entre elas é sempre igual a uma constante k , denominada constante de proporcionalidade.

$$\frac{\text{Grandeza A}}{\text{Grandeza B}} = k$$

Para todos os valores que podem ser assumidos **simultaneamente** por A e B.

Esse conceito pode ser estendido para quando temos mais de uma grandeza. Uma grandeza A é diretamente proporcional às grandezas B, C e D quando:

$$\frac{\text{Grandeza A}}{(\text{Grandeza B}) \times (\text{Grandeza C}) \times (\text{Grandeza D})} = k$$

Para todos os valores que podem ser assumidos **simultaneamente** por A, B, C e D.

Divisão em partes diretamente proporcionais

Problemas de divisão em partes proporcionais (ou seja, em partes diretamente proporcionais) tratam da divisão de uma quantia em partes proporcionais a alguns números. Para resolver esse tipo de problema, pode ser necessário utilizar as "propriedades fundamentais das proporções".

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Buritizal/2018) Três amigos fizeram um bolão para um jogo de loteria, sendo que um deles colaborou com R\$ 13,00, outro com R\$ 14,00 e o terceiro com R\$ 22,00. Eles foram sorteados e receberam um prêmio de R\$ 7.350,00, que será dividido em partes diretamente proporcionais ao que cada um contribuiu no bolão. O valor que receberá o amigo que contribuiu com a menor quantia será

- a) R\$ 1.950,00.
- b) R\$ 2.000,00.
- c) R\$ 2.050,00.
- d) R\$ 2.100,00.
- e) R\$ 2.150,00.

Comentários:

Se as partes proporcionais a R\$13, R\$14 e R\$22 forem respectivamente a , b e c , então:

$$\frac{a}{13} = \frac{b}{14} = \frac{c}{22} = k$$

A soma das partes é o total do prêmio, isto é, $a + b + c = \text{R\$ } 7.350$.

Utilizando a "propriedade fundamental da soma" na proporção $\frac{a}{13} = \frac{b}{14} = \frac{c}{22}$, temos:

$$\frac{a}{13} = \frac{b}{14} = \frac{c}{22} = \frac{a+b+c}{13+14+22}$$

$$\frac{a}{13} = \frac{b}{14} = \frac{c}{22} = \frac{7350}{49}$$

$$\frac{a}{13} = \frac{b}{14} = \frac{c}{22} = 150$$

Portanto, a nossa constante de proporcionalidade é 100. O valor que receberá o amigo que contribuiu com a menor quantia é tal que:

$$\frac{a}{13} = 150$$

$$a = 1.950$$

Gabarito: Letra A.

Grandezas inversamente proporcionais

Para trabalhar com grandezas inversamente proporcionais, devemos saber que as expressões a seguir querem dizer a mesma coisa:

- A é inversamente proporcional a B;
- A é diretamente proporcional ao inverso de B;
- A é diretamente proporcional a $\frac{1}{B}$.

Essa breve introdução é suficiente para resolver todos os problemas sobre grandezas inversamente proporcionais: basta converter o problema de grandezas inversamente proporcionais em um problema de grandezas diretamente proporcionais. Vamos entrar em detalhes.

Definição de grandezas inversamente proporcionais

Uma grandeza A é inversamente proporcional a uma grandeza B quando, para todos os valores que podem ser assumidos simultaneamente pelas duas grandezas, a razão entre a grandeza A e o inverso da grandeza B é sempre igual a uma constante k, denominada constante de proporcionalidade.

$$\frac{\text{Grandeza A}}{\frac{1}{\text{Grandeza B}}} = k$$

Para todos os valores que podem ser assumidos simultaneamente por A e B.

Note que:

$$\frac{\text{Grandeza A}}{\frac{1}{\text{Grandeza B}}} = (\text{Grandeza A}) \times (\text{Grandeza B})$$

Podemos, então, reescrever a definição assim:

Uma grandeza A é inversamente proporcional a uma grandeza B quando, para todos os valores que podem ser assumidos simultaneamente pelas duas grandezas, o produto da grandeza A pela grandeza B é sempre igual a uma constante k, denominada constante de proporcionalidade.

$$(\text{Grandeza A}) \times (\text{Grandeza B}) = k$$

Para todos os valores que podem ser assumidos simultaneamente por A e B.

Esse conceito pode ser estendido para quando temos mais de uma grandeza. Uma grandeza A é inversamente proporcional às grandezas B, C e D quando:

$$\frac{\text{Grandeza A}}{\left(\frac{1}{\text{Grandeza B}}\right) \times \left(\frac{1}{\text{Grandeza C}}\right) \times \left(\frac{1}{\text{Grandeza D}}\right)} = k$$

Para todos os valores que podem ser assumidos simultaneamente por A, B, C e D.

Novamente, podemos reescrever o conceito, dizendo que uma grandeza A é inversamente proporcional às grandezas B, C e D quando:

$$(\text{Grandeza A}) \times (\text{Grandeza B}) \times (\text{Grandeza C}) \times (\text{Grandeza D}) = k$$

Para todos os valores que podem ser assumidos simultaneamente por A, B, C e D.

Divisão em partes inversamente proporcionais

Problemas de divisão em **partes inversamente proporcionais** tratam da divisão de uma quantia em partes inversamente proporcionais a alguns números. As questões de concurso público costumam apresentar uma contextualização. Vamos praticar:

(BANESTES/2018) Em um terminal de autoatendimento bancário há apenas cédulas de R\$ 10,00, R\$ 20,00 e R\$ 50,00. As quantidades de cada um dos três tipos de cédula na máquina são inversamente proporcionais aos seus valores. Se há 272 cédulas ao todo, então a quantidade total de dinheiro armazenado no terminal é:

- a) R\$ 3.600,00;
- b) R\$ 3.960,00;
- c) R\$ 4.050,00;
- d) R\$ 4.240,00;
- e) R\$ 4.800,00.

Comentários:

Se as quantidades de cédulas de R\$10 , R\$20 e R\$50 forem respectivamente a , b e c , então:

$$\frac{a}{\frac{1}{10}} = \frac{b}{\frac{1}{20}} = \frac{c}{\frac{1}{50}} = k$$

A soma do número de cédulas é 272, isto é, $a + b + c = 272$.

Utilizando a "propriedade fundamental da soma" na proporção, temos:

$$\frac{a}{\frac{1}{10}} = \frac{b}{\frac{1}{20}} = \frac{c}{\frac{1}{50}} = \frac{a+b+c}{\frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{50}}$$

$$\frac{a}{\frac{1}{10}} = \frac{b}{\frac{1}{20}} = \frac{c}{\frac{1}{50}} = \frac{272}{\frac{10+5+2}{100}}$$

$$10a = 20b = 50c = \frac{272}{\frac{17}{100}}$$

$$10a = 20b = 50c = 272 \times \frac{100}{17}$$

$$10a = 20b = 50c = 1.600$$

Portanto, a nossa constante de proporcionalidade é 1.600. O número de cédulas de cada tipo é:

$$10a = 1.600 \rightarrow a = 160$$

$$20b = 1.600 \rightarrow b = 80$$

$$50c = 1.600 \rightarrow c = 32$$

Temos, portanto, 160 cédulas de R\$10, 80 cédulas de R\$20 e 32 cédulas de R\$50. A quantidade total de dinheiro armazenado no terminal é:

$$160 \times R\$10 + 80 \times R\$20 + 32 \times R\$50 = R\$4.800$$

Gabarito: Letra E.

Grandezas direta e inversamente proporcionais

Quando se apresentam problemas em que uma grandeza A é diretamente proporcional a algumas grandezas e inversamente proporcional a outras grandezas, **devemos transformar tudo para grandezas diretamente proporcionais**.

Se uma grandeza A for diretamente proporcional às grandezas B e C e inversamente proporcional às grandezas D e E, então podemos dizer que **a grandeza A é diretamente proporcional às grandezas B, C, 1/D e 1/E**. Logo:


$$\frac{(\text{grandeza } A)}{(\text{grandeza } B) \times (\text{grandeza } C) \times \frac{1}{(\text{grandeza } D)} \times \frac{1}{(\text{grandeza } E)}} = k$$

Onde k é a constante de proporcionalidade.

Problemas com grandezas direta e inversamente proporcionais

Para entendermos como resolver problemas envolvendo grandezas direta e inversamente proporcionais, vamos a um exemplo:

EXEMPLIFICANDO



Em uma fábrica de parafusos, a receita em reais obtida em um mês é diretamente proporcional ao número de parafusos produzidos e inversamente proporcional à cotação do dólar.

Em um determinado mês, foram produzidos 1.000.000 de parafusos e a receita foi de R\$ 10.000,00, sendo o dólar cotado a R\$ 2,50.

Determine a receita em reais obtida ao se produzir 500.000 parafusos com o dólar cotado a R\$ 5,00.

Veja que a grandeza "receita obtida" é diretamente proporcional a grandeza "número de parafusos" e inversamente proporcional à grandeza "cotação do dólar".

$$\frac{(\text{receita obtida})}{(\text{número de parafusos}) \times \frac{1}{(\text{cotação do dólar})}} = k$$

Supondo que a receita em reais obtida ao se produzir 500.000 parafusos com o dólar a R\$ 5,00 foi x , então:

$$\frac{10.000}{1.000.000 \times \frac{1}{2,5}} = \frac{x}{500.000 \times \frac{1}{5}} = k$$

$$\frac{10.000 \times 2,5}{1.000.000} = \frac{x \times 5}{500.000} = k$$

Podemos simplificar a proporção $\frac{10.000 \times 2,5}{1.000.000} = \frac{x \times 5}{500.000}$ para depois realizar a "multiplicação cruzada". Simplificando os denominadores de lados diferentes da igualdade por 500.000, temos:

$$\frac{10.000 \times 2,5}{2} = \frac{x \times 5}{1}$$

Realizando a "multiplicação cruzada", temos:

$$2 \times (x \times 5) = 10.000 \times 2,5 \times 1$$

$$10x = 25.000$$

$$x = 2.500$$


Logo, a receita em reais obtida foi de R\$ 2.500,00.

Divisão em partes direta e inversamente proporcionais

Problemas de divisão em **partes direta e inversamente proporcionais** tratam da divisão de uma quantia em partes proporcionais a alguns números e inversamente proporcionais a outros números.

Para resolver esse tipo de problema, pode ser necessário utilizar as "propriedades fundamentais das proporções".

EXEMPLIFICANDO



Um pai quer dividir a quantia de R\$ 15.000 a seus três filhos Arnaldo, Bernaldo e Cernaldo de modo diretamente proporcional às notas obtidas em uma prova de matemática e de modo inversamente proporcional ao tempo semanal que eles jogam videogame.

Arnaldo obteve 10 em matemática e joga videogame durante 10h por semana.

Bernaldo obteve 8 em matemática e joga videogame durante 2h por semana.

Cernaldo obteve 5 em matemática e joga videogame durante 1h por semana.

Qual foi a quantia em reais que cada filho recebeu?

A quantia foi dividida em partes diretamente proporcionais à nota obtida em matemática e inversamente proporcionais ao tempo dispendido com videogame.

Se Arnaldo recebeu a quantia A, Bernaldo recebeu a quantia B e Cernaldo recebeu a quantia C, temos a seguinte proporção:

$$\frac{A}{10 \times \frac{1}{10}} = \frac{B}{8 \times \frac{1}{2}} = \frac{C}{5 \times \frac{1}{1}} = k$$

$$\frac{A}{1} = \frac{B}{4} = \frac{C}{5} = k$$

Temos que a soma das quantias recebidas é R\$ 15.000.

$$A + B + C = 15.000$$

Utilizando a "propriedade fundamental da soma" na proporção $\frac{A}{1} = \frac{B}{4} = \frac{C}{5}$, temos:

$$\frac{A}{1} = \frac{B}{4} = \frac{C}{5} = \frac{A+B+C}{1+4+5}$$

$$\frac{A}{1} = \frac{B}{4} = \frac{C}{5} = \frac{15.000}{10}$$

$$\frac{A}{1} = \frac{B}{4} = \frac{C}{5} = 1.500$$

Portanto, a nossa constante de proporcionalidade é 1.500.

$$\frac{A}{1} = 1.500 \rightarrow A = 1.500$$

$$\frac{B}{4} = 1.500 \rightarrow B = 6.000$$

$$\frac{C}{5} = 1.500 \rightarrow C = 7.500$$

Logo, Arnaldo, Bernaldo e Cernaldo receberam, respectivamente, R\$ 1.500, R\$ 6.000 e R\$ 7.500.

Regra de Três Simples

Regra de três é um procedimento prático! Sendo assim, nada melhor do que começar a analisá-la por meio de uma questão bem recente.

EXEMPLIFICANDO



(IMBEL/2024) Em um hospital, quatro médicos atendem, em média, 54 pacientes por dia. Considerando seis médicos, com a mesma capacidade operacional dos primeiros, sejam capazes de atender, por dia:

- A) 61
- B) 65
- C) 85
- D) 90
- E) 81

Comentários:

Inicialmente, devemos determinar se estamos trabalhando com grandezas inversamente ou diretamente proporcionais. Note que quanto maior o número de médicos, maior será a quantidade de pessoas atendidas por dia. Logo, estamos diante de grandezas **diretamente** proporcionais. Se M representa a quantidade de médicos e P é a quantidade de pessoas atendidas, então podemos escrever:

$$\frac{M}{P} = k$$

A questão afirma que 4 médicos atendem 54 pacientes por dia. Podemos substituir esses valores na relação acima e encontrar o valor de k .

$$k = \frac{4}{54} \quad \rightarrow \quad k = \frac{2}{27}$$

Vamos deixar na forma de fração mesmo! Não precisamos escrever o número "quebrado". A questão quer saber quantas pessoas podem ser atendidas por **seis médicos**. Dessa vez, conhecemos " k ", sabemos " M " e vamos determinar " P ".

$$\frac{M}{P} = k$$

$$P = \frac{6}{\left(\frac{2}{27}\right)}$$

$$P = 6 \cdot \frac{27}{2}$$

$$P = 81$$

Observe que **os seis médicos poderão atender 81 pessoas**! Logo, o gabarito é a alternativa E!

Pessoal, até aqui nada de novo. Respondemos a questão **sem falar de regra de três**, apenas aplicando os conceitos de proporcionalidade já vistos. Saiba que a regra de três vem apenas como um método facilitador, ajudando a responder esse tipo de questão **de uma maneira mais direta**.

Considere que temos uma quantidade de médicos M_1 que atendem P_1 pessoas. Assim:

$$\frac{M_1}{P_1} = k$$


Agora, considere que temos uma outra quantidade de médico M_2 e que essa quantidade atende P_2 pessoas.

$$\frac{M_2}{P_2} = k$$


Veja que podemos igualar as duas expressões acima, pois as duas valem o mesmo "k".

$$\frac{M_1}{P_1} = \frac{M_2}{P_2} \quad \rightarrow \quad P_1 M_2 = P_2 M_1$$

Por que mostrar para vocês nessa forma? Pois, na hora da prova, fazemos assim:



Multiplicando cruzado:



$$M_1$$

$$P_1$$

$$M_2$$

$$P_2$$

Ficamos com:

$$P_1 M_2 = P_2 M_1$$

Observe que é exatamente a mesma expressão que obtivemos anteriormente. Só que, dessa vez, nada falamos sobre "k". Apenas esquematizamos, fizemos uma multiplicação cruzada e pronto! Já estamos com a expressão que resolverá nosso problema. Do enunciado, retiramos que:

$$P_1 = 54$$

$$M_1 = 4$$

$$M_2 = 6$$

Substituindo:

$$54 \cdot 6 = P_2 \cdot 4 \quad \rightarrow \quad P_2 = \frac{54 \cdot 6}{4} \quad \rightarrow \quad P_2 = 81 \text{ pessoas}$$

Gabarito: LETRA E.

Concordam comigo que é bem mais rápido do que achar constante de proporcionalidade? Vocês devem ter percebido que devemos sempre nos perguntar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Isso acontece, pois, **o procedimento para quando elas forem inversamente proporcionais é um pouquinho diferente**. Vamos conferir.

EXEMPLIFICANDO



(CAU BR/2024) A respeito de regra de três, julgue o item subsequente.

Certo dia, foi verificado que um estoque de alimentos era suficiente para alimentar um grupo de 200 pessoas por 30 dias. Nesse mesmo dia, 50 novas pessoas foram acrescentadas a esse grupo inicial. Nessa situação, conclui-se que o referido estoque de alimentos será suficiente para alimentar esse novo grupo por menos de 20 dias.

Comentários:

A primeira coisa que devemos perceber é: quanto maior a quantidade de pessoas, menor será o tempo em que esse estoque poderá alimentar essas pessoas. Logo, estamos diante de grandezas **inversamente** proporcionais. Se P representa a quantidade de pessoas e T é o tempo que dura o estoque de alimentos, então podemos escrever:

$$P = \frac{k}{T}$$

A questão afirma que 200 pessoas podem ser alimentadas por 30 dias. Podemos substituir esses valores na relação acima e encontrar o valor de k.

$$k = PT \quad \rightarrow \quad k = 200 \cdot 30 \quad \rightarrow \quad k = 6000$$

Vamos guardar esse valor. A questão quer saber se o estoque durará menos de 20 dias para 250 pessoas. Para isso, vamos usar nossa relação novamente:

$$P = \frac{k}{T}$$

Dessa vez, conhecemos "k", sabemos "P" e vamos determinar "T".

$$250 = \frac{6000}{T}$$

$$T = \frac{600}{25}$$

$$T = 24$$

Observe que, de acordo com nossas contas, **o estoque durará 24 dias!** Observe que o estoque durará por mais de vinte dias, ao contrário do que afirma o item. Logo, o gabarito é item **ERRADO!**

Agora, vamos repetir aquele passo que fizemos anteriormente. Isolar "k" e igualar as expressões.

Considere que temos uma quantidade de pessoas P_1 que fará o estoque de alimentos durar um tempo T_1 .

$$P_1 = \frac{k}{T_1} \quad \rightarrow \quad k = P_1 T_1$$


Analogamente, considere que temos uma outra quantidade de pessoas P_2 e que essa quantidade faz o estoque durar um tempo T_2 .

$$P_2 = \frac{k}{T_2} \quad \rightarrow \quad k = P_2 T_2$$


Veja que podemos igualar as duas expressões acima, pois as duas valem o mesmo "k".

$$P_1 T_1 = P_2 T_2$$

Por que mostrar para vocês nessa forma? Pois, na hora da prova, fazemos assim:



Multiplicando direto:



Ficamos com:

$$P_1 T_1 = P_2 T_2$$

Tudo bem, galera? É apenas um jeito de chegar na expressão. Do enunciado, retiramos que:

$$P_1 = 200$$

$$T_1 = 30$$

$$P_2 = 250$$

Substituindo:

$$200 \cdot 30 = 250 \cdot T_2 \quad \rightarrow \quad T_2 = \frac{6000}{250} \quad \rightarrow \quad T_2 = 24 \text{ dias}$$

Gabarito: ERRADO.

Regra de Três Composta

Nas questões anteriores, vimos a regra de três simples, que relaciona duas grandezas. Por sua vez, na regra de três composta, relacionaremos três ou mais delas e uma grande parte dos problemas cobrados em prova são nesse nível de complexidade. Falo em "complexidade", mas não se preocupe, você ficará fera.

EXEMPLIFICANDO



(PC-PE/2024) Se, em uma delegacia, 6 servidores de plantão atendem 28 pessoas em 8 horas, então, para que 42 pessoas sejam atendidas em 6 horas durante um plantão nessa delegacia, a quantidade de servidores disponíveis deverá ser igual a

- A) 7.
- B) 8.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 14.

Comentários:

Vamos lá, o primeiro passo é identificar as grandezas envolvidas no problema. Temos:

- O número de servidores de plantão;
- A quantidade de pessoas atendidas;
- O tempo de atendimento.

Note que são **três grandezas**! Nessas situações, devemos lembrar que a regra de três composta é uma ótima saída! Mais uma vez, reafirmo que se trata apenas de um método facilitador! Fará com que você economize preciosos minutos durante a sua prova. Dito isso, vamos a resolução. O segundo passo é **esquematizar uma tabela** em que organizamos as grandezas e os valores repassados no enunciado.

Servidores	Pessoas	Tempo (h)
6	28	8
x	42	6

A nossa tabela reflete exatamente o enunciado: 6 servidores atendem 28 pessoas em 8 horas. "x" servidores atendem 42 pessoas em 6 horas. Pessoal, sempre coloquem a grandeza que você busca na primeira coluna. Além disso, ela será nossa grandeza de "referência", pois precisaremos saber quem é diretamente ou inversamente proporcional a ela. Vamos fazer isso agora!

- Note que quanto maior o número de servidores, maior será a quantidade de pessoas atendidas em um determinado tempo. Sendo assim, podemos concluir que são grandezas diretamente proporcionais.

- Agora, note que quanto maior o número de servidores, menor será o tempo para atender determinada quantidade de pessoas. Isso nos mostra que são grandezas inversamente proporcionais. Esses dois fatos nos permitem esquematizar mais um pouco a tabela:

Servidores	Pessoas	Tempo (h)
6	28	8
x	42	6

Pronto! Agora, podemos equacionar o problema.

$$\frac{6}{x} = \frac{28}{42} \cdot \frac{6}{8}$$

Observe que, como o tempo é inversamente proporcional à quantidade de servidores, nós também invertemos os valores associados a ele na hora de equacionarmos o problema. Agora é só resolver.

$$\frac{6}{x} = \frac{168}{336} \quad \rightarrow \quad \frac{6}{x} = \frac{1}{2} \quad \rightarrow \quad x = 12$$

Gabarito: LETRA D.

Esse é o método, moçada! Lembre-se sempre que é possível resolver pela aplicação direta dos conceitos de proporcionalidade. Alguns acham mais fácil por essa via, outros acham mais fácil usar a regra de três composta (é uma receitinha de bolo). Cada um usa o que achar mais conveniente e se sentir mais seguro. Resolvam muitas questões, só assim para isso entrar na "massa do sangue".

Porcentagem

O termo "porcento" é derivado do latim *per centum*, que significa "por cem" ou "às centenas". Porcentagem, então, representa uma razão em que o denominador é igual a cem (100).

TOME NOTA!



Porcentagem representa **uma razão** em que o denominador é igual a 100

Então, $k\%$ será igual a:

$$k\% = \frac{k}{100}$$

Vejamos alguns exemplos:

Exemplo 1:

$$15\% = \frac{15}{100} = 0,15$$

Exemplo 2:

$$36,3\% = \frac{36,3}{100} = 0,363$$

Exemplo 3:

$$100\% = \frac{100}{100} = 1$$

Veja que **nada impede que uma porcentagem tenha um resultado numérico maior que 1**.

Observe, nos exemplos acima, que podemos representar a Porcentagem em 3 tipologias diferentes. Veremos abaixo cada uma delas.

Formas de Representação

Iremos tomar como base o primeiro exemplo (15%) e analisar as formas em que podemos representá-lo.

Forma Percentual

É apresentada com o símbolo representativo da operação (%).

$$15\%$$

Forma Fracionária

Nesta forma, iremos apresentar a porcentagem através de uma fração com denominador 100.

$$\frac{15}{100}$$

Forma Unitária

Representada por números decimais.

$$0,15$$

Perceba que a forma unitária, nada mais é, que o resultado matemático da divisão da forma fracionária. 15 divididos por 100, na forma unitária, é igual a 0,15.

Então, para passar da forma fracionária para a forma unitária, dividimos por 100, ou, em uma linguagem decimal, "andamos" duas casas para a esquerda.

Cálculo da Porcentagem de um número

Para calcular a Porcentagem de um valor, multiplicamos a razão centesimal correspondente à Porcentagem por este valor. Vejamos alguns exemplos:

Exemplo 1: 15% de 600.

$$\frac{15}{100} \times 600 = \frac{9.000}{100} = 90$$

Uma palavra muito importante que deve ser observada quando se resolve problemas envolvendo Porcentagem é a preposição "**de**". Isso porque, via de regra, esse termo nos indica uma **multiplicação**.

FIQUE ATENTO!



"de" → multiplicação

Então, 15% de 600, como vimos acima, é igual a fração $\frac{15}{100}$ vezes 600.

Poderíamos resolver também, multiplicando diretamente a Porcentagem na forma unitária vezes o número.

$$0,15 \times 600 = 90$$

TOME NOTA!



Esta forma de resolução é mais utilizada na Matemática Financeira, pois nesta, a Taxa de Juros é inserida nas fórmulas na forma unitária. Todavia, em nada muda o resultado, uma vez que, como vimos, a forma unitária nada mais é que o resultado matemático da divisão da forma fracionária. 15 divididos por 100, na forma unitária, é igual a 0,15.

Exemplo 2: 18,5% de 300

$$\frac{18,5}{100} \times 300 = 55,5$$

Observe que simplificamos a fração e aceleramos os cálculos, assim como você fará na sua prova. Antes de iniciarmos as questões, esclareceremos um ponto.

ESCLARECENDO!



Difícilmente, uma questão será direta perguntando o valor de uma porcentagem. A maioria das questões vai trazer o conceito de porcentagem dentro da solução dos problemas.

Vamos, nas questões abaixo, resolver algumas questões que trazem, não só o uso da porcentagem, mas também, uma ideia por trás da resolução. As questões irão aumentar de nível uma a uma e vamos comentar o passo a passo de cada para que você possa entender perfeitamente a mecânica de resolução.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Novo Hamburgo - 2020 - Adaptada) É correto afirmar que:

- a) 0,89% de 400 é igual a 356.
- b) 1.700% de 18 é igual a 30.600.
- c) 0,018 é igual a 12% de 0,15.
- d) 95 é igual a 17% de 500.

Comentários:

Vamos resolver item a item. Questão bem interessante para gente treinar bem o conceito de porcentagem.

a) 0,89% de 400 é igual a 356.

Observe que, apesar de estar com vírgulas (casas decimais), o valor nos é fornecido na forma percentual.

Então, o valor da letra a será igual a:

$$a = 0,89\% \times 400$$

$$a = \frac{0,89}{100} \times 400$$

$$a = 0,89 \times 4 \rightarrow a = 3,56$$

Nesse ponto que deve residir nossa atenção. Vejamos o resultado que ocorreria caso inseríssemos na fórmula a representação percentual.

$$a = 0,89 \times 400 \rightarrow a = 356$$

E assim, marcaríamos a letra a como gabarito, pois o resultado teria batido. Mas isto está **ERRADO**.

Friso, mais uma vez que, quando trabalhamos com porcentagem e/ou taxa, inserimos estes valores na forma fracionária (ou na forma unitária).

ITEM ERRADO

b) 1.700% de 18 é igual a 30.600.

$$b = 1.700\% \times 18$$

$$b = 17 \times 18 \rightarrow b = 306$$

Observe que esta passagem (da linha 1 para a linha 2) é feita automaticamente pela sua cabeça. Na hora da prova, você não vai nem escrever a primeira linha. Sua cabeça vai pensar no modo automático que 1.700% é igual a 17 e vai inserir diretamente este valor na fórmula. Foi muito rápido? Vejamos o passo a passo.

$$b = 1.700\% \times 18$$

$$b = \frac{1.700}{100} \times 18$$

$$b = 17 \times 18 \rightarrow b = 306$$

ITEM ERRADO

c) 0,018 é igual a 12% de 0,15.

$$\begin{aligned}c &= 12\% \times 0,15 \\c &= \frac{12}{100} \times \frac{15}{100} \\c &= \frac{180}{10.000} \rightarrow c = 0,018\end{aligned}$$

ITEM CERTO

d) 95 é igual a 17% de 500.

$$d = \frac{17}{100} \times 500 \rightarrow d = 85$$

ITEM ERRADO

Gabarito: Alternativa C

Transformação de uma Fração Ordinária em Taxa Percentual

Para transformar uma fração em uma Taxa Percentual, multiplicamos esta fração por 100 e assim, encontramos o resultado na forma percentual.

Exemplo 1: $\frac{4}{5}$ em termos percentuais será igual a:

$$\frac{4}{5}$$

Multiplicando a fração por 100.

$$\frac{4}{5} \times 100 = \frac{400}{5} = 80$$

Ou seja,

$$\frac{4}{5} = 80\%$$

Poderíamos também, chegar nesta mesma resposta, efetuando a divisão da fração e obtendo o resultado na forma decimal.

$$\frac{4}{5} = 0,8 = 80\%$$

Porém, acredito que é mais simples multiplicar a fração por 100.

FIQUE ATENTO!



Observe que, quando multiplicamos a fração por 100, o resultado será diretamente na forma percentual.

Exemplo 2: $\frac{7}{8}$ em termos percentuais será igual a:

$$\frac{7}{8} \times 100 = \frac{700}{8} = 87,5 \text{ ou seja: } \frac{7}{8} = 87,5\%$$

Exemplo 3: $\frac{15}{12}$ em termos percentuais será igual a:

$$\frac{15}{12} \times 100 = \frac{1.500}{12} = 125 \text{ ou seja: } \frac{15}{12} = 125\%$$

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Cerquilho SP - 2019) Eliana fez uma avaliação física na academia, na qual foi apontado que seu peso atual é de 64 quilogramas. Sabendo-se que 16 quilogramas desse peso é gordura, a porcentagem de gordura de Eliana é de

- a) 20%
- b) 24%
- c) 25%
- d) 28%
- e) 30%

Comentários:

A porcentagem será igual ao valor do peso em gordura dividido pelo total do peso.

$$\frac{16}{64}$$

Antes de multiplicarmos por 100, podemos simplificar a fração. 64 é múltiplo de 16. Simplificando a fração (dividindo o numerador e o denominador por 16) teremos:

$$\frac{16}{64} = \frac{1}{4}$$

Multiplicando por 100 e calculando a porcentagem:

$$\frac{1}{4} \times 100 = \frac{100}{4} = 25$$

Ou seja,

$$\frac{16}{64} = 25\%$$

Gabarito: Alternativa C

QUESTÕES COMENTADAS - FGV

Operações Básicas

1. (FGV/ALEP-PR/2024) O número real $\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ é igual a:

- A) $\sqrt{3} - \sqrt{2}$
- B) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$
- C) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})/5$
- D) $1/\sqrt{5}$
- E) $1/\sqrt{6}$

Comentários:

Precisamos racionalizar o denominador! Para isso, devemos multiplicar a fração por uma expressão equivalente a 1 que tenha o conjugado do denominador. O conjugado de uma soma ou diferença de raízes é obtido **trocando-se o sinal entre elas**. Assim, temos:

$$\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} \cdot \frac{(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})} = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3^2-2^2}} = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3-2} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$$

Portanto, a alternativa correta é a letra A.

Gabarito: LETRA A.

2. (FGV/ALEP-PR/2024) O número real $\sqrt{2} + \sqrt{8}$ é igual a:

- A) 4
- B) 8
- C) $3\sqrt{2}$
- D) $4\sqrt{8}$
- E) $\sqrt{10}$

Comentários:

Para resolver essa questão, podemos usar a seguinte **propriedade**:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

Assim, podemos simplificar a expressão $\sqrt{2} + \sqrt{8}$ da seguinte forma:

$$\sqrt{2} + \sqrt{8} = \sqrt{2} + \sqrt{4 \cdot 2} = \sqrt{2} + \sqrt{4} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$

Portanto, a alternativa correta é a letra C.

Gabarito: LETRA C.

3. (FGV/PREF. SP/2023) Sendo N um número real maior do que 1, o valor de $\sqrt[3]{N\sqrt[3]{N^2\sqrt[3]{N}}}$ é igual a:

- A) $N^{\frac{1}{27}}$
- B) $N^{\frac{4}{27}}$
- C) $N^{\frac{8}{27}}$
- D) $N^{\frac{16}{27}}$
- E) $N^{\frac{1}{3}}$

Comentários:

Nessa questão, utilizaremos **três importantes** propriedades da potenciação/radiciação.

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Agora, vamos escrever a expressão do enunciado usando apenas expoentes.

$$\sqrt[3]{N\sqrt[3]{N^2\sqrt[3]{N}}} = \left(N \left(N^2 \cdot N^{\frac{1}{3}} \right)^{\frac{1}{3}} \right)^{\frac{1}{3}}$$

Com isso, vamos começar a resolver do parênteses mais interno para o mais externo.

$$\left(N \left(N^2 \cdot N^{\frac{1}{3}} \right)^{\frac{1}{3}} \right)^{\frac{1}{3}} \rightarrow \left(N \left(N^{2+\frac{1}{3}} \right)^{\frac{1}{3}} \right)^{\frac{1}{3}} \rightarrow \left(N \left(N^{\frac{7}{3}} \right)^{\frac{1}{3}} \right)^{\frac{1}{3}} \rightarrow \left(N \cdot N^{\frac{7}{9}} \right)^{\frac{1}{3}} \rightarrow \left(N^{1+\frac{7}{9}} \right)^{\frac{1}{3}} \rightarrow \left(N^{\frac{16}{9}} \right)^{\frac{1}{3}} \rightarrow N^{\frac{16}{27}}$$

Gabarito: LETRA D.

4. (FGV/AGENERSA/2023) Considere o conjunto $A = \{2, 3, 5, 6\}$ e a operação $\&$ entre números inteiros quaisquer a e b definida por $a\&b = 2a + b$. Seja agora o conjunto B definido como sendo o conjunto dos elementos y tais que $y = x\&4$, para cada x pertencente ao conjunto A . A soma dos elementos de B é

- A) 54.
- B) 48.

- C) 44.
- D) 40.
- E) 36.

Comentários:

O enunciado define uma nova operação "&" tal que:

$$a \& b = 2a + b$$

Depois, ele fala que "B" é o conjunto dos elementos y tal que:

$$y = x \& 4$$

Em que "x" são os elementos de $A = \{2, 3, 5, 6\}$. Dessa forma, precisaremos usar essa nova operação para cada um dos elementos de A.

i) Para $x = 2$:

$$y = 2 \& 4$$

$$y = 2 \cdot 2 + 4$$

$$y = 8$$

ii) Para $x = 3$:

$$y = 3 \& 4$$

$$y = 2 \cdot 3 + 4$$

$$y = 10$$

iii) Para $x = 5$:

$$y = 5 \& 4$$

$$y = 2 \cdot 5 + 4$$

$$y = 14$$

iv) Para $x = 6$:

$$y = 6 \& 4$$

$$y = 2 \cdot 6 + 4$$

$$y = 16$$

Pronto! Temos todos os elementos de B.

$$B = \{8, 10, 14, 16\}$$

Queremos a soma (S) desses elementos.

$$S = 8 + 10 + 14 + 16$$

$$S = 48$$

Gabarito: LETRA B.

5. (FGV/SEAD-AP/2022) Suponha que $a \# b$ signifique $2a + 3b$. Se $3 \# (4 \# x) = 48$, então o valor de x é

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.
- e) 4.

Comentários:

Esse tipo de questão anda recorrente nas provas da FGV! O enunciado informa que:

$$a \# b = 2a + 3b$$

O “#” é apenas um símbolo que o examinador escolheu para representar a operação que ele criou! Ele poderia ter colocado um coração, uma casa, uma árvore. Eu já vi vários alunos se confundirem nesse tipo de questão por achar que o “#” significa alguma coisa que ele não sabe. É apenas um símbolo. Se você tem que resolver $a \# b$, então você deve fazer a operação $2a + 3b$ para obter o resultado.

Dito isso, vamos resolver o problema! A questão informa também que:

$$3 \# (4 \# x) = 48$$

Nesse momento, devemos avaliar a expressão por partes.

Observe que $4\#x$ é equivalente a:

$$4\#x = 2 \cdot 4 + 3 \cdot x = 8 + 3x$$

Ou seja:

$$3\#(4\#x) = 3\#(8 + 3x)$$

Assim:

$$3\#(4\#x) = 3\#(8 + 3x) = 2 \cdot 3 + 3 \cdot (8 + 3x) = 6 + 24 + 9x = 30 + 9x$$

Sabemos que a expressão vale 48. Portanto:

$$30 + 9x = 48 \rightarrow 9x = 18 \rightarrow x = 2$$

Gabarito: Letra C.

QUESTÕES COMENTADAS - FGV

MMC e MDC

1. (FGV/PMSP/2024) Um número N é tal que dividido por 6 deixa resto 2 e dividido por 8 também deixa resto 2. A soma dos algarismos do menor número N que satisfaz essas condições é

- a) 8.
- b) 7.
- c) 6.
- d) 5.
- e) 4.

Comentários:

Segundo o enunciado, ao dividir N por 6 ou por 8, sempre temos **resto 2**. Isso significa que, ao dividir $(N-2)$ por 6 ou por 8, sempre temos **resto zero**. Em outras palavras, $(N-2)$ é múltiplo comum a 6 e 8.

Observe que o problema pergunta pelo menor valor de N . Logo, $(N-2)$ deve ter o menor valor possível. Portanto, $(N-2)$ é o mínimo múltiplo comum a 6 e 8.

Realizando a **decomposição simultânea para o MMC**, temos:

$$\begin{array}{r|l} 6, 8 & 2 \\ 3, 4 & 2 \\ 3, 2 & 2 \\ 3, 1 & 3 \\ 1, 1 & \end{array}$$

Logo, $MMC(6; 8) = 2^3 \times 3^1 = 24$. Portanto:

$$N - 2 = 24$$

$$N = 26$$

A soma dos algarismos do menor número N que satisfaz as condições do problema é:

$$\begin{aligned} 2 + 6 \\ = 8 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra A

2. (FGV/CMSP/2024) Utilizando apenas pesos de 200g e de 350g, o número mínimo de pesos que devem ser reunidos para que se obtenha exatamente 4kg é

- a) 12
- b) 14
- c) 16
- d) 18
- e) 20

Comentários:

Fazendo uso apenas de pesos de 200g e de 350g devemos obter exatamente 4.000g (4kg) com a menor quantidade de pesos. Note que, se quantidade de gramas a ser obtida fosse múltipla de 200g e de 350g ao mesmo tempo, utilizaríamos somente pesos de 350g de modo a minimizar o número de pesos utilizados. Nesse momento, vamos obter o Menor Múltiplo Comum (MMC) entre 200g e 350g:

$$\begin{array}{r|l} 200 & 350 & 2 \\ 100 & 175 & 2 \\ 50 & 175 & 2 \\ 25 & 175 & 5 \\ 5 & 35 & 5 \\ 1 & 7 & 7 \\ 1 & 1 & \end{array}$$

Logo, $MMC(200, 350) = 2^3 \times 5^2 \times 7^1 = 1.400$.

Note, portanto, que para quantidades múltiplas de 1400g:

- Poderíamos utilizar somente pesos de 200g, utilizando $\frac{1400}{200} = 7$ pesos a cada 1400g; e
- Poderíamos usar somente pesos de 350g, utilizando $\frac{1400}{350} = 4$ pesos a cada 1400g.

Como a ideia é minimizar o número de pesos utilizados, vamos utilizar, a cada 1400g, 4 pesos de 350g.

Note que o maior múltiplo de 1.400g menor do que 4.000g é $2 \times 1.400 = 2.800g$. Logo, para obter 2.800g, vamos utilizar $2 \times 4 = 8$ pesos de 350g.

Observe que ainda faltam $4.000g - 2.800 = 1.200g$ para obtermos os 4kg. Esses 1.200g só podem ser obtidos com exatidão por meio de 6 pesos de 200g.

Logo, o número mínimo de pesos que devem ser reunidos para que se obtenha exatamente 4kg é:

$$8 \text{ pesos de } 350g + 6 \text{ pesos de } 200g = \underline{14 \text{ pesos}}$$

Gabarito: Letra B.

3. (FGV/TRT-PB/2022) Laura coleciona figurinhas. Ontem ela arrumou suas figurinhas em montinhos de 6 figurinhas cada e não faltou nem sobrou figurinha alguma. Hoje ela fez uma nova arrumação com as mesmas figurinhas, dessa vez em montinhos de 10 figurinhas cada um e também não faltou nem sobrou figurinha alguma. O número mínimo de figurinhas que Laura pode ter é M. A soma dos algarismos de M é

- a) 2.
- b) 3.
- c) 4.
- d) 5.
- e) 6.

Comentários:

Segundo o enunciado, ao arrumar as figurinhas em montinhos de 6 ou de 10 figurinhas, não resta nenhuma figurinha. Isso significa que o total de figurinhas é divisível por 6 e por 10. Em outras palavras, o total de figurinhas é múltiplo de 6 e de 10.

Para resolver o problema, devemos determinar o número mínimo de figurinhas M que Laura pode ter. Logo, M é o Mínimo Múltiplo Comum (MMC) entre 6 e 10.

Realizando a **decomposição simultânea para o MMC**, temos:

$$\begin{array}{cc|c} 6, & 10 & 2 \\ 3, & 5 & 3 \\ 1, & 5 & 5 \\ 1, & 1 & \end{array}$$

Logo, $M = MMC(6; 10) = 2^1 \times 3^1 \times 5^1 = 30$.

Portanto, como $M = 30$, a **soma dos algarismos de M** é $3 + 0 = 3$.

Gabarito: Letra B.


4. (FGV/CBM-RJ/2022) Max e Rubens estão andando de bicicleta em uma pista circular. Eles andam em sentidos opostos. Max dá uma volta na pista a cada 6 minutos e Rubens dá uma volta na pista a cada 10 minutos. Em um determinado momento eles se cruzam em um ponto P da pista.

Eles voltarão a se cruzar pela primeira vez nesse mesmo ponto P após

- a) 6 minutos.
- b) 10 minutos.
- c) 24 minutos.
- d) 30 minutos.
- e) 60 minutos.

Comentários:

Considere que Max e Rubens se encontraram no seguinte ponto P da pista circular:



Como Max dá uma volta na pista a cada 6 minutos, temos que, a partir do primeiro encontro em P, **Max estará no ponto P a cada 6 minutos**.

Em outras palavras, **Max estará no ponto P sempre que o tempo transcorrido, a partir do primeiro encontro em P, for múltiplo de 6 minutos**.

Além disso, como Rubens dá uma volta na pista a cada 10 minutos, temos que, a partir do primeiro encontro em P, **Rubens estará no ponto P a cada 10 minutos**.

Em outras palavras, **Rubens estará no ponto P sempre que o tempo transcorrido, a partir do primeiro encontro em P, for múltiplo de 10 minutos**.

Note que, sempre que o tempo transcorrido for múltiplo, ao mesmo tempo, de 6min e 10min, Max e Rubens se encontrarão no ponto P.

Como queremos o momento em que eles voltarão a se cruzar pela primeira vez nesse mesmo ponto P, devemos obter o Mínimo Múltiplo Comum (MMC) a 6min e 10min.

Realizando a decomposição simultânea para o MMC, temos:

$$\begin{array}{cc|c} 6, & 10 & 2 \\ 3, & 5 & 3 \\ 1, & 5 & 5 \\ 1, & 1 & \end{array}$$

Logo, $MMC(6; 10) = 2^1 \times 3^1 \times 5^1 = 30$.

Portanto, Max e Rubens voltarão a se cruzar pela primeira vez no ponto P após **30 minutos**.

Gabarito: Letra D.

5. (FGV/PM SP/2022) Seja M o menor número inteiro, maior do que 2, que, dividido por 3, por 5, ou por 7, deixa sempre resto 2. A soma dos algarismos de M é

- a) 8.
- b) 9.
- c) 10.
- d) 12.
- e) 15.

Comentários:

Como M deixa resto 2 quando dividido por 3, por 5, ou por 7, o número $(M-2)$ deixa resto zero quando dividido por 3, por 5, ou por 7.

Isso significa que $(M-2)$ é divisível por 3, por 5 e por 7. Em outras palavras, $(M-2)$ é múltiplo de 3, de 5 e de 7. Como estamos procurando o menor número para M , $M-2$ é o Mínimo Múltiplo Comum (MMC) a 3, 5 e 7. Como 3, 5 e 7 são primos, o MMC entre esses números é $3 \times 5 \times 7 = 105$. Portanto:

$$M - 2 = 105$$

$$M = 107$$

A soma dos algarismos de M é:

$$\begin{aligned} 1 + 0 + 7 \\ = 8 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra A.

QUESTÕES COMENTADAS – FGV

Razão e Proporção

1. (FGV/PMSP/2024) Em um encontro de 57 Policiais Militares, há apenas sargentos, cabos e soldados. Para cada cabo, há 5 soldados, e para cada sargento, há 3 cabos. **O número de soldados nesse encontro é igual a**

- a) 50.
- b) 48.
- c) 45.
- d) 42.
- e) 40.

Comentários:

Considere que no encontro temos S_d soldados, S_a sargentos e C cabos.

Temos 57 Policiais Militares no encontro. Logo:

$$S_d + S_a + C = 57$$

Para obter o número de soldados, vamos escrever S_a e C em termos de S_d e substituir as expressões encontradas nessa primeira equação.

Para cada cabo, há 5 soldados. Logo:

$$\frac{C}{S_d} = \frac{1}{5} \rightarrow C = \frac{S_d}{5}$$

Para cada sargento, há 3 cabos. Logo:

$$\frac{S_a}{C} = \frac{1}{3} \rightarrow S_a = \frac{1}{3} \times C$$

Para escrever S_a em termos de S_d , podemos substituir C por $\frac{S_d}{5}$ no resultado anterior. Ficamos com:

$$S_a = \frac{1}{3} \times \frac{S_d}{5}$$

$$S_a = \frac{S_d}{15}$$

Substituindo os valores de S_a e de C na primeira equação obtida, temos:

$$S_d + S_a + C = 57$$

$$S_d + \frac{S_d}{15} + \frac{S_d}{5} = 57$$

$$\frac{15S_d + S_d + 3S_d}{15} = 57$$

$$\frac{19S_d}{15} = 57$$

$$S_d = \frac{57 \times 15}{19}$$

$$S_d = \frac{3 \times 15}{1}$$

$$S_d = 45$$

Gabarito: Letra C.

2. (FGV/ALEP PR/2024) As grandes distancias entre objetos astronômicos (estrelas, planetas, etc.) são, em geral, expressas por meio da distância que a luz percorre em determinada unidade de tempo no vácuo. Por exemplo, um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, um minuto-luz é a distância que a luz percorre em um minuto no vácuo.

Assim expressamos a distância média entre a Terra e Sol, que é de, aproximadamente, 8,3 minutos-luz. Já a distância média entre a Terra e Lua é de, aproximadamente, 1,3 segundos-luz.

Considerando esses valores, assinale a o número que melhor aproxima a razão entre as distâncias entre a Terra e o Sol e entre a Terra e a Lua.

- a) 6,38
- b) 70,00
- c) 100,79
- d) 283,70
- e) 383,07

Comentários:

Observe que **minuto-luz** e **segundo-luz** são unidades de distância:

- Um **minuto-luz** é a distância que a luz percorre em um minuto no vácuo.
- Um **segundo-luz** é a distância que a luz percorre em um segundo no vácuo.

Para realizar a razão entre as distâncias, é necessário que ambas as distâncias estejam expressas em uma mesma unidade. Nesse momento, **vamos obter a distância entre a Terra e Sol em segundos-luz.**

Segundo o problema, **a distância entre a Terra e Sol é de 8,3 minutos-luz**, ou seja, é a distância que a luz percorre em 8,3 minutos.

Como 1 min = 60 segundos, **a distância entre a Terra e o Sol é a distância que a luz percorre em $8,3 \times 60 = 498$ segundos.** Em outras palavras, **a distância entre a Terra e Sol é de 498 segundos-luz.**

Segundo o enunciado, **a distância entre a Terra e a Lua é de 1,3 segundos-luz.** Logo, a razão entre as distâncias é:

$$\frac{\text{Distância entre a Terra e o Sol}}{\text{Distância entre a Terra e a Lua}} = \frac{498 \text{ segundos-luz}}{1,3 \text{ segundos-luz}} \cong 383,07$$

Gabarito: Letra E.

3. (FGV/TRT-PB/2022) Sobre 4 grandezas X, Y, Z e W sabe-se que:

A razão de W para X é 4:3

A razão de Y para Z é 3:2

A razão de Z para X é 1:6

A razão de X+Y para Z+W é

- a) 5:6
- b) 4:7
- c) 3:5
- d) 6:11
- e) 8:11

Comentários:

O enunciado pergunta pela seguinte razão:

$$\frac{X+Y}{Z+W}$$

Para obter o valor numérico dessa razão, **vamos escrever as incógnitas Y, Z e W em termos de X**. Após realizar a substituição de Y, Z e W na razão anterior, perceba que a incógnita X do numerador será simplificada com a incógnita X do denominador.

Segundo o enunciado:

- A razão de W para X é 4:3 $\rightarrow \frac{W}{X} = \frac{4}{3} \rightarrow W = \frac{4}{3}X$
- A razão de Y para Z é 3:2 $\rightarrow \frac{Y}{Z} = \frac{3}{2} \rightarrow Y = \frac{3}{2}Z$
- A razão de Z para X é 1:6 $\rightarrow \frac{Z}{X} = \frac{1}{6} \rightarrow Z = \frac{1}{6}X$

Note que, como $Y = \frac{3}{2}Z$ e $Z = \frac{1}{6}X$, temos:

$$Y = \frac{3}{2}Z$$

$$Y = \frac{3}{2} \times \left(\frac{1}{6}X\right)$$

$$Y = \frac{1}{4}X$$

Agora que temos Y, Z e W em termos de X, vamos substituir os valores na razão procurada:

$$\frac{X+Y}{Z+W} = \frac{X+\frac{1}{4}X}{\frac{1}{6}X+\frac{4}{3}X} = \frac{\frac{4X+1X}{4}}{\frac{1X+8X}{6}} = \frac{\frac{5X}{4}}{\frac{9X}{6}} = \frac{\frac{5X}{4}}{\frac{3X}{2}}$$

Para a divisão de frações, podemos utilizar o recurso "inverte e multiplica":

$$= \frac{5X}{4} \times \frac{2}{3X}$$

Simplificando a incógnita X , temos:

$$\begin{aligned} &= \frac{5}{4} \times \frac{2}{3} \\ &= \frac{5}{2} \times \frac{1}{3} \\ &= \frac{5}{6} \end{aligned}$$

Logo, a razão de $X+Y$ para $Z+W$ é 5:6.

Gabarito: Letra A.

4. (FGV/TRT-PB/2022) Em uma reunião de condomínio, há jovens com até 21 anos, adultos com mais de 21 e menos de 60 anos, e idosos com 60 anos ou mais. Para cada 2 jovens há 5 adultos e para cada 7 adultos há 3 idosos. A razão entre o número de jovens e o número total de pessoas presentes a essa reunião é

- a) 2/15.
- b) 7/15.
- c) 3/14.
- d) 2/17.
- e) 7/32.

Comentários:

Considere que temos J jovens, A adultos e I idosos. A questão pergunta pela razão entre o número de jovens e o total de pessoas:

$$\frac{J}{J+A+I}$$

Para resolver o problema, vamos escrever A e I em termos de J .

Após realizar a substituição de A e I na razão anterior, perceba que a incógnita J do numerador será simplificada com a incógnita J do denominador.

Segundo o enunciado, para cada 2 jovens há 5 adultos. Logo:

$$\frac{J}{A} = \frac{2}{5}$$

$$5J = 2A$$

$$A = \frac{5}{2}J$$

Além disso, para cada 7 adultos há 3 idosos. Logo:

$$\frac{A}{I} = \frac{7}{3}$$

$$3A = 7I$$

$$I = \frac{3}{7}A$$

Note que I ainda não está escrito em termos de J . Porém, usando o fato de que $A = \frac{5}{2}J$, temos:

$$I = \frac{3}{7}A$$

$$I = \frac{3}{7} \times \left(\frac{5}{2}J\right)$$

$$I = \frac{15}{14}J$$

Agora que temos A e I em termos de J , podemos calcular a razão solicitada:

$$\frac{J}{J+A+I} = \frac{J}{J+\frac{5}{2}J+\frac{15}{14}J} = \frac{J}{\frac{14J+35J+15J}{14}} = \frac{J}{\frac{64J}{14}} = J \times \frac{14}{64J} = \frac{14}{64}$$

Simplificando o numerador e o denominador por 2, temos:

$$\frac{7}{32}$$

Gabarito: Letra E.

5. (FGV/TRT MA/2022) Michael coleciona moedas brasileiras, americanas e francesas. Para cada 3 moedas americanas Michael tem 7 moedas brasileiras e para cada 5 moedas brasileiras, ele tem 2 francesas. Com relação às moedas de Michael, a razão entre a quantidade de moedas brasileiras e a quantidade de moedas não brasileiras é igual a

- a) 7/5.
- b) 12/7.
- c) 25/19.
- d) 30/23.
- e) 35/29.

Comentários:

Considere que Michael apresenta B moedas brasileiras, A moedas americanas e F moedas francesas.

Devemos obter a razão entre a quantidade de moedas brasileiras e a quantidade de moedas não brasileiras, isto é, devemos obter:

$$\frac{B}{A+F}$$

Para obter essa razão, vamos escrever A e F em função da quantidade B .

Note que para cada 3 moedas americanas, Michael tem 7 moedas brasileiras. Logo:

$$\frac{A}{B} = \frac{3}{7}$$
$$A = \frac{3}{7}B$$

Além disso, para cada 5 moedas brasileiras, Michel tem 2 francesas. Logo:

$$\frac{B}{F} = \frac{5}{2}$$
$$F = \frac{2}{5}B$$

Portanto, a razão procurada é:

$$\frac{B}{A+F} = \frac{B}{\frac{3}{7}B + \frac{2}{5}B} = \frac{B}{\frac{15B+14B}{35}} = \frac{B}{\frac{29B}{35}} = B \times \frac{35}{29B} = \frac{35}{29}$$

Gabarito: Letra E.

QUESTÕES COMENTADAS - FGV

Regra de Três

1. (FGV/PM-SP/2024) Uma máquina leva 2 minutos e 15 segundos (2min15s) para imprimir e encadernar certo livro. Para imprimir e encadernar 24 exemplares desse livro, trabalhando continuamente, a máquina levará

- A) 50min.
- B) 51min45s.
- C) 52min30s.
- D) 53min15s.
- E) 54min.

Comentários:

Para resolver essa questão, podemos usar uma regra de três simples: se para imprimir 1 livro a máquina leva 2 min15s, então para imprimir 24 livros a máquina levará "x". No entanto, antes de qualquer coisa, é indicado que o tempo esteja em apenas uma única unidade. Sendo assim, temos que **2 minutos e 15 segundos equivalem a 135 segundos** (1 minuto = 60 segundos). Feito isso, podemos esquematizar:

1 livro	135
segundos	
24 livros	x
segundos	

Ora, quanto mais livros, mais a máquina demorará. Sendo assim, **são grandezas diretamente proporcionais** e podemos fazer aquela **multiplicação cruzada**.

$$x = 24 \cdot 135$$

$$x = 3240$$

A impressão dos 24 livros levará 3240 segundos. Como 1 minuto = 60 segundos, podemos concluir que:

$$3240 \text{ segundos} = 54 \text{ minutos}$$

Gabarito: LETRA E.

2. (FGV/PM-SP/2024) Três profissionais executam um determinado trabalho em 12 horas. Dois profissionais, com a mesma eficiência, executarão o mesmo trabalho em

- A) 8 horas.
- B) 9 horas.
- C) 15 horas.
- D) 16 horas.
- E) 18 horas.

Comentários:

Mais uma questão que envolve regra de três simples. Se três profissionais executam um trabalho em 12 horas, então 2 profissionais executarão em "x". Vamos esquematizar.

3 prof.	12 horas
2 prof.	x horas

Ora, quanto mais profissionais executando o trabalho, menos tempo levará para concluí-lo. Sendo assim, **são grandezas inversamente proporcionais** e, dessa vez, a multiplicação será direta.

$$2x = 3 \cdot 12$$

$$x = \frac{36}{2}$$

$$x = 18 h$$

Gabarito: LETRA E.

3. (FGV/CGM-RJ/2023) O custo com bebidas de um evento com 120 pessoas foi de R\$ 3.600,00. O custo com bebidas de um evento similar, mas com 90 pessoas, é de:

- A) R\$ 2.400,00;
- B) R\$ 2.500,00;
- C) R\$ 2.600,00;
- D) R\$ 2.700,00;
- E) R\$ 2.800,00.

Comentários:

Questão com enunciado bem direto! Para resolvê-la, podemos usar uma regra de três simples. Assim, devemos dizer se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais. Observe que quanto maior o número de pessoas, maior será o custo com bebidas. Logo, são **grandezas diretamente proporcionais** e podemos fazer aquela multiplicação cruzada. Vamos esquematizar.



Multiplicando cruzado.

$$120x = 3600 \cdot 90$$

$$x = 30 \cdot 90$$

$$x = 2700$$

Gabarito: LETRA D.

4. (FGV/CBM-AM/2022) Um avião de passageiros está voando a 11900 m de altitude quando inicia o procedimento de descida. A descida é feita a uma razão constante de 600 metros por minuto até a altitude de 2000 m quando estabiliza sua altitude. A duração dessa descida foi de:

- A) 15min 3s.
- B) 15min 45s.
- C) 16min 5s.
- D) 16min 30s.
- E) 16min 50s.


Comentários:

O primeiro passo aqui é determinar o "tamanho" dessa descida. Se o avião está voando a 11900 metros de altitude e ele desce até alcançar 2000 metros, então ele deve descer:

$$d = 11900 - 2000 \rightarrow d = 9900 \text{ m}$$

Ou seja, concluímos que o avião deve fazer uma descida de 9900 metros. Preste atenção que o avião não desce até o solo, essa é uma descida até a altura de 2000 metros! Cuidado!

Agora, pense assim: se o avião desce **600 metros** em **1 minuto**, então ele descera **9900 metros** em "**x**" minutos. Vamos esquematizar a regra de três.



Note que quanto maior a descida, mais tempo essa levará. Logo, são grandezas diretamente proporcionais, o que nos possibilita multiplicar cruzado.

$$600x = 1 \cdot 9900 \rightarrow x = \frac{9900}{600} \rightarrow x = 16,5 \text{ minutos}$$

Ou seja, a descida durará 16 minutos e meio! Ora, **meio minuto é trinta segundos**. Assim,

$$x = 1630 \text{ s}$$

Gabarito: LETRA D.


5. (FGVP/SSP-AM/2022) Caminhando em um ritmo constante de 2 passos por segundo, Alexandre foi de sua casa ao colégio em 20 minutos. Com passos iguais aos anteriores, caminhando ao ritmo constante de 3 passos por segundo, Alexandre percorrerá o trajeto de sua casa ao colégio em

- A) 12 minutos.
- B) 13 minutos e 20 segundos.
- C) 15 minutos e 10 segundos.
- D) 18 minutos e 30 segundos.
- E) 30 minutos.

Comentários:

É importante notar que quanto mais passos por segundo Alexandre der, menos tempo será necessário para que ele chegue até a escola. Logo, já conseguimos identificar que estamos trabalhando com grandezas inversamente proporcionais.

Agora, pense comigo: se com 2 passos por segundo ele demora 20 minutos, então com **3 passos por segundo** ele demorará **x minutos**. Vamos esquematizar essa regra de três!



Como são grandezas inversamente proporcionais, não podemos aplicar aqui a multiplicação cruzada. Multiplicaremos diretamente cada linha e as igualaremos.

$$3x = 2 \cdot 20 \rightarrow x = \frac{40}{3} \rightarrow x = 13,33 \text{ minutos}$$

Logo, o percurso demorará 13 minutos + 0,33 minutos (um terço de minuto). Lembre-se que **0,33 minutos são 20 segundos**.

$$x = 1320 s$$

Gabarito: LETRA B.

QUESTÕES COMENTADAS – FGV

Porcentagem

1. (FGV / SSP AM - 2022) Em um saco há muitas bolinhas, todas do mesmo tamanho, algumas brancas, e as outras pretas. Dessas bolinhas, umas são mais leves e as outras, mais pesadas. Sabe-se que:

- 70% de todas as bolinhas são brancas.
- 25% das bolinhas leves são pretas.
- 60% das bolinhas pretas são pesadas.

A porcentagem de bolinhas pesadas e brancas nesse saco é de

- a) 26%
- b) 30%
- c) 34%
- d) 38%
- e) 42%

Comentários:



A melhor maneira de se resolver esta questão é montando uma tabela com os dados fornecidos. Vamos preencher passo a passo. Vejamos:

- *No saco há bolinhas brancas e pretas sendo umas mais leves e outras mais pesadas.*

Vamos arbitrar um valor de 100 para o total de bolinhas no saco a fim de facilitar as contas.

	Brancas	Pretas	Total
Leves			
Pesadas			
Total			100

- *70% de todas as bolinhas são brancas.*

Logo, o restante, isto é, 30% são pretas. Preenchemos na tabela.

	Branças	Pretas	Total
Leves			
Pesadas			
Total	70	30	100

Passamos para a última informação.

- 60% das bolinhas pretas são pesadas.

Há 30 bolinhas pretas. E, dessas 30, 60% são pesadas. Logo,

$$pretas_{pesadas} = \frac{60}{100} \times 30 \rightarrow pretas_{pesadas} = 18$$

	Branças	Pretas	Total
Leves		$30 - 18 = 12$	
Pesadas		18	
Total	70	30	100

Perceba que, se há 18 bolinhas pretas pesadas e o total de bolinhos pretas é de 30, é porque o restante, isto é, 12 bolinhas, é de bolinhas pretas e leves (conforme assinalado acima).

Por fim, utilizamos a segunda informação.

- 25% das bolinhas leves são pretas.

Sabemos que 12 bolinhas são leves e pretas. Então:

$$\frac{25}{100} \times leves = 12$$

$$leves = 12 \times \frac{100}{25} \rightarrow leves = 48$$

Se 48 bolinhas são leves e 12 das leves são pretas é porque o restante das leves, isto é, $48 - 12 = 36$, é de bolinhas brancas.

Observe que com essas informações conseguimos preencher toda a tabela inicial.

	Brancas	Pretas	Total
Leves	$48 - 12 = 36$	12	48
Pesadas	$70 - 36 = 34$	18	$100 - 48 = 52$
Total	70	30	100

E assim, de posse da tabela, conseguimos responder o questionamento da banca.

A porcentagem de bolinhas pesadas e brancas nesse saco é de:

	Brancas	Pretas	Total
Leves	36	12	48
Pesadas	34	18	52
Total	70	30	100

$$pesada_{brancas} = \frac{34}{100} \rightarrow pesada_{brancas} = 34\%$$

Gabarito: Alternativa C

2. (FGV / CBM AM - 2022) Um clube possuía, certo ano, mais de uma centena de sócios. No ano seguinte recebeu 54 novos sócios que correspondiam a 30% do número de sócios do ano anterior. No ano seguinte a esse, o clube recebeu novamente 54 novos sócios. A porcentagem que esses últimos novos sócios representam do número de sócios do ano anterior é, aproximadamente,
- 30%.
 - 27%.
 - 25%.
 - 23%.
 - 21%.

Comentários:

Vamos chamar de x a quantidade de sócios que o clube possuía.

No ano seguinte recebeu 54 novos sócios que correspondiam a 30% do número de sócios do ano anterior, isto é:

$$\frac{54}{x} = 0,3$$

Ou seja, a parte 54 dividida pelo todo do ano anterior x , é igual a 30% (0,3).
Calculando x :

$$\frac{54}{x} = 0,3$$

$$x = \frac{54}{0,3} \rightarrow x = 180$$

Então, inicialmente, havia 180 sócios no clube. No ano seguinte recebeu 54 sócios e ficou com 234.

E, no ano posterior a esse, recebeu mais 54.

A banca nos questiona o valor da porcentagem que esses últimos novos sócios (54) representam do número de sócios do ano anterior (234). Isto é, a parte 54 pelo todo 234.

$$p = \frac{54}{234} \rightarrow p = 0,23 \text{ ou } 23\%$$

Gabarito: Alternativa D

3. (FGV / SSP AM - 2022) Em um saco há 180 bolinhas, umas brancas, outras pretas e não há bolinhas de outra cor. Das bolinhas do saco, 60% são pretas. São retiradas N bolinhas brancas do saco e, então a porcentagem de bolinhas pretas do saco passou a ser de 80%.

O valor de N é

- a) 20
- b) 25
- c) 30
- d) 40
- e) 45

Comentários:

Em um saco há 180 bolinhas das quais 60% são pretas (p).

$$p = \frac{60}{100} \times 180 \rightarrow p = 108$$

O restante são bolas brancas (b) uma vez que não há mais outras cores no saco.

$$b = 180 - 108 \rightarrow b = 72$$

Então, inicialmente, há 108 bolas pretas e 72 bolas brancas no saco.

São retiradas N bolinhas brancas do saco e, então a porcentagem de bolinhas pretas do saco passou a ser de 80%.

Tínhamos 180 bolas e N foram retiradas. Logo, a quantidade total final será igual a $180 - N$.

A banca nos informa que após a retirada, a porcentagem de bolinhas pretas passou a ser de 80%.

$$\frac{80}{100} = \frac{\text{pretas}}{\text{total restante}}$$
$$\frac{80}{100} = \frac{108}{180 - N}$$

Perceba que **não foi retirada nenhuma bola preta**. Então a quantidade de bolas pretas continua sendo de 108. Calculando N :

$$0,8 = \frac{108}{180 - N}$$
$$180 - N = \frac{108}{0,8}$$
$$180 - N = 135$$
$$N = 180 - 135 \rightarrow N = 45$$

Gabarito: Alternativa E

4. (FGV / MPE GO - 2022) Antônio teve seu aluguel reajustado em 10%. O valor do aluguel reajustado é R\$ 2.772,00. O valor do aluguel de Antônio antes do reajuste era
- a) R\$ 2.072,00.
 - b) R\$ 2.494,80.
 - c) R\$ 2.520,00.
 - d) R\$ 2.507,70.
 - e) R\$ 2.527,20.

Comentários:

Vamos chamar o valor do aluguel antes do reajuste de x . Antônio teve seu aluguel reajustado em 10% resultando em um valor de R\$ 2.772,00.

$$x + \frac{10}{100} \times x = 2.772$$
$$x + 0,1x = 2.772$$
$$1,1x = 2.772$$
$$x = \frac{2.772}{1,1} \rightarrow x = 2.520$$

Gabarito: Alternativa C

5. (FGV - PM SP - 2021) Joana pagou uma conta vencida, com juros de 5%, no valor total (juros incluídos) de R\$ 382,20. Se Joana tivesse pagado a conta até o vencimento, teria economizado

- a) R\$ 18,20.
- b) R\$ 19,11.
- c) R\$ 20,32.
- d) R\$ 20,60.
- e) R\$ 21,22.

Comentários:

Podemos resolver esta questão montando uma equação ou por uma simples regra de três. Vejamos os dois modos.

- Equação

Joana pagou uma conta vencida, com juros de 5%, desembolsando um total de R\$ 382,20. Vamos chamar o valor da conta de x . Então:

$$x + \frac{5}{100} \times x = 382,20$$

Observe que o valor da conta mais 5% de juros (que incide sobre o valor da conta) será igual ao total desembolsado. Calculando x :

$$x + 0,05x = 382,20$$

$$1,05x = 382,20$$

$$x = \frac{382,20}{1,05} \rightarrow x = 364$$

Logo, Joana economizaria:

$$economia = 382,20 - 364 \rightarrow economia = 18,20$$

- Regra de três

Joana pagou uma conta vencida, com juros de 5%, desembolsando um total de R\$ 382,20. Logo, 105% do valor da conta correspondem a R\$ 382,20.

5% (que é o valor que ela teria economizado) corresponderá a *ec*.

Valor	Porcentagem
382,20	105%
<i>ec</i>	5%

Fazendo o produto do meio sendo igual ao produto dos extremos (multiplicando cruzado) teremos:

$$105 \times ec = 5 \times 382,2$$

$$ec = \frac{5 \times 382,2}{105} \rightarrow ec = 18,20$$



Gabarito: Alternativa A

LISTA DE QUESTÕES - FGV

Operações Básicas

1. (FGV/ALEP-PR/2024) O número real $\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ é igual a:
- A) $\sqrt{3} - \sqrt{2}$
B) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$
C) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})/5$
D) $1/\sqrt{5}$
E) $1/\sqrt{6}$
2. (FGV/ALEP-PR/2024) O número real $\sqrt{2} + \sqrt{8}$ é igual a:
- A) 4
B) 8
C) $3\sqrt{2}$
D) $4\sqrt{8}$
E) $\sqrt{10}$
3. (FGV/PREF. SP/2023) Sendo N um número real maior do que 1, o valor de $\sqrt[3]{N\sqrt[3]{N^2\sqrt[3]{N}}}$ é igual a:
- A) $N^{\frac{1}{27}}$
B) $N^{\frac{4}{27}}$
C) $N^{\frac{8}{27}}$
D) $N^{\frac{16}{27}}$
E) $N^{\frac{1}{3}}$
4. (FGV/AGENERSA/2023) Considere o conjunto $A = \{2, 3, 5, 6\}$ e a operação $\&$ entre números inteiros quaisquer a e b definida por $a\&b = 2a + b$. Seja agora o conjunto B definido como sendo o conjunto dos elementos y tais que $y = x\&4$, para cada x pertencente ao conjunto A . A soma dos elementos de B é
- A) 54.
B) 48.
C) 44.
D) 40.
E) 36.

5. (FGV/SEAD-AP/2022) Suponha que $a \# b$ signifique $2a + 3b$. Se $3 \# (4 \# x) = 48$, então o valor de x é
- a) 0.
 - b) 1.
 - c) 2.
 - d) 3.
 - e) 4.

GABARITO

1. LETRA A
2. LETRA C
3. LETRA D
4. LETRA B
5. LETRA C

LISTA DE QUESTÕES - FGV

MMC e MDC

1. (FGV/PMSP/2024) Um número N é tal que dividido por 6 deixa resto 2 e dividido por 8 também deixa resto 2. **A soma dos algarismos do menor número N que satisfaz essas condições é**

- a) 8.
- b) 7.
- c) 6.
- d) 5.
- e) 4.

2. (FGV/CMSP/2024) Utilizando apenas pesos de 200g e de 350g, o número mínimo de pesos que devem ser reunidos para que se obtenha exatamente 4kg é

- a) 12
- b) 14
- c) 16
- d) 18
- e) 20

3. (FGV/TRT-PB/2022) Laura coleciona figurinhas. Ontem ela arrumou suas figurinhas em montinhos de 6 figurinhas cada e não faltou nem sobrou figurinha alguma. Hoje ela fez uma nova arrumação com as mesmas figurinhas, dessa vez em montinhos de 10 figurinhas cada um e também não faltou nem sobrou figurinha alguma. O número mínimo de figurinhas que Laura pode ter é M . A soma dos algarismos de M é

- a) 2.
- b) 3.

- c) 4.
- d) 5.
- e) 6.

4. (FGV/CBM-RJ/2022) Max e Rubens estão andando de bicicleta em uma pista circular. Eles andam em sentidos opostos. Max dá uma volta na pista a cada 6 minutos e Rubens dá uma volta na pista a cada 10 minutos. Em um determinado momento eles se cruzam em um ponto P da pista.

Eles voltarão a se cruzar pela primeira vez nesse mesmo ponto P após

- a) 6 minutos.
- b) 10 minutos.
- c) 24 minutos.
- d) 30 minutos.
- e) 60 minutos.

5. (FGV/PM SP/2022) Seja M o menor número inteiro, maior do que 2, que, dividido por 3, por 5, ou por 7, deixa sempre resto 2. A soma dos algarismos de M é

- a) 8.
- b) 9.
- c) 10.
- d) 12.
- e) 15.

GABARITO

1. LETRA A
2. LETRA B
3. LETRA B
4. LETRA D
5. LETRA A

LISTA DE QUESTÕES – FGV

Razão e Proporção

1. (FGV/PMSP/2024) Em um encontro de 57 Policiais Militares, há apenas sargentos, cabos e soldados. Para cada cabo, há 5 soldados, e para cada sargento, há 3 cabos. **O número de soldados nesse encontro é igual a**

- a) 50.
- b) 48.
- c) 45.
- d) 42.
- e) 40.

2. (FGV/ALEP PR/2024) As grandes distancias entre objetos astronômicos (estrelas, planetas, etc.) são, em geral, expressas por meio da distância que a luz percorre em determinada unidade de tempo no vácuo. Por exemplo, um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, um minuto-luz é a distância que a luz percorre em um minuto no vácuo.

Assim expressamos a distância média entre a Terra e Sol, que é de, aproximadamente, 8,3 minutos-luz. Já a distância média entre a Terra e Lua é de, aproximadamente, 1,3 segundos-luz.

Considerando esses valores, assinale a o número que melhor aproxima a razão entre as distâncias entre a Terra e o Sol e entre a Terra e a Lua.

- a) 6,38
- b) 70,00
- c) 100,79
- d) 283,70
- e) 383,07

3. (FGV/TRT-PB/2022) Sobre 4 grandezas X , Y , Z e W sabe-se que:

A razão de W para X é $4:3$

A razão de Y para Z é $3:2$

A razão de Z para X é $1:6$

A razão de $X+Y$ para $Z+W$ é

a) $5:6$

b) $4:7$

c) $3:5$

d) $6:11$

e) $8:11$

4. (FGV/TRT-PB/2022) Em uma reunião de condomínio, há jovens com até 21 anos, adultos com mais de 21 e menos de 60 anos, e idosos com 60 anos ou mais. Para cada 2 jovens há 5 adultos e para cada 7 adultos há 3 idosos. A razão entre o número de jovens e o número total de pessoas presentes a essa reunião é

a) $2/15$.

b) $7/15$.

c) $3/14$.

d) $2/17$.

e) $7/32$.

5. (FGV/TRT MA/2022) Michael coleciona moedas brasileiras, americanas e francesas. Para cada 3 moedas americanas Michael tem 7 moedas brasileiras e para cada 5 moedas brasileiras, ele tem 2 francesas. Com relação às moedas de Michael, a razão entre a quantidade de moedas brasileiras e a quantidade de moedas não brasileiras é igual a

- a) $7/5$.
- b) $12/7$.
- c) $25/19$.
- d) $30/23$.
- e) $35/29$.

GABARITO

1. LETRA C
2. LETRA E
3. LETRA A
4. LETRA E
5. LETRA E

LISTA DE QUESTÕES - FGV

Regra de Três

1. (FGV/PM-SP/2024) Uma máquina leva 2 minutos e 15 segundos (2min15s) para imprimir e encadernar certo livro. Para imprimir e encadernar 24 exemplares desse livro, trabalhando continuamente, a máquina levará
A) 50min.
B) 51min45s.
C) 52min30s.
D) 53min15s.
E) 54min.
2. (FGV/PM-SP/2024) Três profissionais executam um determinado trabalho em 12 horas. Dois profissionais, com a mesma eficiência, executarão o mesmo trabalho em
A) 8 horas.
B) 9 horas.
C) 15 horas.
D) 16 horas.
E) 18 horas.
3. (FGV/CGM-RJ/2023) O custo com bebidas de um evento com 120 pessoas foi de R\$ 3.600,00. O custo com bebidas de um evento similar, mas com 90 pessoas, é de:
A) R\$ 2.400,00;
B) R\$ 2.500,00;
C) R\$ 2.600,00;
D) R\$ 2.700,00;
E) R\$ 2.800,00.
4. (FGV/CBM-AM/2022) Um avião de passageiros está voando a 11900 m de altitude quando inicia o procedimento de descida. A descida é feita a uma razão constante de 600 metros por minuto até a altitude de 2000 m quando estabiliza sua altitude. A duração dessa descida foi de:
A) 15min 3s.
B) 15min 45s.
C) 16min 5s.
D) 16min 30s.
E) 16min 50s.
5. (FGVP/SSP-AM/2022) Caminhando em um ritmo constante de 2 passos por segundo, Alexandre foi de sua casa ao colégio em 20 minutos. Com passos iguais aos anteriores,

caminhando ao ritmo constante de 3 passos por segundo, Alexandre percorrerá o trajeto de sua casa ao colégio em

- A) 12 minutos.
- B) 13 minutos e 20 segundos.
- C) 15 minutos e 10 segundos.
- D) 18 minutos e 30 segundos.
- E) 30 minutos.

GABARITO

1. LETRA E
2. LETRA E
3. LETRA D
4. LETRA D
5. LETRA B

LISTA DE QUESTÕES – FGV

Porcentagem

1. (FGV / SSP AM - 2022) Em um saco há muitas bolinhas, todas do mesmo tamanho, algumas brancas, e as outras pretas. Dessas bolinhas, umas são mais leves e as outras, mais pesadas. Sabe-se que:

- 70% de todas as bolinhas são brancas.
- 25% das bolinhas leves são pretas.
- 60% das bolinhas pretas são pesadas.

A porcentagem de bolinhas pesadas e brancas nesse saco é de

- a) 26%
- b) 30%
- c) 34%
- d) 38%
- e) 42%

2. (FGV / CBM AM - 2022) Um clube possuía, certo ano, mais de uma centena de sócios. No ano seguinte recebeu 54 novos sócios que correspondiam a 30% do número de sócios do ano anterior. No ano seguinte a esse, o clube recebeu novamente 54 novos sócios.

A porcentagem que esses últimos novos sócios representam do número de sócios do ano anterior é, aproximadamente,

- a) 30%.
- b) 27%.
- c) 25%.
- d) 23%.
- e) 21%.

3. (FGV / SSP AM - 2022) Em um saco há 180 bolinhas, umas brancas, outras pretas e não há bolinhas de outra cor. Das bolinhas do saco, 60% são pretas. São retiradas N bolinhas brancas do saco e, então a porcentagem de bolinhas pretas do saco passou a ser de 80%.

O valor de N é

- a) 20
- b) 25
- c) 30
- d) 40
- e) 45

4. (FGV / MPE GO - 2022) Antônio teve seu aluguel reajustado em 10%. O valor do aluguel reajustado é R\$ 2.772,00. O valor do aluguel de Antônio antes do reajuste era

- a) R\$ 2.072,00.

- b) R\$ 2.494,80.
- c) R\$ 2.520,00.
- d) R\$ 2.507,70.
- e) R\$ 2.527,20.

5. (FGV - PM SP - 2021) Joana pagou uma conta vencida, com juros de 5%, no valor total (juros incluídos) de R\$ 382,20. Se Joana tivesse pagado a conta até o vencimento, teria economizado

- a) R\$ 18,20.
- b) R\$ 19,11.
- c) R\$ 20,32.
- d) R\$ 20,60.
- e) R\$ 21,22.

GABARITO

1. LETRA C
2. LETRA D
3. LETRA E
4. LETRA C
5. LETRA A

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.