

Aula 10

*DataPrev - Raciocínio Lógico - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

13 de Julho de 2026

Índice


1) Geometria Plana	3
2) Geometria Espacial	20
3) Questões Comentadas - Geometria Plana - FGV	31
4) Questões Comentadas - Geometria Espacial - FGV	44
5) Lista de Questões - Geometria Plana - FGV	61

PROBLEMAS GEOMÉTRICOS

Geometria Plana

Ponto

O ponto, a reta e o plano são noções bem **primitivas** de geometria. Tente definir um ponto. Você vai perceber que existe uma certa dificuldade nisso (rsrs). Apesar de não ter uma definição "pra valer", sabemos algumas de suas propriedades, de forma que conseguimos identificá-lo e caracterizá-lo.




A figura acima mostra vários exemplos de pontos. Você pode notar que chamamos cada um deles de uma **letra maiúscula**. É a notação mais comum. Uma outra característica do ponto é que ele **não possui dimensão**. Dizemos que é um elemento adimensional.

Esse fato permite usarmos o ponto para identificar uma localização com bastante acuracidade. Por fim, vale a pena você anotar aí que não podemos dividir um ponto. Isso mesmo, você não pode "quebrar" um ponto em dois pontos.


Reta

Por sua vez, **a reta vai ser formada pela união de infinitos pontos**.




Na imagem acima, tentei representar vários pontos se aglomerando até formarem uma reta (rsrs). Vamos lá! *Quais são as características de uma reta?* Primeiro: **ela é unidimensional**. Enquanto um ponto não possui dimensão (é adimensional), a reta agora é unidimensional.

Segundo: **ela é infinita para ambos os lados!** Ou seja, ela segue indefinidamente para qualquer um dos lados (apesar de não ser obrigatório, usamos reticências nas "extremidades" da reta para expressar esse fato).





A imagem acima mostra a notação que usamos para as retas: **letras minúsculas**. Enquanto nos pontos usamos letras maiúsculas, nas retas são letras minúsculas! Vale ressaltar que o alfabeto que estamos utilizando de referência aqui é o latino (Aa, Bb, Cc, ..., Zz).

Agora, vou contar para vocês uma novidade. Em algumas situações, a reta terá extremidade(s). Logo, ela não se prolongará até ao infinito nos dois lados. Quando ela tiver uma extremidade, a chamaremos de **semirreta**. Por sua vez, quando ela tiver as **duas extremidades**, será apenas um **segmento de reta**.



Normalmente, representamos o segmento de reta com extremidades A e B por $\overline{AB}$. Além desse detalhe, existe mais uma classificação que leva em conta se duas ou mais retas estão se encontrando. *Como assim?!*



As **retas paralelas não se encontram**, enquanto as **retas concorrentes sim**. Essas últimas possuem um único ponto em comum. Duas retas que se encontram em mais de um ponto necessariamente vão se encontrar em todos os demais e serão chamadas retas coincidentes!


$$\text{—————} \quad r \equiv s$$

RETAS COINCIDENTES

É como se uma reta estivesse em cima da outra!!

Para finalizar essa parte introdutória de retas, anote aí a seguinte propriedade:

- Sempre conseguiremos traçar uma reta por quaisquer dois pontos. Essa reta será única.




Ângulos

Um ângulo é formado pelo **encontro de duas semirretas**. Esse encontro pode se dar de várias formas. Veja.




Perceba que dependendo de como arranjamos as semirretas, vamos ter aberturas diferentes. Nós podemos **quantificar essa abertura e expressar o resultado em graus (°) ou radianos (rad)**.



ÂNGULOS REPRESENTADOS EM GRAUS (°)

Agora olhe os mesmos ângulos, mas expressados em radianos.



ÂNGULOS REPRESENTADOS EM RADIANOS (rad)

São duas maneiras bem diferentes de expressarmos os ângulos, concorda? Muitos alunos possuem facilidade quando estão trabalhando com graus ($^{\circ}$), mas quando aparece um ângulo em radianos (rad), já ficam assustados. Moçada, apenas uma regra de três simples separa um ângulo em radiano de um ângulo em grau (ou vice-versa). Para isso, lembre-se sempre do seguinte:

180° equivalem a π rad.

Sabendo disso, é só usar uma regra de três para converter um em outro. Vamos fazer alguns exemplos.

EXEMPLIFICANDO



1) Converter 60° em radianos.

Você pensa assim: se 180° equivalem a π rad, então 60° equivalem a x . Com isso, podemos esquematizar:



Multiplicando cruzado.

$$180x = 60\pi \rightarrow x = \frac{60\pi}{180} \rightarrow x = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

Logo, podemos dizer que 60° equivalem a $\pi/3$ rad.

2) Converter $\frac{5\pi}{6}$ rad em graus.

Pensamento muito semelhante, moçada! Se 180° equivalem a π rad, então x equivalem a $\frac{5\pi}{6}$ rad.




Multiplicando cruzado.

$$x \cdot \pi = 180 \cdot \frac{5\pi}{6} \rightarrow x = 30 \cdot 5 \rightarrow x = 150^\circ$$

Logo, $\frac{5\pi}{6}$ rad equivalem a 150° .

Agora que sabemos o que é um ângulo e suas unidades, vamos entrar nas nomenclaturas e classificações.

- **Ângulo Raso:** É o ângulo de 180° (π rad).
- **Ângulo Reto:** É o ângulo de 90° ($\pi/2$ rad)
- **Ângulo Agudo:** Todo ângulo maior que 0° e menor que 90° .



e são ângulos agudos.

- **Ângulo Obtuso:** Todo ângulo maior que 90° e menor que 180° .



e são ângulos obtusos.

- **Ângulos Complementares:** Dois ângulos são chamados de complementares quando sua soma é igual a 90° .



Por exemplo, 60° e 30° são ângulos complementares, já que $30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$. Da mesma forma, 40° e 50° também são. Beleza?!!


- **Ângulos Suplementares:** Dois ângulos são chamados de suplementares quando sua soma é igual a 180° .



Observe que 150° e 30° são ângulos suplementares, uma vez que sua soma é igual a 180° . Da mesma forma, 75° e 105° também são.

Circunferência


A primeira figura geométrica que estudaremos na aula de hoje será a circunferência. Particularmente, acho ela bem interessante, já que é uma forma bem corriqueira. Lembre-se de uma pizza, de um pneu, de uma moeda... todos eles possuem um formato circular (circunferencial). Com um pouco mais de rigor, nós definimos uma circunferência como sendo **o conjunto dos pontos equidistantes de um centro (C)**.



Raio, Diâmetro e Cordas

Quando estamos falando do raio (R) de uma circunferência, estamos falando da **distância entre seus pontos e o centro**. Por sua vez, corda é o segmento de reta que une dois pontos quaisquer de uma circunferência.


Acontece que **quando essa corda passa pelo centro da circunferência**, nós a chamamos de **diâmetro**. Para um melhor entendimento, vamos dar uma olhada nas figuras abaixo!



A figura de esquerda ilustra o **raio**. É exatamente a distância entre o centro e um ponto da circunferência. Na situação retratada, chamamos esse ponto de D. Já na circunferência da direita, quero mostrar pra você a diferença entre o diâmetro e uma corda qualquer.


Pessoal, para ser diâmetro, o **segmento de reta precisa passar pelo centro da circunferência**. Caso não passe (como o segmento AB), teremos uma corda. É verdade que o diâmetro não deixa de ser uma corda, mas é uma "corda especial", pois ela **é a corda de maior comprimento**!

Se olharmos com atenção para a figura, vemos que o comprimento do diâmetro (ou simplesmente diâmetro a partir de agora) vale exatamente duas vezes o raio. Por esse motivo, escrevemos que:



Comprimento de uma Circunferência

Lembra que no tópico passado eu falei sobre comprimento do arco? Que era tipo a medida da borda da fatia da pizza. Aqui, no comprimento da circunferência, estamos nos referindo **a medida da borda de toda a pizza** e não apenas da fatia! *Eita, tanta pizza que já tá dando fome! (rsrs)*. Existe uma figura que eu gosto bastante para explicar o comprimento da circunferência, veja:



Ficou um pouco melhor de visualizar? Para tentar explicar de uma outra forma, imagine uma formiga no ponto vermelho, onde a tesoura vai cortar! **A distância que ela andaria para completar a volta** (andando apenas sobre a linha preta) é exatamente igual ao comprimento da circunferência (C). Esse valor é dado por uma fórmula bem conhecida que já adiantei um pouco na imagem acima, anota aí!

$$C = 2\pi R \quad \text{ou} \quad C = \pi D$$

Área de uma Circunferência

Quando calculamos a área de uma figura plana, estamos tentando quantificar o tamanho da região delimitada por ela. Pode ser um conceito meio abstrato, mas sempre usamos no dia a dia. Se conhecemos o raio da circunferência, podemos calcular sua área.

$$A = \pi R^2$$

Sugiro muito que guardem essa fórmula no coração. Além disso, a dica suprema é: **faça muitos exercícios** que envolvam cálculos de áreas de circunferência.


Triângulos

Agora falaremos um pouco sobre os triângulos. De modo simplificado, podemos definir um triângulo como uma **figura plana formada por três segmentos de reta**. Acontece que esses segmentos de reta não são dispostos de qualquer maneira. Eles devem formar três lados e três ângulos bem definidos, tudo bem?

Assim como na circunferência, nesse tópico falaremos sobre perímetros e áreas, mas tudo no seu devido tempo! Primeiro, devemos aprender **quais os tipos de triângulo existem** e suas características. Vamos?!


Classificações

Quando estamos olhando apenas para o lado, podemos classificar os triângulos de três maneiras.



- **Escaleno:** todo triângulo que possui os **três lados distintos**! $a \neq b \neq c$. Como consequência, os ângulos opostos a cada um desses lados também serão diferentes.
- **Isósceles:** triângulo que possui **dois lados iguais**. Os ângulos opostos a esses lados também serão idênticos.
- **Equilátero:** triângulo com **todos os lados iguais**. Assim, todos os ângulos internos desse tipo de triângulo também são congruentes, medindo exatamente 60° .

Já quando estamos olhando para os ângulos internos, podemos classificar os triângulos da seguinte forma:



- **Retângulo:** um dos ângulos do triângulo é um ângulo reto, isto é, de 90° . Talvez, esse é o triângulo mais comum em provas. Afinal, é nele que utilizamos o famoso "Teorema de Pitágoras". Estudaremos esse triângulo com mais detalhes em breve.
- **Acutângulo:** todos os ângulos do triângulo são agudos, isto é, maiores que 0° e menores que 90° .
- **Obtusângulo:** um dos ângulos do triângulo é um ângulo obtuso, isto é, maior que 90° e menor que 180° .


Ângulos Internos

Feito esse parêntese para o estudo dos triângulos retângulos, vamos voltar a analisar os triângulos em geral. Pessoal, guardem aí com vocês o seguinte: a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180° .

PRESTE MAIS ATENÇÃO!




A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180° !



$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

Lembre-se que no triângulo equilátero, todos os lados são iguais e que, com isso, temos que todos os ângulos internos também são! Em uma imagem, podemos representar assim:



Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180° , temos que:

$$\alpha + \alpha + \alpha = 180^\circ \rightarrow 3\alpha = 180^\circ \rightarrow \alpha = \frac{180^\circ}{3} \rightarrow \alpha = 60^\circ$$

É por esse motivo que, sempre que estamos trabalhando com triângulos equiláteros, qualquer um de seus ângulos internos valerá 60° .

Área de um Triângulo

Pessoal, esse é **um dos tópicos mais importantes dessa aula**. Há diversas maneiras de calcularmos a área de um triângulo. De acordo com as informações que tivermos, usaremos uma fórmula ou outra.

- Quando temos a base e a altura do triângulo.

"h" representa a medida da altura, enquanto "b" representa a medida da base. Quando tivermos essas informações, podemos calcular a área de um triângulo por meio da seguinte fórmula:

$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

- Quando o triângulo é retângulo

Perceba que quando o triângulo é retângulo, a altura relativa à base "b" é o próprio cateto "c". Assim,

$$A = \frac{b \cdot c}{2}$$

- Quando o triângulo é equilátero



Quando o triângulo é equilátero, a altura relativa a qualquer um dos lados, vai sempre dividir esse lado ao meio. Agora, observe o triângulo retângulo em destaque. Com o teorema de Pitágoras, podemos determinar a altura "h" em função do lado "L".


$$L^2 = h^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2 \rightarrow h^2 = L^2 - \frac{L^2}{4} \rightarrow h^2 = \frac{3L^2}{4} \rightarrow h = \frac{L\sqrt{3}}{2}$$

Com isso, podemos usar a fórmula que vimos anteriormente, substituindo o valor da altura "h" por esse que acabamos de encontrar.

$$A = \frac{bh}{2} \rightarrow A = \frac{L \cdot \left(\frac{L\sqrt{3}}{2}\right)}{2} \rightarrow A = \frac{L^2\sqrt{3}}{4}$$

Portanto, observe que existe uma fórmula "pronta" para calcularmos a área de um triângulo equilátero. **Se você sabe apenas o lado, já pode calcular a área.** No entanto, na prática, você não precisa memorizá-la. Se conhece a fórmula $A = bh/2$ e o Teorema de Pitágoras, **poderá deduzi-la a qualquer tempo.**

- Quanto temos apenas os lados do triângulo.



Nessas situações, usaremos a famosa fórmula de Heron. Não é tão comum à sua cobrança em provas, mas é bom estarmos espertos. Quando você tiver todos os lados, mas não souber os ângulos nem as alturas, a fórmula abaixo resolve sua vida:

$$A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$


Não é uma fórmula muito amigável, eu sei. Sorte nossa que **ela cai muito pouco**. Aqui, o "p" representa o semiperímetro, que pode ser determinado por meio da fórmula abaixo!

$$p = \frac{a+b+c}{2}$$

Peço que não se preocupe com a demonstração, pois **o custo-benefício de fazê-la aqui é quase nulo**. Nessas horas, vamos tentar ser o mais prático e objetivo possível.

Triângulo Retângulo

O triângulo retângulo é tão importante que estudaremos ele em separado! Lembrem-se que chamamos de triângulo retângulo qualquer triângulo que possua **um de seus ângulos igual a 90 graus** ou $\frac{\pi}{2}$ radianos.



- O lado c é chamado de hipotenusa. **Ele é o maior dos lados** e está oposto ao ângulo de 90°.
- Os lados **a e b são os catetos**.
 - Com relação ao ângulo α, a é o cateto oposto e b é o cateto adjacente.
 - Com relação ao ângulo β, b é o cateto oposto e a é o cateto adjacente.

Relações Trigonométricas - Seno, Cosseno e Tangente

Moçada, eu sei que essa é uma parte da trigonometria e por isso não vou me aprofundar muito, mas vale a pena você saber as seguintes relações trigonométricas para a sua prova de geometria plana!

- Seno

$$\text{sen } \alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}$$

- Cosseno

$$\text{cos } \alpha = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$$


- Tangente

$$\tan \alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$$

- Relação Fundamental

$$\operatorname{sen}^2 \alpha + \operatorname{cos}^2 \alpha = 1$$

Teorema de Pitágoras



O Teorema de Pitágoras é um grande clássico dos nossos estudos, não é verdade? Desde muito cedo, quando crianças, escutamos falar desse teorema. Vamos rever o que ele diz!


A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa.

Matematicamente, podemos escrever:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Lei do Senos e a Lei dos Cossenos


Para aproveitar que falamos um pouco de seno e cosseno nessa aula, quero conversar com vocês sobre duas leis que relacionam as medidas dos lados de um triângulo com os senos e cossenos dos ângulos internos. Considere o triângulo genérico abaixo.



De acordo com a lei dos senos, a razão entre o lado e o seno do ângulo oposto é uma constante no triângulo. Dessa forma, podemos escrever que:

$$\frac{a}{\hat{A}} = \frac{b}{\hat{B}} = \frac{c}{\hat{C}}$$

Por sua vez, a lei dos cossenos vai relacionar os lados de um triângulo qualquer com o cosseno de um dos ângulos. Guarde com você o seguinte:



Observe o esquema abaixo para entender melhor as expressões.



Quadriláteros

Nessa seção, mostrarei para vocês os quadriláteros mais conhecidos. Serei bem objetivo e quero que vocês deem especial atenção para as fórmulas de área. Combinado?!

Retângulo



Características Principais:

- Comprimento: "b"; Largura: "a";

- Ângulos internos são iguais a 90° ;
- Lados opostos são iguais

Quadrado



Características Principais:

- Todos os lados são iguais;
- Todos os ângulos internos são iguais a 90° ;
- É um polígono regular


Paralelogramo



Características Principais:

- Lados opostos são iguais (congruentes) e paralelos;
- Ângulos opostos são iguais (congruentes)
- A área é dada em função da altura "h" e esse "h" nem sempre vai estar disponível para nós. Na maioria das vezes, teremos que usar um pouco dos conhecimentos sobre triângulos retângulos, tudo bem?

Losango



Características Principais:

- O losango é um paralelogramo com todos os lados iguais;
- É também chamado de paralelogramo equilátero;
- Ângulos opostos iguais;
- "D" é a medida da diagonal maior, enquanto "d" é a medida da diagonal menor.

Trapézio



Características Principais:

- "B" representa a medida da base maior, "b" é a medida da base menor;
- As bases são paralelas;
- "h" é a altura do trapézio.

Tipos de Trapézios:

Trapézio
Isósceles

Trapézio
Retângulo

Trapézio
Escaleno

- **Trapézio Isósceles:** Os lados não paralelos possuem a mesma medida. Além disso, são simétricos.
- **Trapézio Retângulo:** Um dos lados não paralelos faz um ângulo de 90° com as bases.
- **Trapézio Escaleno:** É o trapézio que apresenta todos os seus lados distintos.


Geometria Espacial

Poliedros


O primeiro passo na Geometria Espacial é **entender o que é um poliedro**. Para isso, é preciso que você tenha feito a aula de Geometria Plana, pois usaremos muitos conceitos vistos lá. Vamos lá!

Poliedro é um sólido geométrico limitado por uma quantidade finita de polígonos. Além disso, é importante ressaltar que cada um desses polígonos divide um lado com um outro, vizinho a ele.

Vamos visualizar alguns poliedros.



Talvez o poliedro mais conhecido seja o cubo (que é o primeiro da esquerda na figura acima). Note que o cubo tem seis faces e cada uma dessas faces é um **quadrado**. Aproveitando esse cubo, vamos estudar alguns elementos que estão presentes nos poliedros de modo geral.




- A **face** normalmente é conhecida como o "lado" do poliedro. Uma observação importante é que ela sempre será um polígono.
- A **aresta** é a intersecção de duas dessas faces. Ademais, também podemos defini-la como sendo o segmento de reta que une dois vértices.
- O **vértice** é o ponto de encontro das arestas. Ele forma um "cantinho" no referido sólido geométrico.

Esclarecido isso, podemos notar que o cubo tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Vocês também chegaram nesses números?!


Agora, quero contar para vocês que podemos classificar os poliedros em convexos ou não convexos.

- **Poliedro Convexo:** todo poliedro em que qualquer segmento de reta com extremidades nas faces está inteiramente contido dentro do poliedro. Para melhor entendimento, veja alguns poliedros convexos.




Note que as retas que traçamos unindo pontos nas faces ficam totalmente dentro do poliedro!! Quando isso acontece para qualquer segmento de reta com essas características, o poliedro é convexo!

- **Poliedro Não Convexo (ou côncavo):** qualquer poliedro que não seja convexo.




Prisma

O prisma é um poliedro convexo que possui duas bases paralelas distintas (que são polígonos). As faces laterais são paralelogramos. Vamos conhecer alguns.




O prisma da esquerda é chamado de prisma quadrangular, pois sua base é um quadrilátero. Por sua vez, o prisma da direita é um prisma pentagonal, pois sua base é um pentágono. Vamos conhecer seus elementos.



BASE

ARESTA LATERAL

FACE
LATERAL



ARESTA DA
BASE

Todos os prismas terão os elementos acima. *Especial atenção nas duas bases paralelas, ok?! Dito isso, quero apresentar para dois prismas bem famosos.*

Esses dois sólidos geométricos são os mais comuns em prova!! Todos dois são prismas quadrangulares. A principal diferença entre os dois é que, no cubo, **todas as arestas possuem a mesma medida**. Normalmente, as questões vão nos perguntar sobre áreas e volumes. Vamos falar sobre isso!

Áreas



A **área total da superfície de um prisma** é calculada por meio da seguinte soma:

$$A_{total} = A_{lateral} + 2A_{base}$$

Observe que a área total é composta de duas parcelas. A área lateral e a área da base.

- **Área Lateral** ($A_{lateral}$): soma das áreas das faces laterais. No prisma, as faces laterais são paralelogramos (mais especificamente, serão retângulos quando os prismas forem retos).

- **Área da Base** (A_{base}): É a área do polígono que está na base. Se a base for um quadrado, será a área do quadrado, se for um pentágono, será a área do pentágono etc.



No paralelepípedo acima, vemos que **as bases são retângulos de lados "a" e "b"**, enquanto **as faces são dois retângulos de lados "b" e "c"** e outros dois de lados "a" e "c". Podemos visualizar isso com a planificação.

- Cálculo da Área Lateral:

Temos quatro faces laterais. Nos prismas retos, elas serão retângulos. Aprendemos na aula de Geometria Plana que a área de retângulos é calculada pelo produto de suas duas dimensões. Assim:

$$A_{lateral} = ac + bc + ac + bc \rightarrow A_{lateral} = 2ac + 2bc$$

- Cálculo da Área da Base:

A base é um retângulo de lados "a" e "b". Assim:

$$A_{base} = ab$$

- Cálculo da Área Total:

$$A_{total} = A_{lateral} + 2 \cdot A_{base}$$

Vamos substituir o que achamos.

$$A_{total} = 2ac + 2bc + 2ab$$

$$A_{total} = 2(ac + bc + ab)$$

Essa é a **área superficial de um paralelepípedo**. Ela aparece em provas com uma certa frequência! Nos cubos, todas as arestas são iguais a "a", podemos fazer o seguinte:

$$A_{total} = 2(a \cdot a + a \cdot a + a \cdot a)$$

$$A_{total} = 2 \cdot (a^2 + a^2 + a^2)$$

$$A_{total} = 2 \cdot 3a^2$$

$$A_{total} = 6a^2$$

Essa é a área superficial de um cubo!

Volume



Quando calculamos o volume de algum sólido, estamos **quantificando o espaço que está sendo ocupado por ele**. Considere o prisma abaixo, como exemplo,



Para calcular o volume de prismas, usamos a seguinte expressão:

$$V = A_b H$$

Em que A_b é a área da base e H é a altura. No caso do paralelepípedo, vamos ter o seguinte:



A base é um retângulo de lados "a" e "b". Assim, sua área é dada por: $A_b = ab$. Por sua vez, temos uma altura de medida "c". O volume fica:

$$V = abc$$

Esse é o volume de um paralelepípedo! Cai demais em questões! Ele é dado pelo produto das três dimensões! No caso do cubo, lembre-se que todas as arestas medem "a". Logo,

$$V = a^3$$

Pirâmide

Chegou a vez de falarmos das pirâmides! Elas são poliedros! Aqui, faces laterais serão triângulos!! Observe algumas.

Note que nas pirâmides, vamos ter uma única base. Ademais, algumas arestas que partem da base se encontram em um ponto superior, que vamos chamar de vértice da pirâmide.

Áreas

A área superficial total de uma pirâmide é calculada de maneira muito semelhante à que vimos anteriormente para prismas. A diferença é que não multiplicaremos a área da base por 2, afinal, aqui só temos uma única base mesmo.

$$A_{total} = A_{lateral} + A_{base}$$

Volume

Por sua vez, o volume de uma pirâmide é calculado por meio da seguinte expressão:

$$V = \frac{A_b H}{3}$$

Em que A_b é a área da base e H é a altura. Uma observação importante é que há a divisão por 3, fato que não acontece para os prismas.

Cilindro


Nesse ponto, deixamos de falar de poliedros. O cilindro, o cone e a esfera são exemplos dos **corpos redondos**. A partir desse ponto, não precisaremos mais falar de vértices, arestas ou faces. Observe os elementos de um cilindro.



Esse é um cilindro circular reto. Chamamos o cilindro de reto quando a geratriz for perpendicular ao plano das bases.

Áreas

Para calcular a área superficial, é interessante planificarmos o cilindro circular reto.



Observe que quando planificamos um cilindro, a sua lateral é um retângulo de lados " $2\pi R$ " e " h ". Logo,

$$A_{lateral} = 2\pi R h$$

Por sua vez, as bases são círculos. Com isso, a área da base fica:

$$A_{base} = \pi R^2$$

Como temos duas bases, devemos considerar essa área duas vezes. Assim, a área superficial total fica:

$$A_{total} = A_{lateral} + 2 \cdot A_{base}$$

$$A_{total} = 2\pi R h + 2\pi R^2$$

Colocando $2\pi R$ em evidência:

$$A_{total} = 2\pi R(h + R)$$

Volume

O volume de um cilindro é calculado da mesma forma que fizemos para o prisma.


$$V = A_b h$$

Como sabemos que a área da base é πR^2 , podemos substituir:

$$V = \pi R^2 h$$

Cone

Nosso próximo corpo redondo é o cone! É a forma da casquinha de sorvete! Vamos analisá-las.




Observe que, no cone reto, o eixo é perpendicular ao plano da base. Por sua vez, no cone oblíquo, o eixo não será perpendicular. Vamos aprender como calcular sua área superficial e seu volume.

Áreas

Assim como fizemos anteriormente, é interessante planificarmos o cone para entendermos como sua área superficial é calculada.

▪



Observe que a área lateral é a área de setor circular cujo ângulo central é α e raio é igual a geratriz. Por meio de uma regra de três, podemos encontrar que:

$$A_{lateral} = \pi Rg$$

Por sua vez, a base é um círculo. Sua área sai mais rapidamente:

$$A_{base} = \pi R^2$$

A área superficial total é a soma das duas.

$$A_{total} = \pi Rg + \pi R^2$$

$$A_{total} = \pi R \cdot (g + R)$$

Volume

Já o volume de cone é semelhante ao que vimos para a pirâmide. Como sabemos que a base de um cone é um círculo, podemos usar que $A_b = \pi R^2$.

$$V = \frac{\pi R^2 h}{3}$$

Esfera

Chegamos ao nosso último sólido e corpo redondo! **A esfera!** Acredito que é o que temos mais familiaridade e a abordaremos de forma bem direta nessa aula. Observe o seu formato.



Sobre a esfera, as questões **gostam de explorar a sua área superficial**. Para calculá-la, utilizamos a fórmula:


$$A_s = 4\pi R^2$$

Agora, vamos para as questões!

QUESTÕES COMENTADAS - FGV

Geometria Plana

1. (FGV/CBM-RJ/2024) A figura a seguir mostra o triângulo equilátero ABC, um ponto M do lado CA e um ponto N do lado CB.




São dadas as medidas: $MA = 2$, $AB = 10$ e $BN = 4$. A medida do segmento MN é

- A) $2\sqrt{10}$.
- B) $4\sqrt{3}$.
- C) $2\sqrt{13}$.
- D) $2\sqrt{15}$.
- E) $5\sqrt{2}$.

Comentários:

Mais uma vez, precisamos esquematizar o triângulo com as informações!



Lembre-se que o triângulo é equilátero. Sendo assim, todos os seus lados devem medir 10 (pois o enunciado afirma que $AB = 10$) e todos os ângulos internos são iguais a 60° . Do esquema acima, podemos ver que é possível usar a lei dos cossenos para determinar "x".

$$x^2 = 8^2 + 6^2 - 2 \cdot 8 \cdot 6 \cdot \cos 60^\circ$$

$$x^2 = 64 + 36 - 96 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$x^2 = 100 - 48$$

$$x^2 = 52$$

$$x = 2\sqrt{13}$$


Gabarito: LETRA C.

2. (FGV/PM-SP/2024) Um terreno tem a forma de um quadrilátero ABCD em que os ângulos de vértices A e D são retos. São dadas as medidas de três lados: AB = 30 m, BC = 20 m e CD = 18 m. A área desse terreno em metros quadrados é igual a


- A) 360.
- B) 384.
- C) 418.
- D) 436.
- E) 460.

Comentários:

O quadrilátero descrito no enunciado é um trapézio. Vamos desenhá-lo.



Observe que **não temos a altura do trapézio**. Para encontrá-la, precisamos visualizar o seguinte triângulo retângulo:



Agora, podemos usar o teorema de Pitágoras para determinarmos "x".

$$x^2 + 12^2 = 20^2$$

$$x^2 + 144 = 400$$

$$x^2 = 256$$

$$x = 16$$

Pronto! Temos tudo para o cálculo da área do trapézio.

$$S = \frac{(B+b)h}{2}$$

$$S = \frac{(30+18) \cdot 16}{2}$$

$$S = 48 \cdot 8$$

$$S = 384$$

Gabarito: LETRA B.

3. (FGV/CBM-RJ/2024) Uma parede retangular de 5,2 m de comprimento por 2,4 m de altura deve ser coberta com azulejos quadrados de 20 cm de lado. O número de azulejos necessários para cobrir inteiramente essa parede é igual a

- A) 286.
- B) 312.
- C) 324.
- D) 338.
- E) 350.

Comentários:

Inicialmente, devemos calcular a área da parede retangular e a área de um azulejo quadrado. Em seguida, devemos dividir a área da parede pela área do azulejo para obter o número de azulejos necessários. Para facilitar os cálculos, podemos converter as medidas em centímetros. A área da parede retangular é dada pelo produto das medidas do comprimento e da altura:

$$A_p = 5,2 \text{ m} \cdot 2,4 \text{ m}$$

$$A_p = 520 \text{ cm} \cdot 240 \text{ cm}$$

$$A_p = 124800 \text{ cm}^2$$

A área de um azulejo quadrado é dada pelo quadrado da medida do lado:

$$A_a = (20 \text{ cm})^2$$

$$A_a = 400 \text{ cm}^2$$

O número de azulejos necessários é dado pelo quociente entre a área da parede e a área do azulejo:

$$N = \frac{A_p}{A_a} \rightarrow N = \frac{124800}{400} \rightarrow N = 312$$

Portanto, o número de azulejos necessários para cobrir inteiramente a parede é igual a 312.

Gabarito: LETRA B.

4. (FGV/CBM-RJ/2024) Em um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 39 cm, a tangente de um dos ângulos agudos é 5/12. A soma das medidas dos catetos desse triângulo é igual a:

- A) 13 cm.
- B) 17 cm.
- C) 34 cm.
- D) 43 cm.
- E) 51 cm.

Comentários:

Vamos começar por identificar os dados do triângulo retângulo. Sabemos que a hipotenusa mede 39 cm e que a tangente de um dos ângulos agudos é 5/12. Chamemos esse ângulo de x. Usando a definição de tangente, temos que:

$$\tan(x) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$$

Substituindo os valores conhecidos, obtemos:

$$\frac{5}{12} = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$$

Isolando o cateto oposto, temos:

$$\text{cateto oposto} = \left(\frac{5}{12}\right) \text{cateto adjacente}$$

Agora, vamos usar o teorema de Pitágoras, que diz que:

$$\text{hipotenusa}^2 = \text{cateto oposto}^2 + \text{cateto adjacente}^2$$

Substituindo os valores conhecidos, temos:

$$39^2 = \left[\left(\frac{5}{12} \right) \text{cateto adjacente} \right]^2 + \text{cateto adjacente}^2$$

Simplificando a equação:

$$1521 = \left(\frac{25}{144} \right) \text{cateto adjacente}^2 + \text{cateto adjacente}^2$$

Colocando tudo em um só lado:

$$\left(\frac{169}{144} \right) \text{cateto adjacente}^2 = 1521$$

Resolvendo a equação do segundo grau, encontramos duas raízes possíveis para o cateto adjacente:

$$\text{cateto adjacente} = 36 \quad \text{ou} \quad \text{cateto adjacente} = -4$$

Como o cateto adjacente não pode ser negativo, descartamos a segunda raiz e ficamos com:

$$\text{cateto adjacente} = 36 \text{ cm}$$

Usando a relação que encontramos anteriormente, podemos calcular o cateto oposto:

$$\text{cateto oposto} = \left(\frac{5}{12} \right) \text{cateto adjacente}$$

$$\text{cateto oposto} = \left(\frac{5}{12} \right) 36$$

$$\text{cateto oposto} = 15 \text{ cm}$$

Finalmente, para encontrar a soma das medidas dos catetos, basta somar os dois valores:

$$\text{soma dos catetos} = \text{cateto oposto} + \text{cateto adjacente}$$


$$\text{soma dos catetos} = 15 + 36$$

$$\text{soma dos catetos} = 51 \text{ cm}$$

Portanto, a alternativa correta é a letra E.

Gabarito: LETRA E.

5. (FGV/ALE-TO/2024) De uma placa quadrada de madeira, foram recortados e, em seguida, descartados dois pedaços: o primeiro, em forma de um quadrado de lado 12 dm; o outro, em forma de retângulo, tendo comprimento igual a 27 dm. A imagem a seguir ilustra o aspecto da placa após os descortes. Nela, estão indicadas as medidas, em decímetros, de alguns dos segmentos.




O menor lado do retângulo recortado dessa placa mede

- A) 11 dm.
- B) 10 dm.
- C) 9 dm.
- D) 8 dm.
- E) 7 dm.

Comentários:

Vamos esquematizar um pouco sobre o desenho fornecido!



A questão deseja o valor de " x ". Como a placa é quadrada, **os lados são iguais!** Logo, podemos escrever:

$$10 + x + 51 = 68$$

$$x + 61 = 68$$

$$x = 7$$

Logo, o menor lado do retângulo recortado mede 7 dm.

Gabarito: LETRA E.

6. (FGV/PMERJ/2024) Em um novo loteamento, Paulo comprou um lote retangular de 540 metros quadrados medindo 18 metros de frente para a rua. Para a segurança de seu terreno, ele pretende cercá-lo com três voltas de arame farpado, e a loja de materiais vende o arame em rolos de comprimentos múltiplos de 50 metros. Para realizar seu objetivo, o rolo de arame farpado mais econômico que Paulo deve comprar tem:

- A) 200 m;
- B) 250 m;
- C) 300 m;
- D) 350 m;
- E) 400 m.

Comentários:

Inicialmente, devemos encontrar as dimensões do lote retangular de Paulo. Sabemos que **a área é 540 m² e a frente para a rua é 18 m**, então podemos usar a fórmula da área do retângulo:

$$A = ab$$

Substituindo os valores dados, temos:

$$540 = 18b$$

$$b = \frac{540}{18}$$

$$b = 30$$

Portanto, o lote de Paulo tem 18 m de largura e 30 m de comprimento. Agora, para cercar o lote com três voltas de arame farpado, precisamos calcular o perímetro total do retângulo multiplicado por três. O perímetro de um retângulo é dado pela soma dos comprimentos de todos os seus lados, ou seja:

$$P = 2a + 2b$$

Substituindo os valores encontrados, temos:

$$P = 2 \cdot 18 + 2 \cdot 30$$

$$P = 36 + 60$$

$$P = 96$$

O perímetro total do lote é 96 m, então para cercá-lo com três voltas de arame farpado, precisamos de $3 \times 96 = 288$ m de arame. Como a loja de materiais vende o arame em rolos de comprimentos múltiplos de 50 m, devemos escolher o menor múltiplo de 50 que seja maior ou igual a 288. Esse múltiplo é 300, pois $300 / 50 = 6$ e $288 / 50 = 5,76$.

Portanto, o rolo de arame farpado mais econômico que Paulo deve comprar tem 300 m.

Gabarito: LETRA C.

7. (FGV/ALEP-PR/2024) Um retângulo com 24 cm de perímetro tem um dos lados com o triplo do comprimento do outro. A medida da área desse retângulo, é:

- A) 6 cm².
- B) 8 cm².
- C) 27 cm².
- D) 48 cm².

E) 72 cm^2 .

Comentários:

Para resolver o problema, podemos usar as seguintes informações:

- A área do retângulo é dada pelo produto dos lados: $A = ab$.
- O perímetro do retângulo é dado pela soma dos lados: $P = 2a + 2b$.
- Um dos lados do retângulo tem o triplo do comprimento do outro: $a = 3b$.

Substituindo a terceira informação na fórmula da área, temos:

$$A = ab \rightarrow A = (3b)b \rightarrow A = 3b^2$$

Substituindo a terceira informação na fórmula do perímetro, temos:

$$P = 2a + 2b \rightarrow P = 2(3b) + 2b \rightarrow P = 6b + 2b \rightarrow P = 8b$$

Como o perímetro é dado como 24 cm, podemos isolar o valor de b:

$$P = 8b \rightarrow 24 = 8b \rightarrow b = \frac{24}{8} \rightarrow b = 3$$

Agora que sabemos o valor de b, podemos encontrar o valor de a:

$$a = 3b \rightarrow a = 3 \cdot 3 \rightarrow a = 9$$


Com os valores de a e b, podemos calcular a área do retângulo:

$$A = ab \rightarrow A = 9 \cdot 3 \rightarrow A = 27$$

Portanto, a medida da área do retângulo é 27 cm^2 .

Gabarito: LETRA C.

8. (FGV/TCE-BA/2023) Em uma empresa 40% dos funcionários trabalham na sede e os demais, nas filiais. Para representar visualmente essa informação, a empresa fez o infográfico a seguir. A figura mostra duas circunferências concêntricas, sendo que as áreas da região interna e do anel externo são respectivamente proporcionais aos números de funcionários que trabalham na sede e nas filiais. O raio da circunferência interna mede 4 cm.




A medida, em centímetros, do raio da circunferência externa é:

- A) $4\sqrt{2}$
- B) $4\sqrt{3}$
- C) $3\sqrt{5}$
- D) $3\sqrt{6}$
- E) $2\sqrt{10}$

Comentários:

Vamos desenhar novamente as circunferências, destacando algumas informações importantes.



Sabemos que a área do círculo interno é 40% da área total. Com isso, podemos escrever:

$$A_{int} = 0,4A_{total}$$

$$\pi r_i^2 = 0,4\pi r_e^2$$

$$4^2 = 0,4r_e^2$$

$$r_e = \sqrt{40}$$

$$r_e = 2\sqrt{10}$$

Gabarito: LETRA E.

9. (FGV/PREF. SJC/2023) Um triângulo equilátero tem perímetro igual a 36 dm. A área da região interior a esse triângulo mede

- A) $6\sqrt{2}$ dm²
- B) $36\sqrt{2}$ dm²
- C) $36\sqrt{3}$ dm²
- D) $72\sqrt{2}$ dm²
- E) $72\sqrt{3}$ dm²

Comentários:

Um triângulo equilátero é um triângulo com **os três lados iguais**.

Se **o perímetro desse triângulo é 36 dm**, podemos escrever:

$$3L = 36 \rightarrow L = 12 \text{ dm}$$

Pronto. "L" é o lado do nosso triângulo.

Vimos na teoria que a área de um triângulo equilátero pode ser encontrada por:

$$S = \frac{L^2\sqrt{3}}{4}$$

Substituindo "L", ficamos com:

$$S = \frac{12^2\sqrt{3}}{4} \rightarrow S = \frac{144\sqrt{3}}{4} \rightarrow S = 36\sqrt{3}$$


Gabarito: LETRA C.

10. (FGV/TCE-BA/2023) É dado um retângulo ABCD com $AB = 6$ e $BC = 4$. Duas circunferências de mesmo raio estão no interior desse retângulo. Uma é tangente aos lados DA e DC e outra é tangente aos lados BA e BC. A distância entre os centros dessas circunferências é igual a 4. O diâmetro de cada circunferência mede:

- A) $4 - \sqrt{2}$
- B) $4 - \sqrt{3}$
- C) $5 - \sqrt{5}$
- D) $5 - \sqrt{7}$
- E) $6 - \sqrt{10}$

Comentários:

Mais uma vez, vamos desenhar!



O primeiro passo é nos atentar que EGF forma um triângulo retângulo de catetos "x" e "y" e hipotenusa "4". Para determinarmos "x" e "y", devemos observar os lados do retângulo!

$$R + x + R = 4 \quad \rightarrow \quad x = 4 - 2R$$

$$R + y + R = 6 \quad \rightarrow \quad y = 6 - 2R$$

Ora, como estamos procurando o diâmetro das circunferências (D), podemos substituir o "2R" por "D".

$$x = 4 - D$$

$$y = 6 - D$$

Com "x" e "y" em função de "D", podemos aplicar o Teorema de Pitágoras no triângulo EGF e determinar D.

$$(4 - D)^2 + (6 - D)^2 = 4^2$$

$$(16 - 8D + D^2) + (36 - 12D + D^2) = 16$$

$$2D^2 - 20D + 36 = 0$$

$$D^2 - 10D + 18 = 0$$

- Cálculo do Discriminante

$$\Delta = b^2 - 4ac \rightarrow \Delta = (-10)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 18 \rightarrow \Delta = 100 - 72 \rightarrow \Delta = 28$$

- Cálculo das Raízes

$$D = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \rightarrow D = \frac{-(-10) \pm \sqrt{28}}{2 \cdot 1} \rightarrow D = \frac{10 \pm 2\sqrt{7}}{2} \rightarrow D = 5 \pm \sqrt{7}$$

$$D' = 5 + \sqrt{7}$$

$$D'' = 5 - \sqrt{7}$$

Observe que a única raiz contemplada nas alternativas é D'' , portanto, nosso gabarito.

Professor, e D' ?

Galera, D' é um diâmetro maior do que o maior lado do retângulo! Veja:

$$D' = 5 + \sqrt{7} \cong 5 + 2,64 = 7,64$$

Dessa forma, essas circunferências não seriam internas como afirma o enunciado. Elas extrapolariam as dimensões do retângulo, fugindo das condições propostas. Portanto, nossa resposta só pode ser D'' .

Gabarito: LETRA D.

QUESTÕES COMENTADAS - FGV

Geometria Espacial

1. (FGV/PM-SP/2024) Uma caixa tem dimensões internas de 8 cm x 8 cm x 15 cm. A capacidade dessa caixa em litros é

- A) 960.
- B) 96.
- C) 9,6.
- D) 0,96.
- E) 0,096.

Comentários:

Nessa questão, devemos calcular o volume de um paralelepípedo. Para isso, vimos na teoria que devemos multiplicar as dimensões.

$$V = abc \quad \rightarrow \quad V = 8 \cdot 8 \cdot 15 \quad \rightarrow \quad V = 960 \text{ cm}^3$$

Como as alternativas estão em litros, devemos converter esse resultado para litros. Lembre-se que:

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$$

Sendo assim:

$$V = 960 \text{ cm}^3 \cdot \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ cm}^3} \quad \rightarrow \quad V = 0,96 \text{ L}$$

Gabarito: LETRA D.

2. (FGV/ALEP-PR/2024/ADAPTADA) João tem uma piscina na forma de um paralelepípedo reto retângulo, com 250 cm de comprimento, 220 cm de largura e 180 cm de altura. Sabe-se que a cada 1 m³ tem-se 1000 kg de água. Assinale a opção que indica a massa da água na piscina, em quilogramas, se ela estiver totalmente cheia, apenas com esse líquido.

- A) 650,0.
- B) 6500,0.
- C) 9,9.
- D) 990,0.
- E) 9900,0.

Comentários:

Inicialmente, vamos converter as medidas da piscina para metros. Assim, temos que:

$$250 \text{ cm} = 2,5 \text{ m} \qquad 220 \text{ cm} = 2,2 \text{ m} \qquad 180 \text{ cm} = 1,8 \text{ m}$$

O volume da piscina é dado pelo **produto das dimensões** do paralelepípedo reto retângulo, ou seja:

$$V = \text{comprimento} \cdot \text{largura} \cdot \text{altura}$$

$$V = 2,5 \cdot 2,2 \cdot 1,8$$

$$V = 9,9 \text{ m}^3$$

Como **cada metro cúbico de água equivale a 1000 kg**, a massa da água na piscina é:

$$M = \text{densidade} \cdot \text{volume}$$

$$M = 1000 \cdot 9,9$$

$$M = 9900 \text{ kg}$$

Obs.: Na questão original, o enunciado afirmava que em 1 m^3 tinha 1 kg de água. Por ser uma afirmação errada, a questão foi anulada. De todo modo, fiz as adaptações necessárias para que pudéssemos aproveitar a questão.

Gabarito: LETRA E.

3. (FGV/CBM-RJ/2024) Uma panela cilíndrica, como a representada abaixo, possui 30 cm de diâmetro e 20 cm de altura.



O volume dessa panela é de, aproximadamente,

- A) 6 litros.
- B) 9 litros.
- C) 12 litros.
- D) 14 litros.
- E) 18 litros.

Comentários:

Para resolver esse problema, devemos usar a fórmula do volume de um cilindro, que é $V = \pi R^2 H$, onde **R é o raio da base** e **H é a altura**. Como o diâmetro da panela é 30 cm, o raio é metade disso, ou seja, 15 cm. A altura é 20 cm. Substituindo na fórmula, temos:

$$V = \pi \cdot 15^2 \cdot 20$$

$$V = \pi \cdot 225 \cdot 20$$

$$V = 4500\pi$$

O valor aproximado de π é 3,14, então:

$$V = 4500 \cdot 3,14$$

$$V = 14130 \text{ cm}^3$$

Esse é o volume em **centímetros cúbicos**. Para converter em litros, devemos dividir por 1000, pois 1 litro equivale a 1000 cm³. Assim:

$$V = \frac{14130}{1000} \rightarrow V = 14,13 \text{ L}$$

A alternativa que mais se aproxima desse valor é a letra D, 14 litros.


Gabarito: LETRA D.

4. (FGV/TCE-SP/2023) A, B, C e D são os vértices da base de um paralelepípedo reto. A aresta AB mede 8, a aresta BC mede 3 e a aresta vertical CG mede 4. A área do triângulo ABG vale:

- A) 10
- B) 15
- C) 18
- D) 20
- E) 24

Comentários:

Vamos pegar as informações do enunciado e transformá-las em um desenho.



Observe que destaquei de verde o triângulo cuja área procuramos.

Nesse intuito, o primeiro passo é perceber que **BCG forma um triângulo retângulo**. Dessa forma, podemos determinar o lado BG por meio do Teorema de Pitágoras.

$$\overline{BG}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{CG}^2$$

$$\overline{BG}^2 = 3^2 + 4^2$$

$$\overline{BG}^2 = 25$$

$$\overline{BG} = 5$$

Feito isso, perceba que **ABG também forma um triângulo retângulo**. Como temos os dois catetos, $\overline{AB}$ e $\overline{BG}$, podemos calcular a área do triângulo.

$$A_{ABG} = \frac{8 \cdot 5}{4} \quad \rightarrow \quad A_{ABG} = 20$$


Gabarito: LETRA D.

5. (FGV/TCE-SP/2023) Marcelo deseja construir um depósito na forma de um cubo de lado igual a 3 m. Ele dispõe de tijolos de formato cúbico, com arestas iguais a 20 cm. Todas as 6 paredes, incluindo o teto e o chão, deverão ser completamente fechadas. Assim, cada parede terá 20 cm de espessura. O número de tijolos que Marcelo deverá usar é igual a

- A) 1350;
- B) 1242;
- C) 1236;
- D) 1178;
- E) 1170.

Comentários:

Inicialmente, vamos desenhar o depósito e o tijolo.




Como temos dois cubos, sabemos calcular os volumes de cada um (em metros cúbicos).

$$V_{\text{depósito}} = 3^3 \quad \rightarrow \quad V_{\text{depósito}} = 27 \text{ m}^3$$

$$V_{\text{tijolo}} = 0,2^3 \quad \rightarrow \quad V_{\text{depósito}} = 0,008 \text{ m}^3$$

Vamos guardar esses volumes.

Nesse momento, vamos **visualizar "de cima"**, como ficaria essa parede de tijolos do depósito.



Observe que o volume vazio dentro do depósito equivale ao volume de um **cuo de 2,6 metros de aresta**. Dessa forma, também conseguimos calcular esse volume.

$$V_{\text{vazio}} = 2,6^3 \quad \rightarrow \quad V_{\text{vazio}} = 17,576 \text{ m}^3$$

Pronto! Com esse volume, podemos calcular quanto do depósito estará realmente ocupado por tijolos.

$$V_{\text{ocupado}} = V_{\text{depósito}} - V_{\text{vazio}}$$

$$V_{\text{ocupado}} = 27 - 17,576$$

$$V_{\text{ocupado}} = 9,424 \text{ m}^3$$

Para saber quantos tijolos (n) precisamos para ocupar esse volume, fazemos:

$$n = \frac{V_{\text{ocupado}}}{V_{\text{tijolo}}} \rightarrow n = \frac{9,424}{0,008} \rightarrow n = 1178$$


Gabarito: LETRA D.

6. (FGV/MPE-SP/2023) Um recipiente tem forma de paralelepípedo reto-retângulo com arestas medindo 2 dm, 3,5 dm e 4 dm. Em seu interior, há 21 dm^3 de um líquido. Como o prisma é totalmente fechado, não há como ocorrer vazamentos, qualquer que seja a sua posição. Se esse recipiente for colocado sobre uma mesa horizontal, apoiado sobre uma das duas faces de maior área, é certo que o líquido em seu interior corresponderá a uma coluna de altura

- A) 1,5 dm.
- B) 1,8 dm.
- C) 2,5 dm.
- D) 4,0 dm.
- E) 7,0 dm.

Comentários:

Temos um paralelepípedo e vamos apoiá-lo sobre sua maior face, ou seja, a face $3,5 \text{ dm} \times 4 \text{ dm}$.



Para encontrar "H", devemos usar a fórmula do volume, considerando que $V = 21 \text{ dm}^3$.

$$V = abc$$

$$21 = 4 \cdot 3,5 \cdot H \rightarrow 21 = 14H \rightarrow H = 1,5 \text{ dm}$$

Gabarito: LETRA A.

7. (FGV/TCE-SP/2023) Um cilindro e um cone têm o mesmo volume. O cilindro tem 60 cm de altura e o raio da base do cone é o dobro do raio da base do cilindro. A altura do cone mede:

- A) 15 cm
- B) 30 cm
- C) 45 cm
- D) 60 cm
- E) 75 cm

Comentários:

Usando as informações dadas, vamos desenhar o cone e o cilindro.



Como os dois volumes são iguais, podemos escrever:

$$V_{cone} = V_{cilindro}$$

$$\frac{A_{b,cone} \cdot h}{3} = A_{b,cilindro} \cdot 60$$


$$\frac{\pi(2r)^2 h}{3} = 60\pi r^2$$

$$\frac{4h}{3} = 60$$

$$h = 45 \text{ cm}$$

Gabarito: LETRA C.

8. (FGV/PREF. SP/2023) A figura abaixo é a planificação de um sólido geométrico, formada por polígonos regulares; o perímetro da planificação mede 48 cm.




O volume do sólido geométrico formado é então igual a

- A) $18\sqrt{2} \text{ cm}^3$
- B) 27 cm^3
- C) 36 cm^3
- D) $3\sqrt{2} \text{ cm}^3$
- E) $36\sqrt{2} \text{ cm}^3$

Comentários:

O primeiro passo é ter atenção ao enunciado. Ele fala que a planificação é formada por polígonos regulares. Sendo assim, os triângulos são equiláteros e quadrilátero central é um quadrado. Dito isso, todas as arestas medem "L".



De acordo com a questão, o **perímetro da planificação mede 48 cm**. Sendo assim:

$$L + L + L + L + L + L + L + L = 48 \rightarrow 8L = 48 \rightarrow L = 6 \text{ cm}$$


Nesse momento, perceba que temos uma planificação de uma **pirâmide de base quadrada**. Portanto, para calcular seu volume, precisaremos usar:

$$V = \frac{A_b H}{3}$$

A área da base é a área do quadrado, ou seja:

$$A_b = L^2 \rightarrow A_b = 6^2 \rightarrow A_b = 36 \text{ cm}^2$$

Por fim, precisaremos da altura dessa pirâmide também! Vamos colocá-la no seu formato original.



Para encontrar H, será preciso encontrar "x" primeiro. Ora, "x" é metade da diagonal da base, ou seja:

$$x = \frac{6\sqrt{2}}{2} \rightarrow x = 3\sqrt{2} \text{ cm}$$

Com "x", podemos aplicar o **Teorema de Pitágoras** no triângulo destacado e encontrar "H".

$$6^2 = H^2 + (3\sqrt{2})^2 \rightarrow 36 = H^2 + 18 \rightarrow H^2 = 18 \rightarrow H = 3\sqrt{2} \text{ cm}$$

Pronto! Temos tudo para a **fórmula do volume**.

$$V = \frac{A_b H}{3} \rightarrow V = \frac{36 \cdot 3\sqrt{2}}{3} \rightarrow V = 36\sqrt{2} \text{ cm}^3$$

Gabarito: LETRA E.

9. (FGV/SSP-AM/2022) Uma pirâmide de base retangular tem volume igual a 36. As arestas da base da pirâmide são então duplicadas e a altura, triplicada. O volume da nova pirâmide é

- A) 108.
- B) 216.
- C) 324.
- D) 396.
- E) 432.

Comentários:

Vamos desenhar uma pirâmide de altura "H" e arestas da base "a" e "b".



O volume dessa pirâmide é igual a 36. Sendo assim, podemos escrever que:

$$V = \frac{A_b H}{3} \rightarrow \frac{abH}{3} = 36 \rightarrow abH = 108 \quad (1)$$

Quando as arestas são duplicadas e a altura triplicada, a nova pirâmide passa a ter o seguinte volume:


$$V' = \frac{(2a)(2b)(3H)}{3} \rightarrow V' = 4abH \quad (2)$$

Usando (1) em (2), conseguimos obter o volume da nova pirâmide.

$$V' = 4 \cdot 108 \rightarrow V' = 432$$

Gabarito: LETRA E.

10. (FGV/SEAD-AP/2022) Considere a pirâmide quadrangular regular cuja planificação está abaixo.



Cada face lateral é um triângulo cujos lados medem 8 cm, 9 cm e 9 cm. O volume dessa pirâmide em cm^3 é, aproximadamente,

- a) 150.
- b) 180.
- c) 260.
- d) 320.
- e) 450.


Comentários:

O primeiro passo é relembrar a fórmula do volume de uma pirâmide: $V = \frac{A_b H}{3}$

" A_b " representa a área da base e "H" representa a altura do pirâmide. Note que a base dessa pirâmide é um quadrado de lado igual a 8. Sendo assim, sua área é:


$$A_b = 8^2 \rightarrow A_b = 64 \text{ cm}^2$$

Pronto! Já encontramos a base. Agora, precisamos determinar a altura da pirâmide. É nesse ponto que precisaremos de um pouco mais de atenção. Observe o desenho.



Observe o triângulo retângulo destacado em amarelo. É dele que tiraremos a altura H.

Antes disso, é importante que você perceba que "x" é metade da diagonal do quadrado da base. Ora, lembre-se que para encontrar a diagonal de um quadrado, nós fazemos o seguinte:




Observe que a diagonal (d) do quadrado é a hipotenusa do triângulo retângulo destacado em roxo. "L" é o lado do quadrado. Com isso, podemos usar o teorema de Pitágoras.

$$d^2 = L^2 + L^2 \rightarrow d^2 = 2L^2 \rightarrow d = L\sqrt{2}$$

Como o quadrado da base da pirâmide tem lado igual a **8 cm**, podemos substituir:

$$d = 8\sqrt{2}$$

No entanto, observe novamente a figura:



Antes de determinar o "H", queremos o "x". O "x" é metade da diagonal do quadrado, ou seja:

$$x = \frac{8\sqrt{2}}{2} \rightarrow x = 4\sqrt{2}$$

Pronto, temos um cateto e a hipotenusa do triângulo retângulo em amarelo. Podemos usar o teorema de Pitágoras para determinar H.

$$9^2 = H^2 + (4\sqrt{2})^2$$

$$81 = H^2 + 32 \rightarrow H^2 = 49 \rightarrow H = 7$$


Pronto! Com a área da base e **a altura**, conseguimos calcular o volume dessa pirâmide.

$$V = \frac{64 \cdot 7}{3} \rightarrow V = \frac{448}{3} \rightarrow V = 149,33 \text{ cm}^3$$

Observe que a alternativa que **mais se aproxima** desse valor é a **A**.

Gabarito: LETRA A.

11. (FGV/MPE-SP/2023) A figura a seguir ilustra um sólido obtido a partir de um paralelepípedo reto-retângulo maciço, com arestas medindo 6 dm, 7 dm e 12 dm, do qual foi recortado e removido um outro paralelepípedo reto-retângulo de base quadrada e cujas arestas são paralelas às arestas do sólido original.



O volume desse sólido é

- A) 432 dm³.
- B) 456 dm³.
- C) 465 dm³.
- D) 484 dm³.
- E) 504 dm³.

Comentários:

A estratégia para resolver essa questão será a seguinte: calcularemos o volume do paralelepípedo maior e do paralelepípedo que foi removido. O volume do sólido resultante será a subtração desses dois volumes.

Como o paralelepípedo maior possui arestas 7 dm, 12 dm e 6 dm, seu volume é:

$$V_M = abc \rightarrow V_M = 7 \cdot 12 \cdot 6 \rightarrow V_M = 504 \text{ dm}^3$$

Como o paralelepípedo que foi removido tem base quadrada, suas arestas são: 2 dm , 2 dm e 12 dm .

$$V_m = abc \quad \rightarrow \quad V_m = 2 \cdot 2 \cdot 12 \quad \rightarrow \quad V_m = 48\text{ dm}^3$$

Pronto! O volume do sólido resultante é:

$$V = V_M - V_m$$

$$V = 504 - 48$$

$$V = 456\text{ dm}^3$$

Gabarito: LETRA B.

12. (FGV/IBGE/2022) Uma caixa com o formato de um paralelepípedo tem dimensões iguais a 25 cm , 36 cm e 20 cm . A capacidade volumétrica dessa caixa, em litros, é

- A) 1,8.
- B) 18.
- C) 180.
- D) 1800.
- E) 18000.

Comentários:

Aqui, precisamos calcular o volume dessa caixa. Vimos que o volume de um paralelepípedo é o produto de suas dimensões.

$$V = abc \quad \rightarrow \quad V = 25 \cdot 36 \cdot 20 \quad \rightarrow \quad V = 18.000\text{ cm}^3$$

Muito cuidado! O resultado que encontramos está em cm^3 . A questão pede o resultado em litros. Nessa parte da questão, você teria que lembrar que $1\text{ cm}^3 = 1\text{ mL}$. Dessa forma, podemos escrever:

$$V = 18.000\text{ mL}$$

Para converter de mililitro (mL) para litros (L), devemos **dividir o resultado por 1.000**.

$$V = \frac{18.000}{1.000} \quad \rightarrow \quad V = 18\text{ L}$$

Gabarito: LETRA B.

13. (FGV/TJ-TO/2022) Um prisma possui 13 faces. O número de arestas desse prisma é:

- A) 27.
- B) 30.
- C) 33.
- D) 36.

Comentários:

O primeiro passo é lembrar que **o prisma tem 2 bases!** Sendo assim, dessas 13 faces que a questão comenta, **11 serão faces laterais e 2 serão bases**. Ademais, em um prisma, todas as faces laterais são quadrangulares e, como temos 11 faces laterais, as bases serão undecágonos (polígonos com 11 lados). Resumindo:

Faces	Arestas
11 faces quadrangulares	4 arestas em cada face
2 faces (bases) undecagonais	11 arestas em cada base

Lembre-se sempre que **uma aresta é "compartilhada" por duas faces**. Logo, após contabilizarmos as arestas, devemos **dividir o resultado por dois**, para excluir as duplicidades.

$$A = \frac{11 \cdot 4 + 2 \cdot 11}{2} \rightarrow A = \frac{66}{2} \rightarrow A = 33$$

Gabarito: LETRA C.

14. (FGV/PM-CE/2021) O raio de uma esfera aumentou $\frac{1}{3}$ de seu valor. Sendo V o volume inicial da esfera, é correto afirmar que o novo volume

- A) é menor do que V .
- B) está entre V e $(\frac{4}{3})V$.
- C) está entre $(\frac{4}{3})V$ e $2V$.
- D) está entre $2V$ e $3V$.
- E) é maior que $3V$.

Comentários:

Considere uma esfera de raio R . O volume dessa esfera é dado por:

$$V = \frac{4\pi R^3}{3}$$

Se o raio dessa esfera aumenta de $\frac{1}{3}$, então seu novo raio é:

$$R' = R + \frac{R}{3} \rightarrow R' = \frac{4R}{3}$$

O volume dessa nova esfera é dado por:

$$V' = \frac{4\pi R'^3}{3}$$

Substituindo R' :

$$V' = \frac{4\pi}{3} \left(\frac{4R}{3} \right)^3 \rightarrow V' = \left(\frac{64}{27} \right) \cdot \frac{4\pi R^3}{3} \rightarrow V' = 2,37 \cdot V$$

Note então que o novo volume está entre $2V$ e $3V$.

Gabarito: LETRA D

15. (FGV/PREF. PAULÍNIA/2021) Um recipiente cônico invertido, com altura 27cm e raio da base 24cm, está cheio de água. A água é, então, totalmente transferida para um recipiente cilíndrico com raio da base 18cm e altura suficiente para conter, com sobras, toda a água. A altura, em centímetros, que a água atinge no cilindro é

- A) 9.
- B) 12.
- C) 16.
- D) 18.
- E) 24.

Comentários:

Opa! O primeiro passo aqui é calcular o volume do cone. Temos a altura ($H = 27$ cm) e o raio ($R = 24$ cm).

Lembre-se da fórmula:

$$V = \frac{\pi R^2 H}{3}$$

Vamos substituir os valores.

$$V = \frac{\pi \cdot 24^2 \cdot 27}{3} \rightarrow V = 5.184\pi \text{ cm}^3$$

Esse volume vai totalmente para o cilindro! O volume de um cilindro é dado por:

$$V = \pi R^2 H$$

Dessa vez, temos o volume (V) e o raio da base (R = 18 cm). Com isso, conseguimos determinar H.


$$5.184\pi = \pi \cdot 18^2 \cdot H \quad \rightarrow \quad H = \frac{5.184}{324} \quad \rightarrow \quad H = 16 \text{ cm}$$

Gabarito: LETRA C.

LISTA DE QUESTÕES - FGV

Geometria Plana

1. (FGV/CBM-RJ/2024) A figura a seguir mostra o triângulo equilátero ABC, um ponto M do lado CA e um ponto N do lado CB.




São dadas as medidas: $MA = 2$, $AB = 10$ e $BN = 4$. A medida do segmento MN é

- A) $2\sqrt{10}$.
B) $4\sqrt{3}$.
C) $2\sqrt{13}$.
D) $2\sqrt{15}$.
E) $5\sqrt{2}$.
2. (FGV/PM-SP/2024) Um terreno tem a forma de um quadrilátero ABCD em que os ângulos de vértices A e D são retos. São dadas as medidas de três lados: $AB = 30$ m, $BC = 20$ m e $CD = 18$ m. A área desse terreno em metros quadrados é igual a
- A) 360.
B) 384.
C) 418.
D) 436.
E) 460.
3. (FGV/CBM-RJ/2024) Uma parede retangular de 5,2 m de comprimento por 2,4 m de altura deve ser coberta com azulejos quadrados de 20 cm de lado. O número de azulejos necessários para cobrir inteiramente essa parede é igual a
- A) 286.
B) 312.
C) 324.
D) 338.
E) 350.
4. (FGV/CBM-RJ/2024) Em um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 39 cm, a tangente de um dos ângulos agudos é $\frac{5}{12}$. A soma das medidas dos catetos desse triângulo é igual a:

- A) 13 cm.
- B) 17 cm.
- C) 34 cm.
- D) 43 cm.
- E) 51 cm.

5. (FGV/ALE-TO/2024) De uma placa quadrada de madeira, foram recortados e, em seguida, descartados dois pedaços: o primeiro, em forma de um quadrado de lado 12 dm; o outro, em forma de retângulo, tendo comprimento igual a 27 dm. A imagem a seguir ilustra o aspecto da placa após os descortes. Nela, estão indicadas as medidas, em decímetros, de alguns dos segmentos.



O menor lado do retângulo recortado dessa placa mede

- A) 11 dm.
- B) 10 dm.
- C) 9 dm.
- D) 8 dm.
- E) 7 dm.


6. (FGV/PMERJ/2024) Em um novo loteamento, Paulo comprou um lote retangular de 540 metros quadrados medindo 18 metros de frente para a rua. Para a segurança de seu terreno, ele pretende cercá-lo com três voltas de arame farpado, e a loja de materiais vende o arame em rolos de comprimentos múltiplos de 50 metros. Para realizar seu objetivo, o rolo de arame farpado mais econômico que Paulo deve comprar tem:

- A) 200 m;
- B) 250 m;
- C) 300 m;
- D) 350 m;
- E) 400 m.

7. (FGV/ALEP-PR/2024) Um retângulo com 24 cm de perímetro tem um dos lados com o triplo do comprimento do outro. A medida da área desse retângulo, é:

- A) 6 cm².
- B) 8 cm².
- C) 27 cm².
- D) 48 cm².
- E) 72 cm².

8. (FGV/TCE-BA/2023) Em uma empresa 40% dos funcionários trabalham na sede e os demais, nas filiais. Para representar visualmente essa informação, a empresa fez o infográfico a seguir. A figura mostra duas circunferências concêntricas, sendo que as áreas da região interna e do anel externo são respectivamente proporcionais aos números de funcionários que trabalham na sede e nas filiais. O raio da circunferência interna mede 4 cm.



A medida, em centímetros, do raio da circunferência externa é:

- A) $4\sqrt{2}$
- B) $4\sqrt{3}$
- C) $3\sqrt{5}$
- D) $3\sqrt{6}$
- E) $2\sqrt{10}$

9. (FGV/PREF. SJC/2023) Um triângulo equilátero tem perímetro igual a 36 dm. A área da região interior a esse triângulo mede

- A) $6\sqrt{2}$ dm²
- B) $36\sqrt{2}$ dm²
- C) $36\sqrt{3}$ dm²
- D) $72\sqrt{2}$ dm²
- E) $72\sqrt{3}$ dm²

10. (FGV/TCE-BA/2023) É dado um retângulo ABCD com $AB = 6$ e $BC = 4$. Duas circunferências de mesmo raio estão no interior desse retângulo. Uma é tangente aos lados DA e DC e outra é tangente aos lados BA e BC. A distância entre os centros dessas circunferências é igual a 4. O diâmetro de cada circunferência mede:

- A) $4 - \sqrt{2}$
- B) $4 - \sqrt{3}$
- C) $5 - \sqrt{5}$
- D) $5 - \sqrt{7}$
- E) $6 - \sqrt{10}$

GABARITO

- | | |
|------------|-------------|
| 1. LETRA C | 6. LETRA C |
| 2. LETRA B | 7. LETRA C |
| 3. LETRA B | 8. LETRA E |
| 4. LETRA E | 9. LETRA C |
| 5. LETRA E | 10. LETRA D |

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.