

EXEMPLO 6 Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} x \cotg x$.**SOLUÇÃO** Aqui, dividimos o numerador e o denominador por x :

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} x \cotg x &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x}{\sin x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{\frac{\sin x}{x}} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \cos x}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}} \\
 &= \frac{\cos 0}{1} \quad (\text{pela continuidade do cosseno e pela Equação 2}) \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

3.3 Exercícios

1–16 Derive.

- ✓ 1. $f(x) = x^2 \sin x$
- ✓ 3. $f(x) = e^x \cos x$
- ✓ 5. $g(t) = t^3 \cos t$
- ✓ 7. $h(\theta) = \operatorname{cosec} \theta + e^\theta \cotg \theta$
- ✓ 9. $y = \frac{x}{2 - \tg x}$
- ✓ 11. $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}$
- ✓ 13. $y = \frac{t \sin t}{1 + t}$
- ✓ 15. $f(\theta) = \theta \cos \theta \sin \theta$
2. $f(x) = x \cos x + 2 \tg x$
4. $y = 2 \sec x - \operatorname{cosec} x$
6. $g(t) = 4 \sec t + \tg t$
8. $y = e^u (\cos u + cu)$
10. $y = \sin \theta \cos \theta$
12. $y = \frac{\cos x}{1 - \sin x}$
14. $y = \frac{\sin t}{1 + \tg t}$
16. $f(t) = te^t \cotg t$

✓ 17. Demonstre que $\frac{d}{dx} (\operatorname{cosec} x) = -\operatorname{cosec} x \cotg x$.

18. Demonstre que $\frac{d}{dx} (\sec x) = \sec x \tg x$.

✓ 19. Demonstre que $\frac{d}{dx} (\cotg x) = -\operatorname{cosec}^2 x$.

✓ 20. Demonstre, pela definição de derivada, que se $f(x) = \cos x$, então $f'(x) = -\sin x$.

21–24 Encontre uma equação da reta tangente à curva no ponto dado.

- ✓ 21. $y = \sin x + \cos x$, $(0, 1)$
- ✓ 22. $y = e^x \cos x$, $(0, 1)$
- ✓ 23. $y = \cos x - \sin x$, $(\pi, -1)$
- ✓ 24. $y = x + \tg x$, (π, π)

✓ 25. (a) Encontre uma equação da reta tangente à curva $y = 2x \sin x$ no ponto $(\pi/2, \pi)$.

✎ (b) Ilustre a parte (a) fazendo o gráfico da curva e da tangente na mesma tela.

26. (a) Encontre uma equação da reta tangente à curva $y = 3x + 6 \cos x$ no ponto $(\pi/3, \pi + 3)$.

✎ (b) Ilustre a parte (a) fazendo o gráfico da curva e da tangente na mesma tela.

✓ 27. (a) Se $f(x) = \sec x - x$, encontre $f'(x)$.

✎ (b) Verifique se sua resposta para a parte (a) é razoável fazendo os gráficos de f e f' para $|x| < \pi/2$.

28. (a) Se $f(x) = e^x \cos x$, encontre $f'(x)$ e $f''(x)$.

✎ (b) Verifique se suas respostas para a parte (a) são razoáveis fazendo os gráficos de f , f' e f'' .

✓ 29. Se $H(\theta) = \theta \sin \theta$, encontre $H'(\theta)$ e $H''(\theta)$.

30. Se $f(t) = \sec t$, encontre $f''(\pi/4)$.

✓ 31. (a) Use a Regra do Quociente para derivar a função

$$f(x) = \frac{\tg x - 1}{\sec x}.$$

(b) Simplifique a expressão para $f(x)$ escrevendo-a em termos de $\sin x$ e $\cos x$ e, então, encontre $f'(x)$.

(c) Mostre que suas respostas para as partes (a) e (b) são equivalentes.

32. Suponha $f(\pi/3) = 4$ e $f'(\pi/3) = -2$, e faça $g(x) = f(x) \sin x$ e $h(x) = (\cos x)/f(x)$. Encontre

(a) $g'(\pi/3)$

(b) $h'(\pi/3)$

33–34 Para quais valores de x o gráfico f tem uma reta tangente horizontal?


✓ 33. $f(x) = x + 2 \sin x$

34. $f(x) = e^x \cos x$

✓ 35. Um corpo em uma mola vibra horizontalmente sobre uma superfície lisa (veja a figura). Sua equação de movimento é $x(t) = 8 \sin t$, onde t está em segundos e x , em centímetros.

(a) Encontre a velocidade e a aceleração no tempo t .

(b) Encontre a posição, velocidade e aceleração do corpo no instante $t = 2\pi/3$. Em que direção ele está se movendo nesse momento?



36. Uma tira elástica é presa a um gancho e uma massa é presa na ponta inferior da tira. Quando o corpo é puxado para baixo e então solto, ele vibra verticalmente. A equação do movimento é $s = 2 \cos t + 3 \sin t$, $t \geq 0$, onde s é medido em centímetros e t , em segundos. (Consideremos o sentido positivo como para baixo.)
- (a) Encontre a velocidade e a aceleração no instante t .
- (b) Faça os gráficos das funções velocidade e aceleração.
- (c) Quando o corpo passa pela posição de equilíbrio pela primeira vez?
- (d) A que distância da posição de equilíbrio o corpo chega?
- (e) Quando a velocidade é máxima?
37. Uma escada com 6 m de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Seja θ o ângulo entre o topo da escada e a parede e seja x , a distância do pé da escada até a parede. Se o pé da escada escorregar para longe da parede, quão rápido x varia em relação a θ quando $\theta = \pi/3$?
38. Um objeto de massa m é arrastado ao longo de um plano horizontal por uma força agindo ao longo de uma corda atada ao objeto. Se a corda faz um ângulo θ com o plano, então a intensidade da força é

$$F = \frac{\mu mg}{\mu \sin \theta + \cos \theta}$$

onde μ é uma constante chamada *coeficiente de atrito*.

(a) Encontre a taxa de variação de F em relação a θ .

(b) Quando essa taxa de variação é igual a 0?

39. Se $m = 20$ kg, $g = 9,8$ m/s² e $\mu = 0,6$, faça o gráfico de F como uma função de θ e use-o para encontrar o valor de θ para o qual $dF/d\theta = 0$. Esse valor é consistente com a resposta dada na parte (b)?

39–50 Encontre o limite

39. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{3x}$

40. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sin \pi x}$

41. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan 6t}{\sin 2t}$

42. $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{\sin \theta}$

43. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{5x^3 - 4x}$

44. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x \sin 5x}{x^2}$

45. $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta + \tan \theta}$

46. $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{cosec} x \sin(\sin x)$

47. $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{2\theta^2}$

48. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{x}$

49. $\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{1 - \tan x}{\sin x - \cos x}$

50. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x-1)}{x^2 + x - 2}$

51–52 Encontre a derivada dada, encontrando as primeiras derivadas e observando o padrão que ocorre.

51. $\frac{d^{99}}{dx^{99}}(\sin x)$

52. $\frac{d^{35}}{dx^{35}}(x \sin x)$

53. Encontre constantes A e B de forma que a função $y = A \sin x + B \cos x$ satisfaça a equação diferencial $y'' + y' - 2y = \sin x$.

54. (a) Avalie $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x}$.

(b) Avalie $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}$.

- (c) Ilustre as partes (a) e (b) fazendo o gráfico de $y = x \sin(1/x)$.


55. Derive cada identidade trigonométrica para obter uma nova identidade (ou uma familiar).

(a) $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ (b) $\sec x = \frac{1}{\cos x}$

(c) $\sin x + \cos x = \frac{1 + \cot x}{\operatorname{cosec} x}$


56. Um semicírculo com diâmetro PQ está sobre um triângulo isósceles PQR para formar uma região com um formato de sorvete, conforme mostra a figura. Se $A(\theta)$ é a área do semicírculo e $B(\theta)$ é a área do triângulo, encontre

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{A(\theta)}{B(\theta)}$$



57. A figura mostra um arco de círculo com comprimento s e uma corda com comprimento d , ambos subtendidos por um ângulo central θ . Encontre

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{s}{d}$$



58. Seja $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1 - \cos 2x}}$.

(a) Faça o gráfico de f . Que tipo de descontinuidade parece ocorrer em 0?

(b) Calcule os limites laterais de f em 0. Esses valores confirmam sua resposta para a parte (a)?