


LÓGICA OPERATIVA

Criterios AGS Beers B01-B23 en SIGRAM

Qué evalúa cada código, qué datos necesita y cuál es la respuesta actual del sistema.

Regla general. Un Bxx se considera solo si un medicamento del paciente está vinculado a ese código en el catálogo. Para la aplicación canónica de AGS Beers, el paciente debe tener 65 años o más.

Flujo de evaluación



B01-B12

Código	Qué evalúa	Respuesta actual de SIGRAM
B01	Benzodiacepinas y sus excepciones clínicas.	Revisión clínica: se debe conocer indicación, duración y justificación; no se alerta automáticamente.
B02	Relajantes musculares esqueléticos, incluida orfenadrina.	Activado al detectar el medicamento del catálogo; recomendación AGS: evitar.
B03	Propiedad anticolinérgica fuerte (Tabla 7).	Clasificación de apoyo, no alerta. Sirve como insumo para B13, B14 y B18.
B04	IBP: duración e indicación de mantenimiento.	Activado si supera 8 semanas sin indicación documentada. Si faltan datos: requiere información.
B05	AINE crónico o AINE con factores de alto riesgo GI.	Requiere duración, gastroprotección y alternativas ineficaces. Se activa si hay AINE >90 días o combinación de riesgo sin excepción completa.
B06	AINE en insuficiencia cardíaca.	Sin IC: no aplicable. IC sin estado: requiere información. Asintomática: precaución. Sintomática: evitar.
B07	AINE/AAS con antecedente de úlcera.	Requiere antecedente y gastroprotección. Se activa si no se documenta excepción clínica completa.
B08	AINE con CrCl <30 mL/min.	Con AINE + CrCl <30: activado. Sin CrCl: requiere información. TFGe no reemplaza CrCl automáticamente.
B09	Aspirina para prevención primaria frente a	Requiere conocer finalidad preventiva; permanece en revisión clínica.

Código	Qué evalúa	Respuesta actual de SIGRAM
	secundaria.	
B10	Sulfonilureas: línea terapéutica, barreras y tipo de fármaco.	Revisión clínica; no se automatiza por falta de información terapéutica suficiente.
B11	Diuréticos/tramadol y SIADH o hiponatremia.	Revisión clínica; exige sodio y contexto de inicio o cambio de dosis. Recomendación: precaución.
B12	Fármacos de riesgo en delirium.	Con delirium/riesgo documentado, queda en revisión clínica para valorar indicación y excepciones.

B13-B23

Código	Qué evalúa	Respuesta actual de SIGRAM
B13	Anticolinérgicos fuertes o benzodiazepinas en demencia/deterioro cognitivo.	Revisión clínica si se documenta el contexto; B03 aporta la clasificación anticolinérgica.
B14	Fármacos de riesgo en antecedente de caídas o fracturas.	Revisión clínica; requiere antecedente y consideración de excepciones terapéuticas.
B15	Opioide + benzodiazepina.	Activado si ambas clases están activas. Se evita el falso positivo de interpretar “no opioide” como opioide.
B16	Opioide + gabapentina o pregabalina.	Activado si coexisten; reconoce la excepción de transición o reducción de opioides documentada.
B17	Tres o más fármacos activos sobre SNC.	Activado con 3+ de las clases Beers definidas; con 1-2 medicamentos: sin hallazgo. Expone los fármacos contados.
B18	Dos o más anticolinérgicos fuertes.	Activado solo con 2+ medicamentos clasificados por B03. Uno solo no activa B18.
B19	Gabapentina con CrCl <60 mL/min.	Activado y recomienda reducir dosis. Sin CrCl: requiere información.
B20	Tramadol con CrCl <30 mL/min y formulación.	Inmediata: reducir dosis. Prolongada: evitar. Sin CrCl o formulación: requiere información.
B21	Combinaciones SRA en ERC estadio 3a+.	Activado con ERC 3a+ confirmada más doble SRA, o SRA + amilorida/triamtereno.
B22	Litio con IECA, ARA-II o ARNI.	Revisión clínica: requiere interpretar riesgo, concentraciones de litio y monitorización.
B23	Tamsulosina con síncope/hipotensión ortostática.	Revisión clínica manual; no se presenta como “evitar” automático por evidencia limitada.

Resumen por tipo de respuesta

- Automatizados con datos objetivos: B02, B04-B08 y B15-B21, con las condiciones y excepciones descritas.
- Clasificación de apoyo: B03. Identifica una propiedad farmacológica, no un problema clínico independiente.

- Revisión clínica deliberada: B01, B09-B14, B22 y B23. Son importantes, pero la información actual no permite una decisión automática segura.

Nota de alcance

SIGRAM-AM es un sistema de tamizaje y apoyo a la revisión profesional. Un resultado Beers no constituye por sí mismo una orden de suspensión, prescripción o ajuste terapéutico.