





4. TAUTOLOGIA, CONTRADIÇÃO e CONTINGÊNCIA

4.1. TAUTOLOGIA

Uma Tautologia (ou proposições logicamente verdadeira) é toda proposição composta que é verdadeira, quaisquer que sejam os valores lógicos de suas proposições componentes, ou seja, uma proposição cuja tabela da verdade contém somente **V**ez na coluna principal, isto é, cuja última coluna da sua tabela da verdade encerra-se somente com a letra **V**(verdade).

Exemplos:

(1) A proposição " \neg (p $\land \neg$ p)" (Princípio da não contradição, ou seja, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo) é tautológica, conforme se vê pela sua tabela da verdade:

р	¬р	p ∧ ¬ p	¬(p ∧ ¬p)
V	F	F	V
F	V	F	V

Portanto, dizer que uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa é sempre verdadeiro.

(2) A proposição "p ∨ ¬p" (Princípio do terceiro excluído, ou seja, toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, isto é, verifica-se sempre um destes casos e nunca um terceiro) é tautológica, como imediatamente se vê pela sua tabela da verdade:

р	¬р	p∨¬p
V	F	V
F	V	٧

Portanto, dizer que uma proposição ou é verdadeira ou é falsa é sempre verdadeiro.

Exemplos de proposições compostas que são tautológicas:

(1)
$$P(p,q) = p \vee \neg (p \wedge q)$$

р	q	p∧q	¬(p ∧ q)	p ∨ ¬(p ∧ q)
V	V	V	F	V
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	V	V







(2)
$$P(p,q) = p \wedge q \rightarrow (p \leftrightarrow q)$$

р	q	p∧q	$p \leftrightarrow q$	$p \wedge q \to (p \leftrightarrow q)$
V	٧	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	F	F	V
F	F	F	V	V

(3)
$$P(p,q,r) = [(p \rightarrow q) \rightarrow r] \rightarrow [p \rightarrow (q \rightarrow r)]$$

р	q	r	[(p	\rightarrow	q)	\rightarrow	r]	\rightarrow	[p	\rightarrow	(q	\rightarrow	r)]
٧	٧	V	7	٧	V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	F	٧	V	F	V	F	F
V	F	٧	V	F	F	V	V	٧	V	V	F	V	V
V	F	F	V	F	F	V	F	٧	V	V	F	V	F
F	٧	V	H	٧	V	V	V	V	F	V	V	V	V
F	>	F	F	٧	>	F	F	٧	F	V	V	F	F
F	F	>	F	٧	F	>	>	٧	F	V	F	V	V
F	F	F	F	V	F	F	F	٧	F	V	F	V	F
			1	2	1	3	1	4	1	3	1	2	1

4.2. CONTRADIÇÃO

Uma Contradição (ou proposições logicamente falsas) é toda proposição composta que é falsa, quaisquer que sejam os valores lógicos de suas proposições componentes, ou seja, uma proposição cuja tabela da verdade contém somente **F**'s na coluna principal, isto é, cuja última coluna da sua tabela da verdade encerra-se somente com a letra **F**(falsidade).

Como uma Tautologia é sempre verdadeira(V), a negação de uma Tautologia é sempre falsa(F), ou seja, é uma Contradição, e vice-versa.

Portanto, P(p,q,r,...) é uma Tautologia se e somente se $\neg P(p,q,r,...)$ é uma Contradição, e P(p,q,r,...) é uma Contradição se e somente se $\neg P(p,q,r,...)$ é uma Tautologia.

Exemplos de proposições compostas que são Contradições:

(1)
$$P(p) = p \land \neg p$$

р	¬р	p ∧ ¬ p
V	F	F
F	V	F







Portanto, dizer que uma proposição pode ser simultaneamente verdadeira e falsa é sempre falso.

(2)
$$P(p) = p \leftrightarrow \neg p$$

р	Г	p ↔ ¬ p
٧	F	F
F	V	F

(3)
$$P(p,q) = (p \wedge q) \wedge \neg (p \vee q)$$

р	q	p∧q	p v q	¬(p ∨ q)	$(p \land q) \land \neg (p \lor q)$
V	V	V	V	F	F
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	F	F
F	F	F	F	V	F

(4)
$$P(p,q) = \neg p \land (p \land \neg q)$$

р	q	Γр	¬q	p∧¬q	¬p ∧ (p ∧ ¬q)
V	٧	F	F	F	F
V	F	F	V	V	F
F	V	V	F	F	F
F	F	٧	٧	F	F

4.3. CONTINGÊNCIA

Uma Contingência (ou proposições indeterminadas) é toda proposição composta cuja na última coluna da sua tabela da verdade figuram as letras V e F cada uma pelo menos uma vez, isto é, é toda proposição composta que não é Tautologia e nem Contradição.

Exemplos de proposições compostas que são Contingências:

(1)
$$P(p) = p \rightarrow \neg p$$

р	¬р	$\mathbf{p} \rightarrow \neg \mathbf{p}$
V	F	F
F	V	V

(2)
$$P(p,q) = p \vee q \rightarrow p$$

Р	q	p ∨ q	$p \lor q \to p$
٧	V	V	V







V	F	V	V
F	V	V	F
F	F	F	V

(3)
$$P(x = 3, x = y) = x = 3 \land (x \# y \rightarrow x \# 3)$$

x = 3	x = y	x # 3	x # y	x # y → x # 3	$x = 3 \wedge (x \# y \rightarrow x \# 3)$
V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	F
F	F	V	V	V	F

EXERCÍCIOS (valendo pontos para a avaliação/prova)

1. Determinar quais das seguintes proposições são Tautológicas, Contradições, ou Contingentes:

a)
$$p \rightarrow (\neg p \rightarrow q)$$

b)
$$\neg p \lor q \rightarrow (p \rightarrow q)$$

c)
$$b \rightarrow [d \rightarrow (d \rightarrow b)]$$

d)
$$[(p \rightarrow q) \leftrightarrow q] \rightarrow p$$

e)
$$p \vee \neg q \rightarrow (p \rightarrow \neg q)$$

f)
$$\neg p \lor \neg q \to (p \to q)$$

g) $p \to (p \lor q) \lor r$

h)
$$p \land q \rightarrow (p \leftrightarrow q \lor r)$$