

Esercitazione a casa sul cap. 3 di EAM 2 del 21 dicembre 2022

Studente.....*Alfonso*  
Numero di matricola.....*10000 25452*

PARTE A (TEORIA)

1. Enunciare e dimostrare la prima formula di integrazione indefinita per sostituzione

2. Nel seguito  $f, g$  sono due funzioni reali continue nello stesso intervallo  $[a, b]$ . Per ciascuna delle seguenti affermazioni dire se è vera o falsa.

A)  $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx \quad \forall k \in \mathbb{R} \quad \mathbf{F} \rightarrow k \neq 0$

B)  $\int f(x)g(x) dx = \left( \int f(x) dx \right) \left( \int g(x) dx \right) \quad \mathbf{F}$

C)  $\int (f(x) + g(x)) dx = \left( \int f(x) dx \right) + \left( \int g(x) dx \right) \quad \mathbf{V}$

D)  $\int f(g(x)) dx = \left[ \int f(t) dt \right]_{t=g(x)} \quad \mathbf{F}$

E)  $\int f(x) dx = \int_a^x f(t) dt + k, \quad k \in \mathbb{R} \quad \mathbf{V} \rightarrow \text{la funzione integrale è una primitiva}$

F)  $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx \quad \mathbf{V}$

PARTE B (ESERCIZI)

Svolgere i seguenti esercizi

1) Calcolare il seguente integrale definito

$$\int_0^1 x \arctan(4x^2) dx$$

2) Determinare tutte le primitive della funzione

$$f(x) = \begin{cases} \cos x + x^2, & x < 0 \\ e^x + \log(x+1), & x \geq 0 \end{cases}$$

nell'intervallo  $] -\infty, +\infty[$

3) Calcolare il seguente integrale definito

$$\int_0^1 |2x-1| \log(x^2+x+1) dx$$

## Parte A

HP  $f: (c, d) \Rightarrow \mathbb{R}$  det. la primit.  $g: (a, b) \Rightarrow (c, d)$  deriv.

$$TS \quad \int f(g(x)) g'(x) dx = \left[ \int f(t) dt \right]_{t=g(x)}$$

DIM

Sia  $F$  una primit. di  $f$  allora il I membro è  $[F(t) + K]_{t=g(x)} = F(g(x)) + K$

$$\text{Cons. } D[F(g(x))] = F'(g(x)) g'(x) = f(g(x)) g'(x)$$

$\Rightarrow$  il I membro è  $F(g(x)) + K$

## PARTE B

$$\int_0^1 x \arctan(4x^2) dx$$

Trasformo la primitiva

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{8} \int 8x \arctan(4x^2) dx \\ &= \frac{1}{8} \left[ \int \arctan(t) dt \right]_{t=4x^2} \\ &= \frac{1}{8} \left[ x \arctan(x) - \frac{1}{2} \log|x^2+1| + K \right]_{t=4x^2} \end{aligned}$$

$$I = \frac{1}{8} (4x^2 \arctan(4x^2) - \frac{1}{2} \log(16x^4 + 1)) + K \Rightarrow \text{Primitive}$$

$$\left[ \frac{1}{8} (4x^2 \arctan(4x^2) - \frac{1}{2} \log(16x^4 + 1)) \right]_0^1 = F(1) - F(0) = \dots$$

2) Determinare tutte le primitive della funzione

$$f(x) = \begin{cases} \cos x + x^2, & x < 0 \\ e^x + \log(x+1), & x \geq 0 \end{cases}$$

nell'intervallo  $]-\infty, +\infty[$

$f$  è continua?

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$$

$f$  continua  $\Rightarrow$  quindi ammette primitive.

$$F'(x) = \begin{cases} \sin x + \frac{1}{3} x^3 + K \\ e^x + 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \log(x+1) dx &= x \log(x+1) - \int \frac{x+1-1}{x+1} dx \\ &= x \log(x+1) - x + \log|x+1| + K \end{aligned}$$

$$F'(x) = \begin{cases} \sin x + \frac{1}{3} x^3 + K & \text{se } x < 0 \\ e^x + x \log(x+1) - x + \log|x+1| + c & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

Imporre la continuità

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x)$$

$$K = 1 + c$$

$$F'(x) = \begin{cases} \sin x + \frac{1}{3} x^3 + 1 + c & \text{se } x < 0 \\ e^x + x \log(x+1) - x + \log|x+1| + c & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

3) Calcolare il seguente integrale definito

$$\int_0^1 |2x-1| \log(x^2+x+1) dx$$

Proprietà additiva

$$\frac{1}{2} \int_0^1 (2x-1) \log(x^2+x+1) dx + \frac{1}{2} \int_{\frac{1}{2}}^1 (2x-1) \log(x^2+x+1) dx$$

Troviamo le primitive

$$\int \underset{\substack{\downarrow \\ \text{FD}}}{(2x-1)} \log(x^2+x+1) dx = (x^2-x) \log(x^2+x+1) - \int \frac{x^2-x}{x^2+x+1} (2x+1) dx$$

$$J = \int \frac{2x^3 - x^2 - x}{x^2+x+1} dx = \int (2x-3) + \frac{3}{x^2+x+1} dx$$

$$\begin{array}{r|l} 2x^3 - x^2 - x & x^2 + x + 1 \\ - 2x^3 - 2x^2 - 2x & 2x - 3 \\ \hline 1 - 3x^2 - 3x & \\ + 3x^2 + 3x & \\ \hline 1/1 + 3 & \end{array} = x^2 - 3x + 3 \int \frac{1}{x^2+x+1} dx$$

$$x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$$

$$= x^2 - 3x + 3 \int \frac{1}{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dx$$

$$= x^2 - 3x + \frac{3}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \arctan \frac{x + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} + K$$

$$= \left[ (x^2 - x) \log(x^2+x+1) - x^2 + 3x - \frac{3}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \arctan \frac{x + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \right]_0^{\frac{1}{2}} +$$

$$+ \left[ (x^2 - x) \log(x^2+x+1) - x^2 + 3x - \frac{3}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \arctan \frac{x + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \right]_{\frac{1}{2}}^1 = \dots$$