

Cognome e Nome: _____

Matricola: _____

Esame di Strutture Discrete

27 Luglio 2021

Soluzioni

Prima parte

1. Trasformare la formula $(p \wedge q) \vee (q \wedge r) \vee (p \wedge r)$, in CNF (forma normale congiuntiva).

Risposta: Utilizzando la proprietà distributiva

$$(p \vee q \vee p) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee r \vee p) \wedge (p \vee r \vee r) \wedge \\ (q \vee q \vee p) \wedge (q \vee q \vee r) \wedge (q \vee r \vee p) \wedge (q \vee r \vee r)$$

Da cui otteniamo

$$(p \vee q) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee r) \wedge (p \vee r) \wedge \\ (q \vee p) \wedge (q \vee r) \wedge (q \vee r \vee p) \wedge (q \vee r)$$

E quindi, semplificando

$$(p \vee q) \wedge (p \vee r) \wedge (q \vee r)$$

2. Dimostrare che $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$

Risposta: Dimostriamo prima che $(A \cup B) \setminus C \subseteq (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$ e poi il viceversa. Sia allora $x \in (A \cup B) \setminus C$, abbiamo che $x \in A \cup B$ e $x \notin C$. Due casi sono possibili:

1. $x \in A$ e quindi $x \in A \setminus C$ da cui $x \in (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$

2. $x \in B$ e quindi $x \in B \setminus C$ da cui $x \in (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$

Dimostriamo adesso che $(A \setminus C) \cup (B \setminus C) \subseteq (A \cup B) \setminus C$. Sia $x \in (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$. Due casi sono possibili:

1. $x \in A \setminus C$ e quindi $x \in A$ e $x \notin C$. Ne segue che $x \in (A \cup B)$ e quindi $x \in (A \cup B) \setminus C$

2. $x \in B \setminus C$ e quindi $x \in B$ e $x \notin C$. Ne segue che $x \in (A \cup B)$ e quindi $x \in (A \cup B) \setminus C$

Seconda parte

3. Calcolare $101^{-1} \bmod 11$ ossia, l'inverso di 101 modulo 11.

Risposta: Come prima cosa notiamo che 101 e 11 sono coprimi e, in effetti, entrambi primi, quindi l'inverso esiste. Per il Teorema di Eulero $101^{\phi(11)} \equiv 1 \bmod 11$. Ne segue che l'inverso di 101 modulo 11 è $101^{\phi(11)-1} \bmod 11 = 101^9 \bmod 11$. Calcoliamo

$$101^9 \equiv (101 \bmod 11)^9 \equiv 2^9 \bmod 11$$

E

$$2^9 \equiv (2^4 \bmod 11) \cdot (2^5 \bmod 11) \equiv 5 \cdot 10 \equiv 50 \equiv 6 \bmod 11.$$

Quindi, $101^{-1} \bmod 11 = 6$.

4. Calcolare $26^{50} \bmod 21$

Risposta: Come prima cosa notiamo che $26 = 2 \cdot 13$ e $21 = 3 \cdot 7$ sono coprimi. Inoltre, $\phi(21) = 2 \cdot 6 = 12$. Quindi

$$26^{50} \equiv 26^{50 \bmod \phi(21)} \equiv 26^{50 \bmod 12} \equiv 26^2 \bmod 21$$

E

$$26^2 \equiv (26 \bmod 21)^2 \equiv 5^2 \equiv 4 \bmod 21.$$

Quindi, $26^{50} \bmod 21 = 4$.

Terza parte

5. Dati gli insiemi $A = \{1, 2, \dots, 9\}$ e $B = \{1, 2, \dots, 10\}$ è possibile definire una funzione iniettiva dall'insieme di tutti i sottoinsiemi di cardinalità 5 di A nell'insieme di tutti i sottoinsiemi di cardinalità 7 di B ?

Risposta: I sottoinsiemi di cardinalità 5 di A sono $\binom{9}{5} = \frac{9!}{5! \cdot 4!} = 126$. I sottoinsiemi di cardinalità 7 di B sono $\binom{10}{7} = \frac{10!}{7! \cdot 3!} = 120$. Quindi, non è possibile definire una funzione iniettiva dall'insieme di tutti i sottoinsiemi di cardinalità 5 di A nell'insieme di tutti i sottoinsiemi di cardinalità 7 di B .

6. Se in un'urna abbiamo 6 palline rosse, 5 palline verdi e 4 palline bianche, qual è la probabilità di estrarre 3 palline tutte dello stesso colore, senza reintroduzione?

Risposta: Le palline sono 15, ne estraiamo 3 senza reintroduzione, l'ordine di estrazione non è importante, quindi il numero di casi possibili è $\binom{15}{3} = 455$. Il numero di possibili estrazioni di 3 palline tutte rosse è $\binom{6}{3} = 20$. Il numero di possibili estrazioni di 3 palline tutte verdi è $\binom{5}{3} = 10$. Infine, il numero di possibili estrazioni di 3 palline tutte bianche è $\binom{4}{3} = 4$. Ne segue che il numero possibile di estrazioni di 3 palline tutte dello stesso colore è $20 + 10 + 4$ e quindi la probabilità che ciò avvenga è

$$\frac{34}{455}$$


Commento EXTRA: Possibile risposta alternativa. Lo stesso risultato si ottiene calcolando la probabilità di estrarre 3 palline di uno dei 3 colori e poi sommando tali probabilità. La probabilità di estrarre 3 palline rosse è $\frac{6}{15} \cdot \frac{5}{14} \cdot \frac{4}{13} = \frac{120}{2730}$. La probabilità di estrarre 3 palline verdi è $\frac{5}{15} \cdot \frac{4}{14} \cdot \frac{3}{13} = \frac{60}{2730}$. La probabilità di estrarre 3 palline bianche è $\frac{4}{15} \cdot \frac{3}{14} \cdot \frac{2}{13} = \frac{24}{2730}$. In totale abbiamo allora

$$\frac{120}{2730} + \frac{60}{2730} + \frac{24}{2730} = \frac{204}{2730} = \frac{34 \cdot 6}{455 \cdot 6} = \frac{34}{455}$$

Quarta parte

7. Dato il grafo G_1 in figura, quanti sono gli archi che bisogna aggiungere per renderlo massimale?

GRAFO G_1




Risposta: Un grafo planare massimale con v vertici ha esattamente $3v - 6$ archi. Il grafo G_1 ha 9 vertici, quindi per essere massimale dovrebbe avere $27 - 6 = 21$ archi. Ne ha 13 e quindi ne dobbiamo aggiungere ancora 8.

Commento EXTRA: Nello specifico, tali archi potrebbero essere per cominciare: $(2, 8)$, $(3, 8)$, $(4, 6)$, $(5, 9)$, $(3, 7)$, $(3, 4)$, $(4, 9)$. A questo punto tutte le facce sarebbero definite tra 3 archi, tranne quella esterna definita dagli archi $(3, 4)$, $(4, 9)$, $(9, 7)$, $(7, 3)$. Se aggiungiamo come ottavo arco $(3, 9)$ oppure $(4, 7)$ anche la faccia esterna diventa triangolare.

8. Dato il grafo orientato G_2 in figura, si può rendere fortemente connesso aggiungendo 1 arco? Se sì, quale? Altrimenti, quanti archi servono?

GRAFO G_2



Risposta: Il grafo G_2 ha 3 componenti fortemente connesse, ossia $\{1\}$, $\{2, 3, 4, 5, 6\}$ e $\{7\}$. Se aggiungiamo l'arco orientato $[1, 7]$ creiamo un ciclo $1 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ che coinvolge i vertici 1 e 7 e vertici della terza componente fortemente connessa. Quindi, tutti i vertici del grafo apparterrebbero ad un'unica componente fortemente connessa.