

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Matematika – 2. stopnja

Marija Novak
NASLOV DELA

Magistrsko delo

Mentor: prof. dr. Janez Novak

Ljubljana, 2017

Kazalo

1	Uvod	1
2	Dilatacije	1
3	Povsem pozitivne preslikave	3
3.1	Operatorski sistemi	6
4	Povsem omejene preslikave	12
5	Povsem pozitivne preslikave na $C(X)$	19
6	Stinespringov izrek	25
7	Povsem pozitivne preslikave na $M_n(\mathbb{C})$	33
8	Arvesonov razširitveni izrek	39
9	Abstraktni operatorski sistemi	43
10	C^* -ogrinjače	49
11	Nekomutativen rob Šilova	56
12	Nekomutativen Choquetov rob	61
	Literatura	71

Naslov dela

POVZETEK

Tukaj napišemo povzetek vsebine. Sem sodi razlaga vsebine in ne opis tega, kako je delo organizirano.

Angleški prevod slovenskega naslova dela

ABSTRACT

An abstract of the work is written here. This includes a short description of the content and not the structure of your work.

Math. Subj. Class. (2020): 74B05, 65N99

Ključne besede: integracija, kompleks, C^* -algebre

Keywords: integration, complex, C^* -algebras

1 Uvod

Napišite kratek zgodovinski in matematični uvod. Pojasnite motivacijo za problem, kje nastopa, kje vse je bil obravnavan. Na koncu opišite tudi organizacijo dela – kaj je v katerem razdelku.

2 Dilatacije

Definicija 2.1. *Dilatacija* operatorja $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ je operator $S \in \mathcal{B}(\mathcal{K})$, pri čemer je $\mathcal{H}$ podprostor Hilbertovega prostora $\mathcal{K}$, $P_{\mathcal{H}} : \mathcal{K} \hookrightarrow \mathcal{H}$ njegova vložitev in $T = P_{\mathcal{H}} S|_{\mathcal{H}}$. Pravimo, da je T *kompresija* S .

Ker je $\mathcal{K} = \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}^{\perp}$, lahko operator S zapišemo v matrični obliki

$$S = \begin{bmatrix} T & * \\ * & * \end{bmatrix}.$$

Zgled 2.2. Dokažimo, da ima vsaka izometrija unitarno dilatacijo. Naj bo $V \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ izometrija in $P := I - VV^*$ projekcija na $(\text{im } V)^{\perp}$. Zapišimo $\mathcal{K} := \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$ ter definirajmo $U \in \mathcal{B}(\mathcal{K})$ v matrični obliki kot

$$U := \begin{bmatrix} V & P \\ 0 & V^* \end{bmatrix}.$$

Očitno je U dilatacija V . Dokazati moramo še, da je tudi unitarna. Ker velja

$$\begin{aligned} U^*U &= \begin{bmatrix} V^* & 0 \\ P & V \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V & P \\ 0 & V^* \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} V^*V & V^*P \\ PV & P^2 + VV^* \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \end{aligned}$$

in

$$\begin{aligned} UU^* &= \begin{bmatrix} V & P \\ 0 & V^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V^* & 0 \\ P & V \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} P^2 + VV^* & PV \\ V^*P & V^*V \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

je U res unitarna dilatacija V . Še več, v tem primeru je U *potenčna dilatacija* V . To pomeni, da je za vsak $n \in \mathbb{N}$ operator

$$U^n = \begin{bmatrix} V^n & * \\ 0 & (V^*)^n \end{bmatrix}$$

dilatacija za V^n .

◇

Zgled 2.3. Dokažemo lahko tudi, da ima vsaka skrčitev izometrično dilatacijo. Vzemimo $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, tako da je $\|T\| \leq 1$. Definirajmo

$$D_T := (I - T^*T)^{\frac{1}{2}} \in \mathcal{B}(\mathcal{H}),$$

tako da za vsak $x \in \mathcal{H}$ velja

$$\begin{aligned} \|Tx\|^2 + \|D_Tx\|^2 &= \langle Tx, Tx \rangle + \langle D_Tx, D_Tx \rangle \\ &= \langle T^*Tx, x \rangle + \langle D_T^2x, x \rangle \\ &= \langle T^*Tx, x \rangle + \langle (I - T^*T)x, x \rangle \\ &= \langle x, x \rangle = \|x\|^2. \end{aligned}$$

Nato definirajmo Hilbertov prostor $\mathcal{K} := \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{H}$, ki je prostor zaporedij

$$\{(x_1, x_2, \dots) \mid x_n \in \mathcal{H}, \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|^2 < \infty\}$$

s skalarnim produktom

$$\langle (x_1, x_2, \dots), (y_1, y_2, \dots) \rangle := \sum_{n=1}^{\infty} \langle x_n, y_n \rangle.$$

Nazadnje definiramo še operator

$$V : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{K}, \quad (x_1, x_2, x_3, \dots) \mapsto (Tx_1, D_Tx_2, x_3, \dots),$$

ki je izometrija, saj velja

$$\begin{aligned} \|V(x_1, x_2, x_3, \dots)\|^2 &= \|Tx_1\|^2 + \|D_Tx_2\|^2 + \sum_{n=3}^{\infty} \|x_n\|^2 \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|^2 \\ &= \|(x_1, x_2, x_3, \dots)\|^2. \end{aligned}$$

Če identificiramo $\mathcal{H}$ s $\mathcal{H} \oplus 0 \oplus 0 \oplus \dots \subseteq \mathcal{K}$, potem velja

$$T^n = P_{\mathcal{H}} V^n \big|_{\mathcal{H}}$$

za vse $n \in \mathbb{N}$. ◇

Kot posledico zgledov 2.2 in 2.3 dobimo naslednji izrek.

Izrek 2.4 (Sz.-Nagy). *Naj bo $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ skrčitev. Potem obstaja Hilbertov prostor $\mathcal{K} \supseteq \mathcal{H}$ in unitaren operator $U \in \mathcal{B}(\mathcal{K})$, tako da velja*

$$T^n = P_{\mathcal{H}} U^n \big|_{\mathcal{H}}$$

za vse $n \in \mathbb{N}$.

Sz.-Nagyjev izrek nam omogoča, da trditev o skrčitvah reduciramo na trditev o unitarnih operatorjih. Za ilustracijo tega argumenta dokažimo naslednjo trditev.

Posledica 2.5 (von Neumannova neenakost). *Naj bo $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ skršitev $p \in \mathbb{C}[z]$ kompleksen polinom. Potem imamo*

$$\|p(T)\| \leq \sup\{|p(z)| \mid z \in \mathbb{T}\}.$$

Dokaz. Naj bo U potenčna dilatacija T , torej $T^n = P_{\mathcal{H}}U^n|_{\mathcal{H}}$ za vse $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Potem velja $p(T) = P_{\mathcal{H}}p(U)|_{\mathcal{H}}$ in posledično $\|p(T)\| \leq \|p(U)\|$. Ker je U normalna, imamo po spektralnem izreku

$$\|p(U)\| = \sup\{|p(\lambda)| \mid \lambda \in \sigma(U)\}.$$

Nato upoštevamo še, da je U unitarna in zanjo velja $\sigma(U) \subseteq \mathbb{T}$, torej

$$\sup\{|p(\lambda)| \mid \lambda \in \sigma(U)\} \leq \sup\{|p(\lambda)| \mid \lambda \in \mathbb{T}\}.$$

Vse to skupaj implicira

$$\|p(T)\| \leq \|p(U)\| = \sup\{|p(\lambda)| \mid \lambda \in \sigma(U)\} \leq \sup\{|p(\lambda)| \mid \lambda \in \mathbb{T}\}. \quad \square$$

3 Povsem pozitivne preslikave

Naj bo $\mathfrak{A}$ $*$ -algebra. Definiramo $M_n(\mathfrak{A})$ kot algebro $n \times n$ matrik z elementi v $\mathfrak{A}$, z običajnim matričnim seštevanjem in množenjem. Na $M_n(\mathfrak{A})$ lahko definiramo matrično involucijo

$$[a_{ij}]_{i,j}^* := [a_{ji}^*]_{i,j},$$

s katero $M_n(\mathfrak{A})$ postane $*$ -algebra.

Definicija 3.1. Naj bosta $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ $*$ -algebri in $\phi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$ linearna preslikava. Za vsak $n \in \mathbb{N}$ definiramo

$$\phi^{(n)} : M_n(\mathfrak{A}) \rightarrow M_n(\mathfrak{B}), \quad [a_{ij}]_{i,j} \mapsto [\phi(a_{ij})]_{i,j}.$$

Preslikavi $\phi^{(n)}$ pravimo n -ta ampliacija ϕ .

Če je $\mathfrak{A}$ C^* -algebra, potem po Gelfand–Naimark–Segalovem (v nadaljevanju: GNS) izreku obstaja Hilbertov prostor $\mathcal{H}$ in injektivna upodobitev $\pi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$, kar inducira injektivni $*$ -homomorfizem

$$\pi^{(n)} : M_n(\mathfrak{A}) \rightarrow M_n(\mathcal{B}(\mathcal{H}))$$

za vsak $n \in \mathbb{N}$. To pomeni, da lahko $M_n(\mathfrak{A})$ identificiramo z $*$ -podalgebro C^* -algebre $M_n(\mathcal{B}(\mathcal{H}))$. Ker je slika $\pi^{(n)}(M_n(\mathfrak{A}))$ zaprta v $M_n(\mathcal{B}(\mathcal{H}))$, je tudi C^* -podalgebra v $M_n(\mathcal{B}(\mathcal{H}))$. To nam inducira normo na $M_n(\mathfrak{A})$, s katero $M_n(\mathfrak{A})$ postane C^* -algebra. Spomnimo, da vsaka $*$ -algebra premore največ eno normo, za katero postane C^* -algebra, kar pomeni, da je zgoraj opisana norma na $M_n(\mathfrak{A})$ kanonična oziroma neodvisna od izbora upodobitve π . Kot bomo videli, nam kanonične norme na $M_n(\mathfrak{A})$ povedo dodatne informacije o začetni C^* -algebri $\mathfrak{A}$.

Definicija 3.2. Element $a \in \mathfrak{A}$ je *pozitiven*, če obstaja $b \in \mathfrak{A}$, tako da je $a = b^*b$. Množico vseh pozitivnih elementov v $\mathfrak{A}$ označimo z $\mathfrak{A}_+$.

Opomba 3.3. Množica $\mathfrak{A}_+$ je konveksen stožec.

Definicija 3.4. Naj bosta $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ C^* -algebri in $\varphi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$ linearna preslikava.

1. φ je *pozitivna*, če je $\varphi(\mathfrak{A}_+) \subseteq \mathfrak{B}_+$;
2. φ je *n -pozitivna*, če je $\varphi^{(n)}$ pozitivna;
3. φ je *povsem pozitivna*, če je n -pozitivna za vsak $n \in \mathbb{N}$.

Množico vseh (enotskih) povsem pozitivnih preslikav označimo s $\text{PP}(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ (oziroma $\text{EPP}(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$).

Opomba 3.5. • Če je φ n -pozitivna, potem je tudi k -pozitivna za vse $k \leq n$.

- Kompozitum pozitivnih (n -pozitivnih, povsem pozitivnih) preslikav je prav tako pozitiven (n -pozitiven, povsem pozitiven).
- Če sta $\varphi, \psi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$ pozitivni (n -pozitivni, povsem pozitivni) preslikavi in $\alpha, \beta \geq 0$, potem je tudi $\alpha\varphi + \beta\psi$ pozitivna (n -pozitivna, povsem pozitivna).

V nadaljevanju si bomo oglejmo nekaj primerov povsem pozitivnih preslikav in njihovih osnovnih lastnosti. Model povsem pozitivnih preslikav so pozitivni funkcionali.

Zgled 3.6. Dokažimo, da je vsak pozitivni linearni funkcional φ na C^* -algebri $\mathfrak{A}$ povsem pozitiven. Dovolj je pokazati, da je

$$\varphi^{(n)} : M_n(\mathfrak{A}) \rightarrow M_n(\mathbb{C})$$

pozitivna preslikava. Vzemimo neko matriko $[a_{ij}]_{i,j} \in M_n(\mathfrak{A})_+$ in $\alpha \in \mathbb{C}^n$. Ker je $[a_{ij}]_{i,j} \geq 0$, imamo

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} \alpha_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_n & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}^* \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_n & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \sum_{i,j=1}^n \overline{\alpha_i} \alpha_j a_{ij} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \geq 0 \end{aligned}$$

in zato $\sum_{i,j=1}^n \overline{\alpha_i} \alpha_j a_{ij} \geq 0$ v $\mathfrak{A}$. Ker je φ pozitiven funkcional, dobimo

$$\begin{aligned} \langle \varphi^{(n)}([a_{ij}]_{i,j})\alpha, \alpha \rangle &= \langle [\varphi(a_{ij})]_{i,j}\alpha, \alpha \rangle \\ &= \left\langle \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^n \varphi(a_{1j})\alpha_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n \varphi(a_{nj})\alpha_j \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} \right\rangle \\ &= \sum_{i,j} \overline{\alpha_i} \alpha_j \varphi(a_{ij}) \\ &= \varphi \left(\sum_{i,j} \overline{\alpha_i} \alpha_j a_{ij} \right) \geq 0, \end{aligned}$$

zato je $\varphi^{(n)}([a_{ij}]_{i,j}) \geq 0$. ◇

To nam omogoča, da na povsem pozitivne preslikave gledamo kot na posplošitve stanj, pri čemer je kodomena poljubna C^* -algebra. Izkazalo se bo, da lahko teorijo stanj posplošimo na povsem pozitivne preslikave.

Zgled 3.7. Če je $\varphi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$ $*$ -homomorfizem, je φ pozitiven, saj $\varphi(a^*a) = \varphi(a)^*\varphi(a)$. Še več, v tem primeru je tudi $\varphi^{(n)}$ $*$ -homomorfizem, zato je $\varphi^{(n)}$ pozitivna za vsak $n \in \mathbb{N}$. Od tod sledi, da je vsak $*$ -homomorfizem med dvema C^* -algebrama povsem pozitiven. $\diamond$

Zgled 3.8. Obstajajo pozitivne preslikave, ki niso povsem pozitivne Primer take preslikave je

$$\varphi : M_2(\mathbb{C}) \rightarrow M_2(\mathbb{C}), \quad A \mapsto A^\top$$

(tukaj operacija $A^\top$ pomeni realno transpozicijo matrike brez konjugiranja, saj mora biti φ linearna preslikava). Očitno je φ pozitivna preslikava, kar pa ne velja za njeno drugo ampliacijo

$$\varphi^{(2)} : M_4(\mathbb{C}) \rightarrow M_4(\mathbb{C}), \quad \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} A_{11}^\top & A_{12}^\top \\ A_{21}^\top & A_{22}^\top \end{bmatrix}.$$

Ta namreč slika pozitivno matriko

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}^* \geq 0$$

v

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

ki ima negativno lastno vrednost -1 (in zato seveda ne more biti pozitivna). $\diamond$

Zgled 3.9. Naj bosta $\mathcal{H}, \mathcal{K}$ Hilbertova prostora in $V \in \mathcal{B}(\mathcal{K}, \mathcal{H})$ omejen operator. Dokazujemo, da je preslikava

$$\varphi : \mathcal{B}(\mathcal{H}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K}), \quad A \mapsto V^*AV$$

povsem pozitivna. Vzemimo pozitivno matriko $[A_{ij}]_{i,j} \in M_n(\mathcal{B}(\mathcal{H}))_+$. Potem je

$$\begin{aligned} \varphi^{(n)}([A_{ij}]_{i,j}) &= \begin{bmatrix} \varphi(A_{11}) & \cdots & \varphi(A_{1n}) \\ \vdots & & \vdots \\ \varphi(A_{n1}) & \cdots & \varphi(A_{nn}) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} V^*A_{11}V & \cdots & V^*A_{1n}V \\ \vdots & & \vdots \\ V^*A_{n1}V & \cdots & V^*A_{nn}V \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} V & & \\ & \ddots & \\ & & V \end{bmatrix}^* \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V & & \\ & \ddots & \\ & & V \end{bmatrix} \end{aligned}$$

pozitivna matrika, torej je $\varphi^{(n)}$ pozitivna preslikava. Posledično je φ povsem pozitivna.

Če je $\mathfrak{A}$ C^* -algebra in $\psi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ povsem pozitivna preslikava, potem je tudi kompozicija

$$\mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K}), \quad A \mapsto V^* \psi(a) V \quad (3.1)$$

povsem pozitivna. $\diamond$

Zgled 3.10. Denimo, da sta $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{K}$ Hilbertova prostora. Po zgledu 3.9 sta preslikavi

$$\mathcal{B}(\mathcal{K}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}), \quad A \mapsto P_{\mathcal{H}} A|_{\mathcal{H}},$$

in

$$\mathcal{B}(\mathcal{H}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K}), \quad A \mapsto \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

povsem pozitivni.

Ker je kompozitum povsem pozitivnih preslikav ponovno povsem pozitiven, je za vsako povsem pozitivno preslikavo $\varphi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ tudi preslikava

$$\psi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K}), \quad a \mapsto \begin{bmatrix} \varphi(a) & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

povsem pozitivna.

Prav tako je za vsako povsem pozitivno preslikavo $\psi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$ tudi preslikava

$$\varphi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}), \quad \varphi(a) = P_{\mathcal{H}} \psi(a)|_{\mathcal{H}}$$

povsem pozitivna. $\diamond$

3.1 Operatorski sistemi

V zgornjih zgledih smo obravnavali povsem pozitivne preslikave na C^* -algebrah. V praksi pa imamo pogosto opravka s povsem pozitivnimi preslikavami, ki so definirane zgolj na podprostorih C^* -algebre.

Definicija 3.11. Naj bo $\mathfrak{A}$ enotska C^* -algebra. Njenemu podprostoru $\mathcal{M} \subseteq \mathfrak{A}$, ki vsebuje enico, pravimo *operatorski prostor*. Operatorskemu prostoru $\mathcal{S} \subseteq \mathfrak{A}$, za katerega velja $\mathcal{S} = \mathcal{S}^*$, pravimo *operatorski sistem*.

Zgled 3.12. Če je $\mathcal{M}$ operatorski prostor, potem je $\mathcal{S} = \mathcal{M} + \mathcal{M}^*$ operatorski sistem. $\diamond$

Če je $\mathcal{M}$ (oziroma $\mathcal{S}$) operatorski prostor (sistem) v $\mathfrak{A}$, potem je $M_n(\mathcal{M})$ operatorski prostor (sistem) v $M_n(\mathfrak{A})$ za vse $n \in \mathbb{N}$. Pozitivni elementi v operatorskem prostoru so $\mathcal{M}_+ = \mathcal{M} \cap \mathfrak{A}_+$. Za poljubno C^* -algebro $\mathfrak{B}$ in linearno preslikavo $\varphi : \mathcal{M} \rightarrow \mathfrak{B}$, potem na enak način kot prej definiramo pojme pozitivne, n -pozitivne ter povsem pozitivne preslikave.

Zgled 3.13. Če je $\mathcal{S} \subseteq \mathfrak{A}$ operatorski sistem in $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{C}$ pozitiven funkcional, potem je φ povsem pozitivna preslikava. Dokaz poteka popolnoma enako kot v zgledu 3.6. $\diamond$

Operatorski sistemi imajo pomembno vlogo v teoriji se v teoriji povsem pozitivnih preslikav, saj je vsak njihov element linearna kombinacija pozitivnih elementov. Res, vsak element v operatorskem sistemu $a \in \mathcal{S}$ je linearna kombinacija dveh sebiadjungiranih elementov

$$a = \underbrace{\frac{a + a^*}{2}}_{\operatorname{Re} a} + i \cdot \underbrace{\frac{a - a^*}{2i}}_{\operatorname{Im} a},$$

ki prav tako ležita v $\mathcal{S}$. Poleg tega lahko vsak sebiadjungiran element zapišemo kot razliko dveh pozitivnih elementov

$$a = \frac{1}{2}(\|a\| + a) - \frac{1}{2}(\|a\| - a),$$

ki ležita v $\mathcal{S}$.

Operatorski sistemi so zato ‘naravna’ domena za povsem pozitivne preslikave. Z oznako **OSys** označimo kategorijo operatorskih sistemov, v kateri so morfizmi povsem pozitivne preslikave, v **OSys**₁ pa enotske povsem pozitivne preslikave.

Zgled 3.14. Za razliko od operatorskih sistemov lahko operatorski prostori vsebujejo le trivialne sebiadjungirane elemente, torej $\mathbb{R} \cdot 1$. Oglejmo si operatorski prostor $\mathcal{M} := \mathbb{C}[z] \subseteq C(\mathbb{T})$. Najprej dokažimo, da je $\{z^k\}_{k \in \mathbb{Z}} \subseteq C(\mathbb{T})$ linearno neodvisna množica. Denimo, da obstajajo cela števila $k_1 \leq k_2 \leq \dots \leq k_l$ in skalarji $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l \in \mathbb{C}$, da velja $\sum_{j=1}^l \alpha_j z^{k_j} = 0$ na $\mathbb{T}$. Potem je tudi polinom $\sum_{j=1}^l \alpha_j z^{k_j - k_1}$ ničelen na $\mathbb{T}$. Po osnovnem izreku algebre ima vsak neničelen kompleksen polinom končno število ničel, zato mora biti

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_l = 0.$$

Sedaj lahko dokažemo, da so edini sebiadjungirani elementi v $\mathbb{C}[z]$ trivialni. Vzemimo poljuben sebiadjungiran polinom $p = \sum_{j=0}^l \alpha_j z^j$. Potem je

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^l \alpha_j z^j &= \overline{\sum_{j=0}^l \alpha_j z^j} \\ &= \sum_{j=0}^l \overline{\alpha_j} \overline{z^j} \\ &= \sum_{j=0}^l \overline{\alpha_j} z^{-j}. \end{aligned}$$

Od tod sledi $\alpha_0 \in \mathbb{R}$ in $\alpha_j = 0$ za $j \geq 1$. ◇

Zgornji zgled nam pove, da operatorski prostori pogosto ne premorejo ‘dovolj’ pozitivnih elementov. V naslednjih dveh razdelkih odgovorimo na vprašanje, kdaj lahko preslikavo na operatorskem prostoru $\mathcal{M}$ razširimo do povsem pozitivne preslikave na operatorskem sistemu $\mathcal{M} + \mathcal{M}^*$. Te preslikave bodo služile kot analogija povsem pozitivnih preslikav za operatorske prostore.

Za začetek podajmo nekaj osnovnih lastnosti pozitivnih in povsem pozitivnih preslikav.

Lema 3.15. Naj bo $\mathcal{S}$ operatorski sistem in $\mathfrak{B}$ C^* -algebra. Če je $\varphi : \mathfrak{S} \rightarrow \mathfrak{B}$ pozitivna preslikava, potem je $*$ -linearna, torej

$$\varphi(a^*) = \varphi(a)^*, \quad \forall a \in \mathcal{S}.$$

Dokaz. Ta trditev očitno velja za $a \in \mathcal{S}_+$. Sedaj predpostavimo, da je $a \in \mathcal{S}$ sebiadjungiran (torej $a = a^*$). Vemo, da lahko vsak tak a zapišemo kot $a = \frac{1}{2}(\|a\| + a) - \frac{1}{2}(\|a\| - a)$. Sedaj dobimo

$$\begin{aligned} \varphi(a)^* &= \varphi\left(\frac{1}{2}(\|a\| + a) - \frac{1}{2}(\|a\| - a)\right)^* \\ &= \varphi\left(\frac{1}{2}(\|a\| + a)\right)^* - \varphi\left(\frac{1}{2}(\|a\| - a)\right)^* \\ &= \varphi\left(\frac{1}{2}(\|a\| + a)\right) - \varphi\left(\frac{1}{2}(\|a\| - a)\right) \\ &= \varphi\left(\frac{1}{2}(\|a\| + a) - \frac{1}{2}(\|a\| - a)\right) \\ &= \varphi(a) = \varphi(a^*). \end{aligned}$$

Tako za povsem splošen $a \in \mathcal{S}$ dobimo

$$\begin{aligned} \varphi(a)^* &= \varphi(\operatorname{Re} a + i \cdot \operatorname{Im} a)^* \\ &= \varphi(\operatorname{Re} a)^* - i\varphi(\operatorname{Im} a)^* \\ &= \varphi(\operatorname{Re} a) - i\varphi(\operatorname{Im} a) \\ &= \varphi(\operatorname{Re} a - i \cdot \operatorname{Im} a) = \varphi(a^*). \end{aligned} \quad \square$$

Lema 3.16. Naj bo $\mathcal{S}$ operatorski sistem in $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{C}$ funkcional. Potem je φ pozitiven natanko tedaj, ko je $\|\varphi\| = \varphi(1)$.

Dokaz. Ker za vsak $a \in \mathcal{S}_+$ velja

$$-\|a\| \leq a \leq \|a\|,$$

sledi

$$\varphi(a) \leq \varphi(\|a\|), \quad \forall a \in \mathcal{S}.$$

Za $a, b \in \mathcal{S}$ definiramo seskvilinearno formo $\langle a, b \rangle := \varphi(b^*a)$, od koder po Cauchy-Schwarzevi neenakosti sledi

$$|\varphi(b^*a)|^2 \leq \varphi(b^*b) \cdot \varphi(a^*a). \quad (3.2)$$

Če vstavimo $b = 1$, dobimo

$$\begin{aligned} |\varphi(a)|^2 &\leq \varphi(a^*a) \cdot \varphi(1) \leq \varphi(\|a^*a\|) \cdot \varphi(1) \\ &= \|a^*a\| \cdot \varphi(1)^2 = \|a\|^2 \cdot \varphi(1)^2. \end{aligned}$$

Če enačbo korenimo, dobimo $\|\varphi\| \leq \varphi(1)$. Ker je $\varphi(1) \leq \|\varphi\|$, smo implikacijo v desno dokazali. Za implikacijo v levo vzamemo $a \in \mathcal{S}_+$ in $\varphi(a) := \alpha + i\beta$. Za vsak

$t \in \mathbb{R}$ je

$$\begin{aligned}\alpha^2 + (\beta + t\|\varphi\|)^2 &= |\alpha + i(\beta + t\varphi(1))|^2 \\ &= |\varphi(a + it)|^2 \\ &\leq \|a + it\|^2 \cdot \|\varphi\|^2 \\ &= (\|a\|^2 + t^2) \|\varphi\|^2.\end{aligned}$$

Od tod sledi $2\beta t\|\varphi\| \leq \|a\|^2 \cdot \|\varphi\|^2$. Ker je bil $t \in \mathbb{R}$ poljuben, imamo $\beta = 0$ in $\varphi(a) = \alpha \in \mathbb{R}$. Tako dobimo

$$\begin{aligned}\|a\| \cdot \|\varphi\| - \varphi(a) &= \varphi(\|a\| - a) \\ &\leq \| \|a\| - a \| \cdot \|\varphi\| \\ &\leq \|a\| \cdot \|\varphi\|,\end{aligned}$$

torej $\varphi(a) \geq 0$. □

Za poljubno pozitivno preslikavo $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathfrak{B}$ imamo na voljo slabšo oceno.

Trditev 3.17. *Naj bo $\mathcal{S}$ operatorski sistem in $\mathfrak{B}$ C^* -algebra. Če je $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathfrak{B}$ pozitivna preslikava, potem je omejena in velja $\|\varphi\| \leq 2 \cdot \varphi(1)$.*

Dokaz. Za sebiadjungiran $a \in \mathcal{S}$ velja

$$-\|a\| \leq a \leq \|a\|$$

in posledično

$$-\varphi(\|a\|) \leq \varphi(a) \leq \varphi(\|a\|).$$

Od tod sledi $|\varphi(a)| \leq \|a\| \cdot \varphi(1)$. Sedaj za poljuben $a \in \mathcal{S}$ dobimo

$$\begin{aligned}\|\varphi(a)\| &= \|\varphi(\operatorname{Re} a + i \cdot \operatorname{Im} a)\| \\ &\leq \|\varphi(\operatorname{Re} a)\| + \|\varphi(\operatorname{Im} a)\| \\ &\leq (\|\operatorname{Re} a\| + \|\operatorname{Im} a\|) \cdot \|\varphi(1)\| \\ &\leq 2\|a\| \cdot \|\varphi(1)\|.\end{aligned}$$
□

Naslednji zgled pokaže, da je konstanta 2 v oceni iz trditve 3.17 tudi dosežena.

Zgled 3.18 (Arveson). Naj bo $\mathcal{S} \subseteq C(\mathbb{T})$ operatorski sistem, ki ga razpenjajo funkcije $1, z, \bar{z}$. Definirajmo preslikavo

$$\varphi : \mathcal{S} \rightarrow M_2(\mathbb{C}), \quad \varphi(a + bz + c\bar{z}) = \begin{bmatrix} a & 2b \\ 2c & a \end{bmatrix}.$$

Dokazujemo, da je φ pozitivna preslikava.

Trdimo, da velja

$$a + bz + c\bar{z} \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad b = \bar{c} \text{ in } a \geq 2|b|.$$

Najprej implikacija v levo: če velja $b = \bar{c}$ in $a \geq 2|b|$, potem je

$$a + bz + c\bar{z} = a + 2\operatorname{Re} bz \geq 0,$$

saj $a \geq 2|b| \geq 2 \operatorname{Re} bz$ za vse $z \in \mathbb{T}$. Nato še implikacija v desno: če je

$$\overline{a + bz + c\bar{z}} = a + bz + c\bar{z},$$

sledi $a = \bar{a}$ in $c = \bar{b}$. Od tod dobimo $a + 2 \operatorname{Re}(bz) \geq 0$ za vse $z \in \mathbb{T}$. Na krožnici obstaja tak $z \in \mathbb{T}$, da velja $bz = -|b|$, zato mora veljati tudi $a \geq 2|b|$.

Če je $a + bz + \bar{b}\bar{z} \geq 0$, potem se s φ preslika v matriko

$$\begin{bmatrix} a & 2b \\ 2\bar{b} & a \end{bmatrix}.$$

Slednja ima nenegativne diagonalne elemente in determinanto

$$\det \begin{bmatrix} a & 2b \\ 2\bar{b} & a \end{bmatrix} = a^2 - 4|b|^2 \geq 0,$$

zato je pozitivna in φ je pozitivna preslikava.

Nazadnje opazimo, da velja

$$\|\varphi\| \leq 2 \cdot \|\varphi(1)\| = 2 = \|\varphi(z)\| \leq \|\varphi\|,$$

torej $\|\varphi\| = 2 \cdot \|\varphi(1)\|$. ◇

Opomba 3.19. V zgornjem zgledu sta dve težavi: kodomena $M_2(\mathbb{C})$ je nekomutativna (glej lemo 3.16) in operatorski sistem $\mathcal{S}$ ‘ne premore’ dovolj pozitivnih elementov (glej trditev 5.10). Zgled 3.18 nam pove, da za posplošitev stanj na preslikave $\varphi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$ ni dovolj predpostaviti zgolj pozitivnost, temveč potrebujemo povsem pozitivnost.

Podrazdelek zaključimo s trditvijo, da je enotsko skrčitev na operatorskem prostoru $\mathcal{M}$ moč razširiti do pozitivne preslikave na operatorskem sistemu $\mathcal{M} + \mathcal{M}^*$.

Trditev 3.20. *Naj bo $\mathcal{S}$ operatorski sistem in $\mathfrak{B}$ C^* -algebra. Potem je vsaka enotska skrčitev $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathfrak{B}$ pozitivna.*

Dokaz. Po izreku GNS lahko (kot bomo v nadaljevanju pogosto storili) brez škode za splošnost predpostavili, da je $\mathfrak{B} = \mathcal{B}(\mathcal{H})$ za nek Hilbertov prostor $\mathcal{H}$. Fiksirajmo nek $x \in \mathcal{H}$, tako da velja $\|x\| = 1$. Oglejmo si funkcional

$$\rho_x : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \rho_x(a) = \langle \varphi(a)x, x \rangle.$$

Po Cauchy-Schwarzevi neenakosti sledi

$$|\rho_x(a)| \leq \|\varphi(a)x\| \cdot \|x\| \leq \|\varphi(a)\| \cdot \|x\|^2 = \|\varphi(a)\| \leq \|a\|,$$

torej $\|\rho_x\| \leq 1$. Ker pa velja $\rho_x(1) = 1$, smo dokazali $\|\rho_x\| = 1 = \rho_x(1)$. Lema 3.16 nam zato pove, da je ρ_x pozitiven funkcional. Sedaj vzemimo poljuben $a \in \mathcal{S}_+$. Ker je

$$\langle \varphi(a)x, x \rangle = \rho_x(a) \geq 0$$

za vsak enotski vektor $x \in \mathcal{H}$, mora $\varphi(a)$ biti pozitiven. □

Trditev 3.21. *Naj bo $\mathcal{M} \subseteq \mathfrak{A}$ operatorski prostor in $\mathfrak{B}$ C^* -algebra. Potem lahko vsako enotsko skrčitev $\varphi : \mathcal{M} \rightarrow \mathfrak{B}$ enolično razširimo do pozitivne preslikave na operatorskem sistemu $\mathcal{M} + \mathcal{M}^*$ s predpisom*

$$\tilde{\varphi} : \mathcal{M} + \mathcal{M}^* \rightarrow \mathfrak{B}, \quad \tilde{\varphi}(a + b^*) = \varphi(a) + \varphi(b)^*.$$

Dokaz. Najprej dokažimo enoličnost. Če je $\psi : \mathcal{M} + \mathcal{M}^* \rightarrow \mathfrak{B}$ pozitivna razširitev φ , mora biti $*$ -linearna. To pomeni, da za vsaka $a, b \in \mathcal{M}$ velja

$$\begin{aligned} \psi(a + b^*) &= \psi(a) + \psi(b^*) \\ &= \psi(a) + \psi(b)^* \\ &= \varphi(a) + \varphi(b)^* \\ &= \tilde{\varphi}(a + b^*). \end{aligned}$$

Nato dokažemo, da je $\tilde{\varphi}$ sploh dobro definirana preslikava. Vzemimo operatorski sistem

$$\mathcal{S} := \{a \mid a \text{ in } a^* \text{ sta elementa } \mathcal{M}\}.$$

($\mathcal{S}$ vsebuje enico, zato je neprazen). Ker je $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathfrak{B}$ enotska skrčitev, je pozitivna in v posebnem $*$ -linearna. To pomeni, da za vsak $a \in \mathcal{S}$ velja

$$\varphi(a^*) = \varphi(a)^*.$$

Sedaj predpostavimo, da velja $a + b^* = c + d^* \in \mathcal{M} + \mathcal{M}^*$. Potem je

$$a - c = (-b + d)^* \in \mathcal{S},$$

torej

$$\begin{aligned} \varphi(a) - \varphi(c) &= \varphi(a - c) \\ &= \varphi(-b + d)^* \\ &= -\varphi(b)^* + \varphi(d)^*. \end{aligned}$$

Od tod potem sledi

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}(a + b^*) &= \varphi(a) + \varphi(b)^* \\ &= \varphi(c) + \varphi(d)^* \\ &= \tilde{\varphi}(c + d^*), \end{aligned}$$

torej je $\tilde{\varphi}$ dobro definirana.

Nazadnje dokažimo, da je $\tilde{\varphi}$ pozitivna. Ponovno lahko predpostavimo, da je $\mathfrak{B} = \mathcal{B}(\mathcal{H})$ za nek Hilbertov prostor $\mathcal{H}$. Vzemimo nek $x \in \mathcal{H}$, za katerega velja $\|x\| = 1$. Kot v prejšnji trditvi definiramo

$$\rho_x : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \rho_x(a) = \langle \varphi(a)x, x \rangle$$

in

$$\tilde{\rho}_x : \mathcal{M} + \mathcal{M}^* \rightarrow \mathbb{C}, \quad \tilde{\rho}_x(a) = \langle \tilde{\varphi}(a)x, x \rangle.$$

Dovolj je dokazati, da je $\tilde{\rho}_x$ pozitiven funkcional. Ker velja $1 = \rho_x(1) = \|\rho_x\|$, je ρ_x po lemi 3.16 pozitiven funkcional. Po Hahn-Banachovem izreku ga lahko razširimo

do funkcionala $\rho'_x : \mathcal{M} + \mathcal{M}^* \rightarrow \mathbb{C}$, za katerega prav tako velja $\|\rho'_x\| = 1 = \rho'_x(1)$. Slednji je zato pozitiven in posledično $*$ -linearen. Od tod sledi, da za vsaka $a, b \in \mathcal{M}$ velja

$$\rho'_x(a + b^*) = \rho_x(a) + \rho_x(b)^* = \tilde{\rho}_x(a + b^*).$$

Torej je $\tilde{\rho}_x = \rho'_x$ pozitiven. □

Zgled 3.22. Naj bo $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ skrčitev in

$$\mathcal{M} = \mathbb{C}[z] \subseteq \mathbb{C}(T)$$

operatorski sistem. Potem je preslikava

$$\varphi : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}), \quad p \mapsto p(T)$$

enotska skrčitev po von Neumannovi neenakosti (posledica 2.5). To pa pomeni, da jo lahko razširimo do pozitivne preslikave

$$\tilde{\varphi} : \mathcal{M} + \mathcal{M}^* \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}), \quad p + q^* \mapsto p(T) + q(T)^*,$$

kjer je

$$\mathcal{M} + \mathcal{M}^* = \{p(z) + \overline{q(z)} \mid p, q \text{ polinoma}\}.$$

◇

4 Povsem omejene preslikave

Sedaj lahko postavimo zadostni pogoj za preslikavo $\varphi : \mathcal{M} \rightarrow \mathfrak{B}$, da jo lahko razširimo do povsem pozitivne preslikave $\tilde{\varphi} : \mathcal{M} + \mathcal{M}^* \rightarrow \mathfrak{B}$.

Definicija 4.1. Naj bosta $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ C^* -algebri in $\mathcal{M} \subseteq \mathfrak{A}$ operatorski prostor. Potem je preslikava $\varphi : \mathcal{M} \rightarrow \mathfrak{B}$:

1. *povsem omejena*, če je $\|\varphi\|_{\text{po}} := \sup_{n \in \mathbb{N}} \|\varphi^{(n)}\| < \infty$;
2. *povsem skrčitev*, če je $\|\varphi\|_{\text{po}} \leq 1$;
3. *povsem izometrija*, če je $\varphi^{(n)}$ izometrija za vsak $n \in \mathbb{N}$.

Množico vseh povsem omejenih preslikav označujemo s $\text{PO}(\mathcal{M}, \mathfrak{B})$.

Posledica 4.2. Naj bo $\mathcal{S}$ operatorski sistem in $\mathfrak{B}$ C^* -algebra. Potem je vsaka enotska povsem skrčitev $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathfrak{B}$ povsem pozitivna.

Dokaz. Za vsak $n \in \mathbb{N}$ je $\varphi^{(n)} : M_n(\mathcal{S}) \rightarrow M_n(\mathfrak{B})$ enotska skrčitev, zato je pozitivna. □

Posledica 4.3. Vsaka enotska povsem skrčitev $\varphi : \mathcal{M} \rightarrow \mathfrak{B}$ premore enolično določeno povsem pozitivno razširitev $\tilde{\varphi} : \mathcal{M} + \mathcal{M}^* \rightarrow \mathfrak{B}$.

Dokaz. Za poljuben $n \in \mathbb{N}$ je $\varphi^{(n)} : M_n(\mathcal{M}) \rightarrow M_n(\mathfrak{B})$ enotska skrčitev, torej je $\widetilde{(\varphi^{(n)})} : M_n(\mathcal{M}) + M_n(\mathcal{M})^* \rightarrow M_n(\mathfrak{B})$ pozitivna. Ker je $M_n(\mathcal{M}) + M_n(\mathcal{M})^* = M_n(\mathcal{M} + \mathcal{M}^*)$, zadošča dokazati, da $\widetilde{(\varphi^{(n)})}$ sovpada s $(\tilde{\varphi})^{(n)} : M_n(\mathcal{M} + \mathcal{M}^*) \rightarrow M_n(\mathfrak{B})$. Vzemimo matriki $[a_{ij}]_{i,j} \in M_n(\mathcal{M})$, $[b_{ij}^*]_{i,j} \in M_n(\mathcal{M})$. Potem je

$$\begin{aligned} \widetilde{(\varphi^{(n)})}([a_{ij}]_{i,j} + [b_{ij}^*]_{i,j}) &= \varphi^{(n)}([a_{ij}]_{i,j}) + \varphi^{(n)}([b_{ij}^*]_{i,j})^* \\ &= [\varphi(a_{ij})]_{i,j} + [\varphi(b_{ij}^*)]_{i,j}^* \\ &= [\varphi(a_{ij})]_{i,j} + [\varphi(b_{ij})^*]_{i,j} \\ &= [\varphi(a_{ij})]_{i,j} + [\varphi(b_{ij}^*)]_{i,j} \\ &= [\varphi(a_{ij} + b_{ij}^*)]_{i,j} \\ &= [\tilde{\varphi}(a_{ij} + b_{ij}^*)]_{i,j} \\ &= \tilde{\varphi}^{(n)}([a_{ij} + b_{ij}^*]_{i,j}) \\ &= \tilde{\varphi}^{(n)}([a_{ij}]_{i,j} + [b_{ij}^*]_{i,j}), \end{aligned}$$

torej je $\tilde{\varphi}^{(n)}$ pozitivna za vsak $n \in \mathbb{N}$. □

Opomba 4.4. Z oznako **OS** označujemo kategorijo operatorskih prostorov, v kateri so morfizmi povsem omejene preslikave, v **OS**₁ pa enotske povsem omejene preslikave.

Trditev 4.5. *Množica $\text{PO}(\mathcal{M}, \mathfrak{B})$ je Banachov prostor.*

Dokaz. Enostavno je videti, da je $\text{PO}(\mathcal{M}, \mathfrak{B})$ vektorski prostor in $\|\cdot\|_{\text{po}}$ res ustreza aksiomom za normo. Da dokažemo polnost, vzemimo poljubno Cauchyjevo zaporedje $\{\varphi_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subseteq \text{PO}(\mathcal{M}, \mathfrak{B})$. Ker je $\|\cdot\| \leq \|\cdot\|_{\text{po}}$, je $\{\varphi_k\}$ Cauchyjevo tudi v navadni normi $\|\cdot\|$, torej $\varphi_k \rightarrow \psi$ v navadni normi. Od tod sledi $\varphi_k^{(n)} \rightarrow \psi^{(n)}$ za vsak $n \in \mathbb{N}$. Za poljuben $\varepsilon > 0$ obstaja tak $M \in \mathbb{N}$, da za vsaka $k, l \geq M$ velja $\|\varphi_k - \varphi_l\|_{\text{po}} < \varepsilon$, torej $\|\varphi_k^{(n)} - \varphi_l^{(n)}\|_{\text{po}} < \varepsilon$ za vsak $n \in \mathbb{N}$. Če pošljemo $l \rightarrow \infty$, dobimo $\|\varphi_k^{(n)} - \psi^{(n)}\| \leq \varepsilon$ za vsak $n \in \mathbb{N}$, od koder sledi $\|\varphi_k - \psi\|_{\text{po}} \leq \varepsilon$ za vse $k \geq M$. To pomeni, da $\varphi_k \rightarrow \psi$ tudi v normi $\|\cdot\|_{\text{po}}$. □

V nadaljevanju obravnavamo povezavo med povsem pozitivnimi in povsem omejenimi preslikavami? Oglejmo si nekatere zglede povsem omejenih preslikav.

Zgled 4.6. Iz zgleda 3.6 že vemo, da je vsak pozitivni funkcional $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{C}$ povsem pozitiven. Dokazujemo, da je povsem omejena, in sicer da velja $\|\varphi^{(n)}\| = \|\varphi\|$ za vsak $n \in \mathbb{N}$. Brez škode za splošnost predpostavimo, da je $\|\varphi\| = \varphi(1) = 1$. Dovolj je dokazati Cauchy-Schwarzevo neenakost

$$\varphi^{(n)}(A)^* \varphi^{(n)}(A) \leq \varphi^{(n)}(A^* A) \quad (4.1)$$

za poljubno matriko $A \in M_n(\mathcal{S})$. Od tod po pozitivnosti $\varphi^{(n)}$ sledi

$$\|\varphi^{(n)}(A)\|^2 = \|\varphi^{(n)}(A)^* \varphi^{(n)}(A)\| \leq \|\varphi^{(n)}(A^* A)\| \leq \|\varphi^{(n)}(1)\| \cdot \|A^* A\| = \|A\|^2,$$

torej $\|\varphi^{(n)}\| = \|\varphi\| = 1$ za vsak $n \in \mathbb{N}$. Preostane le še, da dokažemo neenakost (4.1). Vzemimo poljuben vektor $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{C}^n$. Potem je po uporabi neenakosti (3.2)

$$\begin{aligned}
\langle \varphi^{(n)}(A)^* \varphi^{(n)}(A) \alpha, \alpha \rangle &= \langle \varphi^{(n)}(A) \alpha, \varphi^{(n)}(A) \alpha \rangle = \sum_{i=1}^n \left| \sum_{k=1}^n \varphi(a_{ik}) \alpha_k \right|^2 \\
&= \sum_{i=1}^n \left| \varphi \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} \alpha_k \right) \right|^2 \leq \sum_{i=1}^n \varphi \left(\left(\sum_{k=1}^n a_{ik} \alpha_k \right)^* \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} \alpha_j \right) \right) \\
&= \sum_{i=1}^n \varphi \left(\sum_{k=1}^n a_{ik}^* \overline{\alpha_k} \sum_{j=1}^n a_{ij} \alpha_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_j \varphi(a_{ik}^* a_{ij}) \overline{\alpha_k} \\
&= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \alpha_j \varphi(a_{ik}^* a_{ij}) \overline{\alpha_k} = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_j \varphi \left(\sum_{i=1}^n a_{ik}^* a_{ij} \right) \overline{\alpha_k} \\
&= \langle \varphi^{(n)}(A^* A) \alpha, \alpha \rangle,
\end{aligned}$$

torej $\varphi^{(n)}(A)^* \varphi^{(n)}(A) \leq \varphi^{(n)}(A^* A)$. $\diamond$

Zgled 4.7. Vemo že, da je vsak enotski $*$ -homomorfizem $\varphi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$ povsem pozitiven. Velja pa tudi, da je φ skrčitev. Ker so preslikave $\varphi^{(n)}$ prav tako enotski $*$ -homomorfizmi, so tudi skrčitve in je φ povsem skrčitev. Če je φ enotski $*$ -monomorfizem, je izometrija in enako velja za vse njegove ampliacije $\varphi^{(n)}$. Torej je vsak enotski $*$ -monomorfizem med C^* -algebrama povsem izometrija. $\diamond$

Opazimo, da so vse povsem pozitivne preslikave, ki jih do sedaj poznamo, tudi povsem omejene. V preostanku tega podrazdelka dokažemo, da to velja tudi v splošnem. Ključno bo dokazati Cauchy-Schwarzevo neenakost tipa (4.1).

Lema 4.8. *Naj bo $\mathcal{H}$ Hilbertov prostor in $P, Q, A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$. Potem je*

$$\begin{bmatrix} P & A \\ A^* & Q \end{bmatrix} \geq 0$$

natanko tedaj, ko sta P, Q pozitivna operatorja in $|\langle Ax, y \rangle|^2 \leq \langle Py, y \rangle \cdot \langle Qx, x \rangle$ za vse $x, y \in \mathcal{H}$. V posebnem velja

$$\begin{bmatrix} 1 & A \\ A^* & Q \end{bmatrix} \geq 0$$

natanko tedaj, ko $A^ A \leq Q$.*

Dokaz. Predpostavimo, da velja $|\langle Ax, y \rangle|^2 \leq \langle Py, y \rangle \cdot \langle Qx, x \rangle$ za vse $x, y \in \mathcal{H}$. Potem sledi

$$\begin{aligned}
\left\langle \begin{bmatrix} P & A \\ A^* & Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix} \right\rangle &= \langle Py, y \rangle + 2 \operatorname{Re} \langle Ax, y \rangle + \langle Qx, x \rangle \\
&\geq \langle Py, y \rangle - 2 |\langle Ax, y \rangle| + \langle Qx, x \rangle \\
&\geq \langle Py, y \rangle - 2 \langle Py, y \rangle^{\frac{1}{2}} \langle Qx, x \rangle^{\frac{1}{2}} + \langle Qx, x \rangle \\
&= (\langle Py, y \rangle^{\frac{1}{2}} - \langle Qx, x \rangle^{\frac{1}{2}})^2 \geq 0.
\end{aligned}$$

Predpostavimo še obratno, torej da obstajata x, y , tako da $|\langle Ax, y \rangle|^2 > \langle Py, y \rangle \cdot \langle Qx, x \rangle$. Brez škode za splošnost smemo predpostaviti, da je $\langle Py, y \rangle = \langle Qx, x \rangle = 1$, saj bi v nasprotnem primeru lahko pomnožili x, y z ustreznima faktorjema. Prav tako lahko predpostavimo $\langle Ax, y \rangle \leq 0$, saj lahko v nasprotnem primeru preprosto zavrtimo x za ustrezen kot $e^{i\theta}$. Od tod sledi

$$\langle Ax, y \rangle = -|\langle Ax, y \rangle| < -1$$

in

$$\begin{aligned} \left\langle \begin{bmatrix} P & A \\ A^* & Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix} \right\rangle &= \langle Py, y \rangle + 2 \operatorname{Re} \langle Ax, y \rangle + \langle Qx, x \rangle \\ &< 1 - 2 + 1 = 0. \end{aligned}$$

Za dokaz druge trditve je dovolj pokazati, da velja $|\langle Ax, y \rangle|^2 \leq \langle y, y \rangle \cdot \langle Qx, x \rangle$ za vse x, y . Če vstavimo $y = Ax$, dobimo

$$\langle Ax, Ax \rangle \leq \langle Qx, x \rangle$$

za vse x . Ker je leva stran enačbe enaka $\langle A^*Ax, x \rangle$, dobimo $A^*A \leq Q$. Obratno, če velja $A^*A \leq Q$, potem po Cauchy-Schwarzove neenakosti sledi

$$\begin{aligned} |\langle Ax, y \rangle|^2 &\leq \|Ax\|^2 \cdot \|y\|^2 \\ &\leq \langle A^*Ax, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle \\ &\leq \langle Qx, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle. \end{aligned} \quad \square$$

Posledica 4.9. *Naj bo*

$$\begin{bmatrix} P & A \\ A^* & Q \end{bmatrix} \geq 0.$$

Potem velja:

1. $A^*A \leq \|P\|Q$ in $A^*A \leq \|Q\|P$.
2. $\|P + A + A^* + Q\| \leq (\|P\|^{\frac{1}{2}} + \|Q\|^{\frac{1}{2}})^2$.

Dokaz. 1. Ker je $0 \leq P \leq \|P\|$, imamo

$$\begin{bmatrix} \|P\| & A \\ A^* & Q \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} P & A \\ A^* & Q \end{bmatrix} \geq 0.$$

Od tod sledi

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{A}{\|P\|} \\ \frac{A^*}{\|P\|} & \frac{Q}{\|P\|} \end{bmatrix} \geq 0$$

in

$$\frac{A^*}{\|P\|} \frac{A}{\|P\|} \leq \frac{Q}{\|P\|}$$

po prejšnji lemi. Od tod sledi $A^*A \leq \|P\|Q$. Po enakem argumentu dokažemo tudi drugo trditev.

2. Za vse $x \in \mathcal{H}$ je po prejšnji lemi

$$|\langle Ax, x \rangle|^2 \leq \langle Px, x \rangle \cdot \langle Qx, x \rangle.$$

Sedaj velja

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left\langle \begin{bmatrix} P & A \\ A^* & Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ x \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x \\ x \end{bmatrix} \right\rangle = \langle (P + A + A^* + Q)x, x \rangle \\ &= \langle Px, x \rangle + 2 \operatorname{Re} \langle Ax, x \rangle + \langle Qx, x \rangle \\ &\leq \langle Px, x \rangle + 2 \langle Px, x \rangle^{\frac{1}{2}} \langle Qx, x \rangle^{\frac{1}{2}} + \langle Qx, x \rangle \\ &= (\langle Px, x \rangle^{\frac{1}{2}} + \langle Qx, x \rangle^{\frac{1}{2}})^2. \end{aligned}$$

Če vzamemo supremum obeh strani po $\|x\| = 1$, dobimo

$$\begin{aligned} \|P + A + A^* + Q\| &= \sup_{\|x\|=1} \langle (P + A + A^* + Q)x, x \rangle \\ &\leq \sup_{\|x\|=1} (\langle Px, x \rangle^{\frac{1}{2}} + \langle Qx, x \rangle^{\frac{1}{2}})^2 \\ &\leq \left(\sup_{\|x\|=1} \langle Px, x \rangle^{\frac{1}{2}} + \sup_{\|x\|=1} \langle Qx, x \rangle^{\frac{1}{2}} \right)^2 \\ &= (\|P\|^{\frac{1}{2}} + \|Q\|^{\frac{1}{2}})^2. \end{aligned} \quad \square$$

Na tej točki omenimo še eno uporabno neenakost.

Lema 4.10. Če so $A, B, C, D \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, potem

$$\left\| \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \right\| \leq \left\| \begin{bmatrix} \|A\| & \|B\| \\ \|C\| & \|D\| \end{bmatrix} \right\|.$$

Dokaz. Vzemimo enotski vektor $[x, y]^\top \in \mathcal{H}^2$. Potem je

$$\begin{aligned} \left\| \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \right\|^2 &= \left\| \begin{bmatrix} Ax + By \\ Cx + Dy \end{bmatrix} \right\|^2 \\ &= \|Ax + By\|^2 + \|Cx + Dy\|^2 \\ &\leq (\|A\|\|x\| + \|B\|\|y\|)^2 + (\|C\|\|x\| + \|D\|\|y\|)^2 \\ &= \left\| \begin{bmatrix} \|A\|\|x\| + \|B\|\|y\| \\ \|C\|\|x\| + \|D\|\|y\| \end{bmatrix} \right\|^2 \\ &= \left\| \begin{bmatrix} \|A\| & \|B\| \\ \|C\| & \|D\| \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \|x\| \\ \|y\| \end{bmatrix} \right\|^2 \\ &\leq \left\| \begin{bmatrix} \|A\| & \|B\| \\ \|C\| & \|D\| \end{bmatrix} \right\|^2. \end{aligned} \quad \square$$

Posledica 4.11. Naj bo $\mathcal{S}$ operatorski sistem in $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathfrak{B}$ 2-pozitivna preslikava. Potem je $\|\varphi\| = \|\varphi(1)\|$.

Dokaz. Ker je φ 1-pozitivna, je tudi $*$ -linearna. Vzemimo $a \in \mathcal{S}$, tako da je $\|a\| \leq 1$. Potem je

$$\begin{bmatrix} 1 & a \\ a^* & 1 \end{bmatrix} \geq 0,$$

torej

$$\begin{bmatrix} \varphi(1) & \varphi(a) \\ \varphi(a)^* & \varphi(1) \end{bmatrix} \geq 0.$$

Po prejšnji posledici dobimo

$$\varphi(a)^* \varphi(a) \leq \|\varphi(1)\| \varphi(1)$$

in zato $\|\varphi(a)\|^2 \leq \|\varphi(1)\|^2$. S tem smo dokazali $\|\varphi\| \leq \|\varphi(1)\|$. $\square$

Posledica 4.12 (Cauchy-Schwarz za 2-pozitivne preslikave). *Naj bosta $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ C^* -algebri in $\varphi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$ 2-pozitivna preslikava. Potem velja*

$$\varphi(a^*b)\varphi(b^*a) \leq \|\varphi(a^*a)\| \cdot \varphi(b^*b)$$

in v posebnem

$$\varphi(a)^* \varphi(a) \leq \|\varphi(1)\| \varphi(a^*a).$$

Dokaz. Ker je

$$\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^* \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^*a & a^*b \\ b^*a & b^*b \end{bmatrix} \geq 0,$$

dobimo

$$\begin{bmatrix} \varphi(a^*a) & \varphi(a^*b) \\ \varphi(a^*b)^* & \varphi(b^*b) \end{bmatrix} \geq 0$$

in posledično $\varphi(a^*b)\varphi(ba^*) \leq \|\varphi(a^*a)\| \varphi(b^*b)$. $\square$

Dokaza prejšnjih dveh posledic sta standardna za to področje. Argumentom takšnega tipa pravimo ‘dilatacijski triki’.

Sedaj lahko zapišemo glavno trditev tega podrazdelka.

Trditev 4.13. *Naj bo $\mathcal{S} \subseteq \mathfrak{A}$ operatorski sistem in $\mathfrak{B}$ C^* -algebra. Če je $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathfrak{B}$ povsem pozitivna, potem je tudi povsem omejena in velja $\|\varphi\| = \|\varphi\|_{\text{po}} = \|\varphi(1)\|$.*

Dokaz. Ker je $\|\varphi(1)\| \leq \|\varphi\| \leq \|\varphi\|_{\text{po}}$, zadošča pokazati $\|\varphi\|_{\text{po}} \leq \|\varphi(1)\|$. Vzemimo $n \in \mathbb{N}$ in $a \in M_n(\mathcal{S})$, tako da velja $\|a\| = 1$. Ker je φ povsem pozitivna preslikava, je

$$\varphi^{(2n)} : M_2(M_n(\mathcal{S})) \rightarrow M_2(M_n(\mathcal{S}))$$

pozitivna. Ker pa velja $\varphi^{(2n)} = (\varphi^{(n)})^{(2)}$, je $\varphi^{(n)}$ 2-pozitivna preslikava. Po posledici 4.11 nato sledi $\|\varphi^{(n)}\| = \|\varphi^{(n)}(I_n)\| = \|\varphi(1)\|$. $\square$

Opomba 4.14. V prejšnjem dokazu smo identificirali $M_{2n} \equiv M_2(M_n(\mathcal{S}))$. To smemo narediti, saj imamo za poljubna $m, n \in \mathbb{N}$ $*$ -izomorfizem

$$\Phi_{m,n} : M_m(M_n(\mathfrak{A})) \rightarrow M_{mn}(\mathfrak{A}), \quad \begin{bmatrix} [A_{11}] & \cdots & [A_{1m}] \\ \vdots & & \vdots \\ [A_{m1}] & \cdots & [A_{mm}] \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{m1} & \cdots & A_{mm} \end{bmatrix},$$

ki ohranja pozitivne elemente.

Posledica 4.15. Če je $\mathcal{M} \subseteq \mathfrak{A}$ operatorski prostor in $\varphi : \mathcal{M} \rightarrow \mathfrak{B}$ enotska povsem izometrija, potem je tudi $\tilde{\varphi} : \mathcal{M} + \mathcal{M}^* \rightarrow \mathfrak{B}$ povsem izometrija.

Dokaz. Ker je $\varphi : \mathcal{M} \rightarrow \mathfrak{B}$ enotska skrčitev, je tudi

$$\tilde{\varphi} : \mathcal{M} + \mathcal{M}^* \rightarrow \varphi(\mathcal{M}) + \varphi(\mathcal{M})^*$$

povsem skrčitev. Po drugi strani pa je tudi $\varphi^{-1} : \varphi(\mathcal{M}) \rightarrow \mathfrak{A}$ enotska skrčitev, zato je

$$\widetilde{\varphi^{-1}} : \varphi(\mathcal{M}) + \varphi(\mathcal{M})^* \rightarrow \mathcal{M} + \mathcal{M}^*$$

povsem skrčitev. Ker sta preslikavi $\tilde{\varphi}$ in $\widetilde{\varphi^{-1}}$ druga drugi inverzni in obe povsem skrčitvi, sta obe povsem izometrični. $\square$

Posledica 4.16. Množica $\text{PP}(\mathcal{S}, \mathfrak{B})$ je konveksen stožec v $\text{PO}(\mathcal{S}, \mathfrak{B})$.

Naslednja trditev je posplošitev leme 3.16 za povsem pozitivne preslikave.

Posledica 4.17. Naj bo $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathfrak{B}$ enotska preslikava. Potem je φ povsem pozitivna natanko tedaj, ko je $\|\varphi\|_{\text{po}} = \|\varphi\| = 1$.

Dokaz. Sledi direktno iz posledice 4.3 in prejšnje trditve. $\square$

Ker je vsaka povsem pozitivna preslikava povsem omejena, se je naravno vprašati, ali velja tudi obratno. Odgovor je negativen.

Lema 4.18. Če je $\mathcal{M}$ operatorski prostor in $\varphi : \mathcal{M} \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ omejena preslikava, potem je povsem omejena in velja $\|\varphi\|_{\text{po}} \leq n\|\varphi\|$.

Dokaz. Najprej dokažimo trditev za primer $n = 1$. Tedaj imamo za poljubna vektorja $\alpha, \beta \in \mathbb{C}^n$ in $A \in M_m(\mathcal{M})$

$$\begin{aligned} \left| \langle \varphi^{(m)}(A)\alpha, \beta \rangle \right| &= \left| \varphi(\beta^\top A\alpha) \right| \\ &\leq \|\varphi\| \cdot \|\beta^\top A\alpha\| \\ &\leq \|\varphi\| \cdot \|A\| \cdot \|\alpha\| \cdot \|\beta\|. \end{aligned}$$

Če vzamemo supremum obeh strani neenačbe po enotskih vektorjih $\|\alpha\| = \|\beta\| = 1$, dobimo

$$\|\varphi^{(m)}(A)\| \leq \|\varphi\| \cdot \|A\|$$

in posledično $\|\varphi\|_{\text{po}} = \|\varphi\|$. Sedaj dokažimo trditev za splošen $n \in \mathbb{N}$. Definirajmo preslikave

$$\varphi_{ij} : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \varphi_{ij}(a) = \langle \varphi(a)e_j, e_i \rangle.$$

Ker je $\varphi(a) = \sum_{i,j} \varphi_{ij}(a)E_{ij}$, lahko zapišemo njene ampliacije kot

$$\varphi^{(m)}(A) = \sum_{i,j} \varphi_{ij}^{(m)}(A) \otimes E_{ij} \in M_m(M_n(\mathbb{C})).$$

Opazimo tudi, da je

$$\Phi : M_n(\mathbb{C}) \otimes M_m(\mathbb{C}) \rightarrow M_m(\mathbb{C}) \otimes M_n(\mathbb{C}), \quad A \otimes B \mapsto B \otimes A$$

-izomorfizem C^ -algeber, zato ohranja normo. Od tod sledi

$$\begin{aligned}
\|\varphi^{(m)}(A)\| &= \left\| \sum_{i,j}^n \varphi_{ij}^{(m)}(A) \otimes E_{ij} \right\| \\
&= \left\| \sum_{i,j}^n E_{ij} \otimes \varphi_{ij}^{(m)}(A) \right\| \\
&= \left\| \begin{bmatrix} \varphi_{11}^{(m)}(A) & \cdots & \varphi_{1n}^{(m)}(A) \\ \vdots & & \vdots \\ \varphi_{n1}^{(m)}(A) & \cdots & \varphi_{nn}^{(m)}(A) \end{bmatrix} \right\| \\
&= \left\| \begin{bmatrix} \|\varphi_{11}^{(m)}(A)\| & \cdots & \|\varphi_{1n}^{(m)}(A)\| \\ \vdots & & \vdots \\ \|\varphi_{n1}^{(m)}(A)\| & \cdots & \|\varphi_{nn}^{(m)}(A)\| \end{bmatrix} \right\| \\
&\leq \left\| \begin{bmatrix} \|\varphi_{11}^{(m)}(A)\| & \cdots & \|\varphi_{1n}^{(m)}(A)\| \\ \vdots & & \vdots \\ \|\varphi_{n1}^{(m)}(A)\| & \cdots & \|\varphi_{nn}^{(m)}(A)\| \end{bmatrix} \right\|_F \\
&\leq n \max_{ij} \|\varphi_{ij}^{(m)}(A)\| \\
&\leq n \cdot \|\varphi\| \cdot \|A\|,
\end{aligned}$$

pri čemer $\|\cdot\|_F$ označuje Frobeniusovo matrično normo. $\square$

Zgled 4.19. Preslikava

$$\varphi : M_2(\mathbb{C}) \rightarrow M_2(\mathbb{C}), \quad A \mapsto A^\top$$

iz zgleda 3.8 je po prejšnji lemi povsem omejena, toda ni povsem pozitivna. $\diamond$

5 Povsem pozitivne preslikave na $C(X)$

V prejšnjih podrazdelkih smo že srečali primere povsem pozitivnih preslikav $\varphi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$, kot na primer pozitivni funkcionalne, *-homomorfizme in enotske povsem skrčitve. V tem podrazdelku se omejimo na primer, ko je vsaj ena izmer C^* -algeber $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ komutativna.

Opomba 5.1. Po Gelfandovi transformaciji vemo, da je vsaka enotska komutativna C^* -algebra *-izomorfna $C(X)$, kjer je X nek kompakten Hausdorffov topološki prostor.

Naslednja trditev se prvič pojavi v [6].

Trditev 5.2. *Naj bo $\varphi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$ pozitivna preslikava. Če je vsaj ena izmed $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ komutativna, potem je φ povsem pozitivna.*

Za dokaz te trditve potrebujemo naslednji lemi.

Lema 5.3. Če je $\mathfrak{A}$ C^* -algebra, potem je vsak pozitiven element $M_n(\mathfrak{A})$ vsota n pozitivnih matrik oblike $[a_i^* a_j]_{i,j}$ za neke $\{a_1, \dots, a_n\} \subseteq A$.

Dokaz. Najprej opazimo, da če imamo matriko

$$R = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1 & \cdots & a_n \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \in M_n(\mathfrak{A}),$$

potem je $R^* R = [a_i^* a_j]_{i,j}$. Naj bo sedaj $P \in M_n(\mathfrak{A})_+$ poljubna pozitivna matrika, torej $P = B^* B$ za nek $B \in M_n(\mathfrak{A})$. Zapišemo $B = R_1 + \cdots + R_n$, kjer je R_k matrika, ki ima k -to vrstico enako kot B , drugje pa je ničelna. Ker velja $R_k^* R_l = 0$ za poljubna različna indeksa $k \neq l$ iz $\{1, \dots, n\}$, sledi

$$\begin{aligned} P = B^* B &= (R_1^* + \cdots + R_n^*)(R_1 + \cdots + R_n) \\ &= R_1^* R_1 + \cdots + R_n^* R_n. \end{aligned} \quad \square$$

Lema 5.4. Naj bo $\mathfrak{B}$ C^* -algebra in $A = [a_{ij}]_{i,j} \in M_n(\mathfrak{B})$. Potem je A pozitivna natanko tedaj, ko velja

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}^* A \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \sum_{i,j} b_i^* a_{ij} b_j \geq 0$$

za poljubno n -terico $b_1, \dots, b_n \in \mathfrak{B}$.

Dokaz. Implikacija v levo je trivialna, zato dokazujemo implikacijo v desno.

1. V prvem koraku dokažemo, da če je $A = [a_{ij}]_{i,j} \in M_n(\mathfrak{B})$ takšna matrika, da velja

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}^* A \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \sum_{i,j} b_i^* a_{ij} b_j = 0$$

za poljubno n -terico $b_1, \dots, b_n \in \mathfrak{B}$, potem je $A = 0$. Dokazali bomo, da je vsaka komponenta A ničelna. Če v zgornjo enačbo vstavimo $b_i = 1$ in $b_j = 0$ za vse $j \neq i$, potem dobimo $a_{ii} = 0$. Od tod sledi, da so vsi diagonalni elementi matrike A ničelni. Preostane še pokazati, da je $a_{ij} = 0$ za poljubna indeksa $i \neq j$. Če vstavimo $b_i := 1, b_j := c \in \mathfrak{B}$ in $b_k = 0$ za $k \neq i, j$, dobimo enakost

$$a_{ii} + a_{ij}c + c^* a_{ji} + c^* a_{jj}c = 0.$$

Ker so diagonalni elementi ničelni, sledi

$$a_{ij}c + c^* a_{ji} = 0.$$

Če posebej vstavimo $c = 1$ in $c = i$, dobimo

$$a_{ij} + a_{ji} = 0, \quad ia_{ij} - ia_{ji} = 0,$$

od koder potem sledi $a_{ij} = a_{ji} = 0$. S tem smo dokazali, da je $A = 0$.

2. V drugem koraku dokažemo, da če je

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}^* A \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \sum_{i,j} b_i^* a_{ij} b_j \in \mathfrak{B}$$

sebiadjungiran element za vsako n -terico $b_1, \dots, b_n \in \mathfrak{B}$, potem je A sebiadjungirana matrika. Opazimo namreč, da velja

$$\begin{aligned} \sum_{i,j} b_i^* a_{ij} b_i &= \left(\sum_{i,j} b_i^* a_{ij} b_i \right)^* \\ &= \sum_{i,j} b_j^* a_{ij}^* b_i \\ &= \sum_{i,j} b_i^* a_{ji}^* b_j, \end{aligned}$$

od koder sledi

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}^* (A - A^*) \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \sum_{i,j} b_i^* (a_{ij} - a_{ji}^*) b_i = 0.$$

Po prvemu koraku tako dobimo $A - A^* = 0$.

3. Nazadnje dokažemo, da če je

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}^* A \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \sum_{i,j} b_i^* a_{ij} b_j$$

pozitiven za poljubno n -terico $b_1, \dots, b_n \in \mathfrak{B}$, potem je A pozitivna matrika. Ker je A po prejšnjem koraku sebiadjungirana, imamo po zveznem funkcijskem računu dekompozicijo $A = A_+ - A_-$, kjer sta A_+, A_- pozitivni matriki, tako da velja $A_+ A_- = A_- A_+ = 0$. Po predpostavki imamo

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}^* A_- A A_- \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \geq 0,$$

hkrati pa je izraz na levi strani enak

$$- \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}^* A_-^3 \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \leq 0.$$

Od tod sledi

$$- \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}^* A_-^3 \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = 0$$

za poljubno n -terico $b_1, \dots, b_n \in \mathfrak{B}$. Po prvem koraku nato dobimo $A_-^3 = 0$, od koder po zveznem funkcijskem računu sledi $A_- = 0$. To pa pomeni, da je $A = A_+$ pozitivna matrika. $\square$

Lema 5.3 nam pove, da je za dokazovanje n -pozitivnosti preslikave $\varphi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$ dovolj pokazati, da je $\varphi_n([a_i^* a_j]_{i,j}) \geq 0$ za vsako n -terico $a_1, \dots, a_n \in \mathfrak{A}$. Po lemi 5.4 pa nato sledi, da je dovolj preveriti, da je

$$\sum_{i,j}^n b_i^* \varphi_n([a_i^* a_j]_{i,j}) b_j \geq 0$$

za poljubni n -terici $a_1, \dots, a_n \in \mathfrak{A}$ in $b_1, \dots, b_n \in \mathfrak{B}$.

Dokaz trditve 5.2. (a) Najprej dokažimo trditev za primer, ko je $\mathfrak{A}$ komutativna. Brez škode za splošnost predpostavimo, da je $\mathfrak{A} = C(X)$ za nek kompakten Hausdorffov prostor X in $\mathfrak{B} = \mathcal{B}(\mathcal{H})$ za nek Hilbertov prostor $\mathcal{H}$. Fiksirajmo neka vektorja $u, v \in \mathcal{H}$. Po izreku Riesz-Markova obstaja (enolična) regularna kompleksna Borelova mera $\mu_{u,v}$, tako da velja

$$\langle \varphi(a)v, u \rangle = \int_X a d\mu_{u,v}, \quad \forall a \in \mathfrak{A}.$$

Vzemimo poljubnih n vektorjev $u_1, \dots, u_n \in \mathcal{H}$ in definiramo pozitivno mero $\mu := \sum_{i,j}^n |\mu_{u_i, u_j}|$. Označimo s $h_{u_i, u_j} = \frac{d\mu_{u_i, u_j}}{d\mu}$ Radon–Nikodymove odvode. Dokazujemo, da je matrika

$$H(x) = [h_{u_i, u_j}(x)]_{i,j}$$

pozitivna μ -skoraj povsod. Vzemimo poljubne skalarje $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ in definiramo $u := \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i$. Tedaj je

$$\begin{aligned} \langle \varphi(a)u, u \rangle &= \left\langle \varphi(a) \left(\sum_{j=1}^n \lambda_j u_j \right), \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i \right\rangle \\ &= \sum_{i,j}^n \bar{\lambda}_i \lambda_j \langle \varphi(a)u_j, u_i \rangle \\ &= \sum_{i,j}^n \bar{\lambda}_i \lambda_j \int_X a d\mu_{u_i, u_j}. \end{aligned}$$

Ker je φ pozitivna preslikava, je

$$\mu_{u,u} = \sum_{i,j}^n \bar{\lambda}_i \lambda_j \mu_{u_i, u_j}$$

pozitivna mera. Opazimo, da velja $\mu_{u,u} \ll \mu$, torej je njen Radon–Nikodymov odvod

$$\frac{d\mu_{u,u}}{d\mu} = \sum_{i,j}^n \bar{\lambda}_i \lambda_j h_{u_i, u_j} \geq 0$$

μ -skoraj povsod. Dokazali smo, da je za vsak $\lambda \in \mathbb{C}^n$ funkcija $\langle H(x)\lambda, \lambda \rangle$ nenegativna μ -skoraj povsod. Vzemimo nek gost števen podprostor $D \subseteq \mathbb{C}^n$, recimo $D = (\mathbb{Q} + i\mathbb{Q})^n$. Za vsak $\lambda \in D$ označimo

$$N_\lambda := \{x \in X \mid \langle H(x)\lambda, \lambda \rangle < 0\}$$

ter $N := \bigcup_{\lambda \in D} N_\lambda$. Ker je $\mu(N_\lambda) = 0$ za vsak $\lambda \in D$ in je D števna množica, je tudi $\mu(N) = 0$. Vzemimo poljuben $x \notin N$. Potem je zvezna funkcija $\lambda \mapsto \langle H(x)\lambda, \lambda \rangle$ nenegativna na $D \subseteq \mathbb{C}^n$, torej je nenegativna na celotnem prostoru $\mathbb{C}^n$. To pomeni, da je $H(x)$ nenegativna matrika povsod razen na μ -ničelni množici N . Sedaj vzemimo poljubne $n \in \mathbb{N}$, $a_i, \dots, a_n \in \mathfrak{A}$ in $u_1, \dots, u_n \in \mathcal{H}$. Potem velja

$$\begin{aligned} \left\langle \varphi^{(n)} \left(\begin{bmatrix} a_1^* a_1 & \cdots & a_1^* a_n \\ \vdots & & \vdots \\ a_n^* a_1 & \cdots & a_n^* a_n \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \right\rangle &= \sum_{i,j} \langle \varphi(a_i^* a_j) u_j, u_i \rangle \\ &= \sum_{i,j} \int_X \overline{a_i}(x) a_j(x) d\mu_{u_i, u_j} \\ &= \sum_{i,j} \int_X \overline{a_i}(x) a_j(x) h_{u_i, u_j}(x) d\mu \\ &= \int_X \sum_{i,j} \overline{a_i}(x) a_j(x) h_{u_i, u_j}(x) d\mu \geq 0 \\ &= \int_X \left\langle H(x) \begin{bmatrix} a_1(x) \\ \vdots \\ a_n(x) \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_1(x) \\ \vdots \\ a_n(x) \end{bmatrix} \right\rangle d\mu \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

- (b) Predpostavimo sedaj, da je $\mathfrak{B} = C(X)$ za nek kompakten Hausdorffov prostor X . Vzemimo poljubno pozitivno matriko $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathfrak{A})$ in $b_1, \dots, b_n \in C(X)$. Dokazati želimo, da velja $\sum_{i,j} b_j^* \varphi(a_{ij}) b_i \geq 0$. Za poljuben $x \in X$ imamo

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i,j} b_j^* \varphi(a_{ij}) b_i \right) (x) &= \sum_{i,j} \overline{b_j}(x) \cdot \varphi(a_{ij})(x) \cdot b_i(x) \\ &= \sum_{i,j} \varphi(\overline{b_j}(x) \cdot a_{ij} \cdot b_i(x))(x) \\ &= \varphi \left(\sum_{i,j} \overline{b_j}(x) \cdot a_{ij} \cdot b_i(x) \right) (x) \\ &= \varphi \left(\begin{bmatrix} b_1(x) \\ \vdots \\ b_n(x) \end{bmatrix}^* A \begin{bmatrix} b_1(x) \\ \vdots \\ b_n(x) \end{bmatrix} \right) (x) \geq 0. \quad \square \end{aligned}$$

Opomba 5.5. V točki (b) dokaza nismo nikjer uporabili dejstva, da φ slika iz celotne C^* -algebre $\mathfrak{A}$. S popolnoma enakim argumentom lahko dokažemo, da je

pozitivna preslikava $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow C(X)$ tudi povsem pozitivna, pri čemer je $\mathcal{S} \subseteq \mathfrak{A}$ poljuben operatorski sistem.

Za trditev (a) pa to ne velja. Protiprimer že srečali v zgledu 3.18, kjer smo definirali pozitivno preslikavo $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow M_2(\mathbb{C})$ na operatorskem sistemu $\mathcal{S} \subseteq C(\mathbb{T})$, tako da φ ni povsem pozitivna. Težava je v tem, da razcep iz leme 5.3 ne velja za poljuben operatorski sistem, temveč zgolj za celotno C^* -algebro $\mathfrak{A}$.

Posledica 5.6. *Naj bosta $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ C^* -algebri in $\varphi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$ enotska skrčitev. Če je ena izmed C^* -algeber $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ komutativna, potem je φ povsem skrčitev.*

Dokaz. Ker je φ enotska skrčitev, je pozitivna. Po trditvi 5.2 je tudi povsem pozitivna in zato povsem skrčitev. $\square$

Opomba 5.7. Po prejšnji opombi je vsaka enotska skrčitev $\varphi : \mathcal{M} \rightarrow C(X)$ na poljubnem operatorskem prostoru povsem skrčitev.

Sedaj se vrnemo na primer 3.22.

Zgled 5.8. Naj bo $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ skrčitev in

$$\tilde{\varphi} : \mathcal{M} + \mathcal{M}^*, \quad p + q^* \mapsto p(T) + q(T)^*,$$

pozitivna preslikava iz primera 3.9. Ker je $\mathcal{M} + \mathcal{M}^*$ enotska algebra v $C(\mathbb{T})$, ki loči točke in je zaprta za adjungiranje, je po Stone-Weierstrassovem izreku gosta v $C(\mathbb{T})$. Ker je $\tilde{\varphi}$ pozitivna preslikava na $\mathcal{M} + \mathcal{M}^*$, jo lahko razširimo do pozitivne preslikave $\psi : C(\mathbb{T}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$. Da to dokažemo, vzamemo poljuben $x \in \mathcal{H}$ z $\|x\| = 1$. Potem je

$$\rho_x : \mathcal{M} + \mathcal{M}^* \rightarrow \mathbb{C}, \quad \rho_x(a) = \langle \tilde{\varphi}(a)x, x \rangle$$

pozitiven funkcional, torej $\|\rho_x\| = \rho_x(1)$. To pomeni, da enako velja tudi za njegovo razširitev $\langle \psi(a)x, x \rangle$, ki je zato tudi pozitivna. S tem smo dokazali, da je preslikava $\psi : C(\mathbb{T}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ pozitivna. Po trditvi 5.2 pa sledi, da je tudi povsem pozitivna. $\diamond$

Opomba 5.9. Po prejšnjem zgledu za vsako skrčitev $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ obstaja enolična povsem pozitivna preslikava $\psi : C(\mathbb{T}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$, tako da velja $\psi(p) = p(T)$ za poljuben polinom $p \in C(\mathbb{T})$.

Podrazdelek zaključimo z naslednjo trditvijo.

Trditev 5.10 (Russo-Dye). *Če sta $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ C^* -algebri in $\varphi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$ pozitivna preslikava, potem je $\|\varphi\| = \|\varphi(1)\|$.*

Dokaz. Brez škode za splošnost predpostavimo, da je $\mathfrak{A} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$. Vzemimo poljuben $a \in \mathfrak{A}$ z $\|a\| \leq 1$. Po prejšnji opombi obstaja povsem pozitivna preslikava $\psi : C(\mathbb{T}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$, tako da je $\psi(z) = a$. Po konstrukciji je

$$\psi(C(\mathbb{T})) = \overline{\{p(a) \mid p \in \mathbb{C}[z]\}} \subseteq \mathfrak{A}.$$

Posledično je preslikava

$$\varphi \circ \psi : C(\mathbb{T}) \rightarrow \mathfrak{B}$$

pozitivna, zato je po trditvi 5.2 povsem pozitivna. Od tod sledi

$$\|\varphi(a)\| = \|(\varphi \circ \psi)(z)\| \leq \|(\varphi \circ \psi)(1)\| = \|\varphi(1)\|$$

in posledično $\|\varphi\| = \|\varphi(1)\|$. $\square$

Opomba 5.11. Trditev 5.10 velja tudi pri šibkejših predpostavkah. Za domeno φ lahko namreč vzamemo $\mathcal{A} + \mathcal{A}^*$, kjer je $\mathcal{A} \subseteq \mathfrak{A}$ enotska podalgebra.

Posledica 5.12 (Matrična von Neumannova neenakost). *Naj bo $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ skrčitev in $p = [p_{ij}]_{i,j} \in M_n(\mathbb{C}[z])$ kompleksna matrični polinom. Potem velja*

$$\|p(T)\| = \|[p_{ij}(T)]_{i,j}\| \leq \sup\{\|[p_{ij}(z)]_{i,j}\| \mid z \in \mathbb{T}\}.$$

Dokaz. Ker je $\psi : C(\mathbb{T}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ enotska povsem pozitivna preslikava, velja $\|\psi\|_{\text{po}} = 1$. V posebnem velja $\|\psi^{(n)}\| = 1$ za vsak $n \in \mathbb{N}$. Potem za $[p_{ij}]_{i,j} \in M_n(\mathbb{C}[z])$ velja

$$\|[p_{ij}(T)]_{i,j}\| = \|\psi^{(n)}([p_{ij}]_{i,j})\| \leq \|[p_{ij}]_{i,j}\|. \quad \square$$

6 Stinespringov izrek

V tem podrazdelku povežemo povsem pozitivne preslikave z dilatacijami. Ključni rezultat je Stinespringov izrek, ki je prvič dokazan v članku [6]. Stinespringov izrek implicira, da je vsaka povsem pozitivna preslikava $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ oblike (3.1). Razdelek zaključimo z dokazom Choijevega izreka, ki nam pove, da so vse povsem pozitivne preslikave $\varphi : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_m(\mathbb{C})$ vsote preslikav iz zgleda 3.9.

Izrek 6.1 (Stinespring). *Naj bo $\mathfrak{A}$ C^* -algebra in $\varphi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ povsem pozitivna preslikava. Potem obstaja Hilbertov prostor $\mathcal{K}$, omejen operator $V \in \mathcal{B}(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ in $*$ -homomorfizem $\pi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$, tako da je*

$$\varphi(a) = V^* \pi(a) V, \quad \forall a \in \mathfrak{A}.$$

Če je φ enotska preslikava, potem je V izometrija.

Opomba 6.2. Če je preslikava $\varphi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ iz Stinespringovega izreka enotska, lahko Hilbertov prostor $\mathcal{H}$ identificiramo s podprostorom $V\mathcal{H} \leq \mathcal{K}$, saj je V izometrija. S to identifikacijo operator V^* sovпада s projekcijo $P_{\mathcal{H}}$ iz $\mathcal{K}$ na $\mathcal{H}$, zato velja

$$\varphi(a) = P_{\mathcal{H}} \pi(a)|_{\mathcal{H}}, \quad \forall a \in \mathfrak{A}.$$

Stinespringov izrek nam torej pove, da lahko vsako enotsko povsem pozitivno preslikavo $\varphi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ dilatiramo do $*$ -homomorfizma.

Dokaz izreka 6.1. Oglejmo si algebraični tenzorski produkt vektorskih prostorov $\mathfrak{A} \otimes \mathcal{H}$. Na njem definiramo seskvilinearno formo

$$\langle a \otimes x, b \otimes y \rangle = \langle \varphi(b^* a) x, y \rangle,$$

ki jo razširimo linearno. Za vsak $u = \sum_{j=1}^n a_j \otimes x_j \in \mathfrak{A} \otimes \mathcal{H}$ imamo

$$\begin{aligned} \langle u, u \rangle &= \sum_{i,j} \langle \varphi(a_i^* a_j) x_j, x_i \rangle \\ &= \left\langle \varphi^{(n)} \left(\begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}^* \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \right\rangle \geq 0, \end{aligned}$$

kar pomeni, da je $\langle \cdot, \cdot \rangle$ polskalarni produkt na $\mathfrak{A} \otimes \mathcal{H}$.

Vsakemu elementu $a \in \mathfrak{A}$ lahko priredimo preslikavo

$$\pi_0(a) : \mathfrak{A} \otimes \mathcal{H} \rightarrow \mathfrak{A} \otimes \mathcal{H}, \quad \sum_{j=1}^n a_j \otimes x_j \mapsto \sum_{j=1}^n a a_j \otimes x_j.$$

Sedaj imamo za $u = \sum_{j=1}^n a_j \otimes x_j$ in $v = \sum_{i=1}^m b_i \otimes y_i$

$$\begin{aligned} \langle u, \pi_0(a)v \rangle &= \left\langle \sum_{j=1}^n a_j \otimes x_j, \sum_{i=1}^m a b_i \otimes y_i \right\rangle \\ &= \sum_{i,j} \langle \varphi((a b_i)^* a_j) x_j, y_i \rangle \\ &= \sum_{i,j} \langle \varphi(b_i^* a^* a_j) x_j, y_i \rangle \\ &= \langle \pi_0(a^*) u, v \rangle. \end{aligned} \tag{6.1}$$

Definirajmo

$$\mathcal{N} := \{u \in \mathfrak{A} \otimes \mathcal{H} \mid \langle u, u \rangle = 0\}.$$

Po Cauchy-Schwarzevi neenakosti je $\mathcal{N}$ podprostor v $\mathfrak{A} \otimes \mathcal{H}$ in $\langle \cdot, \cdot \rangle$ inducira skalarni produkt na $\mathfrak{A} \otimes \mathcal{H} / \mathcal{N}$. Slednji prostor nato dopolnimo do Hilbertovega prostora $\mathcal{K}$.

Vzemimo poljuben $u \in \mathfrak{A} \otimes \mathcal{H}$ in definirajmo

$$f(a) := \langle \pi_0(a)u, u \rangle.$$

Potem je po (6.1) f pozitiven linearen funkcional na $\mathfrak{A}$, saj je

$$\begin{aligned} f(a^* a) &= \langle \pi_0(a^* a)u, u \rangle \\ &= \langle \pi_0(a^*) \pi_0(a)u, u \rangle \\ &= \langle \pi_0(a)u, \pi_0(a)u \rangle \geq 0. \end{aligned}$$

Od tod sledi

$$\langle \pi_0(a)u, \pi_0(a)u \rangle = f(a^* a) \leq \|a^* a\| \cdot f(1) = \|a\|^2 \cdot \langle u, u \rangle.$$

Posledično je $\pi_0(a)(\mathcal{N}) \subseteq \mathcal{N}$, torej je $\mathcal{N}$ invarianten podprostor za $\pi_0(a)$ v $\mathfrak{A} \otimes \mathcal{H}$, zaradi česar $\pi_0(a)$ inducira omejen operator na $\mathfrak{A} \otimes \mathcal{H} / \mathcal{N}$, ki ga nato razširimo do omejenega operatorja na $\mathcal{K}$. Zato π_0 inducira preslikavo (ki je hkrati $*$ -homomorfizem)

$$\pi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K}), \quad \pi(a)(u + \mathcal{N}) = \pi_0(a)u + \mathcal{N}.$$

Nazadnje definiramo še

$$V : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{K}, \quad x \mapsto 1 \otimes x + \mathcal{N}.$$

Ker je

$$\|Vx\|^2 = \langle 1 \otimes x, 1 \otimes x \rangle_{\mathcal{K}} = \langle \varphi(1)x, x \rangle_{\mathcal{H}} \leq \|\varphi(1)\| \cdot \|x\|^2,$$

je V omejen operator. Za poljubna $x, y \in \mathcal{H}$ in $a \in \mathfrak{A}$ imamo

$$\begin{aligned}\langle Vx, a \otimes y + \mathcal{N} \rangle &= \langle 1 \otimes x + \mathcal{N}, a \otimes y + \mathcal{N} \rangle \\ &= \langle \varphi(a^*)x, y \rangle \\ &= \langle x, \varphi(a)^*y \rangle \\ &= \langle x, \varphi(a)y \rangle,\end{aligned}$$

torej je $V^*(a \otimes y + \mathcal{N}) = \varphi(a)y$. Sedaj je

$$V^*\pi(a)Vy = V^*\pi(a)(1 \otimes y + \mathcal{N}) = V^*(a \otimes y + \mathcal{N}) = \varphi(a)y.$$

Če je φ enotska preslikava, potem za poljuben vektor $y \in \mathcal{H}$ velja

$$V^*Vy = V^*\pi(1)Vy = \varphi(1)y = y,$$

torej je $V^*V = I$ in je V izometrija. □

Opomba 6.3. Stinespringov izrek je posplošitev izreka GNS o upodobitvah. Če namreč vzamemo $\mathcal{H} = \mathbb{C}$, potem je $\mathcal{B}(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$ in $\mathfrak{A} \otimes \mathbb{C} = \mathfrak{A}$, tako da je izometrija $V : \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{K}$ določena z $V(1) = x$. Tako imamo

$$\varphi(a) = \varphi(a)(1) \cdot 1 = V^*\pi(a)V(1) \cdot 1 = \langle \pi(a)V(1), V(1) \rangle_{\mathcal{K}}$$

Trojici $(\pi, V, \mathcal{K})$ iz Stinespringovega izreka pravimo *Stinespringova upodobitev* za φ . Naravno se je vprašati, ali je Stinespringova upodobitev enolična. Če že imamo eno Stinespringovo upodobitev $(\pi, V, \mathcal{K})$ za φ , lahko definiramo nov prostor $\mathcal{K}_1 := \overline{\pi(\mathfrak{A})V\mathcal{H}} \leq \mathcal{K}$, ki reducira $\pi(\mathfrak{A})$. To nam omogoča, da definiramo novo upodobitev $\pi_1 : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K}_1)$, za katero prav tako velja

$$\varphi(a) = V^*\pi_1(a)V, \quad \forall a \in \mathfrak{A}$$

in $(\pi_1, V, \mathcal{K}_1)$ je še ena Stinespringova upodobitev za φ . To je motivacija za naslednjo definicijo.

Definicija 6.4. Stinespringova upodobitev $(\pi, V, \mathcal{K})$ povsem pozitivne preslikave $\varphi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ je *minimalna*, če je $\overline{\pi(\mathfrak{A})V\mathcal{H}} = \mathcal{K}$.

Trditev 6.5. Naj bo $\mathfrak{A}$ C^* -algebra in $\varphi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ povsem pozitivna preslikava. Če sta $(\pi_1, V_1, \mathcal{K}_1), (\pi_2, V_2, \mathcal{K}_2)$ minimalni Stinespringovi upodobitvi, potem obstaja unitaren operator $U : \mathcal{K}_1 \rightarrow \mathcal{K}_2$, tako da velja $UV_1 = V_2$ in $U\pi_1U^* = \pi_2$.

Dokaz. Definiramo preslikavo

$$\tilde{U} : \pi_1(\mathfrak{A})V_1\mathcal{H} \rightarrow \pi_2(\mathfrak{A})V_2\mathcal{H}, \quad \sum_i \pi_1(a_i)V_1x_i \mapsto \sum_i \pi_2(a_i)V_2x_i.$$

Takoj lahko opazimo, da je $\tilde{U}$ surjekcija.

Nadalje dokažemo, da je $\tilde{U}$ izometrija:

$$\begin{aligned}
\left\| \sum_i \pi_1(a_i) V_1 x_i \right\|^2 &= \left\langle \sum_i \pi_1(a_i) V_1 x_i, \sum_j \pi_1(a_j) V_1 x_j \right\rangle \\
&= \sum_i \sum_j \langle \pi_1(a_i) V_1 x_i, \pi_1(a_j) V_1 x_j \rangle \\
&= \sum_i \sum_j \langle V_1^* \pi_1^*(a_j) \pi_1(a_i) V_1 x_i, x_j \rangle \\
&= \sum_i \sum_j \langle V_1^* \pi_1(a_j^* a_i) V_1 x_i, x_j \rangle \\
&= \sum_i \sum_j \langle \varphi(a_j^* a_i) x_i, x_j \rangle \\
&= \sum_i \sum_j \langle V_2^* \pi_2(a_j^* a_i) V_2 x_i, x_j \rangle \\
&= \left\langle \sum_i \pi_2(a_i) V_2 x_i, \sum_j \pi_2(a_j) V_2 x_j \right\rangle \\
&= \left\| \sum_i \pi_2(a_i) V_2 x_i \right\|^2.
\end{aligned}$$

Torej lahko razširimo $\tilde{U}$ do izometrije $U : \mathcal{K}_1 \rightarrow \mathcal{K}_\infty$ Ker je $U(\mathcal{K}_1)$ gosta v $\mathcal{K}_2$, je U surjektivna.

Enakost $UV_1 = V_2$ sledi direktno iz definicije U . Do dokažemo $U\pi_1 = \pi_2U$, opazimo, da za vsak $a \in \mathfrak{A}$ velja

$$\begin{aligned}
\pi_2(a)U \Big|_{\pi_1(\mathfrak{A})V_1\mathcal{H}} &= \pi_2(a)\tilde{U} \Big|_{\pi_1(\mathfrak{A})V_1\mathcal{H}} \\
&= \tilde{U}\pi_1(a) \Big|_{\pi_1(\mathfrak{A})V_1\mathcal{H}} \\
&= U\pi_1(a) \Big|_{\pi_1(\mathfrak{A})V_1\mathcal{H}},
\end{aligned}$$

torej $\pi_2(a)U = U\pi_1(a)$. □

Opomba 6.6. V dokazu izreka 6.1 je množica

$$\pi(\mathfrak{A})V\mathcal{H} = \mathfrak{A} \otimes \mathcal{H} / \mathcal{N}$$

gosta v svoji napolnitvi $\mathcal{K}$, torej v dokazu konstruiramo minimalno Stinespringovo upodobitev.

Posledica 6.7 (Sz.-Nagyjeva minimalna unitarna dilatacija). *Naj bo $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ skrčitev. Potem obstaja Hilbertov prostor $\mathcal{K} \supseteq \mathcal{H}$ in unitaren operator $U \in \mathcal{B}(\mathcal{K})$, tako da je $\mathcal{K}$ najmanjši reducirajoč prostor za U , da velja*

$$T^n = P_{\mathcal{H}} U^n \Big|_{\mathcal{H}}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Če je $(U', \mathcal{K}')$ še en takšen par, potem obstaja unitaren operator $V : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{K}'$, tako da je $V \Big|_{\mathcal{H}} = \text{id}_{\mathcal{H}}$ in $VUV^ = U'$.*

Dokaz. Stinespringov izrek uporabimo na pozitivni preslikavi $\psi : C(\mathbb{T}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ iz zgleda 5.8, ki preslika poljuben polinom $p \in \mathbb{C}[z]$ v $p(T) \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$. Potem obstaja minimalna Stinespringova upodobitev $(\pi, V, \mathcal{K})$, pri čemer je V izometrija, saj je ψ enotska preslikava. Posledično lahko identificiramo $\mathcal{H} \equiv V\mathcal{H}$.

Sedaj za poljuben $n \in \mathbb{N}$ velja

$$T^n = \psi(z^n) = P_{\mathcal{H}}\pi(z)^n|_{\mathcal{H}} = P_{\mathcal{H}}U^n|_{\mathcal{H}},$$

kjer je $U := \pi(z) \in \mathcal{B}(\mathcal{K})$ unitaren operator. Po zveznem funkcijskem računu je $\pi(f) = f(U)$ za poljubno funkcijo $f \in C(\mathbb{T})$. Ker je $(\pi, V, \mathcal{K})$ minimalna Stinespringova upodobitev, je $\pi(C(\mathbb{T}))\mathcal{H} = \mathcal{K}$. Ker pa je $\pi(C(\mathbb{T})) = C^*(U)$, je to ekvivalentno

$$\overline{\{U^n h \mid n \in \mathbb{Z}, h \in \mathcal{H}\}} = \mathcal{K}.$$

Slednje pa je ekvivalentno temu, da je $\mathcal{K}$ najmanjši reducirajoč prostor za U . Zadnja trditev v izreku nato sledi direktno iz unitarne ekvivalence minimalnih Stinespringovih upodobitev. $\square$

Nadaljujemo s posplošitvijo Radon-Nikodymovega izreka za povsem pozitivne preslikave.

Definicija 6.8. Na množici $\text{PP}(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ lahko definiramo delno urejenost

$$\varphi \leq \psi \iff \psi - \varphi \in \text{PP}(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}).$$

Trditev 6.9. Naj bosta $\varphi, \psi \in \text{PP}(\mathfrak{A}, \mathcal{B}(\mathcal{H}))$ in $(\pi, V, \mathcal{K})$ minimalna Stinespringova upodobitev ψ . Potem je $\psi \geq \varphi$ natanko tedaj, ko obstaja enoličen $T \in \pi(\mathfrak{A})'$, tako da je

$$\varphi(a) = V^*T\pi(a)V$$

in $0 \leq T \leq 1$.

Opomba 6.10. Za poljubno množico $\mathcal{S} \subseteq \mathfrak{A}$ definiramo njen *komutant* kot

$$\mathcal{S}' := \{a \in A \mid as = sa, \forall s \in \mathcal{S}\}.$$

Dokaz. Denimo, da je $\varphi = V^*T\pi(a)V$, pri čemer velja $0 \leq T \leq 1$ in $T \in \pi(\mathfrak{A})'$. Ker je $1 - T \geq 0$, lahko definiramo $S := (1 - T)^{\frac{1}{2}}$. Opazimo, da velja $1 - T \in \pi(\mathfrak{A})'$, zato imamo po zveznem funkcijskem računu $S \in \pi(\mathfrak{A})'$. Od tod pa sledi, da je

$$\psi - \varphi = V^*(1 - T)\pi(a)V = V^*S^*\pi(a)SV$$

povsem pozitivna.

Za obratno implikacijo predpostavimo, da je $\psi - \varphi$ povsem pozitivna. Ker so vse minimalne Stinespringove dilatacije ψ unitarno ekvivalentne, lahko brez škode za splošnost vzamemo trojico $(\pi, V, \mathcal{K})$, ki smo jo konstruirali v dokazu izreka 6.1. V istem dokazu smo vpeljali polskalarna produkta

$$\langle a \otimes x, b \otimes y \rangle_{\varphi} := \langle \varphi(b^*a)x, y \rangle, \quad \langle a \otimes x, b \otimes y \rangle_{\psi} := \langle \psi(b^*a)x, y \rangle$$

na prostoru $\mathfrak{A} \otimes \mathcal{H}$. Ker je $\psi - \varphi$ povsem pozitivna, sledi

$$\langle u, u \rangle_{\varphi} \leq \langle u, u \rangle_{\psi}$$

za poljuben $u \in \mathfrak{A} \otimes \mathcal{H}$. Po Cauchy-Schwarzevi neenakosti imamo za poljubna $u, v \in \mathcal{H}$

$$\langle u, v \rangle_\varphi \leq \langle u, u \rangle_\varphi \langle v, v \rangle_\varphi \leq \langle u, u \rangle_\psi \langle v, v \rangle_\psi. \quad (6.2)$$

Označimo $\mathcal{N} = \{u \in \mathfrak{A} \otimes \mathcal{H} \mid \langle u, u \rangle_\psi\}$, tako da $\langle \cdot, \cdot \rangle_\psi$ tvori skalarni produkt na prostoru $\mathfrak{A} \otimes \mathcal{H} / \mathcal{N}$. Slednjega nato napolnimo do Hilbertovega prostora $\mathcal{K}$.

Po neenakosti (6.2) $\langle \cdot, \cdot \rangle_\varphi$ inducira omejen polskalarni produkt na $\mathcal{K}$. Po Riesz-zovem izreku obstaja operator $T \in \mathcal{B}(\mathcal{K})$, tako da je

$$\langle u, v \rangle_\varphi = \langle Tu, v \rangle_\psi, \quad \forall u, v \in \mathcal{K}.$$

Potem za vsak $a \in \mathfrak{A}$ in $x, y \in \mathcal{H}$ velja

$$\begin{aligned} \langle (V^*T\pi(a)V)x, y \rangle &= \langle T\pi(a)Vx, Vy \rangle_\psi \\ &= \langle T\pi(a)(1 \otimes x + \mathcal{N}), (1 \otimes y + \mathcal{N}) \rangle_\psi \\ &= \langle T(a \otimes x + \mathcal{N}), (1 \otimes y + \mathcal{N}) \rangle_\psi \\ &= \langle (a \otimes x + \mathcal{N}), (1 \otimes y + \mathcal{N}) \rangle_\varphi \\ &= \langle \varphi(a)x, y \rangle, \end{aligned}$$

od koder sledi $\varphi(a) = V^*T\pi(a)V$. Prav tako za vsak $u \in \mathcal{K}$ velja

$$0 \leq \langle Tu, u \rangle_\psi = \langle u, u \rangle_\varphi \leq \langle u, u \rangle_\psi,$$

torej $0 \leq T \leq 1$.

Da dokažemo $T \in \pi(\mathfrak{A})'$, vzamemo poljubne $a, b, c \in \mathfrak{A}$ ter $x, y \in \mathcal{H}$. Potem

$$\begin{aligned} \langle T\pi(a)(b \otimes x + \mathcal{N}), (c \otimes y + \mathcal{N}) \rangle_\psi &= \langle T(ab \otimes x + \mathcal{N}), (c \otimes y + \mathcal{N}) \rangle_\psi \\ &= \langle (ab \otimes x + \mathcal{N}), (c \otimes y + \mathcal{N}) \rangle_\varphi \\ &= \langle \varphi(c^*ab)x, y \rangle \\ &= \langle \varphi((a^*c)^*b)x, y \rangle \\ &= \langle (b \otimes x + \mathcal{N}), (a^*c \otimes y + \mathcal{N}) \rangle_\varphi \\ &= \langle T(b \otimes x + \mathcal{N}), \pi(a^*)(c \otimes y + \mathcal{N}) \rangle_\psi \\ &= \langle \pi(a)T(b \otimes x + \mathcal{N}), (c \otimes y + \mathcal{N}) \rangle_\psi \end{aligned}$$

torej $\langle T\pi(a)u, v \rangle_\psi = \langle \pi(a)Tu, v \rangle_\psi$ za vse $u, v \in \mathcal{K}$. Od tod dobimo $T\pi(a) = \pi(a)T$.

Za dokaz enoličnosti vzemimo nek $T' \in \pi(\mathfrak{A})'$, tako da je $0 \leq T' \leq 1$ in $\varphi = V^*T'\pi V$. Ponovno vzemimo poljubna $a, b \in \mathfrak{A}$ in $x, y \in \mathcal{H}$. Potem je

$$\begin{aligned} \langle T(a \otimes x + \mathcal{N}), (b \otimes y + \mathcal{N}) \rangle_\psi &= \langle (V^*T\pi(b^*a)V)x, y \rangle \\ &= \langle (V^*T'\pi(b^*a)V)x, y \rangle \\ &= \langle T'(a \otimes x + \mathcal{N}), (b \otimes y + \mathcal{N}) \rangle_\psi, \end{aligned}$$

zato je $\langle Tu, v \rangle_\psi = \langle T'u, v \rangle_\psi$ za poljubna $u, v \in \mathcal{K}$. Od tod dobimo $T' = T$. $\square$

Za zaključek podrazdelka dokažemo uporabno posledico Stinespringovega izreka, ki klasificira vse povsem pozitivne preslikave med prostori končno razsežnih matrik.

Izrek 6.11 (Choi). Naj bo $\varphi : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_m(\mathbb{C})$ povsem pozitivna. Potem obstaja $r \leq m \cdot n$, tako da imamo r kompleksnih matrik $V_1, \dots, V_r$ dimenzije $n \times m$, ki zadoščajo

$$\varphi(A) = \sum_{k=1}^r V_k^* A V_k, \quad \forall A \in M_n(\mathbb{C}). \quad (6.3)$$

Za dokaz potrebujemo naslednjo lemo.

Lema 6.12. Naj bo $\mathfrak{A}$ C^* -algebra in $\pi : M_n(\mathfrak{A}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$ upodobitev. Potem obstaja upodobitev $\rho : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$, tako da je π unitarno ekvivalentna $\rho^{(n)} : M_n(\mathfrak{A}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}^n)$.

Dokaz. Za poljuben par indeksov i, j definirajmo $P_{ij} := \pi(E_{ij}) \in \mathcal{B}(\mathcal{K})$. Očitno velja $P_{ij}^* = P_{ji}$ in

$$P_{ij}P_{kl} = \delta_{jk}P_{il}. \quad (6.4)$$

V posebnem je

$$P_{ii}^2 = P_{ii} = P_{ii}^*,$$

torej je P_{ii} ortogonalna projekcija na zaprt (po izreku o zaprtem grafu) podprostor $\mathcal{H}_i \subseteq \mathcal{K}$. Ker je

$$P_{11} + \dots + P_{nn} = I, \quad P_{ii}P_{jj} = 0,$$

mora veljati

$$\mathcal{H}_1 + \dots + \mathcal{H}_n = \mathcal{K}, \quad \mathcal{H}_i \perp \mathcal{H}_j$$

in posledično

$$\mathcal{H}_1 \oplus \dots \oplus \mathcal{H}_n = \mathcal{K}.$$

Za vsak $a \in \mathfrak{A}$ ter P_{ii} velja $P_{ii}\pi(aI) = \pi(aI)P_{ii}$, torej je vsak $\mathcal{H}_i$ reducirajoč prostor za $\pi(aI)$ in je

$$\pi_{ii} : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_i), \quad \pi_{ii}(a) = \pi(aI)|_{\mathcal{H}_i}$$

upodobitev.

Po enačbi (6.4) imamo $P_{ij}(\mathcal{H}_k) = \delta_{jk}\mathcal{H}_i$, kar pomeni, da lahko P_{ij} zapišemo v matrični obliki na $\mathcal{H}_1 \oplus \dots \oplus \mathcal{H}_n$ kot

$$P_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \underbrace{P_{ij}|_{\mathcal{H}_j}}_{(i,j)} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Iz (6.4) prav tako sledi

$$P_{ij}^*P_{ij} = P_{ji}P_{ij} = P_{jj},$$

od koder dobimo

$$(P_{ij}|_{\mathcal{H}_j})^*(P_{ij}|_{\mathcal{H}_j}) = (P_{ji}|_{\mathcal{H}_i})(P_{ij}|_{\mathcal{H}_j}) = P_{jj}|_{\mathcal{H}_j} = \text{id}_{\mathcal{H}_j}.$$

To implicira, da je $P_{ij}|_{\mathcal{H}_j} : \mathcal{H}_j \rightarrow \mathcal{H}_i$ unitaren operator in

$$P_{ij}\pi_{jj}(a)P_{ji} = \pi_{ii}(a), \quad \forall a \in \mathfrak{A}.$$

Sedaj definiramo $\mathcal{H} := \mathcal{H}_1$, $\rho := \pi_{11}$ in $U_i := P_{i1}|_{\mathcal{H}_1} : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_i$, zato je

$$U = \oplus_i^n U_i : \mathcal{H}^n \rightarrow \oplus_{i=1}^n \mathcal{H}_i = \mathcal{K}$$

unitaren operator. Ker je

$$\begin{aligned} U^* \pi(a E_{ij}) U &= \begin{bmatrix} U_1^* & & \\ & \ddots & \\ & & U_n^* \end{bmatrix} \pi_{ii}(a) P_{ij} \begin{bmatrix} U_1 & & \\ & \ddots & \\ & & U_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} P_{11}|_{\mathcal{H}_1} & & \\ & \ddots & \\ & & P_{1n}|_{\mathcal{H}_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \pi_{ii}(a) P_{ij}|_{\mathcal{H}_j} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{11}|_{\mathcal{H}_1} & & \\ & \ddots & \\ & & P_{n1}|_{\mathcal{H}_1} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (P_{1i}|_{\mathcal{H}_i}) \pi_{ii}(a) (P_{ij}|_{\mathcal{H}_j}) (P_{j1}|_{\mathcal{H}_1}) \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (P_{1i}|_{\mathcal{H}_i}) \pi_{ii}(a) (P_{i1}|_{\mathcal{H}_1}) \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \pi(a) \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

sledi $U^* \pi([a_{ij}]_{i,j}) U = [\pi(a_{ij})]_{i,j}$. □

Če v zgornji lemi vzamemo $\mathfrak{A} = \mathbb{C}$, potem za vsak $*$ -homomorfizem $\pi : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$ obstaja Hilbertov prostor $\mathcal{H}$ in unitaren operator $U : \mathcal{H}^n \rightarrow \mathcal{K}$, tako da za vsako matriko $A = [a_{ij}]_{i,j} \in M_n(\mathfrak{A})$ velja

$$U^* \pi(A) U = A \otimes \text{id}_{\mathcal{H}} \in M_n(\mathcal{B}(\mathcal{H})) = \mathcal{B}(\mathcal{H}^n).$$

Denimo, da je $\{v_i\}_{i \in I}$ ortonormalna baza $\mathcal{H}$. Potem imamo dekompozicijo

$$\mathcal{H}^n = \oplus_{i \in I} \mathcal{V}_i,$$

pri čemer je $\mathcal{V}_i = \text{Lin}\{u_i\}^n$. Zgornja lema nam potem pove, da je

$$U^* \pi(A) U|_{\mathcal{V}_i} = A : \mathcal{V}_i \rightarrow \mathcal{V}_i,$$

od koder sledi $U^* \pi(A) U = \oplus_{i \in I} A$.

Dokaz izreka 6.11. Naj bo $\varphi : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_m(\mathbb{C}) = \mathcal{B}(\mathbb{C}^m)$ povsem pozitivna prelikava. Po Stinespringovem izreku obstaja upodobitev $\pi : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$ in $V : \mathbb{C}^m \rightarrow \mathcal{K}$, tako da je

$$\varphi(A) = V^* \pi(A) V$$

za vse $A \in M_n(\mathbb{C})$. Iz konstrukcije Stinespringovega izreka sledi

$$\dim(\mathcal{K}) \leq \dim(M_n(\mathbb{C}) \otimes \mathbb{C}^m) = n^2 m.$$

Po prejšnjem odstavku lahko vzamemo $\mathcal{K} = \bigoplus_{k=1}^r \mathbb{C}_k^n$, pri čemer je $r \leq nm$ in $\pi(A)|_{\mathbb{C}_k^n} = A$ za vsak $k \leq r$. V bločno matrični obliki preslikavo $V : \mathbb{C}^m \rightarrow \bigoplus_{k=1}^r \mathbb{C}_k^n$ sedaj zapišemo

$$V = \begin{bmatrix} V_1 \\ \vdots \\ V_r \end{bmatrix}, \quad V_i \in \mathbb{C}^{n \times m}.$$

Če vse to združimo, dobimo

$$\begin{aligned} \varphi(A) &= V^* \pi(A) V \\ &= \begin{bmatrix} V_1^* & \cdots & V_r^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & & \\ & \ddots & \\ & & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ \vdots \\ V_r \end{bmatrix} \\ &= \sum_{k=1}^r V_k^* A V_k \end{aligned}$$

za vsako matriko $A \in M_n(\mathbb{C})$. □

7 Povsem pozitivne preslikave na $M_n(\mathbb{C})$

V tem podrazdelku obravnavamo povsem pozitivne preslikave $\varphi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$, kjer je vsaj ena izmed algeber $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ oblike $M_n(\mathbb{C})$.

Najprej si oglejmo primer, ko je $\mathfrak{A} = M_n(\mathbb{C})$. Za začetek navedemo še en dokaz Choijevega izreka 6.11.

Dokaz Choijevega izreka. Označimo z $E_{ij} \in M_n(\mathbb{C})$ standardne bazne matrike v $M_n(\mathbb{C})$. Definirajmo vektor

$$e = \begin{bmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{n^2}.$$

Potem je

$$ee^* = [E_{ij}]_{i,j} \in M_n(M_n(\mathbb{C}))$$

pozitivna matrika. Ker je φ povsem pozitivna, je *Choijeva matrika* $[\varphi(E_{ij})]_{i,j} = \varphi^{(n)}([E_{ij}]_{i,j}) \in M_{mn}(\mathbb{C})$ prav tako pozitivna. Po lemi 5.3 obstajajo vrstični vektorji $v_1, \dots, v_{mn} \in \mathbb{C}^{mn}$, tako da je

$$[\varphi(E_{ij})]_{i,j} = \sum_{k=1}^{mn} v_k v_k^* \in M_n(M_n(\mathbb{C})) = M_{mn}(\mathbb{C}).$$

Vsakemu stolpcu

$$v_k = \begin{bmatrix} x_1^{(k)} \\ \vdots \\ x_n^{(k)} \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{mn}, \quad x_j^{(k)} \in \mathbb{C}^m,$$

priređimo matriko

$$V_k = \begin{bmatrix} x_1^{(k)*} \\ \vdots \\ x_n^{(k)*} \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{n \times m}.$$

Opazimo, da velja

$$V_k^* E_{ij} V_k = (V_k^* e_i)(e_j^* V_k) = x_i^{(k)} x_j^{(k)*} = v_k v_k^*,$$

torej

$$\varphi^{(n)}([E_{ij}]_{i,j}) = \sum_{k=1}^{mn} (I_n \otimes V_k)^* [E_{ij}]_{i,j} (I_n \otimes V_k).$$

Sedaj za vsako matriko $A = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} E_{ij} \in M_n(\mathbb{C})$ velja

$$\begin{aligned} \varphi(A) &= \varphi \left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij} E_{ij} \right) \\ &= \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \varphi(E_{ij}) \\ &= \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \sum_{k=1}^{mn} V_k^* E_{ij} V_k \\ &= \sum_{k=1}^{mn} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} V_k^* E_{ij} V_k \\ &= \sum_{k=1}^{mn} V_k^* \left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij} E_{ij} \right) V_k \\ &= \sum_{k=1}^{mn} V_k^* A V_k. \end{aligned} \quad \square$$

V zgornjem dokazu nismo uporabili celotne predpostavke, da je φ povsem pozitivna, temveč zgolj to, da je njena Choijeva matrika $\varphi^{(n)}([E_{ij}]_{i,j})$ pozitivna. Od tod sledi naslednja trditev.

Trditev 7.1. Za linearno preslikavo $\varphi : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_m(\mathbb{C})$ so naslednje trditve ekvivalentne:

1. φ je povsem pozitivna;
2. φ je n -pozitivna;
3. Choijeva matrika $\varphi^{(n)}([E_{ij}]_{i,j})$ je pozitivna;
4. φ je oblike (6.2).

Naj bo $\mathfrak{B}$ sedaj poljubna C^* -algebra. S pomočjo Choijeve matrike lahko karak-teriziramo povsem pozitivne preslikave $\varphi : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathfrak{B}$.

Trditev 7.2. Za linearno preslikavo $\varphi : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathfrak{B}$ so naslednje trditve ekvivalentne:

1. φ je povsem pozitivna;
2. φ je n -pozitivna;
3. Choijeva matrika $[\varphi(E_{ij})]_{i,j} \in M_n(\mathfrak{B})$ je pozitivna.

Dokaz. Dovolj je dokazati implikacijo (3.) $\Rightarrow$ (1.). Brez škode za splošnost predpostavimo, da je $\mathfrak{B} = \mathcal{B}(\mathcal{H})$ za nek Hilbertov prostor $\mathcal{H}$. Naj bo $[A_{ij}]_{i,j} \in M_m(M_n(\mathbb{C}))$ pozitivna matrika. Vzemimo poljubne vektorje $x_1, \dots, x_m \in \mathcal{H}$ in dokazujemo, da je

$$\sum_{i,j}^m \langle \varphi(A_{ij})x_j, x_i \rangle \geq 0.$$

Definiramo

$$V : \mathbb{C}^m \rightarrow \mathcal{H}, \quad V e_i = x_i$$

in

$$\psi : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_m(\mathbb{C}), \quad \psi(A) = V^* \varphi(A) V.$$

Ker je Choijeva matrika

$$\psi^{(n)}([E_{ij}]_{i,j}) = [V^* \varphi(E_{ij}) V]_{i,j} = (I_n \otimes V)^* [\varphi(E_{ij})]_{i,j} (I_n \otimes V)$$

po predpostavki pozitivna, je po prejšnji trditvi ψ povsem pozitivna preslikava. Od tod pa sledi

$$\sum_{i,j}^m \langle \varphi(A_{ij})x_j, x_i \rangle = \sum_{i,j}^m \langle V^* \varphi(A_{ij}) V e_j, e_i \rangle = \sum_{i,j}^m \langle \psi(A_{ij}) e_j, e_i \rangle \geq 0. \quad \square$$

Naš cilj za preostanek tega podrazdelka je pridobiti podobno karakterizacijo povsem pozitivnih preslikav $\varphi : \mathfrak{A} \rightarrow M_n(\mathbb{C})$.

Naj bo $\mathcal{M} \subseteq \mathfrak{A}$ operatorski prostor. Za poljubno linearno preslikavo $\varphi \in \mathcal{L}(\mathcal{M}, M_n(\mathbb{C}))$ lahko definiramo

$$s_\varphi \in \mathcal{L}(M_n(\mathcal{M}), \mathbb{C}), \quad s_\varphi(A) = \frac{1}{n} \sum_{i,j}^n \varphi(a_{ij})_{ij}.$$

Obratno lahko vsakemu linearnemu funkcionalu $s \in \mathcal{L}(M_n(\mathcal{M}), \mathbb{C})$ priredimo preslikavo

$$\varphi_s \in \mathcal{L}(\mathcal{M}, M_n(\mathbb{C})), \quad \varphi_s(a) = n \cdot s^{(n)}([aE_{ij}]_{i,j}).$$

Faktor $\frac{1}{n}$ v definiciji s_φ smo dodali zato, da je za enotsko preslikavo φ tudi s_φ enotski funkcional. Preslikavi

$$\Phi : \mathcal{B}(\mathcal{M}, M_n(\mathbb{C})) \rightarrow (M_n(\mathcal{M}))^*, \quad \varphi \mapsto s_\varphi$$

in

$$\Psi : (M_n(\mathcal{M}))^* \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{M}, M_n(\mathbb{C})), \quad s \mapsto \varphi_s$$

sta linearni in druga drugi inverzni.

Linearnost je očitna, zato dokažimo, da je $\Psi \circ \Phi = \text{id}_{\mathcal{B}(\mathcal{M}, M_n(\mathbb{C}))}$. Vzemimo poljuben $\varphi \in \mathcal{B}(\mathcal{M}, M_n(\mathbb{C}))$. Potem je za vsak $a \in \mathcal{M}$

$$\begin{aligned}\varphi_{s_\varphi}(a) &= n \cdot (s_\varphi)^{(n)}([aE_{ij}]_{i,j}) \\ &= n \cdot [s_\varphi(aE_{ij})]_{i,j} \\ &= n \cdot \frac{1}{n}[\varphi(a)_{ij}]_{i,j} \\ &= [\varphi(a)_{ij}]_{i,j} \\ &= \varphi(a).\end{aligned}$$

Sedaj dokažimo še $\Phi \circ \Psi = \text{id}_{M_n(\mathcal{M})^*}$. Za $A = [a_{ij}]_{i,j} \in M_n(\mathcal{M})$ je

$$\begin{aligned}s_{\varphi_s}(A) &= \frac{1}{n} \sum_{i,j}^n \varphi_s(a_{ij})_{ij} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i,j}^n n \cdot (s^{(n)}([a_{ij}E_{ij}]_{i,j}))_{ij} \\ &= \sum_{i,j}^n ([s(a_{ij}E_{ij})]_{i,j})_{ij} \\ &= \sum_{i,j}^n s(a_{ij}E_{ij}) = s(A).\end{aligned}$$

Trditev 7.3. Za linearno preslikavo $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ so naslednje trditve ekvivalentne:

1. φ je povsem pozitivna;
2. φ je n -pozitivna;
3. s_φ je pozitiven funkcional.

Dokaz. Dokažimo najprej implikacijo (2.) $\Rightarrow$ (3.). Naj bo

$$e = \begin{bmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{n^2}$$

kot prej. Potem je

$$s_\varphi(A) = \frac{1}{n} \sum_{i,j}^n \varphi(a_{ij})_{ij} = \frac{1}{n} e^* \varphi^{(n)}(A) e$$

za poljubno matriko $A = [a_{ij}]_{i,j} \in M_n(\mathcal{S})$. Če je $\varphi^{(n)}$ pozitivna preslikava, potem je s_φ pozitiven funkcional.

Sedaj dokažimo še implikacijo (3.) $\Rightarrow$ (1.). Če je s pozitiven funkcional, potem je povsem pozitivna preslikava in posledično je tudi

$$\varphi_s(a) = n \cdot s^{(n)}([aE_{ij}]_{i,j}) = n \cdot s^{(n)}(eae^*)$$

povsem pozitivna. Če je s_φ pozitiven funkcional, potem mora biti $\varphi = \varphi_{s_\varphi}$ povsem pozitivna. $\square$

Posledica 7.4. Naj bo $\mathcal{M} \subseteq \mathfrak{A}$ operatorski sistem. Za enotsko linearno preslikavo $\varphi : \mathcal{M} \rightarrow M_m(\mathbb{C})$ so naslednje trditve ekvivalentne:

1. φ je povsem skrčitev;
2. φ je n -skrčitev;
3. s_φ je skrčitev.

Dokaz. Implikacija (2.) $\Rightarrow$ (3.) sledi, ker je

$$\|s_\varphi(A)\| = \frac{1}{n} \|e^* \varphi^{(n)}(A) e\| \leq \frac{1}{n} \|e\|^2 \|\varphi^{(n)}(A)\| \leq \frac{1}{n} \cdot n \cdot \|A\| = \|A\|.$$

Za implikacijo (3.) $\Rightarrow$ (1.) opazimo, da je s_φ enotska skrčitev na $M_n(\mathcal{M})$, zato jo lahko razširimo do pozitivnega enotskega funkcionala $\widetilde{s}_\varphi : M_n(\mathcal{M}) + M_n(\mathcal{M})^* \rightarrow \mathbb{C}$. Po trditvi 7.3 je $\varphi_{\widetilde{s}_\varphi} : \mathcal{M} + \mathcal{M}^* \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ povsem pozitivna preslikava. Dokažimo, da je razširitev φ . Za poljuben $a \in \mathcal{M}$ je

$$\varphi_{\widetilde{s}_\varphi}(a) = n \cdot \widetilde{s}_\varphi^{(n)}([aE_{ij}]_{i,j}) = n \cdot s_\varphi^{(n)}([aE_{ij}]_{i,j}) = \varphi_{s_\varphi}(a) = \varphi(a),$$

torej je $\varphi_{\widetilde{s}_\varphi}$ v posebnem enotska preslikava. Dokazali smo, da je $\varphi_{\widetilde{s}_\varphi}$ enotska povsem pozitivna preslikava, zato je tudi povsem skrčitev. Od tod pa sledi, da velja enako za njeno zožitev φ . $\square$

Naslednja trditev je analog trditve 7.2 za preslikave na operatorskem sistemu.

Posledica 7.5. Naj bo $\mathcal{S} \subseteq M_n(\mathbb{C})$ operatorski sistem. Za linearno preslikavo $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathfrak{B}$ sta naslednji trditvi ekvivalentni:

1. φ je povsem pozitivna;
2. φ je n -pozitivna.

Dokaz. Denimo, da je φ n -pozitivna preslikava. Brez škode za splošnost vzemimo $\mathfrak{B} = \mathcal{B}(\mathcal{H})$. Naj bo $[A_{ij}]_{i,j} \in M_m(M_n(\mathbb{C}))$ pozitivna matrika in $x_1, \dots, x_m \in \mathcal{H}$ poljubni vektorji. Ponovno definiramo

$$V : \mathbb{C}^m \rightarrow \mathcal{H}, \quad Ve_i = x_i$$

in

$$\psi : \mathcal{S} \rightarrow M_m(\mathbb{C}), \quad \psi(A) = V^* \varphi(A) V.$$

Ker je φ n -pozitivna, je ψ prav tako n -pozitivna in zato po trditvi 7.3 tudi povsem pozitivna. Od tod pa sledi

$$\sum_{i,j}^m \langle \varphi(A_{ij}) x_j, x_i \rangle = \sum_{i,j}^m \langle V^* \varphi(A_{ij}) V e_j, e_i \rangle = \sum_{i,j}^m \langle \psi(A_{ij}) e_j, e_i \rangle \geq 0. \quad \square$$

Posledica 7.6. Naj bo $\mathcal{S} \subseteq M_n(\mathbb{C})$ operatorski sistem. Za linearno preslikavo $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow M_m(\mathbb{C})$ so naslednje trditve ekvivalentne:

1. φ je povsem pozitivna;

2. φ je n -pozitivna;

3. φ je oblike (6.2).

Naj bo $\mathcal{S} \subseteq \mathfrak{A}$. V nadaljevanju bomo dokazali, da lahko povsem pozitivno preslikavo $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ razširimo do povsem pozitivne preslikave $\psi : \mathfrak{A} \rightarrow M_n(\mathbb{C})$.

Najprej to dokažemo za $n = 1$: naslednji rezultat je različica Hahn-Banachovega izreka za pozitivne funkcionalne.

Lema 7.7 (Krein-Riesz). *Če je $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{C}$ pozitiven funkcional, potem ima pozitivno razširitev $\psi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathbb{C}$, tako da je $\|\varphi\| = \|\psi\| = \varphi(1)$.*

Dokaz. Ker je $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{C}$ pozitiven funkcional, velja po lemi 3.16 $\|\varphi\| = \varphi(1)$. Po Hahn-Banachovem izreku obstaja razširitev φ do $\varphi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathbb{C}$, tako da je $\|\varphi\| = \|\psi\|$. Od tod sledi

$$\|\psi\| = \|\varphi\| = \varphi(1) = \psi(1),$$

torej je po lemi 3.16 tudi ψ pozitiven funkcional. $\square$

Trditev 7.8. *Če je $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ povsem pozitivna preslikava, potem ima povsem pozitivno razširitev $\psi : \mathfrak{A} \rightarrow M_n(\mathbb{C})$, tako da velja $\|\psi\|_{\text{po}} = \|\varphi\|_{\text{po}} = \|\varphi(1)\|$.*

Dokaz. Ker je φ povsem pozitivna preslikava, je $s_\varphi : M_n(\mathcal{S}) \rightarrow \mathbb{C}$ pozitiven funkcional, zato ga lahko po lemi 7.7 razširimo do pozitivnega funkcionala $s : M_n(\mathfrak{A}) \rightarrow \mathbb{C}$. Potem je $\psi := \varphi_s : \mathfrak{A} \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ povsem pozitivna preslikava.

Dokazati moramo še, da je razširitev φ . Res, za poljuben $a \in \mathcal{S}$ imamo

$$\psi(a) = \varphi_s(a) = n \cdot s^{(n)}([aE_{ij}]_{i,j}) = n \cdot s_\varphi^{(n)}([aE_{ij}]_{i,j}) = \varphi_{s_\varphi}(a) = \varphi(a).$$

Ker sta φ in ψ povsem pozitivna, sledi še

$$\|\varphi\|_{\text{po}} \leq \|\psi\|_{\text{po}} = \|\psi(1)\| = \|\varphi(1)\| \leq \|\varphi\|_{\text{po}},$$

torej $\|\varphi\|_{\text{po}} = \|\psi\|_{\text{po}} = \|\varphi(1)\|$. $\square$

Posledica 7.9. *Naj bo $\mathcal{M} \subseteq \mathfrak{A}$ operatorski prostor. Če je $\varphi : \mathcal{M} \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ enotska povsem skrščitev, potem ima povsem pozitivna razširitev $\psi : \mathfrak{A} \rightarrow M_n(\mathbb{C})$.*

Dokaz. Enotsko povsem skrščitev $\varphi : \mathcal{M} \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ lahko razširimo do povsem pozitivne preslikave $\tilde{\varphi} : \mathcal{M} + \mathcal{M}^* \rightarrow M_n(\mathbb{C})$, ki jo nato lahko razširimo do povsem pozitivne preslikave $\psi : \mathfrak{A} \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ po trditvi 7.3. $\square$

Podrazdelek zaključimo z verzijo trditve 7.1 za operatorske sisteme.

Trditev 7.10. *Naj bo $\mathcal{S} \subseteq M_n(\mathbb{C})$ operatorski sistem. Za linearno preslikavo $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow M_m(\mathbb{C})$ so naslednje trditve ekvivalentne:*

1. φ je povsem pozitivna;

2. φ je n -pozitivna;

3. φ je oblike (6.2).

Dokaz. Dovolj je dokazati implikacijo (1.) $\Rightarrow$ (3.). Če je φ povsem pozitivna, potem jo lahko po trditvi 7.8 razširimo do povsem pozitivne preslikave $\psi : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_m(\mathbb{C})$, ki mora biti oblike (6.2). Torej je tudi φ oblike (6.2). $\square$

8 Arvesonov razširitveni izrek

V podrazdelku 3 smo dokazali, da lahko vsako povsem pozitivno preslikavo na operatorskem prostoru razširimo do povsem pozitivne preslikave na pripadajočem operatorskem sistemu. Iz tamkajšnje diskusije je sledilo, da so operatorski sistemi naravna domena za teorijo povsem pozitivnih preslikav.

Vendar pa delo na splošnih operatorskih sistemih pogosto otežuje dejstvo, da nimamo na voljo vseh orodij iz teorije C^* -algeber. Zato je naravno vprašanje, kdaj lahko povsem pozitivno preslikavo razširimo do celotne C^* -algebre, v kateri je operatorski sistem vsebovan.

Naj bo $\mathfrak{A}$ C^* -algebra in $\mathcal{S} \subseteq \mathfrak{A}$ operatorski sistem. V tem podrazdelku dokažemo Arvesonov razširitveni izrek, ki trdi, da lahko vsako povsem pozitivno preslikavo

$$\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$$

razširimo do povsem pozitivne preslikave

$$\psi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}).$$

Arvesonov izrek lahko razumemo kot analog Hahn–Banachovega izreka za povsem pozitivne preslikave.

V končno dimenzionalnem primeru smo to že dokazali v trditvi 7.8. Natančneje, če je $\mathcal{H}$ končno dimenzionalen, lahko vsako povsem pozitivno preslikavo

$$\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$$

razširimo do povsem pozitivne preslikave na $\mathfrak{A}$.

Neskončno dimenzionalni primer je bistveno zahtevnejši. Dokaz temelji na konstrukciji ustrezne topologije na prostoru $\mathcal{B}(\mathcal{S}, \mathcal{B}(\mathcal{H}))$, v kateri bo množica

$$\text{PP}_r(\mathcal{S}, \mathcal{B}(\mathcal{H})) := \{L \in \mathcal{B}(\mathcal{S}, \mathcal{B}(\mathcal{H})) \mid L \text{ je p.p. in } \|L\| \leq r\}$$

kompaktna za vsak $r \geq 0$. Ta topologija bo izhajala iz šibke- $*$ topologije, zato bo ključna uporaba Banach–Alaoglujevega izreka.

Naš prvi cilj je zato opisati ustrezno predualno strukturo prostora $\mathcal{B}(X, Y^*)$. Naj bosta X in Y Banachova prostora. Za $x \in X$ in $y \in Y$ definiramo linearen funkcional

$$x \otimes y : \mathcal{B}(X, Y^*) \rightarrow \mathbb{C}, \quad (x \otimes y)(L) := L(x)(y).$$

Lema 8.1. *Za vsaka $x \in X$ in $y \in Y^*$ velja $\|x \otimes y\| = \|x\| \cdot \|y\|$ in posledično $x \otimes y \in \mathcal{B}(X, Y^*)^*$.*

Dokaz. Opazimo, da velja

$$|x \otimes y(L)| \leq \|L\| \cdot \|x\| \cdot \|y\|,$$

od koder sledi $\|x \otimes y\| \leq \|x\| \cdot \|y\|$ in $x \otimes y \in \mathcal{B}(X, Y^*)^*$. Dokazujemo, da velja tudi $\|x \otimes y\| = \|x\| \cdot \|y\|$. Preko Hahn–Banachovega izreka lahko konstruiramo funkcional $\varphi_x \in X^*$, tako da je $\varphi_x(x) = \|x\|$ in $\|\varphi_x\| = 1$. Podobno lahko definiramo $\varphi_y \in Y^*$, tako da velja $\varphi_y(y) = \|y\|$ in $\|\varphi_y\| = 1$. Nato definiramo preslikavo

$$L_{x,y} : X \rightarrow Y^*, \quad L_{x,y}(z) = \varphi_x(z)\varphi_y,$$

za katero velja

$$\|L_{x,y}(z)\| \leq |\varphi_x(z)| \cdot \|\varphi_y\| \leq \|\varphi_x\| \cdot \|\varphi_y\| \cdot \|z\| = \|z\|.$$

To pomeni, da je $\|L_{x,y}\| \leq 1$ in $L_{x,y} \in \mathcal{B}(X, Y^*)$. Po drugi strani pa je $\|L_{x,y}(x)\| = \|x\| \cdot \|\varphi_y\| = \|x\|$ in zato $\|L_{x,y}\| = 1$. Naposled je

$$x \otimes y(L_{x,y}) = \|x\| \cdot \|y\| = \|x\| \cdot \|y\| \cdot \|L_{x,y}\|,$$

zato $\|x \otimes y\| = \|x\| \cdot \|y\|$. □

Definiramo prostor

$$Z := \overline{\text{Lin}\{x \otimes y \mid x \in X, y \in Y\}} \leq \mathcal{B}(X, Y^*)^*.$$

Lema 8.2. *Banachov prostor $\mathcal{B}(X, Y^*)$ je izometrično izomorfen Z^* s preslikavo*

$$\Phi : \mathcal{B}(X, Y^*) \rightarrow Z^*, \quad L \mapsto (x \otimes y \mapsto x \otimes y(L)).$$

Dokaz. Najprej dokažimo, da je Φ izometrija. Vzemimo poljuben $L \in \mathcal{B}(X, Y^*)$. Za vsak $x \otimes y \in Z$ velja

$$\begin{aligned} |\Phi(L)(x \otimes y)| &= |x \otimes y(L)| \\ &= |L(x)(y)| \\ &\leq \|L(x)\| \cdot \|y\| \\ &\leq \|L\| \cdot \|x\| \cdot \|y\| \\ &= \|L\| \cdot \|x \otimes y\|, \end{aligned}$$

od koder sledi $\|\Phi(L)\| \leq \|L\|$. Po drugi strani pa je

$$\begin{aligned} \|L\| &= \sup_{\|x\|=1} \|L(x)\| \\ &= \sup_{\|x\|=1} \sup_{\|y\|=1} |L(x)(y)| \\ &= \sup_{\|x\|=1} \sup_{\|y\|=1} |x \otimes y(L)| \\ &= \sup_{\|x\|=1} \sup_{\|y\|=1} |\Phi(L)(x \otimes y)| \\ &\leq \sup_{\|x \otimes y\|=1} |\Phi(L)(x \otimes y)| = \|\Phi(L)\|. \end{aligned}$$

Nazadnje dokažimo še surjektivnost. Fiksirajmo nek $f \in Z^*$. Za vse $x \in X$ lahko definiramo funkcional

$$f_x : Y \rightarrow \mathbb{C}, \quad y \mapsto f(x \otimes y).$$

Ker je $|f_x(y)| \leq \|f\| \cdot \|x\| \cdot \|y\|$, sledi $f_x \in Y^*$. Potem je

$$L : X \rightarrow Y^*, \quad L(x) = f_x.$$

omejena preslikava in $\Phi(L) = f$. □

Če identificiramo prostor $\mathcal{B}(X, Y^*)$ z Z^* , ga lahko opremimo s šibko-* topologijo. Tej topologiji pravimo *omejeno šibka (OŠ) topologija*.

Lema 8.3. *Naj bo $(L_\lambda)_\lambda$ omejena mreža v $\mathcal{B}(X, Y^*)$. Potem konvergira $L_\lambda \rightarrow L$ v OŠ topologiji natanko tedaj, ko $L_\lambda(x) \rightarrow L(x)$ v šibki-* topologiji za vse $x \in X$.*

Dokaz. Najprej dokažemo implikacijo ($\Rightarrow$). Če $L_\lambda \rightarrow L$ v OŠ topologiji, potem

$$L_\lambda(x)(y) = \Phi(L_\lambda)(x \otimes y) \rightarrow \Phi(L)(x \otimes y) = L(x)(y)$$

za vse $x \in X$ in $y \in Y$, torej $L_\lambda(x) \rightarrow L(x)$ v šibki-* topologiji na Y^* .

Sedaj dokažimo še implikacijo ($\Leftarrow$). Ker je mreža $(L_\lambda)_\lambda$ omejena z normo, obstaja M , tako da je $\|L_\lambda\| \leq M$ za vsak $\lambda \in \Lambda$. Če konvergira $L_\lambda(x) \rightarrow L(x)$ v šibki-* topologiji za vse $x \in X$, tedaj

$$\Phi(L_\lambda)(x \otimes y) = L_\lambda(x)(y) \rightarrow L(x)(y) = \Phi(L)(x \otimes y)$$

za vse $x \otimes y \in \mathcal{B}(X, Y^*)^*$. Posledično $\Phi(L_\lambda)(z) \rightarrow \Phi(L)(z)$ za vse $z \in \text{Lin}\{x \otimes y \mid x \in X, y \in Y\}$. Po definiciji je $Z = \overline{\{x \otimes y \mid x \in X, y \in Y\}}$. Vzemimo poljuben $z \in Z$. Potem obstaja $z_0 \in \text{Lin}\{x \otimes y \mid x \in X, y \in Y\}$, tako da je $\|z - z_0\| \leq \frac{\varepsilon}{3}$. Ker je $\Phi(L_\lambda)(z_0) \rightarrow \Phi(L)(z_0)$, obstaja $\lambda_0 \in \Lambda$, tako da je $\|\Phi(L_\lambda)(z_0) - \Phi(L)(z_0)\| \leq \frac{\varepsilon}{3M}$ za vse $\lambda \geq \lambda_0$. Potem za vsak $\lambda \geq \lambda_0$ velja tudi

$$\begin{aligned} \|\Phi(L_\lambda)(z) - \Phi(L)(z)\| &\leq \|\Phi(L_\lambda)(z) - \Phi(L_\lambda)(z_0)\| + \|\Phi(L_\lambda)(z_0) - \Phi(L)(z_0)\| \\ &\quad + \|\Phi(L)(z_0) - \Phi(L)(z)\| \\ &\leq \|\Phi(L_\lambda)\| \cdot \|z - z_0\| + \frac{\varepsilon}{3} + \|\Phi(L)\| \cdot \|z_0 - z\| \\ &\leq \|L_\lambda\| \cdot \|z - z_0\| + \frac{\varepsilon}{3} + \|L\| \cdot \|z_0 - z\| \\ &\leq M \cdot \|z - z_0\| + \frac{\varepsilon}{3} + M \cdot \|z_0 - z\| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon, \end{aligned}$$

torej $\Phi(L_\lambda)(z) \rightarrow \Phi(L)(z)$. □

Spomnimo, da za poljuben Hilbertov prostor $\mathcal{H}$ obstaja izometrični izomorfizem

$$\mathcal{B}(\mathcal{H}) \cong L^1(\mathcal{H})^*, \quad T \mapsto (S \mapsto \text{Tr}(TS))$$

pri čemer $L^1(\mathcal{H})$ označuje Banachov prostor operatorjev s sledjo, opremljen z normo $\|S\|_1 = \text{Tr}(|S|)$.

Lema 8.4. *Če je $\{L_\lambda\}_\lambda \subseteq \mathcal{B}(X, \mathcal{B}(\mathcal{H}))$ omejena mreža, potem $L_\lambda \rightarrow L$ konvergira v OŠ topologiji natanko tedaj, ko za vse $x \in X$ in $u, v \in \mathcal{H}$ velja $\langle L_\lambda(x)u, v \rangle \rightarrow \langle L(x)u, v \rangle$.*

Dokaz. Za vsaka $u, v \in \mathcal{H}$ definiramo operator ranga 1

$$S_{u,v} \in \mathcal{B}(\mathcal{H}), \quad S_{u,v}(\alpha) = \langle \alpha, v \rangle \cdot u.$$

Opazimo, da velja $\text{Tr}(S_{u,v}) = \langle u, v \rangle$. Linearne kombinacije operatorjev ranga 1 tvorijo množico operatorjev končnega ranga, ki so gosti v $L^1(\mathcal{H})$.

Sedaj imamo naslednji niz ekvivalenc:

$$\begin{aligned}
L_\lambda \rightarrow L &\Leftrightarrow L_\lambda(x) \rightarrow L(x), \quad \forall x \in X \\
&\Leftrightarrow \text{Tr}(L_\lambda(x)S) \rightarrow \text{Tr}(L(x)S), \quad \forall x \in X, \quad \forall S \in L^1(\mathcal{H}) \\
&\Leftrightarrow \text{Tr}(L_\lambda(x)S_{u,v}) \rightarrow \text{Tr}(L(x)S_{u,v}), \quad \forall x \in X, \quad \forall u, v \in \mathcal{H} \\
&\Leftrightarrow \langle L_\lambda(x)u, v \rangle \rightarrow \langle L(x)u, v \rangle, \quad \forall x \in X, \quad \forall u, v \in \mathcal{H}.
\end{aligned}
\quad \square$$

Opomba 8.5. Topologiji na $\mathcal{B}(\mathcal{H})$, inducirani z družino polnorm

$$T \mapsto |\langle Tu, v \rangle|, \quad u, v \in \mathcal{H},$$

pravimo *šibka operatorska topologija* (od tod naprej ŠOT). Prejšnja lema nam torej pove, da omejena mreža $\{L_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda} \subseteq \mathcal{B}(X, \mathcal{B}(\mathcal{H}))$ konvergira v OŠ topologiji natanko tedaj, ko $\{L_\lambda(x)\}_{\lambda \in \Lambda}$ konvergira v ŠOT za vsak $x \in X$.

Lema 8.6. Naj bo $\mathfrak{A}$ C^* -algebra in $\mathcal{S} \subseteq \mathfrak{A}$ zaprt operatorski sistem. Potem je

$$\text{PP}_r(\mathcal{S}, \mathcal{B}(\mathcal{H})) := \{L \in \mathcal{B}(\mathcal{S}, \mathcal{B}(\mathcal{H})) \mid L \text{ p.p. in } \|L\| \leq r\}$$

kompaktna množica v OŠ topologiji.

Dokaz. Po Banach-Alaoglujevem izreku je

$$B_r(\mathcal{S}, \mathcal{B}(\mathcal{H})) := \{L \in \mathcal{B}(\mathcal{S}, \mathcal{B}(\mathcal{H})) \mid \|L\| \leq r\}$$

kompaktna množica v OŠ topologiji. Preostane le še pokazati, da je PP_r zaprt podprostor B_r . Naj bo $(L_\lambda)_\lambda$ mreža v PP_r , ki konvergira v OŠ topologiji k nekemu $L \in B_r$. Dokazati moramo, da je L povsem pozitivna. Naj bo $n \in \mathbb{N}$ in $[a_{ij}]_{i,j} \in M_n(\mathcal{S})$ pozitivna matrika. Potem za poljubne $x_1, \dots, x_n \in \mathcal{H}$ velja

$$\sum_{i,j} \langle L_\lambda([a_{ij}]_{i,j})x_j, x_i \rangle \rightarrow \sum_{i,j} \langle L([a_{ij}]_{i,j})x_j, x_i \rangle.$$

Ker je vsota na levi nenegativna za vsak λ , mora veljati enako za vsoto na desni. $\square$

Sedaj lahko dokažemo glavni izrek v tem podrazdelku. Arvesonov razširitveni izrek izvira iz članka [2].

Izrek 8.7 (Arveson). Naj bo $\mathfrak{A}$ C^* -algebra, $\mathcal{S} \subseteq \mathfrak{A}$ operatorski sistem in $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ povsem pozitivna. Potem lahko φ razširimo do povsem pozitivne preslikave $\psi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$, tako da velja $\|\psi\|_{\text{po}} = \|\varphi\|_{\text{po}} = \|\varphi(1)\|$.

Dokaz. Brez škode za splošnost lahko predpostavimo, da je $\mathcal{S}$ zaprt podprostor in zato Banachov. Za vsak končno dimenzionalen podprostor $\mathcal{F} \leq \mathcal{H}$ definiramo povsem pozitivno preslikavo

$$\varphi_{\mathcal{F}} : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{F}), \quad a \mapsto P_{\mathcal{F}}\varphi(a)|_{\mathcal{F}},$$

kjer je $P_{\mathcal{F}} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{F}$ projekcija. Ker je $\dim(\mathcal{F}) = n < \infty$, lahko identificiramo $\mathcal{B}(\mathcal{F}) \equiv M_n(\mathbb{C})$. Po trditvi 7.8 lahko $\varphi_{\mathcal{F}}$ razširimo do povsem pozitivne preslikave

$\varphi'_{\mathcal{F}} : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{F})$, tako da je $\|\varphi'_{\mathcal{F}}\| = \|\varphi_{\mathcal{F}}\|$. Nazadnje za razcep $\mathcal{H} = \mathcal{F} \oplus \mathcal{F}^{\perp}$ definiramo povsem pozitivno preslikavo

$$\psi_{\mathcal{F}} : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}), \quad \psi_{\mathcal{F}}(a) = \begin{bmatrix} \varphi'_{\mathcal{F}}(a) & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

in vidimo, da velja $\|\psi_{\mathcal{F}}\| = \|\varphi'_{\mathcal{F}}\| = \|\varphi_{\mathcal{F}}\| \leq \|\varphi\|$.

Opazimo, da je $\{\psi_{\mathcal{F}}\}$ mreža v $\text{PP}_{\|\varphi\|}(\mathfrak{A}, \mathcal{B}(\mathcal{H}))$, pri čemer $\mathcal{F}$ teče po vseh končnih podprostorih v $\mathcal{H}$. Ker je $\text{PP}_{\|\varphi\|}(\mathfrak{A}, \mathcal{B}(\mathcal{H}))$ kompaktna množica, ima mreža $\{\psi_{\mathcal{F}}\}$ stekališče v $\psi \in \text{PP}_{\|\varphi\|}(\mathfrak{A}, \mathcal{B}(\mathcal{H}))$.

Dokazujemo, da je $\psi|_{\mathcal{S}} = \varphi$. Fiksirajmo $a \in \mathcal{S}$. Nato vzemimo poljubna vektorja $x, y \in \mathcal{H}$ in definirajmo prostor $\mathcal{F}_{x,y} := \text{Lin}\{x, y\} \leq \mathcal{H}$. Potem za vsak končnorazsežen prostor $\mathcal{K} \subseteq \mathcal{H}$, za katerega velja $\mathcal{F} \geq \mathcal{F}_{x,y}$, dobimo

$$\langle \psi_{\mathcal{F}}(a)x, y \rangle = \langle P_{\mathcal{F}}\varphi(a)P_{\mathcal{F}}x, y \rangle = \langle \varphi(a)x, y \rangle,$$

torej $\psi_{\mathcal{F}}(a) \rightarrow \varphi(a)$ v ŠOT. Po drugi strani pa ima $\{\psi_{\mathcal{F}}(a)\}_{\mathcal{F}}$ stekališče v $\psi(a)$, od koder sledi $\varphi(a) = \psi(a)$.

Oglejmo si še normo razširitve ψ . Ker sta φ in ψ povsem pozitivna, velja

$$\|\psi\|_{\text{po}} = \|\psi\| = \|\psi(1)\| = \|\varphi(1)\| = \|\varphi\| = \|\varphi\|_{\text{po}}. \quad \square$$

Opomba 8.8. Predpostavka o povsem pozitivnosti v Arvesonovem razširitvenem izreku je ključna, saj v splošnem ne moremo razširiti pozitivne preslikave na operatorskem sistemu do pozitivne preslikave na celotni C^* -algebri. Vzemimo na primer pozitivno preslikavo φ iz zgleda 3.18, za katero velja $\|\varphi\| = 2 \cdot \|\varphi(1)\|$. Po trditvi 5.10 za vsako pozitivno preslikavo na C^* -algebri velja $\|\varphi\| = \|\varphi(1)\|$. To pomeni, da φ ne moremo razširiti do pozitivne preslikave na celotni C^* -algebri.

Posledica 8.9. *Naj bo $\mathcal{M} \subseteq \mathfrak{A}$ operatorski prostor in $\varphi : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ enotska povsem skržitev. Potem lahko φ razširimo do enotske povsem pozitivne preslikave $\psi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$.*

9 Abstraktni operatorski sistemi

V funkcionalni analizi imajo konkretni objekti pogosto tudi abstraktno karakterizacijo. Konkretne C^* -algebre (oziroma von Neumannove algebre) operatorjev na Hilbertovem prostoru lahko abstraktno karakteriziramo kot C^* -algebre (oziroma W^* -algebre). Choi in Effros sta pokazala ([5]), da tudi operatorski sistemi, ki jih definiramo kot konkretne prostore operatorjev v C^* -algebri, premorejo abstraktno karakterizacijo. To nam omogoča, da lahko na operatorski sisteme gledamo kot na abstrakten vektorski prostor ali pa na neko njegovo konkretno realizacijo v C^* -algebri.

Začnimo z nekaterimi potrebnimi lastnostmi, ki jih pričakujemo od abstraktnih operatorskih sistemov. Vzemimo kompleksen vektorski prostor $\mathcal{S}$, opremljen z involucijo, torej s poševno linearno preslikavo $*$: $\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$, tako da velja $a^{**} = a$ za vse $a \in \mathcal{S}$. Takšnemu vektorskemu prostoru pravimo *$*$ -vektorski prostor*. Če je $\mathcal{S}$

*-vektorski prostor, velja enako tudi za $M_n(\mathcal{S})$. Množico sebiadjungiranih elementov v *-vektorskem sistemu označimo s $\mathcal{S}_h := \{s \in \mathcal{S} \mid s = s^*\}$.

Tudi v abstraktnem operatorskem sistemu želimo imeti ustrezne elemente, ki imajo vlogo pozitivnih elementov. Zato mora za vsak $n \in \mathbb{N}$ obstajati konveksen stožec $\mathcal{C}_n \subseteq M_n(\mathcal{S})_h$, tako da velja $\mathcal{C}_n \cap -\mathcal{C}_n = \{0\}$. Elementi stožcev $\mathcal{C}_n$ bodo imeli vlogo pozitivnih operatorjev, zato morajo biti ti stožci med seboj na ustrezen način usklajeni: za poljubna $m, n \in \mathbb{N}$ in $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ mora veljati $A^* \mathcal{C}_m A \subseteq \mathcal{C}_n$. Za *-vektorski prostor $\mathcal{S}$, opremljen s stožci $\{\mathcal{C}_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, pravimo, da je *matrično urejen*. Če imamo matrično urejenima *-vektorska prostora $\mathcal{S}, \mathcal{S}'$ s stožci $\{\mathcal{C}_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \{\mathcal{C}'_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, potem je preslikava $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}'$ *n-pozitivna*, če $\varphi(\mathcal{C}_n) \subseteq \mathcal{C}'_n$, in *povsem pozitivna*, če je *n-pozitivna* za vsak $n \in \mathbb{N}$. Kot v konkretnih operatorskih sistemih so povsem pozitivne preslikave naravni morfizem med abstraktnimi operatorski sistemi. Množico (enotskih) povsem pozitivnih preslikav iz $\mathcal{S}$ v $\mathcal{S}'$ ponovno označujemo s $\text{PP}(\mathcal{S}, \mathcal{S}')$ ($\text{EPP}(\mathcal{S}, \mathcal{S}')$).

Nazadnje v abstraktnem operatorskem prostoru potrebujemo še enico. Element $e \in \mathcal{S}_h$ je *enota za urejenost* v $\mathcal{S}$, če za vsak $a \in \mathcal{S}_h$ obstaja pozitivno realno število $r > 0$, tako da je $er + a \in \mathcal{C}_1$. Če velja, da iz $re + a \in \mathcal{C}_1$ za vse $r > 0$ sledi, da je $a \in \mathcal{C}_1$, potem e rečemo *arhimedska enota*. Če je $I_n \in M_n(\mathcal{S})$ enota za urejenost za vse $n \in \mathbb{N}$, potem je e *enota za matrično urejenost*. V primeru, ko je I_n arhimedska za vsak $n \in \mathbb{N}$, je e *arhimedska enota za matrično urejenost* za $\mathcal{S}$.

Opazimo lahko, da obstaja $r > 0$, tako da je $re + e \in \mathcal{C}_1$, zato je $e = (r + 1)^{-1}(re + e) \in \mathcal{C}_1$. Na enak način dobimo tudi $I_n \in \mathcal{C}_n$ za vsak $n \in \mathbb{N}$. Če velja $re + a \in \mathcal{C}_1$, potem za vsak $s > r$ velja $se + a = (s - r)e + (re + a) \in \mathcal{C}_1$. Če je $a \in \mathcal{S}_h$, potem obstaja dovolj velik $r > 0$, tako da je $re \pm a \in \mathcal{C}_1$ in posledično

$$a = \frac{re + a}{2} - \frac{re - a}{2} \in \mathcal{C}_1 - \mathcal{C}_1.$$

Od tod sledi, da je $\mathcal{S}_h = \mathcal{C}_1 - \mathcal{C}_1$.

Definicija 9.1. Matrično urejenemu *-vektorskemu prostoru $\mathcal{S}$ z arhimedsko enoto za matrično urejenost $e \in \mathcal{S}$ pravimo *abstraktni operatorski sistem*.

Ker so konkretni operatorski sistemi vedno normirani, bi enako pričakovali tudi od abstraktnih operatorskih prostorov.

Trditev 9.2. Za abstrakten operatorski sistem $\mathcal{S}$ lahko definiramo normo na $M_n(\mathcal{S})$ s predpisom

$$\|A\|_n := \inf \left\{ r \mid \begin{bmatrix} rI_n & A \\ A^* & rI_n \end{bmatrix} \in \mathcal{C}_{2n} \right\},$$

za katero velja $\|I_n\|_n = 1$ in $\|A\|_n = \|A^*\|_n$ za vse $A \in M_n(\mathcal{S})$. V topologiji, inducirani s to normo, je $\mathcal{C}_n \subseteq M_n(\mathbb{C})$ zaprta množica.

Dokaz. 1. Najprej dokazujemo, da je $\|a\|_1 \geq 0$ za vsak $a \in \mathcal{S}$. Če je

$$\begin{bmatrix} re & a \\ a^* & re \end{bmatrix} \in \mathcal{C}_2,$$

potem je tudi

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} re & a \\ a^* & re \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} re & -a \\ -a^* & re \end{bmatrix} \in \mathcal{C}_2.$$

To pomeni, da je tudi njuna vsota $2rI_2 \in \mathcal{C}_2$, zato je $2r \geq 0$ in $\|a\|_1 \geq 0$.

2. Nato dokazujemo, da iz $\|a\|_1 = 0$ sledi $a = 0$. Če res velja $\|a\|_1$, potem je za vsak $r > 0$

$$\begin{bmatrix} re & a \\ a^* & re \end{bmatrix} \in \mathcal{C}_2$$

in za vsak $\lambda \in \mathbb{C}$

$$\begin{bmatrix} 1 & \bar{\lambda} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} re & a \\ a^* & re \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda \end{bmatrix} = r(1 + |\lambda|^2)e + \lambda a + (\lambda a)^* \in \mathcal{C}_1.$$

Po arhimedski lastnosti je $\lambda a + (\lambda a)^* \in \mathcal{C}_1$ za vsak $\lambda \in \mathbb{C}$. Če vstavimo $\lambda = 1$, dobimo $a + a^* = 0$, če pa $\lambda = i$, pa dobimo $ia - ia^* = 0$. Ko ti enačbi seštejemo, dobimo $a = 0$.

3. Naprej dokazujemo, da za vsak $\lambda \in \mathbb{C}$ velja $\|\lambda a\|_1 = |\lambda| \|a\|_1$. Razpišimo $\lambda = |\lambda| \xi$, kjer je $|\xi| = 1$. Potem je

$$\begin{bmatrix} \frac{re}{|\lambda|} & a \\ a^* & \frac{re}{|\lambda|} \end{bmatrix} \in \mathcal{C}_2$$

natanko tedaj, ko je

$$|\lambda| \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \xi^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{re}{|\lambda|} & a \\ a^* & \frac{re}{|\lambda|} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \xi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} re & \xi |\lambda| a \\ \xi^* |\lambda| a^* & \xi^* \xi re \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} re & \lambda a \\ \lambda^* a^* & re \end{bmatrix} \in \mathcal{C}_2.$$

Od tod sledi, da je

$$|\lambda| \|a\|_1 = \inf \left\{ r \mid \begin{bmatrix} \frac{re}{|\lambda|} & a \\ a^* & \frac{re}{|\lambda|} \end{bmatrix} \in \mathcal{C}_2 \right\} = \inf \left\{ r \mid \begin{bmatrix} re & \lambda a \\ \lambda^* a^* & re \end{bmatrix} \in \mathcal{C}_2 \right\} = \|\lambda a\|_1.$$

4. Dokažimo, da je $\|a + b\|_1 \leq \|a\|_1 + \|b\|_1$. Nastavimo $r_1 := \|a\|_1$ in $r_2 = \|b\|_1$. Potem je

$$\begin{bmatrix} r_1 e & a \\ a^* & r_1 e \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} r_2 e & b \\ b^* & r_2 e \end{bmatrix} \in \mathcal{C}_2$$

in zato

$$\begin{bmatrix} (r_1 + r_2)e & (a + b) \\ (a + b)^* & (r_1 + r_2)e \end{bmatrix} \in \mathcal{C}_2.$$

Zato je po definiciji $\|a + b\|_1 \leq r_1 + r_2 = \|a\|_1 + \|b\|_1$.

5. V tem koraku pokažemo, da velja $\|e\|_1 = 1$. Ker je $e \in \mathcal{C}_1$ in

$$\begin{bmatrix} e & e \\ e & e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \in \mathcal{C}_2,$$

velja $\|e\|_1 \leq 1$. Za $r < 1$ je

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} re & e \\ e & re \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} = 2(r - 1)e \notin \mathcal{C}_1,$$

zato

$$\begin{bmatrix} re & e \\ e & re \end{bmatrix} \notin \mathcal{C}_2$$

in $\|e\|_1 = 1$.

6. Dokažimo še, da je $\|a\| = \|a^*\|$. Velja

$$\begin{bmatrix} re & a \\ a^* & re \end{bmatrix} \in \mathcal{C}_2$$

natanko tedaj, ko je

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} re & a \\ a^* & re \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} re & a^* \\ a & re \end{bmatrix} \in \mathcal{C}_2.$$

Od tod sledi $\|a\|_1 = \|a^*\|_1$.

7. Dokažimo še, da je $\mathcal{C}_1$ zaprta množica. Vzemimo zaporedje $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{C}_n$, ki konvergira v normi k nekemu $a \in \mathcal{S}$. Najprej dokažimo, da je $a \in \mathcal{S}_h$. Ker je $\lim_{n \rightarrow \infty} \|a - a_n\|_1 = 0$, je po prejšnji točki tudi $\lim_{n \rightarrow \infty} \|(a - a_n)^*\|_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^* - a_n\| = 0$, zato je $a = a^*$. Sedaj dokazujemo, da za poljuben $r > 0$ velja $a + re \in \mathcal{C}_1$. Vemo, da obstaja $n \in \mathbb{N}$, tako da je $\|a - a_n\| < r$. Potem je

$$\begin{bmatrix} re & a - a_n \\ a - a_n & re \end{bmatrix} \in \mathcal{C}_2$$

in zato

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} re & a - a_n \\ a - a_n & re \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 2re + 2(a - a_n) \in \mathcal{C}_1.$$

Od tod pa sledi $2re + 2a \in \mathcal{C}_1$ in $re + a \in \mathcal{C}_1$. $\square$

Vsak konkreten operatorski sistem $\mathcal{S} \subseteq \mathfrak{A}$ je na kanoničen način abstrakten operatorski sistem: involucija $*$ je inducirana s C^* -algebro, konveksni stožci pa so $\mathcal{C}_n = M_n(\mathcal{S})_+$. Dokažimo še, da je $1 \in \mathcal{S}$ arhimedska enota za matrično urejenost. Brez škode za splošnost naj bo $\mathfrak{A} = \mathcal{B}(\mathcal{H})$ za nek Hilbertov prostor $\mathcal{H}$. Za poljubno sebiadjungirano matriko $A \in M_n(\mathcal{S})$ je $\|A\| \cdot I_n - A \geq 0$, torej je 1 enota za matrično urejenost. Dokazati moramo še, da je $1 \in \mathcal{S}$ arhimedska enota. Denimo, da velja $r \cdot I_n + A \geq 0$ za vse $r > 0$. Če A ni pozitivna matrika, potem obstaja enotski vektor $x \in \mathcal{H}^n$, tako da je $\langle Ax, x \rangle = -\varepsilon < 0$. Če vzamemo sedaj $r < \varepsilon$, potem je $\langle (r \cdot I_n + A)x, x \rangle = r - \varepsilon < 0$, zato tudi $r \cdot I_n + A$ ni pozitivna, protislovje.

Velja pa tudi obratno: vsak abstrakten operatorski sistem je izomorfen konkretnemu operatorskemu sistemu, ki ima na zgoraj opisani način dano strukturo abstraktnega operatorskega sistema. To je vsebina naslednjega izreka.

Izrek 9.3 (Choi-Effros). *Za vsak abstrakten operatorski sistem $\mathcal{S}$ obstaja (konkreten) operatorski sistem $\mathcal{S}_1 \subseteq \mathfrak{A}$ in izomorfizem $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}_1$, ki slika $e \in \mathcal{S}$ v $1 \in \mathcal{S}_1$.*

Za dokaz tega izreka bomo potrebovali analog trditve 7.3. Tudi če je $\mathcal{S}$ abstrakten operatorski prostor, lahko poljubni preslikavi $\varphi \in \mathcal{L}(\mathcal{S}, M_n(\mathbb{C}))$ priredimo linearen funkcional

$$s_\varphi \in \mathcal{L}(M_n(\mathcal{S}), \mathbb{C}), \quad s_\varphi([a_{i,j}]_{i,j}) = \sum_{i,j}^n \varphi(a_{ij})_{ij} = e^* \varphi^{(n)}([a_{ij}]_{i,j})e,$$

pri čemer je

$$e = \begin{bmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{n^2}$$

(tokrat izpustimo faktor $\frac{1}{n}$, saj ga ne potrebujemo). Obratno lahko vsakemu linearnemu funkcionalu $s \in \mathcal{L}(M_n(\mathcal{S}), \mathbb{C})$ priredimo

$$\varphi \in \mathcal{L}(\mathcal{S}, M_n(\mathbb{C})), \quad \varphi(a) = s^{(n)}([aE_{ij}]_{i,j}) = n \cdot s^{(n)}(eae^*).$$

Na enak način kot prej (glej odstavke pred trditvijo 7.3) lahko dokažemo, da sta preslikavi $\varphi \mapsto s_\varphi$ in $s \mapsto \varphi_s$ druga drugi inverzni. Naslednjo trditev dokažemo na enak način kot 7.3, zato dokaz izpustimo.

Trditev 9.4. *Naj bo $\mathcal{S}$ abstrakten operatorski sistem in $\varphi \in \mathcal{L}(\mathcal{S}, M_n(\mathbb{C}))$. Naslednje trditve so ekvivalentne:*

1. φ je povsem pozitivna;
2. φ je n -pozitivna;
3. s_φ je pozitiven funkcional.

Sedaj lahko dokažemo Choi-Effrosov izrek.

Dokaz izreka 9.3. Za vsak $n \in \mathbb{N}$ označimo $\mathcal{P}_n := \text{EPP}(\mathcal{S}, M_n(\mathbb{C}))$ in definiramo preslikavo

$$i : \mathcal{S} \rightarrow \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} M_n(\mathbb{C})^{\oplus \mathcal{P}_n}, \quad \varphi = \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} \bigoplus_{\psi \in \mathcal{P}_n} \psi.$$

Označimo C^* -algebro

$$\mathfrak{A} := \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} M_n(\mathbb{C})^{\oplus \mathcal{P}_n}.$$

Očitno je $i(e) = 1 \in \mathfrak{A}$.

Če želimo dokazati, da je i izomorfizem abstraktnih operatorskih prostorov na svojo sliko, mora veljati, da je $A \in \mathcal{C}_n$ natanko tedaj, ko je $i^{(n)}(A) \geq 0$ v $M_n(\mathfrak{A})$. Implikacija v desno je očitna po definiciji i , zato vzamemo $A_0 \notin \mathcal{C}_n$ in dokazujemo, da $i^{(n)}(A_0)$ ni pozitivna matrika. Dovolj je dokazati, da obstaja $\varphi \in \text{EPP}(\mathcal{S}, M_k(\mathbb{C}))$, tako da $\varphi^{(n)}(A_0)$ ni pozitivna.

Najprej bomo dokazali, da obstaja pozitiven linearen funkcional $s : M_n(\mathcal{S}) \rightarrow \mathbb{C}$, tako da $s(A_0) \not\geq 0$. Po Hahn-Banachovem separacijskem izreku (DOPOLNI) obstaja realen linearen funkcional $s_0 : M_n(\mathcal{S}) \rightarrow \mathbb{R}$, ki loči zaprto konveksno množico $\mathcal{C}_n$ od A_0 , torej obstajata

$$s_0(A_0) < \sup\{s_0(B) \mid B \in \mathcal{C}_n\}.$$

Najprej opazimo, da je $s_0(B) \geq 0$ za vsak $B \in \mathcal{C}_n$. Če bi namreč obstajal $B \in \mathcal{C}_n$, tako da je $s_0(B) < 0$, potem je $\frac{s_0(A_0)}{s_0(B)} > 0$ in zato $\frac{s_0(A_0)}{s_0(B)}B \in \mathcal{C}_n$. To pa bi pomenilo, da je

$$s_0(A_0) < s_0\left(\frac{s_0(A_0)}{s_0(B)}B\right) = s_0(A_0),$$

kar vodi v protislovje. Sedaj pa lahko definiramo želen kompleksen funkcional

$$s : M_n(\mathcal{S}) \rightarrow \mathbb{C}, \quad s(A) = s_0(\operatorname{Re} A) + is_0(\operatorname{Im} A).$$

Ker je $s : M_n(\mathcal{S}) \rightarrow \mathbb{C}$ pozitiven funkcional, je $\varphi_s : \mathcal{S} \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ po prejšnji trditvi povsem pozitivna preslikava. Ker za

$$e = \begin{bmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{n^2}$$

velja

$$e^* \varphi_s^{(n)}(A_0) e = s_{\varphi_s}(A_0) = s(A_0) \not\geq 0,$$

$\varphi_s^{(n)}(A_0)$ ni pozitivna matrika. Če je $\varphi_s(e) = 1$, potem lahko nastavimo $\varphi := \varphi_s$ in smo končali.

Oglejmo si pozitivno matriko $\varphi_s(e) = P = B^* B \in M_n(\mathcal{S})$. Če je P obrnljiva, potem lahko definiramo $\varphi := (B^{-1})^* \varphi_s B^{-1} \in \operatorname{EPP}(\mathcal{S}, M_n(\mathbb{C}))$. V primeru, ko P ni obrnljiva, vzamemo nek $a \in \mathcal{S}$ z normo $\|a\| \leq 1$. Od tod sledi

$$\begin{bmatrix} e & a \\ a^* & e \end{bmatrix} \in \mathcal{C}_2$$

in posledično

$$\begin{bmatrix} P & \varphi_s(a) \\ \varphi_s(a)^* & P \end{bmatrix} \geq 0.$$

Če je $Px = 0$, potem je po lemi 4.8

$$\langle \varphi_s(a)x, \varphi_s(a)x \rangle^2 \leq \langle \varphi_s(a)x, \varphi_s(a)x \rangle \cdot \langle Px, Px \rangle = 0,$$

torej je $\varphi_s(a)x = 0$. Od tod sledi ker $P \subseteq \ker \varphi_s(a)$ in zato $\ker \varphi_s(a)^\perp \subseteq \ker P^\perp$. Naj bo $Q \in M_n(\mathbb{C})$ ortogonalna projekcija na $\ker P^\perp$, torej $Q\varphi_s(A)Q = \varphi_s(A)$. Denimo, da je Q matrika ranga $k < n$ (in zato tudi P ranga k). Ker je $P \geq 0$, obstaja po spektralnem izreku unitarna matrika $U \in M_n(\mathbb{C})$, tako da je

$$P = U^* \begin{bmatrix} \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_k) & \\ & 0 \end{bmatrix} U, \quad \lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_k > 0.$$

Definiramo

$$V := U^* \begin{bmatrix} \operatorname{diag}(\lambda_1^{-\frac{1}{2}}, \dots, \lambda_k^{-\frac{1}{2}}) & \\ & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{n \times k},$$

tako da je $V^* P V = I_k$. Nadalje definiramo

$$W := \begin{bmatrix} \operatorname{diag}(\lambda_1^{\frac{1}{2}}, \dots, \lambda_k^{\frac{1}{2}}) & \\ & 0 \end{bmatrix} U \in \mathbb{C}^{k \times n},$$

tako da velja

$$VW = U^* \begin{bmatrix} I_k & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} U = Q.$$

Sedaj definiramo $\varphi := V^* \varphi_s V \in \operatorname{EPP}(\mathcal{S}, M_k(\mathbb{C}))$, tako da je

$$e^*(I_n \otimes W)^* \varphi^{(n)}(A_0)(I_n \otimes W)e = e^*(I_n \otimes Q)^* \varphi_s^{(n)}(A_0)(I_n \otimes Q)e = e^* \varphi_s^{(n)}(A_0)e < 0,$$

torej $\varphi^{(n)}(A_0)$ ni pozitivna matrika. $\square$

10 C^* -ogrinjače

Izrek 9.3 nam pove, da vsak abstrakten operatorski sistem $\mathcal{S}$ lahko ‘vložimo’ v neko C^* -algebro $\mathfrak{A}$. Zato se naravno pojavi vprašanje, ali obstaja C^* -algebra, v katero lahko vložimo abstrakten operatorski sistem $\mathcal{S}$, in ki je na nek način ‘minimalna’. V ta namen bomo za vsako vložitev $i : \mathcal{S} \rightarrow \mathfrak{A}$ zahtevali, da je $\mathfrak{A} = C^*(i(\mathcal{S}))$.

To vprašanje lahko ekvivalentno prevedemo na (konkretna) operatorske sisteme. $\mathcal{S} \subseteq C^*(\mathcal{S})$. Spomnimo, da je izomorfizem v kategoriji $\mathbf{OSys}_1$ enotska povsem izometrična bijekcija med operatorskima sistemoma. Za konkreten operatorski sistem $\mathcal{S} \subseteq C^*(\mathcal{S})$ torej iščemo ‘minimalno’ C^* -algebro $\mathfrak{A}$, za katero obstaja povsem izometrična enotska preslikava $i : \mathcal{S} \rightarrow \mathfrak{A}$, tako da je $\mathfrak{A} = C^*(i(\mathcal{S}))$.

Definicija 10.1. C^* -pokritje operatorskega sistema $\mathcal{S}$ je par $(i, \mathfrak{A})$, kjer je $i : \mathcal{S} \rightarrow \mathfrak{A}$ enotska povsem izometrija in $\mathfrak{A} = C^*(i(\mathcal{S}))$.

Če sta $(i_1, \mathfrak{A}_1)$ in $(i_2, \mathfrak{A}_2)$ C^* -pokritji $\mathcal{S}$ in obstaja takšen $*$ -homomorfizem $\pi : \mathfrak{B}_1 \rightarrow \mathfrak{B}_2$, da velja $\pi \circ i_1 = i_2$, potem je π morfizem C^* -pokritij $\mathcal{S}$.

Opomba 10.2. Morfizem C^* -pokritij $(i_1, \mathfrak{A}_1)$ in $(i_2, \mathfrak{A}_2)$, če ta obstaja, je enolično določen na generatorjih $i_1(\mathcal{S})$ C^* -algebre $\mathfrak{A}_1$, zato je enoličen.

Ker $i_2(\mathcal{S})$ generira C^* -algebro $\mathfrak{A}_2$ in velja $i_2(\mathcal{S}) = \pi(i_1(\mathcal{S})) \subseteq \pi(\mathfrak{A}_1)$, je $\pi(\mathfrak{A}_1) = \mathfrak{A}_2$, zato je $\pi : \mathfrak{A}_1 \rightarrow \mathfrak{A}_2$ surjektivna.

Definicija 10.3. C^* -ogrinjača operatorske algebre $\mathcal{S}$ definiramo kot končni objekt $(i, C_{\text{env}}^*(\mathcal{S}))$ v kategoriji C^* -pokritij $\mathcal{S}$: če je $(j, \mathfrak{A})$ poljubno C^* -pokritje $\mathcal{S}$, potem obstaja $*$ -homomorfizem $\pi : \mathfrak{A} \rightarrow C_{\text{env}}^*(\mathcal{S})$, tako da je $\pi \circ j = i$.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S} & \xrightarrow{j} & \mathfrak{A} \\ & \searrow i & \downarrow \pi \\ & & C_{\text{env}}^*(\mathcal{S}) \end{array}$$

V tem podrazdelku dokažemo, da C^* -ogrinjača (in posledično ideal Šilova) res obstaja za vsak operatorski sistem $\mathcal{S} \subseteq C^*(\mathcal{S})$. Pri tem sledimo argumentom Dritschell-McCollougha ([4]) in Arvesona ([1]). Začnemo z naslednjo definicijo.

Definicija 10.4. Naj bo $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ enotska povsem pozitivna preslikava. Pravimo, da je neka druga enotska povsem pozitivna preslikava $\psi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$ njena *dilatacija*, če velja $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{K}$ ter

$$P_{\mathcal{H}}\psi(a)|_{\mathcal{H}} = \varphi(a), \quad \forall a \in \mathcal{S}.$$

Rečemo tudi, da je φ *kompresija* za ψ .

Če je $\overline{C^*(\psi(\mathcal{S}))}\mathcal{H} = \mathcal{K}$, potem pravimo, da je ψ *nerazcepna dilatacija* φ .

Opomba 10.5. Relacija $\preceq$ je delna urejenost na enotskih povsem pozitivnih prelikavah iz $\mathcal{S}$ v algebre omejenih operatorjev na Hilbertovih prostorih.

Zgled 10.6. Vsaka enotska povsem pozitivna preslikava $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ ima trivialno dilatacijo $\varphi \oplus \psi$, kjer je $\psi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$ poljubna enotska povsem pozitivna preslikava. $\diamond$

Zgled 10.7. Če je $\varphi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ enotska povsem pozitivna preslikava, potem po Stinespringovem izreku obstaja *-homomorfizem $\pi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$, ki je dilatacija φ . $\diamond$

Definicija 10.8. Enotska povsem pozitivna preslikava $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ je *maksimalna*, če nima nobene netrivialne dilatacije. Ekvivalentno: če je $\psi \succeq \varphi$, potem je $\psi = \varphi \oplus \psi'$ za neko enotska povsem pozitivna preslikava ψ' .

Lema 10.9. Enotska povsem pozitivna preslikava $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ je maksimalna natanko tedaj, ko je edina njena nerazcepna dilatacija φ sama.

Dokaz. Denimo, da je φ maksimalna in $\psi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$ njena nerazcepna dilatacija. Potem je $\psi = \varphi \oplus \psi'$, kjer je $\psi' : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K}')$ enotska povsem pozitivna in $\mathcal{K} = \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}'$. Od tod sledi, da je $\psi(\mathcal{S})\mathcal{H} = \varphi(\mathcal{S})\mathcal{H} = \mathcal{H}$ in posledično $\overline{C^*(\psi(\mathcal{S}))}\mathcal{H} = \mathcal{H}$. Ker pa je ψ nerazcepna, imamo $\overline{C^*(\psi(\mathcal{S}))}\mathcal{H} = \mathcal{K}$. To pomeni, da je $\mathcal{K} = \mathcal{H}$ in $\psi' = 0$, torej $\psi = \varphi$.

V obratno smer predpostavimo, da je φ sama sebi edina nerazcepna dilatacija. Vzemimo poljubno dilatacijo $\psi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$, tako da $\varphi \neq \psi$. Definiramo Hilbertov podprostor $\mathcal{H}_1 := \overline{C^*(\psi(\mathcal{S}))}\mathcal{H} \subseteq \mathcal{K}$. Potem je $P_{\mathcal{H}_1}\psi|_{\mathcal{H}_1}$ nerazcepna dilatacija φ , zato je $\mathcal{H}_1 = \mathcal{H}$. Od tod sledi, da je $\mathcal{H}$ invarianten prostor za $C^*(\psi(\mathcal{S}))$. Fiksirajmo poljuben element $a \in \mathcal{S}$. Potem je $\mathcal{H}$ invarianten prostor za $\psi(a)$. Ker je tudi $a^* \in \mathcal{S}$, je $\mathcal{H}$ invarianten za $\psi(a)^* = \psi(a^*)$. To pomeni, da je tudi $\mathcal{H}^\perp$ invarianten prostor za $\psi(a)$, zato lahko zapišemo

$$\psi(a) = \underbrace{P_{\mathcal{H}}\psi(a)|_{\mathcal{H}}}_{=\varphi(a)} \oplus P_{\mathcal{H}^\perp}\psi(a)|_{\mathcal{H}^\perp}.$$

Če definiramo

$$\psi' : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}^\perp), \quad \psi'(a) = P_{\mathcal{H}^\perp}\psi(a)|_{\mathcal{H}^\perp},$$

potem je $\psi = \varphi \oplus \psi'$. $\square$

Definicija 10.10. Naj bo $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ enotska povsem pozitivna. Pravimo, da je φ *maksimalna v točki* $(a, x) \in \mathcal{S} \times \mathcal{H}$, če za vsako njeno dilatacijo $\psi \succeq \varphi$ velja $\psi(a)x = \varphi(a)x$.

Opomba 10.11. Opazimo, da če je enotska povsem pozitivna φ maksimalna v (a, x) , potem je tudi vsaka njena dilatacija $\psi \succeq \varphi$ maksimalna v (a, x) .

Lema 10.12. Enotska povsem pozitivna preslikava $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ je maksimalna natanko tedaj, ko je maksimalna za vse $(a, x) \in \mathcal{S} \times \mathcal{H}$.

Dokaz. Denimo, da je $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ maksimalna. Če je $\psi \succeq \varphi$, potem je $\psi = \varphi \oplus \psi'$, torej $\psi(a)|_{\mathcal{H}} = \varphi(a)$ za vsak $a \in \mathcal{S}$. Od tod sledi $\psi(a)x = \varphi(a)x$ za vsak $a \in \mathcal{S}$ ter $x \in \mathcal{H}$.

Obratno, denimo, da je φ maksimalna za vse $(a, x) \in \mathcal{S} \times \mathcal{H}$. Naj bo $\psi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$ dilatacija φ . Potem je $\psi(\mathcal{S})\mathcal{H} = \mathcal{H}$. Na enak način kot v prejšnji lemi lahko od tod zaključimo, da

$$\psi' : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}^\perp), \quad \psi'(a) = P_{\mathcal{H}^\perp}\psi(a)|_{\mathcal{H}^\perp}$$

zadošča $\psi = \varphi \oplus \psi'$. $\square$

Posledica 10.13. Naj bo $\{\varphi_i : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_i)\}_{i \in I}$ množica maksimalnih preslikav. Potem je tudi $\bigoplus_{i \in I} \varphi_i : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\bigoplus_{i \in I} \mathcal{H}_i)$ maksimalna preslikava.

Dokaz. Očitno je $\bigoplus_{i \in I} \varphi_i$ enotska povsem pozitivna preslikava. Vzemimo nek $a \in \mathcal{S}$ in $h = (h_i)_{i \in I} \in \bigoplus_{i \in I} \mathcal{H}_i$. Denimo, da je ψ neka njena dilatacija. Potem je ψ tudi dilatacija φ_i za vsak $i \in I$. Od tod sledi

$$\psi(a)h = \psi(a)(h_i)_{i \in I} = (\psi(a)h_i)_{i \in I} = (\varphi_i(a)h_i)_{i \in I} = \left(\bigoplus_{i \in I} \varphi_i \right) (a)h,$$

torej je φ maksimalna na $\mathcal{S} \times (\bigoplus_{i \in I} \mathcal{H}_i)$. $\square$

Lema 10.14. Enotska povsem pozitivna preslikava $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ je maksimalna v točki (a, x) natanko tedaj, ko velja

$$\|\varphi(a)x\| = \sup_{\psi \succeq \varphi} \|\psi(a)x\|.$$

Dokaz. Vzemimo poljubno dilatacijo $\psi \succeq \varphi$. Potem je

$$\|\psi(a)x\| \leq \|\varphi(a)x\| = \|P_{\mathcal{H}}\psi(a)x\|,$$

od koder sledi $\psi(a)x = P_{\mathcal{H}}\psi(a)x = \varphi(a)x$. $\square$

Ključna lastnost maksimalnih preslikav je, da so invariantne za operatorske sisteme.

Trditev 10.15. Naj bosta $\mathcal{S}_1 \subseteq C^*(\mathcal{S}_1)$, $\mathcal{S}_1 \subseteq C^*(\mathcal{S}_1)$ operatorski sistema in $\theta : \mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2$ izomorfizem. Če je $\varphi_1 : \mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ maksimalna preslikava, potem je maksimalna tudi $\varphi_2 := \varphi_1 \circ \theta^{-1} : \mathcal{S}_2 \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$.

Dokaz. Naj bo $\psi_2 : \mathcal{S}_2 \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$ nerazcepna dilatacija φ_2 , torej je

$$\overline{C^*(\psi_2(\mathcal{S}_2))\mathcal{H}} = \mathcal{K}.$$

Definirajmo $\psi_1 := \psi_2 \circ \theta : \mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$, ki je očitno enotska povsem pozitivna preslikava. Sedaj za vsak $a \in \mathcal{S}_1$ velja

$$P_{\mathcal{H}}\psi_1(a)|_{\mathcal{H}} = P_{\mathcal{H}}\psi_2(\theta(a))|_{\mathcal{H}} = \varphi_2(\theta(a)) = \varphi_1(a),$$

torej je $\psi_1 : \mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$ dilatacija φ_1 . Ker je $\psi_1(\mathcal{S}_1) = \psi_2(\theta(\mathcal{S}_1)) = \psi_2(\mathcal{S}_2)$, velja $\overline{C^*(\psi_1(\mathcal{S}_1))\mathcal{H}} = \mathcal{K}$, zato je ψ_1 nerazcepna dilatacija φ_1 . Ker je φ_1 maksimalna, sledi $\psi_1 = \varphi_1$ ter $\mathcal{K} = \mathcal{H}$. Od tod pa sledi $\psi_2 = \varphi_2$. $\square$

Maksimalne preslikave lahko karakteriziramo še na en način, ki je ključen za dokaz obstoja C^* -ogrinjače.

Definicija 10.16. Naj bo $\mathcal{S} \subseteq C^*(\mathcal{S})$ operatorski sistem. Enotska povsem pozitivna preslikava $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ ima lastnost enolične razširitve, če velja:

1. φ ima enolično povsem pozitivno razširitev $\varphi' : C^*(\mathcal{S}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$;
2. φ' je $*$ -homomorfizem.

Trditev 10.17. Preslikava $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ je maksimalna natanko tedaj, ko ima lastnost enolične razširitve.

Za dokaz trditve potrebujemo naslednjo lemo.

Lema 10.18. Preslikava $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ ima lastnost enolične razširitve natanko tedaj, ko je vsaka njena povsem pozitivna razširitev $\tilde{\varphi} : C^*(\mathcal{S}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ multiplikativna.

Dokaz. Denimo, da ima $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ samo multiplikativne povsem pozitivne razširitve na $C^*(\mathcal{S})$. Vzemimo torej eno tako razširitev $\varphi' : C^*(\mathcal{S}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$. Ker je φ' hkrati multiplikativna in $*$ -linearna (kar sledi iz povsem pozitivnosti), je upodobitev $C^*(\mathcal{S})$ na $\mathcal{H}$. Če je φ'' še ena povsem pozitivna razširitev φ na $C^*(\mathcal{S})$, je prav tako upodobitev $C^*(\mathcal{S})$ na $\mathcal{H}$. Ker se ti upodobitvi C^* -algebre $C^*(\mathcal{S})$ ujemata na njeni množici generatorjev $\mathcal{S}$, se ujemata povsod in velja $\varphi' = \varphi''$. $\square$

Dokaz trditve 10.17. Denimo najprej, da je $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ maksimalna. Predpostavimo, da je $\varphi' : C^*(\mathcal{S}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ neka njena povsem pozitivna razširitev. Po Stinespringovemu izreku obstaja Hilbertov prostor $\mathcal{K} \supseteq \mathcal{H}$ ter upodobitev $\pi : C^*(\mathcal{S}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$, tako da je $\mathcal{K} = \overline{\pi(C^*(\mathcal{S}))\mathcal{H}}$ in

$$\varphi'(a) = P_{\mathcal{H}}\pi(a)|_{\mathcal{H}}, \quad \forall a \in C^*(\mathcal{S}).$$

Potem je $\pi|_{\mathcal{S}} : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$ dilatacija $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ in

$$\mathcal{K} = \overline{\pi(C^*(\mathcal{S}))\mathcal{H}} = \overline{C^*(\pi(\mathcal{S}))\mathcal{H}},$$

zato je po maksimalnosti $\mathcal{K} = \mathcal{H}$ ter $\pi|_{\mathcal{S}} = \varphi$. Od tod sledi $\varphi' = \pi$ in φ' je multiplikativna.

Za obratno implikacijo predpostavimo, da ima φ lastnost enolične razširitve. Naj bo $\psi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$ njena poljubna nerazcepna dilatacija, torej $\overline{C^*(\psi(\mathcal{S}))\mathcal{H}} = \mathcal{K}$. Po Arvesonovem razširitvenem izreku lahko ψ razširimo do povsem pozitivne preslikave $\psi' : C^*(\mathcal{S}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$. Ker velja $P_{\mathcal{H}}\psi'(a)|_{\mathcal{H}} = \varphi(a)$ za vsak $a \in \mathcal{S}$, je $P_{\mathcal{H}}\psi'|_{\mathcal{H}} : C^*(\mathcal{S}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ enotska povsem pozitivna razširitev φ . Ker ima φ lastnost enolične preslikave, je $P_{\mathcal{H}}\psi'|_{\mathcal{H}}$ multiplikativna. Po Cauchy-Schwarzevi neenakosti za povsem pozitivne preslikave za poljuben $a \in \mathcal{S}$ velja

$$P_{\mathcal{H}}\psi'(a^*)P_{\mathcal{H}}\psi'(a)P_{\mathcal{H}} = P_{\mathcal{H}}\psi'(a^*a)P_{\mathcal{H}} \geq P_{\mathcal{H}}\psi'(a^*)\psi'(a)P_{\mathcal{H}}.$$

Od tod sledi

$$((1 - P_{\mathcal{H}})\psi'(a)P_{\mathcal{H}})^*((1 - P_{\mathcal{H}})\psi'(a)P_{\mathcal{H}}) = P_{\mathcal{H}}\psi'(a)^*(1 - P_{\mathcal{H}})\psi'(a)P_{\mathcal{H}} \leq 0,$$

zato $((1 - P_{\mathcal{H}})\psi'(a)P_{\mathcal{H}})^*((1 - P_{\mathcal{H}})\psi'(a)P_{\mathcal{H}}) = 0$. Posledično je $\|(1 - P_{\mathcal{H}})\psi'(a)P_{\mathcal{H}}\| = 0$, torej $(1 - P_{\mathcal{H}})\psi'(a)P_{\mathcal{H}} = 0$. To pomeni, da je $\psi'(a)\mathcal{H} \subseteq \mathcal{H}$ in $\psi(\mathcal{S})\mathcal{H} \subseteq \mathcal{H}$. Od tod sledi $C^*(\psi(\mathcal{S}))\mathcal{H} \subseteq \mathcal{H}$ in zato $\mathcal{K} = \mathcal{H}$. S tem smo dokazali, da je $\psi = \varphi$. $\square$

Do sedaj še nismo spoznali nobenega primera maksimalnih preslikav. Njihov obstoj nam zagotavlja naslednji izrek.

Izrek 10.19 (Arveson-Dritschel-McCollough). Vsako enotsko povsem pozitivno preslikavo $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ lahko dilatiramo do maksimalne preslikave $\psi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$.

Dokaz izreka 10.19 je tehničen in temelji na uporabi Zornove leme. Začnimo z naslednjo lemo, ki je splošitev argumenta v dokazu Arvesonovega izreka.

Lema 10.20. *Naj bo $\{\varphi_\lambda : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda}$ usmerjena množica enotskih povsem pozitivnih preslikav z relacijo $\preceq$. Definirajmo $\mathcal{H}_\infty$ kot napolnitev prostora $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{H}_\lambda$. Potem obstaja enolično določena preslikava $\varphi_\infty \in \text{EPP}(\mathcal{S}, \mathcal{B}(\mathcal{H}_\infty))$, tako da je $\varphi_\infty \succeq \varphi_\lambda$ za vsak $\lambda \in \Lambda$.*

Dokaz. Za vsak λ na $\mathcal{H}_\infty = \mathcal{H}_\lambda \oplus \mathcal{H}_\lambda^\perp$ definiramo povsem pozitivno preslikavo

$$\psi_\lambda : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_\infty), \quad \psi_\lambda(a) = \begin{bmatrix} \varphi_\lambda(a) & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

torej je $\{\psi_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ mreža v $\text{PP}_1(\mathcal{S}, \mathcal{B}(\mathcal{H}_\infty))$. Ker je slednji prostor kompakten, ima mreža neko stekališče $\varphi_\infty \in \text{PP}_1(\mathcal{S}, \mathcal{B}(\mathcal{H}_\infty))$. Dokazujemo, da je φ_∞ zelena dilatacija.

Fiksirajmo nek $\lambda \in \Lambda$ in $a \in \mathcal{S}$. Po definiciji za vsak $\kappa \succeq \lambda$ velja $P_{\mathcal{H}_\lambda} \psi_\kappa(a)|_{\mathcal{H}_\lambda} = \varphi_\lambda(a)$. Po drugi strani pa ima $\{\psi_\kappa(a)\}_{\kappa \succeq \lambda}$ stekališče v $\varphi_\infty(a)$ v ŠOT, zato ima $\{P_{\mathcal{H}_\lambda} \psi_\kappa(a)|_{\mathcal{H}_\lambda}\}_{\kappa \succeq \lambda}$ stekališče v $P_{\mathcal{H}_\lambda} \varphi_\infty(a)|_{\mathcal{H}_\lambda}$. Od tod sledi $P_{\mathcal{H}_\lambda} \varphi_\infty(a)|_{\mathcal{H}_\lambda} = \varphi_\lambda(a)$ in $\varphi_\infty \succeq \varphi_\lambda$.

Dokažimo enoličnost. Denimo, da je $\varphi'_\infty : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_\infty)$ še ena povsem pozitivna preslikava, tako da je $\varphi_\lambda \preceq \varphi'_\infty$ za vsak $\lambda \in \Lambda$. Vzemimo poljubna $a \in \mathcal{S}$ in $x, y \in \bigcup_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{H}_\lambda$. Denimo, da je $x \in \mathcal{H}_\mu$ in $y \in \mathcal{H}_\nu$. Potem obstaja $\lambda \in \Lambda$, tako da je $\varphi_\mu \preceq \varphi_\lambda$ in $\varphi_\nu \preceq \varphi_\lambda$, torej $x, y \in \mathcal{H}_\lambda$. Od tod sledi

$$\begin{aligned} \langle \varphi'_\infty(a)x, y \rangle &= \langle P_{\mathcal{H}_\lambda} \varphi'_\infty(a) P_{\mathcal{H}_\lambda} x, y \rangle \\ &= \langle \varphi_\lambda(a)x, y \rangle \\ &= \langle P_{\mathcal{H}_\lambda} \varphi_\infty(a) P_{\mathcal{H}_\lambda} x, y \rangle \\ &= \langle \varphi_\infty(a)x, y \rangle. \end{aligned}$$

Ker je $\overline{\bigcup_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{H}_\lambda} = \mathcal{H}_\infty$, velja

$$\langle \varphi'_\infty(a)x, y \rangle = \langle \varphi_\infty(a)x, y \rangle, \quad \forall x, y \in \mathcal{H}_\infty$$

in posledično $\varphi_\infty(a) = \varphi'_\infty(a)$ za poljuben $a \in \mathcal{S}$.

Preostane le še dokazati, da je φ_∞ enotska preslikava. Kot v prejšnjem odstavku za poljubna $x, y \in \bigcup_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{H}_\lambda$ obstaja tak $\lambda \in \Lambda$, da sta $x, y \in \mathcal{H}_\lambda$. Potem je

$$\begin{aligned} \langle \varphi_\infty(1)x, y \rangle &= \langle P_{\mathcal{H}_\lambda} \varphi_\infty(1) P_{\mathcal{H}_\lambda} x, y \rangle \\ &= \langle \varphi_\lambda(1)x, y \rangle \\ &= \langle x, y \rangle. \end{aligned}$$

Od tod ponovno sledi, da mora veljati $\varphi_\infty(1) = 1$. □

Trditev 10.21. *Naj bo $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ enotska povsem pozitivna preslikava in $(a_0, x_0) \in \mathcal{S} \times \mathcal{H}$. Potem obstaja dilatacija $\psi \succeq \varphi$, ki je maksimalna na (a_0, x_0) .*

Dokaz. Najprej opazimo, da je

$$\sup\{\psi(a_0)x_0 \mid \psi \succeq \varphi\} \leq \|a_0\| \cdot \|x_0\| < \infty.$$

Induktivno konstruiramo zaporedje dilatacij $\varphi \preceq \varphi_1 \preceq \varphi_2 \preceq \dots$ na Hilbertovih prostorih $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{H}_1 \subseteq \mathcal{H}_2 \subseteq \dots$, tako da

$$\|\varphi_{n+1}(a_0)x_0\| \geq \sup_{\psi \succeq \varphi_n} \|\psi(a_0)x_0\| - \frac{1}{n}.$$

Naj bo $\mathcal{H}_\infty$ napolnitev prostora $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{H}_n$ in $\varphi_\infty : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_\infty)$ iz leme 10.20. Preostane še pokazati, da je φ_∞ maksimalna na (a_0, x_0) . Če je $\psi \succeq \varphi_\infty$, potem je tudi $\psi \succeq \varphi_n$ za vsak $n \in \mathbb{N}$ in zato

$$\|\varphi_\infty(a_0)x_0\| \geq \|P_{\mathcal{H}_{n+1}}\varphi_\infty(a_0)x_0\| = \|\varphi_{n+1}(a_0)x_0\| \geq \|\psi(a_0)x_0\| - \frac{1}{n}.$$

Od tod sledi $\|\varphi_\infty(a_0)x_0\| \geq \|\psi(a_0)x_0\|$, kar smo želeli dokazati. $\square$

Opomba 10.22. Brez škode za splošnosti lahko vzamemo $\mathcal{H}_\infty = \mathcal{H} \oplus \mathbb{C}$, saj je φ_∞ , zožena na $\text{Lin}\{\mathcal{H}, \varphi_\infty(a_0)x_0\}$, še vedno maksimalna v (a_0, x_0) .

Dokaz izreka 10.19. Po izreku o dobri urejenosti na množici $\mathcal{S} \times \mathcal{H} = \{(a_\lambda, x_\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda}$ obstaja dobra urejenost.

1. V prvem koraku za vsak $\lambda \in \Lambda$ konstruiramo preslikavo $\varphi_\lambda \in \text{EPP}(\mathcal{S}, \mathcal{B}(\mathcal{H}_\lambda))$, ki je maksimalna na $\{(a_\mu, x_\mu) \mid \mu \preceq \lambda\}$ in za katero velja $\varphi_\lambda \succeq \varphi_\mu$ za vse $\mu \preceq \lambda$. Dokaz tega koraka poteka s transfinitno indukcijo, kar pomeni, da moramo induksijsko predpostavko posebej preveriti na minimumu, naslednikih in limitnih točkah dobre urejenosti $\{(a_\lambda, x_\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda}$.

Označimo z (a_0, x_0) minimum dobre urejenosti. Po trditvi 10.21 obstaja dilatacija $\varphi_0 : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_0)$, tako da je $\varphi_0 \succeq \varphi$ maksimalna na (a_0, x_0) .

Denimo sedaj, da je (a_λ, x_λ) naslednik nekega $x_\nu \in \mathcal{S} \times \mathcal{H}$. Po induksijski predpostavki obstaja enotska povsem pozitivna preslikava $\varphi_\nu : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_\nu)$, tako da je φ_ν maksimalna na množici $\{(a_\mu, x_\mu) \mid \mu \preceq \nu\}$ in $\lambda_\nu \succeq \lambda_\mu$ za vsak $\nu \preceq \mu$. Tedaj po trditvi 10.21 obstaja dilatacija $\varphi_\lambda \succeq \varphi_\nu$, tako da je φ_λ maksimalna na (a_λ, x_λ) . Od tod sledi, da je φ_λ maksimalna na množici $\{(a_\mu, x_\mu) \mid \mu \preceq \lambda\}$ in $\varphi_\mu \preceq \varphi_\lambda$ za vse $\mu \preceq \lambda$.

Nazadnje obravnavamo primer, ko je (a_λ, x_λ) limitna točka v dobri urejenosti. Potem je $\{\varphi_\mu \mid \mu \preceq \lambda\}$ usmerjena množica enotskih povsem pozitivnih preslikav. Označimo s $\mathcal{H}_\lambda$ napolnitev prostora $\bigcup_{\mu \preceq \lambda} \mathcal{H}_\mu$. Potem po lemi 10.20 obstaja $\varphi_\lambda : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_\lambda)$, tako da je $\varphi_\lambda \succeq \varphi_\mu$ za vsak $\mu \preceq \lambda$. Od tod sledi tudi, da je φ_λ maksimalna na množici $\{(a_\mu, x_\mu) \mid \mu \preceq \lambda\}$, s čimer smo zaključili transfinitno indukcijo.

2. V drugem koraku dokazujemo, da lahko φ dilatiramo do enotske povsem pozitivne preslikave $\varphi_1 : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_1)$, ki je maksimalna na $\mathcal{S} \times \mathcal{H}$. Vzemimo dilatacije $\varphi_\lambda : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_\lambda)$, ki smo jih konstruirali v prvem koraku. Naj bo $\mathcal{H}_1$ napolnitev prostora $\bigcup_\lambda \mathcal{H}_\lambda$. Po lemi 10.20 obstaja enotska povsem pozitivna preslikava $\varphi_1 : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_1)$, za katero velja $\varphi_1 \succeq \varphi_\lambda$ za vsak λ . S tem smo konstruirali dilatacijo $\varphi_1 \succeq \varphi$, ki je maksimalna na vseh točkah $(a_\lambda, x_\lambda) \in \mathcal{S} \times \mathcal{H}$.

3. V tretjem koraku uporabimo argument iz drugega koraka, da konstruiramo zaporedje dilatacij $\varphi_n : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_n)$, tako da je $\varphi_n \succeq \varphi_{n-1}$ in φ_n maksimalna na $\mathcal{S} \times \mathcal{H}_{n-1}$. Nazadnje še enkrat uporabimo lemo 10.20, tako da na napolnitvi $\mathcal{K}$ prostora $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{H}_n$ dobimo dilatacijo $\psi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$, za katero velja $\psi \succeq \varphi_n$ za vsak $n \in \mathbb{N}$. Po konstrukciji je ψ maksimalna na $\mathcal{S} \times \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{H}_n$. Ker je $\overline{\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{H}_n} = \mathcal{K}$, sledi, da je ψ maksimalna tudi na $\mathcal{S} \times \mathcal{K}$. $\square$

Sedaj lahko dokažemo glavni rezultat tega razdelka.

Izrek 10.23. *Za vsak operatorski sistem $\mathcal{S} \subseteq C^*(\mathcal{S})$ obstaja C^* -ogrinjača $C_{\text{env}}^*(\mathcal{S})$.*

Dokaz. V prvem koraku dokažemo, da obstaja neka enotska povsem izometrična preslikava $i : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$, ki je maksimalna. Iz GNS izreka vemo, da obstaja $*$ -monomorfizem $\pi : C^*(\mathcal{S}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_0)$, torej je $\pi|_{\mathcal{S}} : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_0)$ enotska povsem izometrija. Po izreku 10.19 obstaja maksimalna preslikava $i : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$, ki je dilatacija $\pi|_{\mathcal{S}}$. Vemo pa, da je dilatacija povsem izometrične preslikave prav tako povsem izometrija; za vsak $a \in \mathcal{S}$ je namreč

$$\|\pi^{(n)}(a)\| \leq \|i^{(n)}(a)\| \leq \|i\|_{\text{po}} \cdot \|a\| = \|a\| = \|\pi^{(n)}(a)\|.$$

Naj bo $\mathfrak{A} = C^*(i(\mathcal{S})) \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$. Dokazujemo, da je C^* -pokritje $i : \mathcal{S} \rightarrow \mathfrak{A}$ C^* -ogrinjača za $\mathcal{S}$. Vzemimo poljubno C^* -pokritje $j : \mathcal{S} \rightarrow \mathfrak{B}$. Ker je i maksimalna preslikava, je po trditvi 10.15 tudi $i \circ j^{-1} : j(\mathcal{S}) \rightarrow \mathfrak{A} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$ maksimalna preslikava. To pomeni, da ima slednja lastnost enolične razširitve, zato jo lahko razširimo do $*$ -homomorfizma $\pi : \mathfrak{B} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$, za katerega po definiciji velja $\pi \circ j(\mathcal{S}) = i(\mathcal{S})$. Ker je π $*$ -homomorfizem, lahko zaključimo

$$\pi(\mathfrak{B}) = \pi(C^*(j(\mathcal{S}))) = C^*(\pi(j(\mathcal{S}))) = C^*(i(\mathcal{S})) = \mathfrak{A}.$$

Torej je $\pi : \mathfrak{B} \rightarrow \mathfrak{A}$ $*$ -homomorfizem iz univerzalne lastnosti za C^* -ogrinjačo, od koder sledi, da je $\mathfrak{A} = C_{\text{env}}^*(\mathcal{S})$. $\square$

Opomba 10.24. V zgornjem dokazu smo pokazali še več: za poljubno povsem izometrično maksimalno preslikavo $i : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ je $i : \mathcal{S} \rightarrow C^*(i(\mathcal{S}))$ C^* -ogrinjača za $\mathcal{S}$.

Pomembna lastnost C^* -ogrinjače je, da je invariantna za izomorfne operatorske sisteme. Od tod sledi, da je C^* -ogrinjača dobro definirana tudi za abstraktne operatorske sisteme.

Trditev 10.25. *Naj bosta $\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2$ operatorska sistema in $\varphi : \mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2$ njun izomorfizem. Naj bosta $i_1 : \mathcal{S}_1 \rightarrow C_{\text{env}}^*(\mathcal{S}_1)$, $i_2 : \mathcal{S}_2 \rightarrow C_{\text{env}}^*(\mathcal{S}_2)$ njuni C^* -ogrinjači. Potem obstaja enoličen $*$ -izomorfizem $\pi : C_{\text{env}}^*(\mathcal{S}_1) \rightarrow C_{\text{env}}^*(\mathcal{S}_2)$, tako da je $\pi \circ i_1 = i_2 \circ \varphi$.*

Dokaz. Ker je $i_1 \circ \varphi^{-1} : \mathcal{S}_2 \rightarrow C_{\text{env}}^*(\mathcal{S}_1)$ C^* -pokritje, obstaja enolično določen $*$ -homomorfizem $\pi : C_{\text{env}}^*(\mathcal{S}_1) \rightarrow C_{\text{env}}^*(\mathcal{S}_2)$, tako da je $\pi \circ (i_1 \circ \varphi^{-1}) = i_2$. Po istem razmisleku obstaja enolično določen $*$ -homomorfizem $\rho : C_{\text{env}}^*(\mathcal{S}_2) \rightarrow C_{\text{env}}^*(\mathcal{S}_1)$, tako da je $\rho \circ (i_2 \circ \varphi) = i_1$. Potem je $\rho \circ \pi : C_{\text{env}}^*(\mathcal{S}_1) \rightarrow C_{\text{env}}^*(\mathcal{S}_1)$ $*$ -homomorfizem, za katerega velja

$$(\rho \circ \pi) \circ i_1 = \rho \circ (\pi \circ i_1 \circ \varphi^{-1}) \circ \varphi = \rho \circ i_2 \circ \varphi = i_1.$$

Ker je $\text{id}_{C_{\text{env}}^*(\mathcal{S}_1)} : C_{\text{env}}^*(\mathcal{S}_1) \rightarrow C_{\text{env}}^*(\mathcal{S}_1)$ še en tak $*$ -homomorfizem, velja $\rho \circ \pi = \text{id}_{C_{\text{env}}^*(\mathcal{S}_1)}$. Po enakem razmisleku sledi tudi $\pi \circ \rho = \text{id}_{C_{\text{env}}^*(\mathcal{S}_2)}$, s čimer smo dokazali trditev. $\square$

11 Nekomutativen rob Šilova

Naj bo $\mathcal{S} \subseteq C^*(\mathcal{S})$ operatorski sistem. V tem podrazdelku vpeljemo ideal Šilova, kot ga je definirala Arveson v [2]. To nam bo omogočilo, da C^* -ogrinjačo $C_{\text{env}}^*(\mathcal{S})$ za nekatere operatorske sisteme tudi eksplicitno določimo; ideal Šilova namreč 'meri', v kolikšni meri se $C^*(\mathcal{S})$ razlikuje od $C_{\text{env}}^*(\mathcal{S})$. Da bi motivirali definicijo in utemeljili terminologijo, si najprej oglejmo pojem robu Šilova za operatorske sisteme v $C(X)$ in ga nato prevedemo v jezik C^* -algeber.

Naj bo torej $\mathcal{S} \subseteq C(X)$ operatorski sistem, za katerega zahtevamo še, da loči točke na X : to pomeni, da za poljubni točki $x \neq y \in X$ obstaja $f \in \mathcal{S}$, tako da je $f(x) \neq f(y)$. Po Stone-Weierstrassovem izreku (DOPOLNI) je to ekvivalentno $C^*(\mathcal{S}) = C(X)$.

Definicija 11.1. Naj bo $\mathcal{S} \subseteq C(X)$ operatorski sistem, ki loči točke na X . Zaprta množica $Y \subseteq X$ je *robna množica* za $\mathcal{S}$, če vsaka funkcija $f \in \mathcal{S}$ na njej doseže svojo normo. Robni množici $\mathcal{S}$ pravimo *rob Šilova*, če vsebuje vse ostale robne množice.

Opomba 11.2. Rob Šilova izhaja iz preučevanja *uniformiranih algeber*: to so enotske podalgebre (ne nujno zaprte za $*$) $\mathcal{A} \subseteq C(X)$, ki ločijo točke na X . Teorija uniformiranih algeber je podrobneje motivirana ter obravnavana v (DOPOLNI).

Zgled 11.3. Oglejmo si operatorski sistem

$$\mathcal{S} = \mathbb{C}[z] + \mathbb{C}[z]^* \subseteq C(\overline{\mathbb{D}}).$$

$\text{Ker } \mathcal{S}$ vsebuje afine funkcije, loči točke na $\overline{\mathbb{D}}$. Eksplicitno lahko izračunamo, da je rob Šilova za $\mathcal{S}$ enak krožnici $\mathbb{T}$.

Najprej pokažemo, da je $\mathbb{T} \subseteq \overline{\mathbb{D}}$ res robna množica za $\mathcal{S}$. Če je $f = p + \bar{q} \in \mathcal{S}$, potem je $|f|^2 = (p + \bar{q})(\bar{p} + q)$ subharmonična funkcija na $\mathbb{D}$:

$$\begin{aligned} \Delta|f|^2 &= 4 \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \frac{\partial}{\partial z} (p + \bar{q})(\bar{p} + q) \\ &= 4 \frac{\partial}{\partial \bar{z}} (p'(\bar{p} + q) + (p + \bar{q})q') \\ &= 4(p'\bar{p}' + \bar{q}'q') \\ &= 4(|p'|^2 + |q'|^2) \geq 0. \end{aligned}$$

Po principu maksimum za subharmonične funkcije (DOPOLNI) $|f|^2$ doseže svoj maksimum na $\mathbb{T}$.

Sedaj dokažemo še, da je $\mathbb{T}$ minimalna robna množica za $\mathcal{S}$. Za vsak $\lambda \in \mathbb{T}$ funkcija $z + \lambda \in \mathcal{S}$ doseže maksimum natanko v λ , torej mora biti λ element robu Šilova za $\mathcal{S}$. $\diamond$

V tem poglavju bomo pojem robu Šilova posplošili na poljuben (ne nujno komutativen) operatorski sistem $\mathcal{S} \subseteq C^*(\mathcal{S})$. Ker $C^*(\mathcal{S})$ v splošnem ni nujno oblike $C(X)$, ne moremo več govoriti o robu Šilova kot o topološkem podprostoru v X . Opazimo pa lahko, da ima vsak zaprt podprostor $Y \subseteq X$ pripadajoč zaprt ideal

$$I(Y) = \{f \in C(X) \mid f|_Y = 0\} \subseteq C(X).$$

Iz naslednje leme sledi, da je ta korespondenca bijektivna.

Lema 11.4. *Preslikava*

$$\begin{aligned} \{\text{zaprte podmnožice } X\} &\rightarrow \{\text{zaprti ideali v } C(X)\} \\ Y &\mapsto I(Y) \end{aligned}$$

je bijekcija.

Dokaz. Najprej dokažimo injektivnost. Denimo, da sta $Y_1, Y_2 \subseteq X$ različni zaprti množici, torej obstaja $x \in Y_2 \setminus Y_1$. Po Uryssohnovi lemi obstaja $f \in C(X)$, tako da je $f(x) = 1$ in $f|_{Y_1} = 0$. Potem je $f \in I(Y_1)$, toda $f \notin I(Y_2)$.

Dokažimo še surjektivnost. Vzemimo nek poljuben zaprt ideal $I \triangleleft C(X)$ in definiramo $Y := \bigcap_{f \in I} f^{-1}(0)$. Dokazujemo, da je $I(Y) = I$. Očitno je $I \subseteq I(Y)$, zato dokažimo, da velja $I \supseteq I(Y)$. Naj bo $f \in I(Y)$ in $U_0 = f^{-1}(-\varepsilon, \varepsilon) \supseteq Y$ odprta okolica. Za poljuben $x \notin Y$ obstaja nek $f_x \in I$, tako da je $f_x(x) \neq 0$. Definiramo $U_x := \{f \neq 0\}$, ki je očitno okolica točke $x \in X$. Potem je družina $U_0 \cup \{U_x\}_{x \in X}$ odprto pokritje X , zato obstaja končno podpokritje

$$U_0 \cup U_{x_1} \cup \dots \cup U_{x_n}.$$

Ker je X kompakten in Hausdorffov, obstaja razčlenitev enote $\rho_0, \dots, \rho_n$, podrejena zgornjemu pokritju. Sedaj definiramo funkcijo $f_\varepsilon := f \cdot \sum_{i=1}^n \rho_i$, za katero velja $\|f - f_\varepsilon\| \leq \varepsilon$ in ki jo lahko zapišemo kot

$$f_\varepsilon = \sum_{i=1}^n \left(\frac{f}{f_{x_i}} \rho_i \right) \cdot f_{x_i} \in I.$$

Ker je ideal I zaprt za supremum normo, sledi $f \in I$. □

Opomba 11.5. Na tej točki opomnimo, da je zaprt ideal $I \triangleleft \mathfrak{A}$ v C^* -algebri vedno zaprt za involucijo, od koder sledi, da je $\mathfrak{A}/I$ prav tako C^* -algebra in je kanonična kvocientna preslikava

$$q_I : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{A}/I$$

$*$ -homomorfizem (bralec lahko dokaz najde v (DOPOLNI)).

Zaprta množica $Y \subseteq X$ je robna za operatorski sistem $\mathcal{S} \subseteq C(X) = C^*(\mathcal{S})$ natanko tedaj, ko je zožitev $*$ -homomorfizma

$$r_Y : C(X) \rightarrow C(Y), \quad f \mapsto f|_Y$$

na $\mathcal{S}$ izometrija. Če je $r_Y|_{\mathcal{S}}$ izometrija, je po opombi 5.7 enotska povsem skržitev in enako velja tudi za njen inverz $r_Y^{-1} : r_Y(\mathcal{S}) \rightarrow C(X)$, zato je $r_Y|_{\mathcal{S}} : \mathcal{S} \rightarrow C(Y)$ povsem izometrija. Slednje pa je ekvivalentno temu, da je $q_{I(Y)}|_{\mathcal{S}} : \mathcal{S} \rightarrow C(X)/I(Y)$ povsem izometrija.

$$\begin{array}{ccc} C(X) & \xrightarrow{r_Y} & C(Y) \\ q_{I(Y)} \downarrow & \nearrow \cong & \\ \frac{C(X)}{I(Y)} & & \end{array} \quad (11.1)$$

S tem smo dokazali naslednje.

Trditev 11.6. Naj bo $\mathcal{S} \subseteq C(X) = C^*(\mathcal{S})$ operatorski sistem. Zaprta množica $Y \subseteq X$ je robna za $\mathcal{S}$ natanko tedaj, ko je zožitev kvocientne preslikave $q_{I(Y)} : C(X) \rightarrow C(X)/I(Y)$ na $\mathcal{S}$ povsem izometrija.

To vodi do naslednje definicije.

Definicija 11.7. Naj bo $\mathcal{S} \subseteq C^*(\mathcal{S})$ operatorski sistem. Zaprt ideal $I \subseteq C^*(\mathcal{S})$ je *robni ideal* za $\mathcal{S}$, če je zožitev kanonične kvocientne preslikave $q_I : C^*(\mathcal{S}) \rightarrow C^*(\mathcal{S})/I$ na $\mathcal{S}$ povsem izometrija. Robnemu idealu pravimo *ideal Šilova*, če vsebuje vse ostale robne ideale.

Zgled 11.8. Če je $Y \subseteq X$ rob Šilova za operatorski sistem $\mathcal{S} \subseteq C(X) = C^*(\mathcal{S})$, potem je

$$I(Y) = \{f \in C(X) \mid f|_Y = 0\}$$

njegov ideal Šilova. ◇

Vsak robni ideal $I \subseteq C^*(\mathcal{S})$ inducira C^* -pokritje

$$q_I|_{\mathcal{S}} : \mathcal{S} \rightarrow C^*(\mathcal{S})/I,$$

pri čemer je $q_I : C^*(\mathcal{S}) \rightarrow C^*(\mathcal{S})/I$ morfizem med C^* -pokritjema $\mathcal{S} \hookrightarrow C^*(\mathcal{S})$ in $q_I|_{\mathcal{S}}$.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S} & \xrightarrow{\quad} & C^*(\mathcal{S}) \\ & \searrow q_I|_{\mathcal{S}} & \downarrow q_I \\ & & \frac{C^*(\mathcal{S})}{I}. \end{array}$$

Ideal Šilova za $\mathcal{S}$ inducira najmanjše C^* -pokritje: C^* -ogrinjačo.

Izrek 11.9. Za vsak operatorski sistem $\mathcal{S} \subseteq C^*(\mathcal{S})$ obstaja ideal Šilova $I \subseteq C^*(\mathcal{S})$ in $q_I|_{\mathcal{S}} : \mathcal{S} \rightarrow C^*(\mathcal{S})/I$ je C^* -ogrinjača.

Dokaz. Naj bo $i : \mathcal{S} \rightarrow C_{\text{env}}^*(\mathcal{S})$ C^* -ogrinjača za $\mathcal{S}$. Po univerzalni lastnosti obstaja $*$ -homomorfizem $\pi : C^*(\mathcal{S}) \rightarrow C_{\text{env}}^*(\mathcal{S})$, tako da je $\pi|_{\mathcal{S}} = i$. Dokazujemo, da je $I := \ker \pi$ ideal Šilova, torej da je zožitev kvocientne projekcije $q_I : C^*(\mathcal{S}) \rightarrow C^*(\mathcal{S})/I$ na $\mathcal{S}$ povsem izometrija. Ker je $\pi : C^*(\mathcal{S}) \rightarrow C_{\text{env}}^*(\mathcal{S})$ surjektiven $*$ -homomorfizem, je

$$\bar{\pi} : C^*(\mathcal{S})/I \rightarrow C_{\text{env}}^*(\mathcal{S}), \quad a + \ker \pi \mapsto \pi(a)$$

izometrični $*$ -izomorfizem. Od tod sledi, da je

$$q_I|_{\mathcal{S}} = \bar{\pi}^{-1} \circ i : \mathcal{S} \rightarrow C^*(\mathcal{S})/I$$

povsem izometrična preslikava, zato je I robni ideal.

Naj bo sedaj $J \subseteq C^*(\mathcal{S})$ nek drug robni ideal in $q_J : C^*(\mathcal{S}) \rightarrow C^*(\mathcal{S})/J$ njegova kanonična kvocientna projekcija, tako da je $q_J|_{\mathcal{S}} : \mathcal{S} \rightarrow C^*(\mathcal{S})/J$ C^* -pokritje za $\mathcal{S}$. Tedaj obstaja $*$ -homomorfizem $\rho : C^*(\mathcal{S})/J \rightarrow C_{\text{env}}^*(\mathcal{S})$ iz univerzalne lastnosti, tako da velja $\rho \circ q_J|_{\mathcal{S}} = i$. Po enoličnosti iz univerzalne lastnosti je $\rho \circ q_J = \pi$, zato $J = \ker q_J \subseteq \ker \pi = I$. □

Posledica 11.10 (Šilov). Če je $\mathcal{S} \subseteq C(X) = C^*(\mathcal{S})$ operatorski sistem, potem obstaja njegov rob Šilova Y in $r_Y|_{\mathcal{S}} : \mathcal{S} \rightarrow C(Y)$ je njegova C^* -ogrinjača.

Dokaz. Po izreku 10.23 obstaja ideal Šilova za $\mathcal{S}$, ki mora po lemi 11.4 biti oblike

$$I(Y) = \{f \in C(X) \mid f|_Y = 0\}$$

za neko zaprto podmnožico $Y \subseteq X$. Po trditvi 11.6 je Y rob Šilova za $\mathcal{S}$. Zadnji stavek potem sledi iz izreka 11.9 in diagrama (11.1). $\square$

Zgled 11.11. Oglejmo si ponovno operatorski sistem $\mathcal{S} = \mathbb{C}[z] + \mathbb{C}[z]^* \subseteq C(\mathbb{D})$ iz zgleda 11.3. Dokazali smo že, da je $\mathbb{T}$ njegov rob Šilova, zato je

$$I(\mathbb{T}) = \{f \in C(\mathbb{D})\}$$

njegov ideal Šilova ter $r_Y|_{\mathcal{S}} : \mathcal{S} \rightarrow C(\mathbb{T})$ njegova C^* -ogrinjača. $\diamond$

Zgled 11.12 (DOPOLNI). Označimo s $\mathcal{T}^{(n)}$ Toeplitzov operatorski sistem, ki ga sestavljajo Toeplitzove matrice

$$\begin{bmatrix} a_0 & a_{-1} & a_{-2} & \cdots & a_{-n} \\ a_1 & a_0 & a_{-1} & \ddots & \vdots \\ a_2 & a_1 & a_0 & \ddots & a_{-2} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a_{-1} \\ a_n & \cdots & a_2 & a_1 & a_0 \end{bmatrix} \in M_n(\mathbb{C})$$

Najprej skicirajmo, zakaj velja $C^*(\mathcal{T}^{(n)}) = M_n(\mathbb{C})$. Označimo matriko $S = \sum_{k=1}^n E_{k+1,k} \in M_n(\mathbb{C})$, ki je Toeplitzova matrika za $a_1 = 1$ in $a_k = 0, k \neq 1$. Potem je $SS^* = I - E_{11}$, zato je $E_{11} \in C^*(\mathcal{T}^{(n)})$. Z indukcijo dokažemo, da so vse matrice oblike $E_{kk} \in C^*(\mathcal{T}^{(n)})$: če je namreč $E_{k-1,k-1} \in C^*(\mathcal{T}^{(n)})$, potem enako velja tudi za $E_{k,k-1} = SE_{k-1,k-1}$ in $E_{k-1,k} = E_{k,k-1}^*$ ter posledično $E_{kk} = E_{k,k-1}E_{k-1,k}$. Sedaj, ko imamo vse diagonalne matrične enote, dobimo tudi $E_{k+i,k} = S^i E_{kk}$ in $E_{k,k+i} = E_{k+i,k}^*$.

Po izreku 10.23 potem obstaja njegov ideal Šilova $I \subseteq M_n(\mathbb{C})$. Ker pa je $M_n(\mathbb{C})$ enostaven kolobar, je $I = (0)$ in $C_{\text{env}}^*(\mathcal{T}^{(n)}) = M_n(\mathbb{C})/I = M_n(\mathbb{C})$. $\diamond$

Zgled 11.13. Prejšnji zgled lahko posplošimo do neskončno dimenzionalnih matrik nad Hilbertovim prostorom $\ell^2(\mathbb{Z}_+)$. Zanimajo nas torej operatorji $T \in \mathcal{B}(\ell^2(\mathbb{Z}_+))$, ki imajo glede na standardno bazo $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ matriko oblike

$$\begin{bmatrix} a_0 & a_{-1} & a_{-2} & \cdots \\ a_1 & a_0 & a_{-1} & \cdots \\ a_2 & a_1 & a_0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} \quad (11.2)$$

Izkaže se, da za takšne operatorje obstaja zelo lepa karakterizacija s t.i. *Toeplitzovimi operatorji*. Dokaze v tem zgledu izpustimo in se zgolj skličemo na knjigo (DOPOLNI), v kateri je ta material podrobneje obravnavan.

Začnemo s prostorom $L^2(\mathbb{T}, m)$, kjer je m normalizirana Lebesgueova mera na $\mathbb{T}$. Iz Fourierjeve teorije vemo, da funkcije $\{z^n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ tvorijo ortonormirano bazo Hilbertovega prostora $L^2(\mathbb{T}, m)$. Sedaj definiramo *Hardyjev prostor*

$$H^2 := \overline{\text{Lin}\{1, z, z^2, \dots\}} \subseteq L^2(\mathbb{T}, m).$$

To je torej prostor L^2 funkcij f na $\mathbb{T}$, ki imajo Fourierovo vrsto oblike

$$f(e^{i\theta}) \sim \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{in\theta}.$$

Ker funkcije $\{z^n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ tvorijo ortonormirano bazo Hilbertovega prostora H^2 , lahko H^2 na očiten način identificiramo s prostorom $\ell^2(\mathbb{Z}_+)$. Nadalje lahko za vsako funkcijo $f \in L^\infty(\mathbb{T}, m)$ definiramo operator

$$M_f \in \mathcal{B}(L^2(\mathbb{T}, m)), \quad M_f(g) = fg$$

in Toeplitzov operator

$$T_f \in \mathcal{B}(H^2), \quad T_f = P_{H^2} M_f|_{H^2}.$$

Sedaj so po izreku (DOPOLNI) operatorji $T \in \mathcal{B}(\ell^2(\mathbb{Z}_+))$ oblike (11.2) natanko operatorji T_f za $f \in L^\infty(\mathbb{T}, m)$, pri čemer je $\|T_f\| = \|f\|_\infty$. Z drugimi besedami: formalna Toeplitzova matrika

$$\begin{bmatrix} a_0 & a_{-1} & a_{-2} & \cdots \\ a_1 & a_0 & a_{-1} & \cdots \\ a_2 & a_1 & a_0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

je matrika omejenega operatorja natanko tedaj, ko obstaja funkcija $f \in L^\infty(\mathbb{T}, m)$, ki ima Fourierovo vrsto $f(e^{i\theta}) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\theta}$.

Posebno lepa teorija je za Toeplitzove operatorje z *zveznim simbolom*:

$$\mathcal{T}(C(\mathbb{T})) := \{T_f \mid f \in C(\mathbb{T})\}.$$

Označimo $S = T_z \in \mathcal{T}(C(\mathbb{T}))$, ki ustreza operatorju premika v desno na $\ell^2(\mathbb{Z}_+)$, torej $Se_n = e_{n+1}$. Operator S generira algebro $C^*(S)$, ki je izjemnega pomena v funkcionalni analizi: rečemo ji *Toeplitzova algebra*. Izrek (DOPOLNI) nam pove, da je Toeplitzova algebra oblike

$$C^*(S) = \{T_f + K \mid f \in C(\mathbb{T}), K \in \mathcal{K}(H^2)\},$$

pri čemer s $\mathcal{K}(H^2)$ označujemo kompaktne operatorje na H^2 . Izrek nam pove še več: vsak element Toeplitzove algebre lahko na enoličen način razpišemo kot $T_f + K$.

Sedaj lahko določimo ideal Šilova za $\mathcal{T}(C(\mathbb{T}))$. Najprej dokažimo, da je to sploh operatorski sistem. Hitro lahko preverimo, da velja

$$T_{\alpha f + \beta g} = \alpha T_f + \beta T_g, \quad T_f^* = T_{\bar{f}},$$

zato je $\mathcal{T}(C(\mathbb{T}))$ vektorski prostor, ki je zaprt za adjungacijo in vsebuje $1 = T_1$. Iz prejšnjega odstavka nato takoj sledi, da $\mathcal{T}(C(\mathbb{T}))$ generira Toeplitzovo algebro $C^*(S)$. Dokazujemo, da je njegov ideal Šilova kar $\mathcal{K}(H^2) \subseteq C^*(S)$.

Znano je namreč, da kompaktni operatorji tvorijo zaprt ideal v algebri operatorjev na Hilbertovem prostoru. Najprej dokažimo, da je $\mathcal{K}(\mathcal{H})$ robni ideal za $\mathcal{T}(C(\mathbb{T}))$. Ker ima vsak element v $C^*(S)$ enoličen zapis oblike $T_f + K$, lahko definiramo preslikavo

$$\varphi : C^*(S) \rightarrow C(\mathbb{T}), \quad T_f + K \mapsto f.$$

Enostavno je preveriti, da je φ *-homomorfizem in $\ker \varphi = \mathcal{K}(H^2)$, zato imamo komutativni diagram

$$\begin{array}{ccc} C^*(S) & \xrightarrow{\varphi} & C(\mathbb{T}) \\ q_{\mathcal{K}(H^2)} \downarrow & \nearrow \cong & \\ \frac{C^*(S)}{\mathcal{K}(H^2)} & & \end{array}$$

Za vsak $f \in C(\mathbb{T})$ je

$$\|\varphi(T_f)\| = \|f\| = \|T_f\|,$$

zato je $\varphi|_{\mathcal{T}(C(\mathbb{T}))} : \mathcal{T}(C(\mathbb{T})) \rightarrow C(\mathbb{T})$ enotska izometrija in posledično povsem skrčitev. Enako velja tudi za njen inverz, zato je $\varphi|_{\mathcal{T}(C(\mathbb{T}))} : \mathcal{T}(C(\mathbb{T})) \rightarrow C(\mathbb{T})$ enotska povsem izometrija. Po zgornjem diagramu je zato tudi $q_{\mathcal{K}(H^2)}|_{\mathcal{T}(C(\mathbb{T}))} : \mathcal{T}(C(\mathbb{T})) \rightarrow C^*(S)/\mathcal{K}(H^2)$ povsem izometrija in $\mathcal{K}(H^2)$ je robni ideal. Dokažimo še, da je tudi ideal Šilova.

Vzemimo nek poljuben ideal $I \supseteq \mathcal{K}(H^2)$ v $C^*(S)$. Potem mora I vsebovati nek Toeplitzov operator T_f , kjer je $f \in C(\mathbb{T})$ neničelna funkcija. To pa pomeni, da $q_I|_{\mathcal{T}(C(\mathbb{T}))} : \mathcal{T}(C(\mathbb{T})) \rightarrow C^*(S)/I$ uniči $T_f \neq 0$, zato ne more biti povsem izometrija. $\diamond$

12 Nekomutativen Choquetov rob

V tem poglavju definiramo Arvesonove robne upodobitve ([2]), ki predstavljajo nekomutativno posplošitev točk v Choquetovem robu za operatorske sisteme v $C(X)$. Dokazali bomo, da za vsak operatorski sistem $\mathcal{S}$ obstaja dovolj robnih upodobitev, da *povsem normirajo* $\mathcal{S}$. Pri tem sledimo članku Davidsona in Kennedyja [3], v katerem avtorja posplošita argumente Arveson-Dritschell-McCollougha izreka.

Kot v prejšnjem poglavju tudi tokrat najprej začnemo z operatorskim sistemom $\mathcal{S} \subseteq C(X)$, ki loči točke na X . V tem kontekstu pravimo, da regularna Borelova verjetnostna mera (od sedaj naprej le: verjetnostna mera) μ na X *zastopa* točko $x \in X$, če velja

$$f(x) = \int_X f d\mu, \quad \forall f \in \mathcal{S}.$$

Takoj je očitno, da vsako točko $x \in X$ zastopa njena Diracova delta δ_x .

Definicija 12.1. Naj bo $\mathcal{S} \subseteq C(X)$ operatorski sistem, ki loči točke na X . *Choquetov rob* $\mathcal{S}$ je množica vseh točk $x \in X$, za katere je Diracova delta δ_x edina verjetnostna mera, ki jih zastopa.

Opomba 12.2. Pojem Choquetovega robu izhaja iz Choquetove teorije, ki se okvirno ukvarja s problemi naslednjega tipa: *Naj bo E lokalno konveksen prostor in $K \subseteq E$ njegova konveksna, kompaktna podmnožica. Ali za vsako točko $x \in K$ obstaja verjetnostna mera μ na K , skoncentrirana na $\text{ext } K$, tako da za vsak omejen linearen funkcional $f \in E^*$ velja $\int_K f d\mu = f(x)$?* Pomemben rezultat v tej smeri je Choquetov izrek (DOPOLNI), ki na to vprašanje odgovori pritrdilno, v kolikor je E metrizabilen prostor. Za več o tej temi glej (DOPOLNI).

Zgled 12.3. Vrnimo se k operatorskemu sistem

$$\mathcal{S} = \mathbb{C}[z] + \mathbb{C}[z]^* \subseteq C(\overline{\mathbb{D}}).$$

Dokazujemo, da je tudi njegov Choquetov rob enak $\mathbb{T}$.

Vzemimo poljubno točko $\lambda \in \mathbb{T}$ in naj bo μ verjetnostna mera, ki jo zastopa. Potem je

$$2 = \left| \int_{\overline{\mathbb{D}}} (z + \lambda) d\mu \right| \leq \int_{\overline{\mathbb{D}}} |z + \lambda| d\mu \leq 2,$$

torej je $\int_{\overline{\mathbb{D}}} (2 - |z + \lambda|) d\mu = 0$ in $2 = |z + \lambda|$ μ -skoraj povsod na $\overline{\mathbb{D}}$. Ker velja $2 - |z + \lambda| = 0$ samo za $z = \lambda$, to pomeni, da je $\mu(\{\lambda\}) = 1$. Slednje implicira, da je $\mu = \delta_\lambda$.

Dokažimo še, da poljubna točka $\lambda \in \mathbb{D}$ ni v Choquetovem robu. Definiramo Poissonovo jedro za $\overline{\mathbb{D}}$

$$P(\lambda, z) = \frac{1 - |\lambda|^2}{|z - \lambda|^2}, \quad z \in \mathbb{T}.$$

Znano dejstvo je (DOPOLNI), da za vsako realno harmonično funkcijo g na $\mathbb{D}$, ki je zvezna na $\overline{\mathbb{D}}$, velja Poissonova reprezentacijska formula

$$g(\lambda) = \int_{\mathbb{T}} g(z) P(\lambda, z) dm,$$

pri čemer je m normalizirana Lebesgueova mera na $\mathbb{T}$. Opazimo, da lahko vsako funkcijo $f \in \mathcal{S}$ zapišemo kot $f(x, y) = p(x, y) + iq(x, y)$, kjer sta p, q realna polinoma (in zato harmonični funkciji na $\mathbb{D}$). To pomeni, da je

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= p(\lambda) + iq(\lambda) \\ &= \int_{\mathbb{T}} p(z) P(\lambda, z) dm + i \int_{\mathbb{T}} q(z) P(\lambda, z) dm \\ &= \int_{\mathbb{T}} f(z) P(\lambda, z) dm. \end{aligned}$$

Definiramo sedaj mero ω_λ na $\overline{\mathbb{D}}$, tako da je za vsako Borelovo množico $E \subseteq \overline{\mathbb{D}}$

$$\omega_\lambda(E) := \int_{E \cap \mathbb{T}} P(\lambda, z) dm(z).$$

Potem je ω_λ verjetnostna mera na $\overline{\mathbb{D}}$, tako da velja

$$f(\lambda) = \int_{\overline{\mathbb{D}}} f d\omega_\lambda$$

za vse $f \in \mathcal{S}$. Ker je $\omega_\lambda \neq \delta_\lambda$, točka λ ni v Choquetovem robu.

Opomnimo, da rob Šilova in Choqueta za operatorski sistem $\mathcal{S}$ sovpadata. Kot bomo videli kasneje, to ni naključje. $\diamond$

Če želimo definicijo Choquetovega robu prenesti na splošne operatorske sisteme, jo moramo najprej prevesti v jezik funkcionalne analize. Za poljubno točko $x \in X$ lahko definiramo $*$ -homomorfizem

$$\text{ev}_x : C(X) \rightarrow \mathbb{C}, \quad f \mapsto f(x).$$

Ker po Rieszovem reprezentacijskem izreku vsakemu enotskemu pozitivnemu funkcionalu na $C(X)$ ustreza enolično določena verjetnostna mera na X , je vsaka točka $x \in X$ v Choquetovem robu natanko tedaj, ko ima funkcional $\text{ev}_x|_{\mathcal{S}} : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{C}$ enolično pozitivno razširitev do $C(X)$. Od tod takoj sledi naslednja trditev.

Trditev 12.4. *Choquetov rob $\mathcal{S}$ sestavljajo natanko točke $x \in X$, za katere ima $\text{ev}_x|_{\mathcal{S}}$ lastnost enolične preslikave.*

Če želimo pojem Choquetovega robu posplošiti na nekomutativen operatorski sistem $\mathcal{S} \subseteq C^*(\mathcal{S})$, moramo najti primeren nekomutativen analog preslikavam $\text{ev}_x : C(X) \rightarrow \mathbb{C}$, kjer je $x \in X$. Ta analog bodo *nerazcepne upodobitve*. To so upodobitve C^* -algeber $\pi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$, ki nimajo nobenega netrivialnega zaprtega invariantnega podprostora v $\mathcal{H}$. Po standardnem izreku iz funkcionalne analize (DOPOLNI) je slednji pogoj ekvivalenten $\pi(\mathfrak{A})' = \mathbb{C} \cdot I$. Ni težko videti, da je preslikava $\text{ev}_x : C(X) \rightarrow \mathbb{C}$ nerazcepna upodobitev C^* -algebre $C(X)$ za poljubno točko $x \in X$. Velja pa tudi obratno.

Trditev 12.5. *Vsaka nerazcepna upodobitev C^* -algebre $C(X)$ je oblike $\text{ev}_x : C(X) \rightarrow \mathbb{C}$ za neko točko $x \in X$.*

Dokaz. Naj bo $\rho : C(X) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ nerazcepna upodobitev, torej $\rho(C(X))' = \mathbb{C} \cdot I$. Ker je $C(X)$ komutativna algebra, je tudi $\rho(C(X))$ komutativna algebra in v posebnem velja $\rho(C(X)) \subseteq \rho(C(X))' = \mathbb{C} \cdot I$. To pomeni, da je vsak podprostor v $\mathcal{H}$ invarianten za ρ , zato mora biti $\dim \mathcal{H} = 1$ in lahko vzamemo $\mathcal{H} \equiv \mathbb{C}$. To pomeni, da je $\rho : C(X) \rightarrow \mathcal{B}(\mathbb{C}) \equiv \mathbb{C}$ multiplikativen funkcional.

Naprej dokazujemo, da je njeno jedro $\ker \rho$ maksimalen ideal v $C(X)$. Vzemimo poljuben ideal $\ker \rho \subsetneq I \subseteq C(X)$, tako da obstaja $f \in I \setminus \ker \rho$, za katerega velja $\rho(f) \neq 0$ in $1 - \frac{f}{\rho(f)} \in \ker \rho$. Od tod sledi

$$1 = \left(1 - \frac{f}{\rho(f)}\right) + \frac{1}{\rho(f)} \cdot f \in I,$$

zato je $I = C(X)$ in $\ker \rho$ je maksimalen (zaprt) ideal v $C(X)$.

Po korespondenci med zaprtimi ideali v $C(X)$ in zaprtimi množicami v X obstaja neka točka $x \in X$, tako da je $\ker \rho = I(\{x\})$. Potem je za poljubno funkcijo $f \in C(X)$ $f - f(x) \cdot 1 \in \ker \rho$, od koder sledi

$$\rho(f) - f(x) = 0$$

in $\rho = \text{ev}_x$. □

Zadnji dve trditvi motivirata naslednjo definicijo.

Definicija 12.6. *Robna upodobitev operatorskega sistema $\mathcal{S} \subseteq C^*(\mathcal{S})$ je nerazcepna upodobitev $\rho : C^*(\mathcal{S}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$, tako da ima $\rho|_{\mathcal{S}}$ lastnost enolične razširitve.*

Dokazali smo že, da so robne upodobitve za operatorski sistem $\mathcal{S} \subseteq C^*(\mathcal{S}) = C(X)$ sovpadajo s preslikavami ev_x za točke x v Choquetovem robu. Vendar pa za splošen operatorski sistem iz definicije ni takoj očitno, da robne upodobitve sploh obstajajo. V tem poglavju bomo dokazali, da za poljuben operatorski sistem $\mathcal{S} \subseteq C^*(\mathcal{S})$ obstaja dovolj robnih upodobitev, da *povsem normirajo* $\mathcal{S}$: to pomeni, da za vsako matriko $A \in M_n(\mathcal{S})$ obstaja robna upodobitev φ , tako da je $\|\varphi^{(n)}(A)\| = \|A\|$.

Najprej uvedemo nov pojem.

Definicija 12.7. Preslikava $\varphi \in \text{PP}(\mathcal{S}, \mathcal{B}(\mathcal{H}))$ je *čista*, če je vsak $\psi \in \text{PP}(\mathcal{S}, \mathcal{B}(\mathcal{H}))$, za katerega velja $0 \leq \psi \leq \varphi$, oblike $\psi = t\varphi$ za nek $0 \leq t \leq 1$.

Zgled 12.8. Oglejmo si množico stanj

$$S(\mathcal{S}) = \{\omega \in \mathcal{S}^* \mid \omega \text{ pozitiven, } \|\omega\| = 1\}$$

na operatorskem sistemu $\mathcal{S}$. Potem je $S(\mathcal{S})$ neprazna, konveksna in po Banach-Alaoglujevem izreku (DOPOLNI) kompaktna v šibki-* topologiji. Po Krein-Milmanovem izreku (DOPOLNI) ima zato neprazno množico ekstremnih točk, ki jo označujemo s $\text{ext } S(\mathcal{S})$. Dokazujemo, da je stanje na $\mathcal{S}$ čisto natanko tedaj, ko je element $\text{ext } S(\mathcal{S})$ (slednje običajno vzamemo za definicijo čistih stanj).

Denimo najprej, da stanje ω ni čisto, torej obstajata $\omega_1, \omega_2 \in S(\mathcal{S})$, ki nista enaka ω in za katera velja $\omega = \frac{1}{2}\omega_1 + \frac{1}{2}\omega_2$. Potem je $0 \leq \frac{1}{2}\omega_1 \leq \omega$, vendar pa $\frac{1}{2}\omega_1$ ni skalarni večkratnik ω .

V obratno smer predpostavimo, da obstaja pozitiven funkcional ψ , ki ni skalarni večkratnik ω in velja $0 \leq \psi \leq \omega$. Potem označimo $t = \psi(1)$ in definiramo stanji $\omega_1 := \frac{1}{t}\psi$ ter $\omega_2 := \frac{1}{1-t}(\omega - \psi)$, ki nista enaki ω . Potem je $\omega = \frac{1}{2}\omega_1 + \frac{1}{2}\omega_2$, torej ne more biti čisto stanje. $\diamond$

Trditev 12.9. Naj bo $\mathfrak{A}$ C^* -algebra. Preslikava $\varphi \in \text{PP}(\mathfrak{A}, \mathcal{B}(\mathcal{H}))$ je čista natanko tedaj, ko ima njena minimalna Stinespringove dilatacija $(\pi, V, \mathcal{K})$ nerazcepno upodobitev π .

Dokaz. Po trditvi 6.9 imamo bijektivno korespondenco med množicama

$$\{\psi \in \text{PP}(\mathfrak{A}, \mathcal{B}(\mathcal{H})) \mid 0 \leq \psi \leq \varphi\}$$

ter

$$\{T \in \pi(\mathfrak{A})' \mid 0 \leq T \leq I\}.$$

Slednja množica vsebuje skalarje natanko tedaj, ko je $\pi(\mathfrak{A})' = \mathbb{C} \cdot I$, kar pa je ekvivalentno temu, da je π nerazcepna (glej DOPOLNI). $\square$

Lema 12.10. Naj bo $\mathcal{S} \subseteq C^*(\mathcal{S})$ operatorski sistem. Če je enotska povsem pozitivna preslikava $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ čista in maksimalna, potem je njena enolična razširitev $\rho : C^*(\mathcal{S}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ robna upodobitev.

Dokaz. Denimo, da ρ ni nerazcepna, torej obstaja nek $(0) \not\leq \mathcal{K} \not\leq \mathcal{H}$, ki reducira ρ . Naj bo $P \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ ortogonalna projekcija na $\mathcal{K}$, torej $P \in \rho(C^*(\mathcal{S}))'$. Potem je $\chi := P\rho$ povsem pozitivna preslikava in $0 \leq \chi|_{\mathcal{S}} \leq \varphi$. Ker pa $\chi(1) = P$ ni skalar, φ ne more biti čista preslikava. $\square$

Naslednji izrek je analog Arveson-Dritschell-McColloughovega izreka za čiste preslikave.

Izrek 12.11 (Davidson-Kennedy). *Vsako čisto enotsko povsem pozitivno preslikavo $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ lahko dilatiramo do maksimalne čiste preslikave $\psi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$, ki ima razširitev na robno upodobitev.*

Pri dokazu bomo uporabili skoraj enake argumente kot pri dokazu izreka 10.19, le da bodo sedaj dilatacije čiste. Spomnimo se leme 10.20, ki pravi, da za vsako usmerjeno množico enotskih povsem pozitivnih preslikav $\{\varphi_\lambda : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda}$ z relacijo $\preceq$ obstaja enolično določena enotska povsem pozitivna preslikava $\varphi_\infty : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_\infty)$, tako da je $\varphi_\infty \succeq \varphi_\lambda$ za vsak $\lambda \in \Lambda$.

Naslednja lema je njen analog za čiste dilatacije.

Lema 12.12. *Naj bo $\{\varphi_\lambda : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda}$ usmerjena množica čistih enotskih povsem pozitivnih preslikav z relacijo $\preceq$. Definirajmo $\mathcal{H}_\infty$ kot napolnitev prostora $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{H}_\lambda$. Potem obstaja čista enolično določena preslikava $\varphi_\infty \in \text{EPP}(\mathcal{S}, \mathcal{B}(\mathcal{H}_\infty))$, tako da je $\varphi_\infty \succeq \varphi_\lambda$ za vsak $\lambda \in \Lambda$.*

Dokaz. Obstoj in enoličnost enotske povsem pozitivne preslikave φ_∞ že imamo po lemi 10.20. Dokazati moramo le, da je φ_∞ tudi čista preslikava. Vzemimo poljubno preslikavo $\psi \in \text{PP}(\mathcal{S}, \mathcal{B}(\mathcal{H}_\infty))$, za katero velja $0 \leq \psi \leq \varphi_\infty$. Potem za vsak $\lambda \in \Lambda$ velja $0 \leq P_{\mathcal{H}_\lambda} \psi|_{\mathcal{H}_\lambda} \leq \varphi_\lambda$, zato je $P_{\mathcal{H}_\lambda} \psi|_{\mathcal{H}_\lambda} = t_\lambda \varphi_\lambda$ za skalarje $t_\lambda \in [0, 1]$. Ker je $P_{\mathcal{H}_\lambda} \psi(1)|_{\mathcal{H}_\lambda} = t_\lambda \cdot I_{\mathcal{H}_\lambda}$, so vsi skalarji t_λ enaki, torej pišemo $t_\lambda = t$. Od tod sledi $P_{\mathcal{H}_\lambda} \psi|_{\mathcal{H}_\lambda} = t \varphi_\lambda$ za vsak $\lambda \in \Lambda$. Ker je $t \cdot \varphi_\infty \succeq t \cdot \varphi_\lambda$ in $\psi \succeq t \cdot \varphi_\lambda$ za vse $\lambda \in \Lambda$, od koder po enoličnosti v lemi 10.20 dobimo $\psi = t \cdot \varphi_\infty$. $\square$

Naslednja trditev je posplošitev trditve 10.21.

Trditev 12.13. *Če je $\mathcal{S}$ operatorski sistem in $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ čista enotska povsem pozitivna preslikava, potem obstaja njena čista dilatacija $\psi \succeq \varphi$, ki je maksimalna na $(a_0, x_0) \in \mathcal{S} \times \mathcal{H}$.*

Dokaz. Predpostavimo, da φ ni maksimalen v (a_0, x_0) , torej

$$\|\varphi(a_0)x_0\| < \sup_{\psi \succeq \varphi} \|\psi(a_0)x_0\| =: M.$$

Definirajmo $C = \sqrt{M^2 - \|\varphi(a_0)x_0\|^2}$. Po trditvi 10.21 obstaja dilatacija $\psi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H} \oplus \mathbb{C})$, ki je maksimalna na (a_0, x_0) . Brez škode za splošnost lahko predpostavimo, da zanjo velja $\psi(a_0)x_0 = (\varphi(a_0)x_0, C)$ (sicer jo lahko konjugiramo z unitarno matriko $I \oplus \lambda$, tako da rotiramo C).

Naj bo

$$L = \{\psi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H} \oplus \mathbb{C}) \text{ e.p.p.} \mid \psi \succeq \varphi, \psi(a_0)x_0 = (\varphi(a_0)x_0, C)\}$$

in

$$K = \{\psi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H} \oplus \mathbb{C}) \text{ e.p.p.} \mid \psi \succeq \varphi\}.$$

Po zgornjem razmisleku je L neprazna množica, prav tako pa je konveksna in kompaktna v OŠ topologiji. Dokažimo, da je L lice K . Predpostavimo, da imamo

$\varphi_1, \varphi_2 \in K$ ter $\psi = \frac{1}{2}(\varphi_1 + \varphi_2) \in L$. Naj bo $\varphi_k(a)h = (\varphi(a)h, x_k)$ za $k = 1, 2$, pri čemer je $|x_k| \leq C$. Potem je

$$C = \frac{x_1 + x_2}{2} = \left| \frac{x_1 + x_2}{2} \right| \leq \frac{1}{2}(|x_1| + |x_2|) \leq C,$$

zato v trikotniški neenakosti $|x_1 + x_2| \leq |x_1| + |x_2|$ velja enačaj. Od tod sledi $x_1 = x_2 = C$ in $\varphi_1, \varphi_2 \in L$.

Po Krein-Milmanovem izreku ima L neko ekstremno točko ψ_0 . Dokazali bomo, da je ψ_0 čista preslikava. Naj bo $0 \leq \psi_1 \leq \psi_0$ in $\psi_2 := \psi_0 - \psi_1$. Brez škode za splošnost lahko predpostavimo, da je $\psi_1(1) \geq \varepsilon I$ in $\psi_2(1) \geq \varepsilon I$ za nek majhen $\varepsilon > 0$. V nasprotnem primeru bi lahko vzeli $\psi'_k = (1 - 2\varepsilon)\psi_k + \varepsilon\psi_0$ za $k = 1, 2$ in če dokažemo, da velja $\psi'_1 = t\psi_0$ za $0 \leq t \leq 1$, potem je $\psi_1 = \frac{t-\varepsilon}{1-2\varepsilon}\psi_0$. Od tod sledi, da sta $\psi_1(1), \psi_2(1)$ obrnljiva. Opazimo tudi, da velja $P_{\mathcal{H}}\psi_k|_{\mathcal{H}} \leq \varphi$ za $k = 1, 2$, zato po predpostavki obstajata skalarja $0 \leq \lambda_1, \lambda_2 \leq 1$, tako da je $P_{\mathcal{H}}\psi_k|_{\mathcal{H}} = \lambda_k\varphi$ za $k = 1, 2$. Prav tako velja $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$ ter $\lambda_k \geq \varepsilon$ za $k = 1, 2$. Potem obstajata vektorja $u_1, u_2 \in \mathcal{H}$ ter $\alpha_1, \alpha_2 > 0$, tako da velja

$$\psi_k(1) = \begin{bmatrix} \lambda_k & \lambda_k^{\frac{1}{2}}u_k \\ \lambda_k^{\frac{1}{2}}u_k^* & \alpha_k \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \lambda_k^{\frac{1}{2}} & 0 \\ u_k^* & \beta_k \end{bmatrix}}_{R_k^*} \underbrace{\begin{bmatrix} \lambda_k^{\frac{1}{2}} & u_k \\ 0 & \beta_k \end{bmatrix}}_{R_k},$$

pri čemer je $\beta_k = \sqrt{\alpha_k - \|\xi\|^2} > 0$, saj sta $\psi_1(1), \psi_2(1)$ obrnljiva. Ker je $\psi_1(1) + \psi_2(1) = I$, mora veljati

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 1, \quad \lambda_1^{\frac{1}{2}}u_1 + \lambda_2^{\frac{1}{2}}u_2 = 0.$$

Prav tako je

$$R_k^{-1} = \begin{bmatrix} \lambda_k^{-\frac{1}{2}} & -\lambda_k^{-\frac{1}{2}}\beta_k^{-1}u_k \\ 0 & \beta_k^{-1} \end{bmatrix}.$$

Sedaj sta

$$\tau_k(a) = R_k^{-1*}\psi_k(a)R_k^{-1} = \begin{bmatrix} \varphi_k(a) & \Gamma_k(a) \\ \Delta_k(a) & \omega(a) \end{bmatrix}, \quad k = 1, 2$$

enotski povsem pozitivni preslikavi iz $\mathcal{S}$ v $\mathcal{B}(\mathcal{H} \oplus \mathbb{C})$, ki dilatirata φ .

V posebnem velja $\Gamma_1, \Gamma_2 \in \mathcal{B}(\mathcal{S}, \mathcal{H})$, $\Delta_1, \Delta_2 \in \mathcal{B}(\mathcal{S}, \mathcal{H}^*)$ in ω_1, ω_2 sta stanji na $\mathcal{S}$. Ker sta τ_1, τ_2 dilataciji φ , mora veljati $|\Gamma_1(a)x_0|, |\Gamma_2(a)x_0| \leq C$. Opazimo, da velja

$$\begin{aligned} \psi_k(a) &= R_k^*\tau_k(a)R_k \\ &= \begin{bmatrix} \lambda_k^{\frac{1}{2}} & 0 \\ u_k^* & \beta_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi_k(a) & \Gamma_k(a) \\ \Delta_k(a) & \omega(a) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_k^{\frac{1}{2}} & u_k \\ 0 & \beta_k \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \lambda_k\varphi(a) & * \\ \lambda_k^{\frac{1}{2}}(u_k^*\varphi(a) + \beta_k\Delta_k(a)) & * \end{bmatrix} \end{aligned}$$

za $k = 1, 2$. Ker je $\psi_1 + \psi_2 = \psi_0$, je $\psi_1(a_0)x_0 + \psi_2(a_0)x_0 = (\varphi(a_0)x_0, C)$. Od tod sledi

$$\begin{aligned}
C &= \lambda_1^{\frac{1}{2}}(u_1^*\varphi(a_0) + \beta_1\Delta_1(a_0))x_0 + \lambda_2^{\frac{1}{2}}(u_2^*\varphi(a_0) + \beta_2\Delta_2(a_0))x_0 \\
&= \left| \lambda_1^{\frac{1}{2}}(u_1^*\varphi(a_0) + \beta_1\Delta_1(a_0))x_0 + \lambda_2^{\frac{1}{2}}(u_2^*\varphi(a_0) + \beta_2\Delta_2(a_0))x_0 \right| \\
&= \left| \langle \lambda_1^{\frac{1}{2}}u_1 + \lambda_2^{\frac{1}{2}}u_2, \varphi(a_0) \rangle x_0 + \lambda_1^{\frac{1}{2}}\beta_1\Delta_1(a_0)x_0 + \lambda_2^{\frac{1}{2}}\beta_2\Delta_2(a_0)x_0 \right| \\
&= \left| \lambda_1^{\frac{1}{2}}\beta_1\Delta_1(a_0)x_0 + \lambda_2^{\frac{1}{2}}\beta_2\Delta_2(a_0)x_0 \right| \\
&\leq \left| \lambda_1^{\frac{1}{2}}\beta_1\Delta_1(a_0)x_0 \right| + \left| \lambda_2^{\frac{1}{2}}\beta_2\Delta_2(a_0)x_0 \right| \tag{12.1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \lambda_1^{\frac{1}{2}}\beta_1 |\Delta_1(a_0)x_0| + \lambda_2^{\frac{1}{2}}\beta_2 |\Delta_2(a_0)x_0| \\
&\leq (\lambda_1^{\frac{1}{2}}\beta_1 + \lambda_2^{\frac{1}{2}}\beta_2)C \\
&\leq (\lambda_1^{\frac{1}{2}}\alpha_1^{\frac{1}{2}} + \lambda_2^{\frac{1}{2}}\alpha_2^{\frac{1}{2}})C \tag{12.2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq (\lambda_1 + \lambda_2)^{\frac{1}{2}}(\alpha_1 + \alpha_2)^{\frac{1}{2}}C \tag{12.3} \\
&= C.
\end{aligned}$$

Najprej opazimo, da imamo v trikotniški neenakosti v vrstici (12.1) enačaj in zato $\Delta_1(a_0)x_0 = \Delta_2(a_0)x_0 = C$, torej $\tau_1, \tau_2 \in L$. Prav tako imamo v Cauchyjevi neenakosti v vrstici (12.3) enačaj, zato sta vektorja $(\lambda_1^{\frac{1}{2}}, \lambda_2^{\frac{1}{2}})$ in $(\alpha_1^{\frac{1}{2}}, \alpha_2^{\frac{1}{2}})$. Ker sta oba tudi enotska, sta enaka in imamo $\lambda_1 = \alpha_1$ ter $\lambda_2 = \alpha_2$. Iz vrstice (12.2) sledi, da je $\beta_1 = \sqrt{\alpha_1 - \|u_1\|^2} = \alpha_1^{\frac{1}{2}}$ in $\beta_2 = \sqrt{\alpha_2 - \|u_2\|^2} = \alpha_2^{\frac{1}{2}}$, torej $\|u_1\| = \|u_2\| = 0$ in posledično $h_1 = h_2 = 0$. To pa pomeni, da je $R_k = \lambda_k^{\frac{1}{2}}I$ za $k = 1, 2$, od koder sledi $\psi_k = \lambda_k\tau_k$ za $k = 1, 2$. S tem smo dokazali, da velja

$$\psi_0 = \lambda_1\tau_1 + \lambda_2\tau_2, \quad \lambda_1 + \lambda_2 = 1,$$

pri čemer sta $\tau_1, \tau_2 \in L$. Ker je ψ_0 ekstremna točka L , mora veljati $\tau_1 = \tau_2 = \psi_0$, zato je $\psi_1 = \lambda_1\psi_0$, kot smo hoteli dokazati. $\square$

Sedaj lahko dokažemo izrek 10.19. Pri tem skoraj popolnoma ponovimo dokaz izreka 10.19, le da bodo tokrat vse dilatacije čiste.

Dokaz izreka 10.19. Po izreku o dobri urejenosti na množici $\mathcal{S} \times \mathcal{H} = \{(a_\lambda, x_\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda}$ obstaja dobra urejenost.

1. V prvem koraku za vsak $\lambda \in \Lambda$ konstruiramo čisto enotsko povsem pozitivno preslikavo $\varphi_\lambda : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_\lambda)$, ki je maksimalna na $\{(a_\mu, x_\mu) \mid \mu \preceq \lambda\}$ in za katero velja $\varphi_\lambda \succeq \varphi_\mu$ za vse $\mu \preceq \lambda$. Dokaz tega koraka ponovno poteka s transfinitno indukcijo.

Označimo z (a_0, x_0) minimum dobre urejenosti. Po trditvi 10.21 obstaja čista dilatacija $\varphi_0 : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_0)$, tako da je $\varphi_0 \succeq \varphi$ maksimalna na (a_0, x_0) .

Denimo sedaj, da je (a_λ, x_λ) naslednik nekega $x_\nu \in \mathcal{S} \times \mathcal{H}$. Po indukcijski predpostavki obstaja čista enotska povsem pozitivna preslikava $\varphi_\nu : \mathcal{S} \rightarrow$

$\mathcal{B}(\mathcal{H}_\nu)$, tako da je φ_ν maksimalna na množici $\{(a_\mu, x_\mu) \mid \mu \preceq \nu\}$ in $\lambda_\nu \succeq \lambda_\mu$ za vsak $\nu \preceq \mu$. Tedaj po trditvi 10.21 obstaja čista dilatacija $\varphi_\lambda \succeq \varphi_\nu$, tako da je φ_λ maksimalna na (a_λ, x_λ) . Od tod sledi, da je φ_λ čista in maksimalna na množici $\{(a_\mu, x_\mu) \mid \mu \preceq \lambda\}$ in $\varphi_\mu \preceq \varphi_\lambda$ za vse $\mu \preceq \lambda$.

Nazadnje obravnavamo primer, ko je (a_λ, x_λ) limitna točka v dobri urejenosti. Potem je $\{\varphi_\mu \mid \mu \preceq \lambda\}$ usmerjena množica čistih enotskih povsem pozitivnih preslikav. Označimo s $\mathcal{H}_\lambda$ napolnitev prostora $\bigcup_{\mu \preceq \lambda} \mathcal{H}_\mu$. Potem obstaja čista dilatacija $\varphi_\lambda : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_\infty)$, tako da je $\varphi_\lambda \succeq \varphi_\mu$ za vsak $\mu \preceq \lambda$. Od tod sledi tudi, da je φ_λ maksimalna na množici $\{(a_\mu, x_\mu) \mid \mu \preceq \lambda\}$, s čimer smo zaključili transfinitno indukcijo.

2. V drugem koraku dokazujemo, da lahko φ dilatiramo do čiste preslikave $\varphi_1 : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_1)$, ki je maksimalna na $\mathcal{S} \times \mathcal{H}$. Vzemimo čiste dilatacije $\varphi_\lambda : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_\lambda)$, ki smo jih konstruirali v prvem koraku. Naj bo $\mathcal{H}_1$ napolnitev prostora $\bigcup_\lambda \mathcal{H}_\lambda$. Potem obstaja čista enotska povsem pozitivna preslikava $\varphi_1 : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_1)$, za katero velja $\varphi_1 \succeq \varphi_\lambda$ za vsak λ . S tem smo konstruirali čisto dilatacijo $\varphi_1 \succeq \varphi$, ki je maksimalna na vseh točkah $(a_\lambda, x_\lambda) \in \mathcal{S} \times \mathcal{H}$.
3. V tretjem koraku uporabimo argument iz drugega koraka, da konstruiramo zaporedje čistih dilatacij $\varphi_n : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_n)$, tako da je $\varphi_n \succeq \varphi_{n-1}$ in φ_n maksimalna na $\mathcal{S} \times \mathcal{H}_{n-1}$. Nazadnje na napolnitvi $\mathcal{K}$ prostora $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{H}_n$ dobimo čisto dilatacijo $\psi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$, za katero velja $\psi \succeq \varphi_n$ za vsak $n \in \mathbb{N}$. Po konstrukciji je ψ maksimalna na $\mathcal{S} \times \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{H}_n$. Ker je $\overline{\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{H}_n} = \mathcal{K}$, sledi, da je ψ maksimalna tudi na $\mathcal{S} \times \mathcal{K}$. $\square$

Z Davidson-Kennedyjevim izrekom lahko dokažemo sedaj glavni izrek tega poglavja.

Izrek 12.14. *Za vsako matriko $A \in M_n(\mathcal{S})$ obstaja robna upodobitev $\rho : C^*(\mathcal{S}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$, tako da je $\|A\| = \|\rho^{(n)}(A)\|$.*

Dokaz. Brez škode za splošnost naj bo $\|A\| = 1$. Oglejmo si matriko

$$B := \begin{bmatrix} I & A \\ A^* & I \end{bmatrix} \in M_{2n}(\mathcal{S}).$$

Ta matrika je pozitivna in dokazali bomo, da je $\|B\| = 2$.

Za poljubna enotska vektorja $x, y \in \mathcal{K}^n$ velja

$$\left\langle B \begin{bmatrix} x/\sqrt{2} \\ y/\sqrt{2} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x/\sqrt{2} \\ y/\sqrt{2} \end{bmatrix} \right\rangle = \frac{1}{2}\|x\|^2 + \operatorname{Re}\langle Ax, y \rangle + \frac{1}{2}\|y\|^2 = 1 + \operatorname{Re}\langle Ax, y \rangle.$$

Če vzamemo supremum po vseh enotskih $x, y \in \mathcal{K}^n$, dobimo na desni strani enačbe $1 + \|A\| = 2$, torej $\|B\| \geq 2$. Po drugi strani pa je

$$\|B\| \leq \left\| \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right\| = \left\| \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \right\| = \left\| \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \right\|^2 = 2.$$

Ker je B pozitivna, obstaja neko stanje ω na $M_{2n}(C^*(\mathcal{S}))$. Označimo s

$$K = \{\omega \in S(M_{2n}(\mathcal{S})) \mid \omega(B) = 2\}$$

množico vseh takšnih stanj na $M_{2n}(\mathcal{S})$. Ta množica je konveksna in kompaktna v OŠ topologiji, zato ima po Krein-Milmanovem izreku ekstremno točko ω_0 . Slednja je čisto stanje, torej ga lahko po prejšnjem izreku dilatiramo do maksimalne čiste enotske povsem pozitivne preslikave $\psi : M_{2n}(\mathcal{S}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$, ki ima razširitev na robno upodobitev $\psi' : M_{2n}(C^*(\mathcal{S})) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$. Po lemi (DOPOLNI) obstaja upodobitev $\rho : C^*(\mathcal{S}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K}_0)$, tako da je ψ' unitarno ekvivalentna $\rho^{(2n)}$, torej obstaja unitarna preslikava $U : \mathcal{K}_0^{2n} \rightarrow \mathcal{K}$, tako da je $\psi' = U\rho^{(2n)}U^*$. Ker je ψ' nerazcepna, velja enako tudi za $\rho^{(2n)}$ in posledično ρ . Dokazujemo, da je ρ zelena robna preslikava.

Najprej dokažimo, da ima $\rho|_{\mathcal{S}}$ lastnost enolične preslikave. Naj bo $\rho' : C^*(\mathcal{S}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K}_0)$ neka njena enotska povsem pozitivna razširitev. Potem je

$$U\rho'^{(2n)}U^* : M_{2n}(C^*(\mathcal{S})) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{K})$$

enotska povsem pozitivna razširitev ψ , zato je po lastnosti enolične preslikave

$$U\rho'^{(2n)}U^* = \psi' = U\rho^{(2n)}U^*.$$

Od tod sledi $\rho'^{(2n)} = \rho^{(2n)}$ in posledično $\rho' = \rho$.

Nazadnje dokažimo še, da je $\|\rho^{(n)}(A)\| = 1$. Ker je ρ *-homomorfizem, velja $\|\rho^{(n)}\| \leq 1$. Ker je $B \in M_{2n}(\mathcal{S})_+$ in ψ enotska povsem pozitivna preslikava, je $\|B\| = \|\psi(B)\|$. Od tod pa sledi

$$\begin{aligned} 2 = \|B\| &= \|\psi(B)\| = \|\rho^{(2n)}(B)\| \\ &= \left\| \begin{bmatrix} I & \rho^{(n)}(A) \\ \rho^{(n)}(A)^* & I \end{bmatrix} \right\| \\ &\leq \left\| \begin{bmatrix} 1 & \|\rho^{(n)}(A)\| \\ \|\rho^{(n)}(A)\| & 1 \end{bmatrix} \right\| \\ &= 1 + \|\rho^{(n)}(A)\| \leq 2. \end{aligned}$$

Tako dobimo $\|\rho^{(n)}(A)\| = 1$. □

Posledica 12.15. *Naj bo $\mathcal{S}$ operatorski sistem in $\pi : C^*(\mathcal{S}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ direktna vsota vseh robnih upodobitev na $\mathcal{S}$. Potem je $\pi|_{\mathcal{S}} : \mathcal{S} \rightarrow \pi(C^*(\mathcal{S}))$ C^* -ogrinjača $\mathcal{S}$ in*

$$\ker \pi = \bigcap \{ \ker \rho \mid \rho \text{ robna upodobitev za } \mathcal{S} \}$$

ideal Šilova za $\mathcal{S}$.

Dokaz. Ker je π *-homomorfizem, je povsem skrčitev. Po izreku 12.14 sledi, da je tudi povsem izometrična preslikava. Nadalje je $\pi|_{\mathcal{S}}$ direktna vsota maksimalnih preslikav, zato je tudi sama maksimalna. Iz izreka 10.23 nato sledi, da je $\pi|_{\mathcal{S}} : \mathcal{S} \rightarrow \pi(C^*(\mathcal{S}))$ C^* -ogrinjača za $\mathcal{S}$ in po izreku 11.9 je $\ker \pi$ ideal Šilova za $\mathcal{S}$. □

Posledica 12.16 (Choquet). *Če je $\mathcal{S} \subseteq C(X) = C^*(\mathcal{S})$ operatorski sistem, potem je njegov rob Šilova enak zaprtju Choquetovega robu.*

Dokaz. Naj bo $Y \subseteq X$ rob Šilova in $Z \subseteq X$ Choquetov rob za $\mathcal{S}$. Ker so vse robne upodobitve $\mathcal{S}$ oblike $\text{ev}_x : C(X) \rightarrow \mathbb{C}$ za $x \in Z$, je po prejšnji posledici

$$I(Y) = \bigcap \{\ker \varphi \mid \varphi \text{ robna upodobitev za } \mathcal{S}\} = \bigcap_{x \in Z} I(\{x\}) = I(\overline{Z}).$$

Preostane le še utemeljiti zadnjo enakost. Očitno je $I(\overline{Z}) \subseteq \bigcap_{x \in Z} I(\{x\})$. Obratno mora vsaka funkcija $f \in \bigcap_{x \in Z} I(\{x\})$ po zveznosti biti ničelna na zaprtju $\overline{Z}$, od koder dobimo $f \in I(\overline{Z})$. $\square$

Zgled 12.17. Vrnimo se k zgledu 11.12 in poiščimo vse robne upodobitve za operatorski sistem $\mathcal{T}^{(n)} \subseteq M_n(\mathbb{C})$. Po lemi (DOPOLNI) so vse nerazcepne upodobitve $\rho : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ unitarno ekvivalentne identiteti $\text{id} : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_n(\mathbb{C})$. Od tod sledi, da je identiteta do unitarne ekvivalence natanko edina robna upodobitev $\mathcal{T}^{(n)}$. $\diamond$

Zgled 12.18. Nadaljujemo zgled 11.13 in določimo še vse robne upodobitve za operatorski sistem $\mathcal{T}(C(\mathbb{T})) \subseteq C^*(S)$. Vemo že, da je $\mathcal{K}(H^2)$ njegov ideal Šilova, zato za vsako robno upodobitev $\rho : C^*(S) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ velja $\mathcal{K}(H^2) \subseteq \ker \rho$. To pomeni, da komutira diagram

$$\begin{array}{ccc} C^*(S) & \xrightarrow{\rho} & \mathcal{B}(\mathcal{H}) \\ q_{\mathcal{K}(H^2)} \downarrow & \nearrow \bar{\rho} & \\ \frac{C^*(S)}{\mathcal{K}(H^2)}, & & \end{array}$$

pri čemer je $\bar{\rho} : \frac{C^*(S)}{\mathcal{K}(H^2)} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ nerazcepna upodobitev za $\frac{C^*(S)}{\mathcal{K}(H^2)}$.

V zgledu 11.13 smo dokazali, da velja $\frac{C^*(S)}{\mathcal{K}(H^2)} \cong C(\mathbb{T})$, zato je $\mathcal{H} = \mathbb{C}$ in $\bar{\rho} = \text{ev}_\lambda : C(\mathbb{T}) \rightarrow \mathbb{C}$ za nek $\lambda \in \mathbb{T}$. S tem smo dokazali, da so vse robne upodobitve oblike

$$\rho_\lambda : C^*(S) \rightarrow \mathbb{C}, \quad \rho_\lambda(T_f + K) = f(\lambda).$$

Dokazati moramo še, da so ρ_λ res robne upodobitve za $\mathcal{T}(C(\mathbb{T}))$.

Vzemimo poljuben $\lambda \in \mathbb{T}$. Po izreku 12.14 mora obstajati neka robna upodobitev ρ , tako da je

$$\|\rho(T_{z+\lambda})\| = \|z + \lambda\| = 2.$$

Ker pa funkcija $z + \lambda \in C(\mathbb{T})$ zavzame svoj maksimum natanko v $z = \lambda$, je $\rho = \rho_\lambda$. $\diamond$

Literatura

- [1] W. Arveson, *Notes on the unique extension property*, 2003, dostopno na <http://users.uoa.gr/~akatavol/newtexfil/arveson/unExt.pdf>.
- [2] W. B. Arveson, *Subalgebras of C^* -algebras*, Acta Mathematica **123** (1969) 141–224.
- [3] K. R. Davidson in M. Kennedy, *The choquet boundary of an operator system*, Duke Mathematical Journal **164**(15) (2015).
- [4] M. A. Dritschel in S. A. McCullough, *Boundary representations for families of representations of operator algebras and spaces*, Journal of Operator Theory **53**(1) (2005) 159–167.
- [5] Z.-J. Ruan, *Subspaces of C^* -algebras*, Journal of Functional Analysis **76** (1988) 217–230.
- [6] W. F. Stinespring, *Positive functions on C^* -algebras*, Proceedings of the American Mathematical Society **6** (1955) 211–216.