

# Matemáticas Discretas

Apuntes

Galindo

*[2021-08-10 mar]*

## Contents

1	Lenguaje formal	2
2	Lenguaje natural	2
3	Variables proposiciones	2
4	Conectivas proposicionales	3
5	Tablas de verdad	6
6	Equivalencia lógica	6
7	Leyes commutativas	7
8	Leyes asociativas	7
9	Leyes distributivas	7
10	Leyes de la identidad	7
11	Leyes de negacion	8
12	Ley de la doble negacion	8
13	Leyes de idempotencia	8
14	Leyes universales acortadas	8
15	Leyes de morgan	8

<b>16 Leyes de absorción</b>	<b>9</b>
<b>17 Negaciones de t y c</b>	<b>9</b>
<b>18 Implicación</b>	<b>9</b>
<b>19 Validación de argumentos (Demostración)</b>	<b>9</b>
<b>20 Ejercicios</b>	<b>9</b>
<b>21 Conjuntos</b>	<b>10</b>
<b>22 Subconjunto</b>	<b>10</b>
<b>23 Simbolos especiales</b>	<b>10</b>
<b>24 Operacion es de conjuntos</b>	<b>10</b>
<b>25 Productos fundamentales</b>	<b>13</b>
<b>26 Representación grafica de las relaciones</b>	<b>14</b>

## **1 Lenguaje formal**

El lenguaje formal es un lenguaje artificial, convencional, elegido de manera consciente y cuidadosa para expresarse precisa, sistemática, rigurosa y unívocamente, por lo común dentro de un cierto campo del saber y con determinados fines.

## **2 Lenguaje natural**

El lenguaje natural es aquel que utilizamos cotidianamente. Surge históricamente dentro de la sociedad y es aprendido sin que exista necesariamente en el individuo un acto reflexivo.

## **3 Variables proposiciones**

conjunto de enunciados declarativos que formalizan la expresión, usualmente se les denota con las letras (p, q, r, s...).

**Enunciado declarativo** es aquella proposición de lenguaje objeto de la cual podemos predicar su verdad o su falsedad.

*"Hay un automóvil blanco en el aparcamiento".*

**Enunciado NO declarativo** es un enunciado que no puede ser convertido a lenguaje formal.

*"¿Dónde está mi automóvil?".*  
*"¡Guarda silencio!".*

**Enunciado atómico** es aquel enunciado único, que en su expresión no incluye ningún conectivo lógico, es decir, no une dos o más enunciados.

*"Hoy es miércoles."*  
*"Vivo en el distrito Federal."*  
*"Pablo es matemático"*

Extraído

## 4 Conectivas proposicionales

### 4.1 resumen

son los símbolos que formalizan los elementos del lenguaje que sirven para su función argumentativa.

Relación	Notación	Lectura
Negación	$\neg$	no
Conjunción	$\vee$	y
Disyunción	$\wedge$	o
Implicación	$\rightarrow$	entonces
Equivalencia	$\equiv$	equivalente a
Por lo tanto	$\vdash$	deduce que, conclusión
Doble implicación	$\leftrightarrow$	Sí y solo sí
Tautología	$\top$ $T$	Verdadero
Contradicción	$\perp$ $F$	Falso
pertenece	$\in$	sí $x$ pertenece a un conjunto
Cuantificador universal	$\forall$	para todo $x$ hay $y$
Cuantificador existencial	$\exists$	existe; hay por lo menos un

conjunción disyunción negación

Lista de símbolos | Lista de Símbolos completa

## 4.2 Conjucion

Solo una de las variables proposicionales tiene que ser verdadera para que el predicado sea verdadero

## 4.3 Disyunción

Lo opuesto a la conjunción, ambas tienen que ser verdaderas para que la expresión sea verdadera.

## 4.4 Implicación

Sí un enunciado es verdadero el otro también es verdadero

$P \equiv \text{"Hace frío"} \quad q \equiv \text{"Usare suéter"}$

$$p \rightarrow q$$

## 4.5 Por lo tanto

Se usa para denotar la conclusión de un argumento, si es verdadero entonces el argumento es válido; si es falso entonces no es válido. *"Juan es francés si nació el 23 de febrero. Si es bretón, entonces es más bien bajo. Ahora bien, nació el 23 de febrero o es bretón. Por consiguiente, es francés o es más bien bajo."*

Convenciones simbólicas:

- $p \equiv$  Juan es francés
- $q \equiv$  Juan nació el 23 de febrero
- $r \equiv$  Juan es bretón
- $s \equiv$  Juan es más bien bajo

Formalización:

$$q \rightarrow p, r \rightarrow s, q \vee r \vdash p \vee s$$

## 4.6 Doble implicación

Se lee como "sí y solo sí", eso significa que para que sea verdadera ambos valores tienen que ser iguales (ambos verdaderos o ambos falsos).

## 4.7 Tautología

es una forma de enunciado que siempre es verdadera, independientemente de los valores de verdad de los enunciados individuales sustituidos por sus enunciados variables. Un enunciado cuya forma es una tautología es un **enunciado tautológico**.

## 4.8 Contradicción

es una forma de enunciado que siempre es falso, independientemente de los valores de verdad de los enunciados individuales de los enunciados sustituidos. Un enunciado cuya forma es una contradicción es un **enunciado contradictorio**.

## 4.9 Cuantificador universal

para todos los elementos de un dominio siempre se cumple una función proposicional.

## 4.10 Cuantificador existencial

De todos los elementos del dominio existe por lo menos un elemento que cumple la función proposicional.

## 4.11 Ejemplo de cuantificador universal y existencial

*"Todos los artistas son ricos. Algunos políticos son corruptos. En conclusión no todos los artistas y no todos los políticos son ricos y corruptos"*

Convenciones simbólicas:

- $A = \{ a \mid a \text{ es un político} \}$
- $B = \{ b \mid b \text{ es un artista} \}$
- $p(a)$ : Los políticos que son ricos

- $p(b)$ : Los artistas que son ricos
- $q(a)$ : Los políticos que son corruptos
- $q(b)$ : Los artistas que son corruptos

Formalización:

$$[(\forall b \in B)p(b), (\exists a \in A)q(a)] \vdash (\exists a \in A)p(a) \wedge (\exists a \in A)q(a) \wedge (\exists b \in B)p(b) \wedge (\exists b \in B)q(b)$$

## 5 Tablas de verdad

Son tablas que nos sirven para conocer los valores de verdad de las proposiciones compuestas.

*"No salió electo Presidente de la República o el crecimiento anual no fue del 7%"*

Convenciones simbólicas:

- $p \equiv$  *"salió electo Presidente de la República"*
- $q \equiv$  *"el crecimiento anual fue del 7%"*

Tabla de verdad:

$p$	$q$	$\neg p$	$\neg q$	$pq$	$\neg pq$	$p\neg q$	$\neg p\neg q$
F	F	V	V	F	V	V	V

Generador de tablas de verdad

## 6 Equivalencia lógica

Dos formas de enunciado se llaman lógicamente equivalentes si y sólo si, tienen los mismos valores de verdad para cada posible sustitución de enunciados por sus enunciados de variables. La equivalencia lógica de las formas de enunciado  $P$  y  $Q$  se denota escribiendo  $P \equiv Q$ .

## 7 Leyes commutativas

Establecen que el orden en el cual sume o multiplique dos números reales no afecta el resultado.

$$p \wedge q \equiv q \wedge p \quad p \vee q \equiv q \vee p$$

## 8 Leyes asociativas

Establecen que cuando suma o multiplica cualesquiera tres números reales, el grupo (o asociación) de los números no afecta el resultado.

$$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r) \\ (p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$$

## 9 Leyes distributivas

Expresa que se obtiene la misma respuesta cuando multiplicas un conjunto de números por otro número que cuando se hace cada multiplicación por separado

$$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r) \\ p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

## 10 Leyes de la identidad

Es la constatación de que dos objetos que matemáticamente se escriben diferente, son de hecho el mismo objeto.

$$p \wedge t \equiv p \quad p \vee c \equiv p$$

## 11 Leyes de negacion

Dada una proposición  $p$  su contraria  $\neg p$  es verdadera.

$$p \wedge \neg p \equiv t \quad p \vee \neg p \equiv c$$

## 12 Ley de la doble negacion

se produce cuando se combina el adverbio no con la presencia de otros elementos que tienen también sentido negativo.

$$\neg(\neg p) \equiv p$$

## 13 Leyes de idempotencia

es la propiedad para realizar una acción determinada varias veces y aun así conseguir el mismo resultado que se obtendría si se realizase una sola vez.

$$p \wedge p \equiv p \quad p \vee p \equiv p$$

## 14 Leyes universales acortadas

$$p \vee t \equiv t \quad p \wedge c \equiv c$$

## 15 Leyes de morgan

son un par de reglas de transformación que son ambas reglas de inferencia válidas. Las normas permiten la expresión de las conjunciones y disyunciones puramente en términos de vía negación.

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q \quad \neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$



## 16 Leyes de absorción

$$p \vee (p \wedge q) \equiv p \quad p \wedge (p \vee q) \equiv p$$

## 17 Negaciones de t y c

El negativo de una tautología es una contradicción y el opuesto de una contradicción es una tautología.

$$\neg t \equiv c \quad \neg c \equiv t$$

## 18 Implicación

La implicación logica se emplea para representar una afirmacion no hipotetica, es decir: A es verdadero por lo tanto B es verdadero.

"Sí llueve, el suelo esta mojado"  
"llueve. por tanto, el suelo esta mojado"

## 19 Validación de argumentos (Demostración)

Un argumento es valido (lógico) sí la conclusion es verdadera siempre y cuando todas las premisas sean verdaderas

Un argumento valido seria algo como:

$$((\neg p \implies q) \wedge (p \implies (\neg r \vee s))) \implies (\neg s \wedge \neg q \wedge \neg r) \implies p$$

## 20 Ejercicios

ejercicios resueltos 1 ejercicios resueltos 2 ejercicios resueltos 3 ejercicios resueltos 4 ejercicios resueltos 5 ejercicios resueltos 6 ejercicios resueltos 7

---

## 21 Conjuntos

Un conjunto es una Colección bien definida de objetos, que se denominan elementos o miembros del conjunto. Usualmente las letras mayúsculas denotan a los conjuntos y las letras minúsculas denotan a los elementos del conjunto.

- $a \in S$  denota que el elemento  $a$  pertenece al conjunto  $S$ .
- $a \notin S$  denota que el elemento **NO** pertenece al conjunto  $S$ .

## 22 Subconjunto

Se dice que  $A$  es un subconjunto de  $B$  si  $A$  está contenido en  $B$  o en otras palabras que  $B$  contiene a  $A$ .  $A \subseteq B$  o  $B \supseteq A$ . Dos conjuntos son iguales si ambos tienen los mismos elementos o, equivalentemente, si cada uno está contenido en el otro.

$$A = B \text{ si y solo si } A \subseteq B \text{ y } B \subseteq A$$

## 23 Simbolos especiales

Los conjuntos numéricos usuales en matemáticas son:

- el conjunto de los números naturales  $\mathbb{N}$ .
- números racionales  $\mathbb{Q}$ .
- números enteros  $\mathbb{Z}$ .
- números reales  $\mathbb{R}$ .
- números complejos  $\mathbb{C}$ .

La relacion entre estos grupos es la siguiente:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

## 24 Operacion es de conjuntos

Existen unas operaciones básicas que permiten manipular los conjuntos y sus elementos, similares a las operaciones aritméticas, constituyendo el álgebra de conjuntos:

### 24.1 Union

La unión de dos conjuntos A y B, es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A o a B, es decir:




Figure 1:  $A \cup B = \{x|x \in A \text{ o } x \in B\}$

### 24.2 Intersección

La intersección de dos conjuntos A y B, es el conjunto de todos los elementos que pertenecen tanto a A como a B, es decir:




Figure 2:  $A \cap B \{x|x \in A \text{ y } x \in B\}$

### 24.3 Complemento (Complemento Absoluto)

El complemento absoluto o simplemente complemento de un conjunto A es el conjunto de elementos que pertenecen a U pero no pertenecen a A:

Dado un conjunto  $A$ , su complementario es el conjunto formado por los elementos que no pertenecen a  $A$ .




Figure 3:  $A^C = \{x|x \in U, x \notin A\}$

#### 24.4 Diferencia de conjuntos (Complemento relativo)

La diferencia entre  $A$  y  $B$  también se denomina complemento relativo de  $B$  en  $A$ , y se denota  $C_A B$ , cuando el segundo es un subconjunto del primero.

El complemento relativo de un conjunto  $B$  respecto de un conjunto  $A$  o la diferencia de  $A$  y  $B$ , es el conjunto de elementos que pertenecen a  $A$  pero no pertenecen a  $B$ :

#### 24.5 Diferencias simétrica

Dados dos conjuntos  $A$  y  $B$ , su diferencia simétrica,  $A \oplus B$ , es un conjunto que contiene los elementos de  $A$  y los de  $B$ , excepto los que son comunes a ambos.

La diferencia simétrica de los conjuntos  $A$  y  $B$  consta de los elementos que pertenecen a  $A$  o a  $B$  pero no a ambos:





Figure 4:  $A \setminus B = \{x | x \in A, x \notin B\}$




$$A \oplus B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

$$A \oplus B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

Mas informacion

## 25 Productos fundamentales

$$\begin{array}{ll} P_1 = A \cap B \cap C & P_2 = A \cap B \cap C^C \\ P_3 = A \cap B^C \cap C & P_4 = A \cap B^C \cap C^C \\ P_5 = A^C \cap B \cap C & P_6 = A^C \cap B \cap C^C \\ P_7 = A^C \cap B^C \cap C & P_8 = A^C \cap B^C \cap C^C \end{array}$$




## 26 Representación grafica de las relaciones

### 26.1 Grafo dirigido

Para representar una relación  $R$  sobre un solo conjunto  $A$ .

$$A = \{1, 2, 3, 4\},$$


$$R = \{(1, 2), (2, 2), (2, 4), (3, 2), (3, 4), (4, 1), (4, 3)\}$$



## 26.2 Diagrama sagital

$A=\{1,2,3\}$ ,  $B=\{x,y,z\}$

$R=\{(1,y),(1,z),(3,y)\}$



## 26.3 Matriz de relación

	$x$	$y$	$z$
1	0	1	1
2	0	0	0
3	0	1	0