RÃl'publique algÃl'rienne dÃl'mocratique et populaire MinistÃlre de l'enseignement supÃl'rieur et de la recherche scientifique





Université Abdelhamid Mehri – Constantine 2

Faculté des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC)

Technologies des Logiciels et des Systèmes d'Information (TLSI)

MÃĽMOIRE DE MASTER

pour obtenir le dipl \tilde{A} t'me de Master en Informatique

RÃľalisÃľ par:

Sous la direction de :

Mr. Gharzouli Abderahmane Mahdi

Mr. Smain Nasr-Eddine Bouzenada

Mr. Sadi Belkacem



Remerciements

Nous remercions dieu le tout puissant de nous avoir donné la santé et la volonté de terminer ce parcours. Nous tenons aussi, à exprimer avec tous notre respect, notre reconaissance et notre sincère remerciement à nos enseignants qui nous ont aidé à acquérir les compétences nécessaires pour bien mener cette recherche, pour leur encadrement exceptionnel leur disponibilités, leur conseils et leur aides précieuse durant notre parcours. Nous sommes profondément reconnaissant envers eux et envers les tous gens à qui nous avons l'honneur de les rencontrer ; tous notre remerciements s'adressent également à tous nos enseignants et particulièrement envers notre encadreur Mr. Smain Nasr-Eddine Bouzenada pour son soutien et son effort son encouragement tout au long de notre parcours universitaire et durant la préparation de ce présent mémoire de Master. Votre expertise et votre patience ont été des facteurs déterminants dans l'aboutissement de notre travail, et nous sommes vraiment reconnaissant pour tout le temps que vous nous avez accordé pour discuter de nos idées et nous guider dans la bonne direction.

Enfin, nous exprimons notre profonde gratitude surtout envers nos parents et nos proches qui nous ont soutenu tout au long de notre études et ont toujours cru en nous. Encore une fois, merci infiniment pour votre précieuse contribution à notre parcours universitaire.

Table des matières

Re	emer	ciemen	ts	ii
Li	ste d	e figure	es	iv
Li	ste d	es abré	viations	v
G	énera	l Intro	duction	1
1	Prés		on générale sur l'agriculture sous Serres	3
	1.1	Introd	luction	3
	1.2	Toma	tes de serre	3
1.3 Caracteristique				4
		1.3.1	Température et Humidité	4
		1.3.2	Lumière	4
		1.3.3	Sol	5
		1.3.4	Irrigation	5

Liste de figures

1.1	Exemple de calendrier de	oroduction de la tomate
-----	--------------------------	-------------------------

Liste des abréviations

IoT Internet Of Things

UML Unified Modeling Language

SI Serre Intelligente

Géneral Introduction

Domaine d'etude

L'agriculture a largement contribué à l'économie de l'Algérie pendant des siècles. L'Algérie est l'un des principaux exportateurs de produits agricoles. Ces dernières années, le gouvernement algérien a pris des mesures pour stimuler le secteur agricole en investissant dans la technologie, les infrastructures et la formation et il s'agit notamment du Plan national de développement agricole (PNDA), qui est conçu pour stimuler l'efficacité et la compétitivité. Dans son rapport [1], le bureau d'étude « Bureau Business France d'ALGER» présise qu' il a été décidé d'orienter les efforts vers une agriculture intelligente et solide face au changement climatique en tenant compte de l'environnement et de l'équilibre des écosystèmes sans négliger le gaspillage, grâce à une bonne gestion des excédents de production.

Problématique

Les serres intelligentes(SI) et l'Internet des Objets (IoT) sont des technologies émergentes qui ont transformé l'agriculture. SI sont des structures utilisées pour cultiver des plantes sous un environnement contrôlé, offrant ainsi une solution efficace pour la production de cultures dans des conditions météorologiques défavorables ou dans des régions où les terres sont limitées. Les serres intelligentes utilisent des technologies de pointe pour optimiser les conditions de croissance des plantes. Ces technologies peuvent inclure des capteurs de température, d'humidité et de lumière, des systèmes d'irrigation automatisés et des logiciels d'analyse de données pour suivre les conditions de croissance des plantes. SI permettent également une surveillance et un contrôle précis des conditions environnementales. L'utilisation de l'IoT dans les SI offre une connectivité en réseau aux appareils électroniques, des capteurs..., afin de collecter une grande quantité de don-

nées, pour qu'elles puissent être analysées et interprétées de manière efficace en faveur d'augmenter la productivité.

Objectifs

Pour bien répondre a notre problématique, nous nous sommes fixés les objectifs suivants :

- 1. Etudier les exigences pour l'obtention d'une bonne productivité agricole, en qualité et en quantité. Pour bien cerner cet objectif, nous concentrons cette étude sur la production de la tomate industrielle, en raison de sa forte productivité et la sa métrise en Algérie Cette phase permettra de ressortir les paramètres importants pour atteindre les objectifs définie par un agriculteur .
- 2. Retrouver les capteurs nécessaires qui répondent au mieux à la collecte des informations .
- 3. Etudier les différents algorithmes d'analyse de données pour retrouver le plus adéquat à notre cas particulier .
- 4. Proposer une solution à notre Smart Farm système, éventuellement proposer un algorithme spécifique de classification .
- 5. Proposer une architecture pour une SmartFarm, permettant une bonne exploitation d'une ferme agricole .
- 6. Tester le système sur un cas particulier sur un type de production agricole, la tomate par exemple.

Organisation de mémoire

Notre mémoire est structuré comme suite :

Chapitre 1: Présentation générale de l'agriculture sous Serres

Chapitre 2: Présentation générale de l'IOT

Chapitre 3: Présentation générale du Conception d'Analyse des données

Chapitre 4: Proposition d'un système de contrôle d'une ferme intelligente « Smart Greenhouse »

Chapitre 5: Implémentation de : Smart Greenhouse

Chapitre 6: Conclusion génerale

Présentation générale sur l'agriculture sous Serres

1.1 Introduction

L'agriculture sous serres est une méthode de production de cultures à l'aide de structures en plastique, en verre ou en polycarbonate pour créer un environnement contrôlé pour les plantes. Cette méthode est utilisée pour cultiver des plantes dans des environnements qui ne sont pas adaptés à leur croissance naturelle. Les serres permettent également de contrôler les niveaux d'humidité, de température, de lumière et de ventilation, ce qui permet aux agriculteurs de produire des cultures tout au long de l'année, indépendamment des conditions météorologiques extérieures. Cette méthode de production de cultures est de plus en plus utilisée dans le monde entier pour répondre aux besoins alimentaires croissants de la population mondiale et pour assurer la sécurité alimentaire dans des conditions climatiques changeantes. Bien que l'agriculture sous serres puisse offrir des avantages tels que des rendements plus élevés et une utilisation plus efficace des ressources.

1.2 Tomates de serre

La tomate est l'une des cultures les plus couramment cultivées sous serres en raison de sa rentabilité et de sa popularité auprès des consommateurs. Les serres permettent également de cultiver des variétés de tomates qui ne seraient pas viables dans des conditions extérieures. Les tomates de serre peuvent être cultivées tout au long de l'année, ce qui permet aux producteurs d'offrir des tomates fraîches en dehors de la saison de croissance traditionnelle. La culture des tomates en serre est un moyen de production de tomates efficace et peu coûteux en Algérie.

Figure 1.1: Exemple de calendrier de production de la tomate

	Période	Stade physiologique à venir
Fin janvier, début février	Semis des variétés et porte- greffes (il est suggéré d'utiliser des plateaux de 72 cellules)	
Mi-février	Greffage dans les mêmes plateaux	
Mars	Empotage en pots d'au moins 10 cm (4 po) de diamètre	
Fin mars à début avril	Transplantation en serre	Implantation
Début mai (ou un peu plus tard selon la régie)	5 sem. après transplantation (entre 4 et 6 semaines)	5 grappes (stade critique car le plant est très chargé) Mise à fruit
	6 sem. après	Mise à fruit et grossissement des fruits
Début juin	8 sem. après	Début récolte
	10 sem. après	Forte récolte
Début juillet	12 sem. après	Fin forte récolte, début récolte stable (il peut y avoir des « poussées » de récolte pendant les vagues de chaleur)
Début aout	14 sem. après	Récolte stable

1.3 Caracteristique

1.3.1 Température et Humidité

Dans le rapport qui rédigé par Anne Weill et Jean Duval [2] exprime que La température est le facteur le plus déterminant dans la production de la tomate. Celle-ci réagit énormément aux variations thermiques. Un écart de température d'un ou deux degrés Celsius entre le jour et la nuit est favorable à la production de fruits. Pour la production des plants et avant l'apparition des premières fleurs, il est préférable toutefois de maintenir la température plus constante à environ 20 °C. En été, l'aération doit être suffisante pour que la température ne dépasse pas 28 °C. Idéalement, il faudrait qu'elle ne dépasse pas 25 °C, car au dessus de cette tempéra- ture la tomate ne fait plus aucun gain. L'humidité ne doit pas être en reste et devrait être maintenue entre 60 et 80 %. La culture elle-même génère beaucoup d'humidité et, par conséquent, le taux d'humidité de la serre est souvent trop élevé. Il faut donc ventiler et même souvent chauffer la serre pour déshumidifier.

1.3.2 Lumière

Eclairage Comme il ete explique dans l'article "Principes agronomiques de la tomate" dans le titre exigences de croissance paragraph N4 : "Les tomates sont sensibles aux conditions de faible luminosité. Elles exigent un minimum de 6 heures d'ensoleillement direct pour fleurir. Toutefois, en cas de trop grande intensité du rayonnement solaire, des fentes, des

brûlures solaires et une coloration inégale peuvent apparaître au stade de maturité. Il est donc essentiel, dans le cas des cultures sous serre, de s'assurer que les fruits disposent de suffisamment d'ombre. La longueur du jour n'influence pas la production de tomates. Les cultures sous serre sont par conséquent répandues sous un large éventail de latitudes".[3]

1.3.3 Sol

En général, la tomate n'a pas d'exigences particulières en matière de sol. Cependant, elle s'adapte bien dans les sols profonds, meubles, bien aérés et bien drainés. Une texture sablonneuse ou sabloli-moneuse est préférable.

1.3.4 Irrigation

Dans le même rapport précédent de Anne Weill et Jean Duval explique irrigation comme suit "Un plant de tomate en pleine production peut nécessiter jusqu'à cinq litres d'eau par jour (ex : en sol sableux), même s'il n'en consommera que 3 environ, le reste étant perdu dans le sol. On recommande 2 ml d'eau/joule/m?; durant une belle journée, on peut accumuler jusqu'à 3 000 joules. II importe donc de bien planifier les arrosages afin d'éviter d'en mettre trop à la fois ou pas assez. Pour éviter le fendillement des fruits et la saturation en eau du sol, il faut idéalement apporter cette eau en plusieurs cycles entre le matin (une à deux heures après le lever du soleil) et le milieu de l'après-midi. Il ne faut jamais entreprendre la nuit avec un sol trop mouillé. Les cycles d'irrigation peuvent être contrôlés par une simple minuterie (ex. en sol sableux, 5 ou 10 minutes par heure pendant l'été). Ce n'est toutefois pas l'idéal, car la croissance des plants varie avec l'ensoleillement et la température, et les besoins en eau suivent la croissance des plants. Il s'agit tout de même d'un compromis acceptable, puisqu'un système automatisé relié à un tensiomètre ou réagissant à l'ensoleillement est beaucoup plus coûteux.".[4]