

Zapiski za MAT v 3. letniku

Gašper Mikložič

1 Kvadratna neenačba

Definicija

Neenačba ima oblike:

$$ax^2 + bx + c > 0$$

$$ax^2 + bx + c < 0$$

$$ax^2 + bx + c \leq 0$$

$$ax^2 + bx + c \geq 0$$

Kjer $a \neq 0$.

Rešitev neenačbe je interval, unija intervalov ali prazna množica.

Način reševanja

$$2x^2 < -6x + 8$$

$$2x^2 + 6x - 8 < 0$$

$$x^2 + 3x - 4 < 0$$

Tukaj rešimo kot kvadratno enačbo, z Vietovim pravilom ali formulo za kvadratno enačbo.

$$x_1 = -4$$

$$x_2 = 1$$

Nato zapišemo interval. Če je znak je manjše (kot v tem primeru) zapišemo interval, kdaj graf funkcije leži pod abscisno osjo.

Če je znak večje, zapišemo, kdaj graf leži nad abscisno osjo. Dobimo rešitev.

$$x \in (-4, 1)$$

2 Kompleksna števila

Definicija

Kompleksna števila, označena s simbolom $\mathbb{C}$, so vsa števila, ki jih lahko opišemo s predpisom:

$$z = a + bi$$

Kjer sta a in b realni števili in je i^2 (imaginarna enota na kvadrat) enak -1

Vsako število lahko tudi razdelimo na realno in imaginarno komponento:


$$\operatorname{Re}(z) = a \text{ in } \operatorname{Im}(z) = b$$

Primer kompleksnega števila

$$z = 4 - 8i$$

Graf

Vsa kompleksna števila lahko tudi ponazorimo na kompleksni ravnini kjer je abscisna os realna komponenta in ordinatna os imaginarna komponenta.



2.1 Računanje s kompleksnimi števili

Seštevanje in odštevanje

$$z = a + bi$$

$$w = c + di$$

$$z + w = a + bi + c + di = \boxed{a + c + (b + d)i}$$

$$z - w = a + bi - (c + di) =$$

$$a + bi - c - di = \boxed{a - c + (b - d)i}$$

Množenje s skalarjem

$$z = a + bi \quad k \in \mathbb{R}$$

$$z \cdot k = k(a + bi) = ka + kbi$$