

RMSNorm

對應程式碼：`scratch/rmsnorm.py`


每一層的入口都會先過它。整個模型裡它的參數量最少（每層只有 d 個），但影響最大——它決定了進入 Attention 和 FFN 的數值尺度。

前向

$$r = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^2 + \varepsilon}$$
$$\hat{x} = \frac{x}{r}$$
$$y = g \odot \hat{x}$$

三個步驟，三個角色：

符號	是什麼	可學嗎
r	這一系列數字的均方根（root-mean-square）	否，算出來的
$\hat{x}$	正規化後的向量，長度被拉到約 $\sqrt{n}$	否
g	每個維度一個的縮放係數	是，初始值全為 1
ε	防止除以零，預設 10^{-5}	否，固定常數



沿哪一維做正規化很重要：是沿最後一維（特徵維度），所以每個位置各自正規化，位置與位置之間互不影響。

跟 LayerNorm 的差別

LayerNorm: $y = g \odot \frac{x - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \varepsilon}} + b$

$$\text{RMSNorm: } y = g \odot \frac{x}{\sqrt{\text{mean}(x^2) + \epsilon}}$$

RMSNorm 少了兩樣東西：

1. 不減平均數 μ
2. 沒有偏置 b

少一次減法、少一組參數，實測效果幾乎一樣。所以現在的 LLM（LLaMA、Mistral、Qwen、minimind）幾乎都用 RMSNorm。

實際數值

從 `traces/sample/train_step_0001.txt` 抓的第一層 `norm1`：

	前 4 個維度
x （輸入）	+0.01647 - 0.04764 + 0.02504 + 0.00472
r	0.019711
$\hat{x}$ （正規化後）	+0.83548 - 2.41710 + 1.27034 + 0.23929
g （初始值）	+1.00000 + 1.00000 + 1.00000 + 1.00000
y （輸出）	+0.83548 - 2.41710 + 1.27034 + 0.23929

驗算第一個維度：

$$\hat{x}_1 = \frac{0.01647}{0.019711} = 0.83557 \approx 0.83548$$

（差在四捨五入。）

注意這個放大倍率：

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{0.019711} = 50.7$$

embedding 出來的向量很小（每個元素約 0.02），RMSNorm 把它們放大了 50 倍。這不是 bug，正是它的用途——把不同來源、不同尺度的向量统一到同一個工作區間。

反向（逐步推導）

設 n 是維度數， $a_i = \frac{\partial L}{\partial y_i} g_i$ 。

第一步： r 對 x 的偏導

$$r = \left(\frac{1}{n} \sum_k x_k^2 + \varepsilon \right)^{1/2}$$

用連鎖律：

$$\frac{\partial r}{\partial x_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} \sum_k x_k^2 + \varepsilon \right)^{-1/2} \cdot \frac{2x_j}{n} = \frac{x_j}{n r}$$

第二步：y 對 x 的偏導

這裡是關鍵—— y_i 透過兩條路依賴 x_j ：

1. 分子裡的 x_i 本身（只有 $i = j$ 時）
2. 分母 r 裡面也含有 x_j （每個 j 都有）

$$y_i = g_i \frac{x_i}{r}$$

用商法則：

$$\frac{\partial y_i}{\partial x_j} = g_i \left[\frac{\delta_{ij}}{r} - \frac{x_i}{r^2} \cdot \frac{\partial r}{\partial x_j} \right] = g_i \left[\frac{\delta_{ij}}{r} - \frac{x_i x_j}{n r^3} \right]$$

其中 δ_{ij} 是 Kronecker delta（ $i = j$ 時為 1，否則為 0）。

第三步：連鎖律加總

$$\frac{\partial L}{\partial x_j} = \sum_i \frac{\partial L}{\partial y_i} \cdot \frac{\partial y_i}{\partial x_j} = \frac{a_j}{r} - \frac{x_j}{n r^3} \sum_i a_i x_i$$

第四步：化簡

把 $x = \hat{x} r$ 代入第二項：

$$\frac{x_j}{n r^3} \sum_i a_i x_i = \frac{\hat{x}_j r}{n r^3} \cdot r \sum_i a_i \hat{x}_i = \frac{\hat{x}_j}{r} \cdot \frac{1}{n} \sum_i a_i \hat{x}_i$$

得到最後要寫進程式的形式：

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{1}{r} \left(a - \hat{x} \cdot \text{mean}(a \odot \hat{x}) \right), \quad a = \frac{\partial L}{\partial y} \odot g}$$

對 g 的梯度

單純得多，因為 $y = g \odot \hat{x}$ 裡 g 只出現一次：

$$\frac{\partial L}{\partial g} = \sum_{\text{所有位置}} \frac{\partial L}{\partial y} \odot \hat{x}$$


第二項在做什麼

$$-\hat{x} \cdot \text{mean}(a \odot \hat{x})$$

它的作用是把梯度中沿著 $\hat{x}$ 方向的分量扣掉。

理由： $\hat{x}$ 的長度已經被 r 固定住了 ($\|\hat{x}\| = \sqrt{n}$)。沿著它自己的方向推，只會改變長度——而長度馬上又會被正規化消掉，所以那個方向的梯度是無效的，扣掉才正確。

幾何上，這是把梯度投影到與 $\hat{x}$ 垂直的超平面上。



一個實測現象：梯度會被放大

前向除以 $r = 0.0197$ ，反向經過同一個除法時，梯度也會被放大差不多的倍數。

這就是為什麼梯度從第 1 層傳到 embedding 時會突然大一個數量級。

實測倍率會比 $1/r = 50.7$ 略小，因為第二項扣掉了一部分。

驗證

`tests/test_layers.py` 用有限差分驗證這一層：

$$\frac{\partial L}{\partial w} \approx \frac{L(w + \varepsilon) - L(w - \varepsilon)}{2\varepsilon}$$

結果：最大相對誤差 2.13×10^{-7} ，**PASS**。

(這一層的誤差比 Linear 的 10^{-12} 大，是因為它含有開根號和除法，浮點運算的累積誤差比較多。 10^{-7} 對 `float64` 來說仍在合理範圍。)