Тимур Гасанов, нейрохирург

gasanovdoc.ru · Telegram @gasanov_doc
8 (963) 050-35-39

Анализы и обследования для госпитализации

Плановая нейрохирургическая операция. Срок годности считается на день госпитализации. Отмечайте сданное галочкой.

Анализы и обследования

☐ Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой	**10 дней**
☐ Общий анализ мочи	**10 дней**
☐ Биохимический анализ крови Общий белок, билирубин общий и прямой, креатинин, глюкоза, калий, натрий, АЛТ, АСТ, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности	**10 дней**
☐ Коагулограмма ПТИ, МНО, АЧТВ, фибриноген, D-димер	**10 дней**
☐ Анализ на сифилис Микрореакция (кардиолипиновая проба)	**10 дней**
☐ Анализ крови на ВИЧ	**6 месяцев**
☐ Анализ крови на гепатиты B и C	**6 месяцев**
☐ КТ или рентгенография лёгких	**6 месяцев**
☐ ЭКГ Плёнка и заключение	**1 месяц**
☐ УЗИ вен нижних конечностей	**1 месяц**
☐ УЗИ сердца (ЭхоКГ)	**2 месяца**
☐ Группа крови и резус-фактор Фенотип и антитела	**любой давности**
☐ Заключение терапевта С указанием, что противопоказаний к операции нет	
☐ Заключение кардиолога С указанием, что противопоказаний к операции нет	

Результаты обследований остаются в больнице. Если они нужны вам самим, сделайте копии заранее.

Что взять с собой

- ☐ Паспорт, полис ОМС, СНИЛС
- ☐ Результаты всех анализов и обследований из списка
- ☐ Все снимки МРТ и КТ, заключения к ним, диски
- ☐ Выписки из больниц, справки о перенесённых инфарктах и инсультах
- ☐ Компрессионные чулки для операции — 2 шт.
- ☐ Все лекарства, которые принимаете постоянно, — в том числе ингаляторы при астме и инсулин при диабете
- ☐ При сахарном диабете — глюкометр и тест-полоски

Лекарства, которые влияют на свёртываемость крови

- Постоянную терапию (от давления, диабета и др.) не отменяйте.
- Ацетилсалициловую кислоту (Кардиомагнил, ТромбоАСС и аналоги) и другие антиагреганты, как правило, отменяют за 5 суток до госпитализации.
- Варфарин за 5–7 дней обычно заменяют уколами антикоагулянтов под кожу — препарат и дозу подбирает терапевт или кардиолог.

Не отменяйте эти препараты самостоятельно. Решение принимает врач, который их назначил, по согласованию с оперирующим хирургом.