

# 天体物理导论笔记

GasinAn

2021 年 12 月 27 日

Copyright © 2021 by GasinAn

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, in any form or by any means, without permission in writing from the publisher, except by a BNUser.

The author and publisher of this book have used their best efforts in preparing this book. These efforts include the development, research, and testing of the theories, technologies and programs to determine their effectiveness. The author and publisher make no warranty of any kind, express or implied, with regard to these techniques or programs contained in this book. The author and publisher shall not be liable in any event of incidental or consequential damages in connection with, or arising out of, the furnishing, performance, or use of these techniques or programs.

Printed in China

# 目录

第一章 天球	
The Celestial Sphere	5
第二章 天体力学	
Celestial Mechanics	7
第三章 光的连续谱	
The Continuous Spectrum of Light	9
第四章 狭义相对论	
The Theory of Special Relativity	11
第五章 光与物质的相互作用	
The Interaction of Light and Matter	13
第六章 望远镜	
Telescopes	15
第七章 双星和恒星参量	
Binary Systems and Stellar Parameters	17
第八章 恒星光谱分类	
The Classification of Stellar Spectra	19
第九章 恒星大气	
Stellar Atmospheres	23

第十章 恒星内部	
The Interiors of Stars	27
第十一章 太阳	
The Sun	31
第十二章 星际介质和恒星形成	
The Interstellar Medium and Star Formation	35
第十三章 主序和主序后恒星演化	
Main Sequence and Post-Main-Sequence Stellar Evolution	37
第十四章 恒星脉动	
Stellar Pulsation	41
第十五章 大质量恒星的命运	
The Fate of Massive Stars	43
第十六章 恒星简并残骸	
The Degenerate Remnants of Stars	45
第十七章 广义相对论	
General Relativity and Black Holes	47
第十八章 密近双星系统	
Close Binary Star Systems	49
第十九章 太阳系中的物理过程	
Physical Process in Solar System	51
第二十章 类地行星	
The Terrestrial Planets	53
第二十一章 巨行星的领域	
The Realms of the Giant Planets	55
第二十二章 太阳系小天体	
Minor Bodies of the Solar System	57

第二十三章 行星系统形成	
Formation of Planetary Systems	59
第二十四章 银河系	
The Milky Way Galaxy	61
第二十五章 星系特性	
The Nature of Galaxies	63
第二十六章 星系演化	
Galactic Evolution	65
第二十七章 宇宙结构	
The Structure of the Universe	67



# 第一章 天球

## The Celestial Sphere

会合周期 (synodic period)  $S$ .

$$1/S = |1/P - 1/P_{\oplus}|.$$

通过定义自己推推就推出来了嘛~

赤经 (right ascension)  $\alpha$ , 赤纬 (declination)  $\delta$ .

$$(\Delta\theta)^2 = (\Delta\alpha \cos \delta)^2 + (\Delta\delta)^2$$

记忆方法: 当成勾股定理. 懒得写了, 自己想.

北天极的高度角等于地理纬度, 由此自己推算在天体上中天时刻, 天体赤纬, 天体天顶距和地理纬度的关系<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>这是本宝宝留给你们的作业题! 哼!





## 第二章 天体力学

# Celestial Mechanics

圆锥曲线 (conic section) 统一方程

$$r = \frac{ed}{1 + e \cos \theta}.$$

椭圆 (ellipse),  $ed = a(1 - e^2)$ . 抛物线 (parabola),  $ed = 2p$ . 双曲线 (hyperbola),  $ed = a(1 + e^2)$ .

半长轴长 (semimajor axis)  $a$ , 半短轴长 (semiminor axis)  $b$ , 离心率 (eccentricity)  $e$ .

焦点 (focal point), 近??点 (perihelion), 远??点 (aphelion).

椭圆面积  $A = \pi ab$ . 证明: 把单位圆横轴方向拉长  $a$  倍, 纵轴方向拉长  $b$  倍.

逃逸速度 (escape velocity)  $v_{\text{esc}}$ .

$$v_{\text{esc}} = \sqrt{2GM/r}.$$

第二宇宙速度 11.2 km/s.

质心 (center of mass)  $\mathbf{R}$ .

$$\mathbf{R} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_i}{\sum_{i=1}^n m_i}.$$

折合质量 (reduced mass)  $\mu$ .

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}.$$

二体问题, 把坐标系建在其中一个天体上, 将其质量强行定为  $M = m_1 + m_2$ , 另一天体质量强行定为  $\mu$ , 把日地系统的 Kepler 三定律, 和日地系统中地球

的机械能和角动量的表达式中的  $M_{\odot}$  都换成  $M$ ,  $M_{\oplus}$  都换成  $\mu$ , 就能得到二体问题的 Kepler 三定律和两天体的总机械能和角动量.

一些有用的表达式.

$$ed = \frac{1}{GM} \frac{L^2}{\mu^2}.$$

$$dA = \frac{1}{2} \frac{L}{\mu} dt$$

$$k = \frac{4\pi^2}{GM}.$$

完蛋了, 把 Kepler 三定律直接给出来了... 第一式推导: 计算 perhelion 处的  $L$ ,  $r$  有了,  $v$  用机械能的表达式算. 第二式推导: 三角形面积是两条边的叉乘的长度的二分之一. 第三式推导: 假装轨道是圆的.

(老师没讲但很重要!) 总机械能  $E$ .

$$E = \begin{cases} -\frac{GM}{2a} & \text{椭圆,} \\ 0 & \text{抛物,} \\ \frac{GM}{2a} & \text{双曲.} \end{cases}$$

维里定理 (virial theorem): 系统, 平均总动能  $\langle T \rangle$ , 平均总势能  $\langle V \rangle$ , 平均总机械能  $\langle E \rangle$ ,

$$2\langle T \rangle + \langle V \rangle = 0,$$

$$\langle E \rangle = \frac{1}{2} \langle V \rangle.$$

推论: 系统稳定, 平均总机械能必小于 0.

# 第三章 光的连续谱

## The Continuous Spectrum of Light

视差 (parallax angle): 从天体上看, 地球和太阳的最大角距离.

$1\text{rad} \simeq 206265''$ ,  $1\text{pc} \simeq 206265\text{AU} \simeq 3.26\text{ly}$ .

视星等 (apparent magnitude)  $m$ . 辐射流量 (radiant flux)  $F$ : 仪器单位面积每秒接收到的能量. 光度 (luminosity)  $L$ : 天体每秒辐射的总能量.

$$m - m_0 = -2.5 \lg \frac{F}{F_0}, F = 100^{-(m-m_0)/5} F_0.$$

记忆法: 视星等五等, 亮度一百倍; 视星等越小越亮.

$$F = \frac{L}{4\pi r^2}.$$

绝对星等 (absolute magnitude)  $M$ : 10pc 处视星等. 距离模数 (distance modulus)  $m - M$ . 作业: 推导距离模数公式.

Stefan-Boltzmann 律:  $F = \sigma T^4$ .  $B(T) = \sigma T^4 / \pi$ : 黑体垂直于单位面元方向单位立体角内单位时间辐射的能量.

$$F = \int_{\theta \in [0, \pi]} B \cos \theta \, d\Omega.$$

Wien 位移<sup>1</sup>律:  $\lambda_{\max} T \simeq (500\text{nm})(6000\text{K})$ .

Planck 函数:

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3/c^2}{e^{h\nu/kT} - 1}.$$

---

<sup>1</sup> “位移” 的英文是 displacement.

$B_\nu(T)$  单位:  $\text{J}/(\text{Hz} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{sr})$ . 作业: 推导  $B_\lambda(T)$ .

Planck 函数的证明:

$$u_\nu(T) = \frac{4\pi}{c} B_\nu(T).$$

$$[u_\nu(T) d\nu] V = \bar{\epsilon}(\nu) g(\nu) d\nu.$$

$$\bar{\epsilon}(\nu) = \frac{h\nu}{e^{h\nu/kT} - 1} = \sum_n (nh\nu) \frac{e^{-nh\nu/kT}}{\sum_n e^{-nh\nu/kT}}.$$

$$g(\nu) d\nu = 2 \left[ 4\pi \left( \frac{L\nu}{c} \right)^2 d \left( \frac{L\nu}{c} \right) \right].$$

色指数 (color index)  $X - Y$ : 不同“波段”视星等的差, 等于不同“波段”绝对星等的差. 热星等 (bolometric magnitude)  $m_{\text{bol}}$  和  $M_{\text{bol}}$ : 全波段星等. 热改正 (bolometric correction)  $BC = m_{\text{bol}} - V = M_{\text{bol}} - M_V$ .

颜色-颜色图<sup>2</sup> (color-color diagram): 横轴某色指数, 纵轴另一个. 黑体一条直线, 恒星线在黑体线下.

---

<sup>2</sup>不是色色图! 不是!

# 第四章 狭义相对论

## The Theory of Special Relativity

太简单了, 没啥好记的.



## 第五章 光与物质的相互作用

# The Interaction of Light and Matter

Kirchhoff 律:

1. 热致密气体或热固体产生连续谱, 无吸收线.
2. 热弥漫气体带发射线.
3. 冷弥漫气体在连续谱源前, 连续谱带吸收线.

补充内容:

刻线间距  $d$ , 反射光与光栅法线夹角  $\theta$ , 光谱阶数  $n$ , 波长  $\lambda$ ,  $d \sin \theta = n\lambda$ .

波长  $\lambda$ , 可分辨的最小波长差  $\Delta\lambda$ , 光谱阶数  $n$ , 刻线总数  $N$ , 分辨本领 (resolving power)  $R = \lambda/\Delta\lambda = nN$ .

Compton 效应: 高能光子打低能 (静止) 电子, 光子波长变长. 逆 Compton 效应: 低能光子打高能电子, 光子波长变短.  $\Delta\lambda = 1 - \cos \theta$ .

$E_n = E_1/n^2$ ,  $r_n = n^2 r_1$ .  $E_1 \simeq -13.6\text{eV}$ ,  $r_1 \simeq 0.05\text{nm}$ .

HI 量子数  $(n, l, m_l, m_s)$ . 主量子数  $n \in \mathbb{N}_+$ , 轨道量子数  $l = 0, \dots, n-1$ , 轨道磁量子数  $m_l = -l, \dots, l$ , 自旋磁量子数  $m_s = -1/2, 1/2$  ( $s = 1/2$ ). 磁场方向为  $z$  方向, 轨道角动量  $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ ,  $z$  方向轨道角动量  $L_z = m_l\hbar$ , 自旋角动量  $S = \sqrt{s(s+1)}\hbar = (\sqrt{3}/2)\hbar$ ,  $z$  方向自旋角动量  $S_z = m_s\hbar$ .

选择定则:  $\Delta l = \pm 1$ ,  $\Delta m_l = 0$  或  $\pm 1$  ( $0 \rightarrow 0$  禁戒).





## 第六章 望远镜

### Telescopes

焦比 (focal ratio)  $F$ : 焦距与口径之比.

Airy 斑<sup>1</sup>,  $\theta \simeq 1.22(\lambda/D)$ .

主动光学 (active optics): 消除由于热效应和望远镜移动时反射镜上重力变化造成的镜面变形. 每秒一次至百秒一次.

自适应光学 (adaptive optics): 消除由于大气湍动造成的星像变形. 每秒数十次至每秒数百次.

补充内容:

Snell 律:  $n_{1\lambda} \sin \theta_1 = n_{2\lambda} \sin \theta_2$ ,  $n_\lambda := c/v_\lambda$ .

透镜靠近光轴处, lensmaker's formula:

$$\frac{1}{f_\lambda} = (n_\lambda - 1) \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right).$$

$f_\lambda$  是凸透镜 (converging lens) 为正, 凹透镜 (diverging lens) 为负.  $R$  是镜面向外凸为正, 向内凹为负.

球面反射镜靠近光轴处  $|f| = R/2$ , 凹面镜 (converging mirror) 为正, 凸面镜 (diverging mirror) 为负.

近光轴, 底片比例尺 (plate scale)  $d\theta/dy = 1/f$ .

衍射极限  $\theta_{\min} \simeq 1.22(\lambda/D)$ .

畸变 (aberration):

- 色差 (chromatic aberration): 折射镜, 折射率不同, 焦距不一, 色散.
- 球差 (spherical aberration): (球面镜) 光不沿光轴时, 汇聚到光轴不同位置. 用抛物面镜解决.

---

<sup>1</sup>斑的英文是 “disk”.

- 彗差 (coma): 抛物面焦距依赖于角度.
- 散光 (astigmatism): 镜子不同部分焦点不同.
- 场曲 (curvature of field): 设计镜子修正散光后, 焦面不是平面.
- 场变 (distortion of field): 设计镜子修正散光后, 底片比例尺与光和光轴的距离相关, 图像变形.

照度 (illumination)  $J$ : 接收器单位面积单位时间接收到的能量.

$$J \propto F^{-2}.$$

焦点系统:

- 主焦点 (prime focus): 反射到中间.
- Newtonian: 加平面镜, 反射到旁边.
- Cassegrain: 主镜抛物面, 加凸面镜, 反射到主镜的洞里, 焦距增大.
- Ritchey–Chrétien: Cassegrain 主镜抛物面  $\rightarrow$  双曲面.
- 折轴式 (coudé): Cassegrain 再加平面镜, 反射到旁边.

Schmidt: 球面 + 旋转四次曲面.

$$1 \text{ Jy} = 10^{-26} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{Hz}). \quad 1 \text{ erg} = 10^{-7} \text{ J}.$$

# 第七章 双星和恒星参量

## Binary Systems and Stellar Parameters

分类:

- 光学双星 (optical double): 假的.
- 视双星 (visual binary): 都能看到, 可分辨开.
- 天体测量双星 (astrometric binary): 一个可见, 振荡运动.
- 食双星 (eclipsing binary): 有掩食.
- 光谱双星 (spectrum binary): 两个堆叠的, 独立的, 可识别的光谱.
- 分光双星 (spectroscopic binary): 谱线周期性运动.

质量函数 (mass function): 分光双星,  $Pv_{ir,max}^3/2\pi G$ .

补充内容:

视双星.  $i$ : 长轴与天球切面夹角.  $\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2$ : 星和自己轨道对称中心的最大角距离.  $d$ : 双星-地球距离.  $i$  是可推定的.

$$\begin{cases} m_1\tilde{\alpha}_1 = m_2\tilde{\alpha}_2, \\ a \cos i = (\tilde{\alpha}_1 + \tilde{\alpha}_2)d. \end{cases}$$

分光双星,  $e \simeq 0$ .  $i$ : 长轴与天球切面夹角.  $v_{1r,max}, v_{2r,max}$ : 星视向速度最大值.  $P$ : 双星运动周期.  $\langle \sin^3 i \rangle \simeq 2/3$ .

$$\begin{cases} m_1v_{1r,max} = m_2v_{2r,max}, \\ 2\pi a = [(v_{1r,max} + v_{2r,max})/\sin i]P. \end{cases}$$

分光食双星,  $i \simeq 90^\circ$ ,  $e \simeq 0$ ,  $a \gg R$ .  $t_a$ : 亮度开始下降到主极小的时刻.  
 $t_b$ : 亮度下降到主极小的时刻.  $t_c$ : 亮度开始从主极小上升的时刻.  $v$ : 双星相对速度.

$$\begin{cases} 2R_{\text{小}} = v(t_b - t_a), \\ 2R_{\text{大}} = v(t_c - t_a). \end{cases}$$

食双星,  $i \simeq 90^\circ$ , 忽略临边昏暗.  $B_{\text{max}}$ : 亮度极大值.  $B_{\text{pmin}}$ : 亮度主极小值.  $B_{\text{smin}}$ : 亮度次极小值.

$$\begin{cases} B_{\text{max}} \propto \pi R_{\text{小}}^2 \sigma T_{\text{小}}^4 + \pi R_{\text{大}}^2 \sigma T_{\text{大}}^4, \\ B_{\text{pmin}} \propto \pi R_{\text{大}}^2 \sigma T_{\text{大}}^4 \\ B_{\text{smin}} \propto \pi R_{\text{小}}^2 \sigma T_{\text{小}}^4 + (\pi R_{\text{大}}^2 - \pi R_{\text{小}}^2) \sigma T_{\text{大}}^4. \end{cases}$$

# 第八章 恒星光谱分类

## The Classification of Stellar Spectra

Havard 光谱分类: OBAFGKM, LT.

- O 型: 强 He II 线, He I 线.
- B 型: 强 He I 线 (B2 最强), Balmer 线.
- A 型: 强 Balmer 线 (A0 最强), Ca II 线.
- F 型: Balmer 线, Ca II 线, 中性金属线.
- G 型: Ca II 线, 中性金属线.
- K 型: 金属线, 强 Ca II 线 (K0 最强<sup>1</sup>).
- M 型: 分子线<sup>2</sup>, 金属线.

Morgan-Keenan(MK) 光度级: Ia-O, Ia-Ib, II-V, VI<sup>3</sup>, D<sup>4</sup>.

- I 型: 超巨星 (supergiant).
  - Ia-O 型: 极端亮超巨星 (extreme, luminous supergiant).
  - Ia 型: 亮超巨星 (luminous supergiant).

---

<sup>1</sup>Ca II 的 H 和 K 线 (Fraunhofer 线), 但金属线是主导的.

<sup>2</sup>分子线主导, 但金属线强如 K 型.

<sup>3</sup>亦记作 “sd”.

<sup>4</sup>亦记作 VII 型?

– Ib 型: 次亮超巨星 (less luminous supergiant).

- II 型: 亮巨星 (bright giant).
- III 型: 正常巨星 (normal giant).
- IV 型: 亚巨星 (subgiant).
- V 型: 主序星 (main-sequence star)/矮星 (dwarf).
- VI 型: 亚矮星 (subdwarf).
- D 型: 白矮星 (white dwarf).

Boltzmann 方程:

$$P \propto g e^{-E/kT}.$$

Maxwell-Boltzmann 速度分布函数: 根据 Boltzmann 方程, 对于理想气体,  $dv_x dv_y dv_z$  内的概率正比于  $e^{-m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)/2kT}$ , 或者写成

$$p(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z \propto e^{-\frac{m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}{2kT}} dv_x dv_y dv_z.$$

Gauss 积分,  $e^{-\xi^2/2\sigma^2}$  归一化系数是  $1/\sqrt{2\pi}\sigma$ , 于是乎有

$$p(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}{2kT}} dv_x dv_y dv_z.$$

这是速度分布, 转化到速率分布, 只需把对小方块  $dv_x dv_y dv_z$  的积分变成对小球壳  $4\pi v^2 dv$  的积分, 于是乎有

$$p(v) dv = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} 4\pi v^2 dv.$$

变成数密度分布, 只需乘上数密度, 于是乎有

$$n_v dv = n \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} 4\pi v^2 dv.$$

也就是说,  $4\pi v^2 dv$  是简并度  $g$ .

最可几速度 (most probable speed): 求导.

方均根速度 (root-mean-square speed): 能量均分定理  $mv^2/2 = 3(kT/2)$ .

Saha 方程: 根据 Boltzmann 方程,

$$\frac{N_{i+1} N_e}{N_i} = \frac{Z_{i+1} Z_e}{Z_i}.$$

其中

$$Z_{i+1} = \sum_j g_{i+1,j} e^{-E_{i+1,j}/kT},$$

$$Z_i = \sum_j g_{i,j} e^{-E_{i,j}/kT},$$

$$Z_e = \int g_e e^{-(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)/2m_e}/kT \frac{dx dy dz dp_x dp_y dp_z}{h^3}.$$

上面三式都以束缚-自由临界状态能量为能量零点, 其中第三式运用了结论“一个微观状态等价于  $x p_x y p_y z p_z$  空间中体积为  $h^3$  的小区域”. 下面计算  $Z_e$ .  $g_e = 2$ , 因此

$$Z_e = \frac{2 \int dx dy dz}{h^3} \int e^{-(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)/2m_e kT} dp_x dp_y dp_z,$$

显然  $V = \int dx dy dz$ , 后面是 Gauss 积分很好算, 结果就是

$$Z_e = \frac{2V}{h^3} (\sqrt{2\pi} \sqrt{m_e kT})^3 = 2V \left( \frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{3/2} = 2V \left( \frac{h}{\sqrt{2\pi m_e kT}} \right)^{-3}.$$

令

$$\tilde{Z}_{i+1} = \sum_j g_{i+1,j} e^{-(E_{i+1,j} - E_{i+1,1})/kT},$$

$$\tilde{Z}_i = \sum_j g_{i,j} e^{-(E_{i,j} - E_{i,1})/kT},$$

$$z_e = 2 \left( \frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{3/2},$$

则由  $\chi = E_{i+1,1} - E_{i,1}$  和  $n_e = N_e/V$  可得

$$\frac{N_{i+1} n_e}{N_i} = \frac{\tilde{Z}_{i+1} z_e}{\tilde{Z}_i} e^{-\chi/kT}.$$

HII 只有一种状态,  $S = 0$ , 根据  $S$  和  $Z$  的关系可得  $Z_{\text{HII}} = 1$ .

分光视差 (spectroscopic parallax)  $d = 100^{(m-M)/5}$ ,  $m$  当然可测,  $M$  通过看光谱比对 H-R 图可测, 和视差没有半毛关系!





# 第九章 恒星大气

## Stellar Atmospheres

- 有效温度 (effective temperature): Stefan–Boltzmann 律
- 激发温度 (excitation temperature): Boltzmann 方程.
- 电离温度 (ionization temperature): Saha 方程.
- 运动温度 (kinetic temperature): Maxwell–Boltzmann 分布.
- 色温度 (color temperature): Planck 律.

不透明度 (opacity)  $\kappa_\lambda$ ,  $dI_\lambda = -I_\lambda \kappa_\lambda \rho ds$ , 单位  $\text{m}^2/\text{kg}$ .

光深 (optical depth)  $\tau_\lambda$ ,  $d\tau_\lambda = -\kappa_\lambda \rho ds$ , 无量纲.

辐射转移方程:

$$-\frac{1}{\kappa_\lambda \rho} \frac{dI_\lambda}{ds} = I_\lambda - S_\lambda.$$

等值宽度 (equivalent width)  $W$ ,

$$W := \int \frac{F_c - F(\lambda)}{F_c} d\lambda.$$

- 自然致宽: 不确定性原理, 激发态有寿命  $\Delta t \Rightarrow$  激发态能量弥散  $\Delta E \Rightarrow$  光子能量弥散  $\Rightarrow$  光子波长弥散, 似乎通常可以无视 (Doppler 致宽千分之一, 广义压强致宽同量级或低一量级).
- Doppler 致宽: Maxwell–Boltzmann 分布, 产生瘦高 Doppler 轮廓.
- 碰撞致宽: 原子和其他原子碰撞, 轨道改变而致宽.

- 压强致宽: 原子深入离子电场, 轨道改变而致宽, 广义包括碰撞致宽, 正比于数密度, 一同产生矮胖阻尼轮廓 (又称 Lorentz 轮廓, 自然致宽也是这个轮廓).

补充内容:

比强度 (specific density)  $I_\lambda$ : 垂直于单位面积方向的单位立体角内单位时间通过的单位波长的能量. 对于黑体,  $I_\lambda = B_\lambda$ .

$$d\Omega = d\phi(\sin\theta d\theta).$$

平均强度 (mean density)  $\langle I_\lambda \rangle$ : 比强度对立体角求平均.

$$\langle I_\lambda \rangle = \frac{\int I_\lambda d\Omega}{\int d\Omega} = \frac{\int I_\lambda d\Omega}{4\pi}.$$

对于黑体,  $\langle I_\lambda \rangle = I_\lambda = B_\lambda$ .

比能量密度 (specific energy density)  $u_\lambda$ : 首先假设只有一个方向的辐射强度, 取个垂直于这个方向的小面  $\Delta A$ , 在  $\Delta t$  时间内通过能量  $I_\lambda \Delta A \Delta t$ , 这些能量充斥了  $\Delta A(c\Delta t)$  的体积, 所以有  $I_\lambda \Delta A \Delta t = u_\lambda \Delta A(c\Delta t)$ ,  $u_\lambda = I_\lambda/c$ . 可以证明任何小体元  $V$  内都有  $\int_V u_\lambda = \int_V I_\lambda/c$ . 现在辐射强度在任意方向都有, 所以要对立体角求和, 故有

$$u_\lambda = \int I_\lambda/c d\Omega = 4\pi \langle I_\lambda \rangle /c.$$

对于黑体,  $u = (4\sigma/c) T^4 := aT^4$ .

比辐射流量 (specific radiative flux)  $F_\lambda$ : 把垂直于面元的辐射分量  $I_\lambda \cos\theta$  对立体角求和, 得到垂直于单位面积方向单位时间通过的单位波长的总能量, 即

$$F_\lambda = \int I_\lambda \cos\theta d\Omega.$$

对于黑体, 只计算  $\theta \leq \pi/2$  的部分, 可得  $F = \sigma T^4 = \pi \langle I_\lambda \rangle$ .

辐射压强 (radiation pressure)  $P_\lambda$ : 反射情形下,  $P_\lambda$  要用辐射到板上的动量的法向分量的 2 倍来算. 首先, 由能量得到动量, 要除以  $c$ . 其次,  $\theta$  方向的辐射不垂直于板,  $\Delta A$  的实际有效面积只有  $\Delta A \cos\theta$ , 所以要乘以  $\cos\theta$ . 最后, 动量只取法向分量, 要再乘以  $\cos\theta$ . 只  $\theta \leq \pi/2$  的部分有贡献, 所以有

$$P_\lambda = 2 \int_{\theta \leq \pi/2} I_\lambda \cos^2\theta /c d\Omega.$$

对于透射情形,  $P_\lambda$  是面元  $\theta < \pi/2$  部分单位时间的动量改变量<sup>1</sup>. 首先  $\theta < \pi/2$  部分无论是吃光子还是吐光子, 动量改变都是一份, 所以不需要 2 倍的因子. 其次既要考虑进入  $\theta < \pi/2$  部分的光子 (运动方向  $\theta < \pi/2$ ) 的动量也要考虑离开  $\theta < \pi/2$  部分的光子 (运动方向  $\theta > \pi/2$ ) 的动量. 所以有

$$P_\lambda = \int I_\lambda \cos^2 \theta / c d\Omega.$$

对于黑体,  $P = (1/3)u$ .

对面源, 测得的是  $I_\lambda$ , 不随距离变化.

对点源, 测得的是  $F_\lambda$ , 和距离呈平方反比.

热动平衡 (thermodynamics equilibrium): 所有正逆反应速率相同.

局部热动平衡 (local thermodynamics equilibrium): 温度显著变化的距离大于粒子和光子的平均自由程, 粒子和光子不能逃出某范围, 在这范围内可以定义一个“这范围内的温度”.

平均自由程 (mean free path)  $\ell$ , 碰撞截面 (collision cross section)  $\sigma$ .  
 $1/n = \sigma\ell$ .  $\sigma_{\text{HI}} = \pi(2a_{\text{Bohr}})^2$ .

吸收系数 (absorption coefficient)/不透明度<sup>2</sup>(opacity)  $\kappa_\lambda$ .

$dI_\lambda = -I_\lambda \kappa_\lambda \rho ds$ .  $\ell = 1/\kappa_\lambda \rho$ .

光深 (optical depth)  $\tau_\lambda$ .  $d\tau_\lambda = -\kappa_\lambda \rho ds$ ,  $ds = -\ell d\tau_\lambda$ , 无量纲.

- Thomson 散射: 自由电子.
- Compton 散射: 高轨束缚电子, 光子动量远大于粒子动量, 光子能量远小于电子静能时  $\rightarrow$  Thomson 散射.
- Rayleigh 散射: 高轨束缚电子, 光子动量远小于粒子动量, 粒子尺度远小于波长<sup>3</sup>,  $\sigma \propto \lambda^{-4}$ .

Kramers 不透明度律:  $\bar{\kappa} = \kappa_0 \rho / T^{3.5}$ .

$\kappa_0$  近似常量,  $\rho$  单位  $\text{kg}/\text{m}^3$ ,  $T$  单位 K.

电子散射,  $\bar{\kappa} = 0.02(1 + X) \text{m}^2/\text{kg}$ .

随机行走 (random walk),  $d^2 = N\ell^2$ ,  $d = \ell\tau_\lambda$ ,  $N = \tau_\lambda^2$ ,  $\tau_\lambda \approx 2/3$  原则.

发射系数 (emission coefficient)  $j_\lambda$ .

<sup>1</sup>单位时间的动量改变量不就是力么, 面元上的力不就是压强么...

<sup>2</sup>这里的不透明度是“质量不透明度”, 单位是  $\text{m}^2/\text{kg}$ , 乘上  $\rho$  是“体积不透明度”, 单位是  $\text{m}^2/\text{m}^3$ .

<sup>3</sup>粒子尺度与波长相当是 Mie 散射.

$$dI_\lambda = j_\lambda \rho ds.$$

源函数 (source function)  $S_\lambda = j_\lambda / \kappa_\lambda$ . 对于黑体,  $S_\lambda = B_\lambda$ .

平面平行层大气 (plane-parallel atmosphere), 垂直光深 (vertical optical depth)  $\tau_{\lambda,v}$ , 注意到  $\kappa_\lambda, j_\lambda, S_\lambda$  无方向性,

$$\frac{d}{d\tau_{\lambda,v}} I_\lambda \cos \theta = I_\lambda - S_\lambda.$$

灰大气 (gray atmosphere),  $\kappa_\lambda = \bar{\kappa}$ . 对波长积分,

$$\frac{d}{d\tau_v} I \cos \theta = I - S.$$

上式对立体角积分和左右乘以  $\cos \theta / c$  后对立体角积分, 得

$$\begin{cases} \frac{d}{d\tau_v} F = 4\pi \langle I \rangle - 4\pi S, \\ \frac{d}{d\tau_v} P = F/c - 0. \end{cases}$$

$F = \sigma T_e^4$  不随  $\tau_v$  变化, 所以

$$\begin{cases} \langle I \rangle = S, \\ P - P_0 = (F/c)\tau_v. \end{cases}$$

Eddington 近似: 向外  $I_{\text{out}}$  相同, 向内  $I_{\text{in}}$  相同, 则

$$\begin{cases} F = (\pi)(I_{\text{out}} - I_{\text{in}}), \\ P = (2\pi/3c)(I_{\text{out}} + I_{\text{in}}). \end{cases}$$

$\tau_v$  时  $I_{\text{in}} = 0$ , 可得  $P_0 = (2\pi/3c)I_{\text{out}} = 2F/3c$ , 所以

$$P = (F/c)(\tau_v + 2/3).$$

恰好有  $P = (4\pi/3c) \langle I \rangle$ , LTE,  $\langle I \rangle = S = B = (\sigma/\pi) T^4$ , 所以

$$T^4 = \frac{3}{4}(\tau_v + \frac{2}{3})T_e^4.$$

等值宽度 (equivalent width)  $W$ ,

$$W := \int \frac{F_c - F(\lambda)}{F_c} d\lambda.$$

是令连续谱 ( $F(\lambda) = F_c$ ) 等于 1 后求等值宽度.

佛脱轮廓 (Voigt profile): Doppler 轮廓和阻尼 (damping) 轮廓的叠加. Doppler 轮廓瘦高, 阻尼轮廓矮胖.

Schuster-Schwarzschild 模型: 恒星光球是黑体辐射源; 光球外的原子产生吸收线.

# 第十章 恒星内部

## The Interiors of Stars

流体静力学平衡: 流体微元所受合力处处为零.

Kelvin–Helmholtz 时标: 太阳总机械能和太阳光度之比,

$$t_{\text{KH}} = \frac{\frac{3}{10} \frac{GM_{\odot}^2}{R_{\odot}}}{L_{\odot}}.$$

Vogt–Russell 定理: 质量和化学组成唯一决定.

Eddington 光度极限: 辐射光度最大值, 超过必有质量损失.

补充内容:

流体静力学平衡方程 (hydrostatic equilibrium equation):

$$\frac{dP}{dr} = -G \frac{M_r \rho}{r^2},$$

即  $-GM_r(\rho dA dr)/r^2 = \Delta P dA$ .

质量守恒方程 (mass conservation equation):

$$\frac{dM_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho,$$

即  $dM_r = \rho(4\pi r^2 dr)$ .

理想气体的压强积分 (pressure integral):

$$P = \frac{1}{3} n(\overline{\mathbf{p} \cdot \mathbf{v}}).$$

平均是数量平均. 记忆法: 压强只需考虑一个朝向固定的板, 由各向同性, 对任意方向  $i$ ,

$$P = n\bar{p}_i\bar{v}_i.$$

而  $P\Delta S = \Delta p_i/\Delta t$ ,  $P\Delta S\Delta t = \Delta p_i$ ,  $P\Delta S(\bar{v}_i\Delta t) = P\Delta V$ ,  $\Delta p_i\bar{v}_i = \Delta N\bar{p}_i\bar{v}_i$ ,  
 $P = (\Delta P/\Delta V)\bar{p}_i\bar{v}_i = n\bar{p}_i\bar{v}_i$ . 另一种记忆法是量纲法: 因为是状态量, 所以  
 $P$  与  $n$ ,  $\bar{p}_i$ ,  $\bar{v}_i$  有关, 已知  $P = nkT$ , 由能量均分定理知  $kT$  与  $\bar{p}_i\bar{v}_i$  同量纲  
(非相对论情形下甚至相同), 所以蒙  $P = n\bar{p}_i\bar{v}_i$ .

平均分子量 (mean modular weight)  $\mu := \bar{m}/m_H := (\rho/n)/m_H$ .

完全中性气体,  $A_j := m_j/m_H$  (相当于原子核内重子数),

$$\mu_n = \frac{\sum_j N_j A_j}{\sum_j N_j}.$$

完全电离气体, 原子  $j$  的电子数  $z_j$ ,

$$\mu_i \simeq \frac{\sum_j N_j A_j}{\sum_j N_j (1 + z_j)}.$$

也就是说电子质量不管了.

强行假设恒星密度均匀, 蒙

$$E \sim -\frac{3}{10} \frac{GM^2}{R^2}.$$

Kelvin–Helmholtz 时标.

核时标.

反应截面 (cross section)  $\sigma(E)$ . 理解 1: 入射粒子有特定能量时, 单位  
时间单个目标粒子的反应数, 比上单位时间目标粒子附近单位面积通过的入  
射粒子数. 理解 2: 入射粒子有特定能量时, 目标粒子附近的一块面积, 当且  
仅当通过这块面积的入射粒子和目标粒子反应.

反应率 (reaction rate)  $r_{ix}$ : 单位时间单位体积的反应数.

Gamow 峰: 使得  $dr_{ix}/dE$  最大的能量. 严格说来不含缓变函数  $S(E)$   
的影响.

电子屏蔽 (electron screening): 自由电子包在原子核周围, 使之有效电  
荷减小, 势阱降低, 反应更容易发生.

产能率 (energy generation rate)  $\epsilon_{ix}$ : 单位时间单位质量物体反应释放  
的能量.

光度梯度方程 (luminosity gradient equation)/能量守恒方程 (energy  
conservation equation)<sup>1</sup>:

$$\frac{dL_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho \epsilon,$$

<sup>1</sup>前面书上的名称, 后面老师视频里的名称.

即  $dL_r = \epsilon dM_r = \epsilon[\rho(4\pi r^2 dr)]$ .

电荷守恒, 核子守恒, 轻子守恒 (正轻子记 +1, 反轻子记 -1).

$T_n$ : 以  $10^n \text{K}$  为单位. 乱七八糟的量都约为 1.

辐射温度梯度:

$$\begin{cases} \frac{dP}{d\tau} = \frac{F}{c}, \\ d\tau = -\bar{\kappa}\rho dr, \\ P = \frac{aT^4}{3}, \\ F = \frac{L_r}{4\pi r^2}. \end{cases}$$

压强标高 (pressure scale height)  $H_P$ :  $P = P_0 e^{-\tau/H_P}$ .

理想气体,  $C_P - C_V = 1$ ,  $C_V = (\text{自由度})/2$ .  $\gamma = C_P/C_V$ . 有电离, 不论定什么过程, 能量都大部分用于电离, 所以  $C_P$  和  $C_V$  巨大,  $\gamma$  约等于 1.

理想气体, 绝热过程,  $PV^\gamma = \text{const.}$

声速  $\sqrt{\partial P/\partial \rho}$  (振动,  $P$  和  $\rho$  是力学强度量, 量纲),  $P\rho^{-\gamma} = \text{const.}$

绝热温度梯度:

$$\begin{cases} P \propto \rho T, \\ P\rho^{-\gamma} \propto 1. \end{cases}$$

超绝热 (superadiabatic): 实际温度梯度大于绝热温度梯度. 超绝热等价于对流. 对流时, 超绝热但接近绝热, 绝热温度梯度公式适用.

温度梯度大的不容易发生. 大恒星中心, 产能率高, 光度大, 对流. 小恒星边缘, 不透明度大, 且正电离,  $\gamma$  约等于 1, 对流.

混合长理论 (mixed-length theory): 假设泡泡能运动和压强标高  $H_P$  相当的距离  $\ell$ , 令  $\ell = \alpha H_P$ ;  $\delta(dT/dr)$  是实际温度梯度 (大小) 减绝热温度梯度 (大小);  $f$  是单位体积泡泡所受合力, 即浮力减重力; 假设泡泡平均速度  $\bar{v}$  满足  $\rho \bar{v}^2/2 = \beta \langle f \rangle \ell$ , 其中  $0 < \beta < 1$ ; 最后得出对流流量  $F = L_r/4\pi r^2$  的表达式.

多方模型 (polytropic model),  $\gamma := (n+1)/n$ ,  $\rho := \rho|_{r=0}(D_n)^n$ ,  $r := \lambda_n \xi$ , Lane-Emden 方程.  $P|_{r=R} = 0$ ,  $(dP/dr)|_{r=0} = 0$ .  $0 \leq n \leq 5^2$ . 假设各处气体压和辐射压比例相同, 可得 Eddington 标准模型  $n = 3$ .

Eddington 极限:  $dP/dr = dP_{\text{rad}}/dr$ . 对大质量恒星,  $\bar{\kappa}$  主要由电子屏蔽导致, 可用上一章的公式.

---

<sup>2</sup> $n = 5$  时半径无限, 但质量有限.  $n > 5$  时质量无限.





# 第十一章 太阳

## The Sun

- 光球 (photosphere): 500nm 光深 1 处往下 100km, 上到温度最小处.
- 色球 (chromosphere): 温度最小处到过渡区.
- 过渡区 (transition region): 温度激增区.
- 日冕 (corona): 过渡区外.

较差自转 (differential rotation): 低纬快, 高纬慢; 辐射区速度一样, 到差旋层 (tachocline) 出现速度差且随半径迅速增大, 对流区速度差一样.

Alfvén 波: 等离子体, 磁力线像弦一样抖动, 波沿磁感应强度方向传播.

补充内容:

MSW 效应<sup>1</sup>: 中微子转变

光球 (photosphere): 500nm 光深 1 处往下 100km, 上到温度最小处. 产生吸收线. 线心波长处, 物质不透明度大 (不透明度随波长变化), 光深等则深度小.

米粒组织 (granulation): 光球底, 亮上浮暗下沉, 对流的结果.

色球 (chromosphere): 温度最小处到过渡区. 产生发射线.

闪谱 (flash spectrum): 日全食时看到的色球谱.

超米粒组织 (supergranulation): 比米粒组织大得多.

针状体 (spicule)<sup>2</sup>: 丝状.

过渡区 (transition region): 温度激增区. 紫外观测.

---

<sup>1</sup>英文: effect

<sup>2</sup>这玩意儿似乎研究得不咋地.

日冕 (corona): 禁戒线, 射电发射 (韧致辐射<sup>3</sup>, 同步辐射<sup>4</sup>), X 射线发射 (高度电离原子的发射). 非 LTE, 温度无统一定义.

- K 日冕: 光球辐射被自由电子散射, 产生连续白光谱. F 日冕内.
- F 日冕: 光球辐射被尘埃散射. K 日冕外.
- E 日冕: 高度电离原子产生发射线. 与 K 日冕和 F 日冕能重合.

冕洞 (coronal hole): 暗的, 冷的区域. X 射线暗区. 原因: 磁力线开放, 粒子数少.

太阳风 (solar wind):

- 快速太阳风: 电子和粒子流.
- 慢速太阳风: 速度快速风一半, 从封闭磁场出来.

彗尾:

- 离子尾: 太阳风.
- 尘埃尾: 辐射压. 弯曲原因: 轨道速度不同.

北极光 (aurora borealis) 和南极光 (aurora australis): 粒子从太阳跑到地球, 被地磁场捕获, 使高层大气分子或原子激发或电离.

Van Allen 辐射带: 被地球捕获的太阳粒子在地磁南北两极间来回运动.

X 射线亮区 (X-ray bright region): 磁力线闭合.

Parker 风模型: 等离子体 (plasma), 等温, 流体静力学平衡, 理想气体, 计算得到的无穷远处数密度和压强过大. 修正, 不流体静力学平衡,  $dv/dt = (dv/dr)(dr/dt) = v(dv/dr)$ ,

$$\begin{cases} P = 2 \frac{\rho}{m_{\text{质子}}} kT, \\ \rho v \frac{dv}{dr} = -\frac{dP}{dr} - G \frac{M_r \rho}{r^2}, \\ \frac{dM_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho, \\ \frac{d(4\pi r^2 \rho v)}{dr} = 0. \end{cases}$$

$F = (1/2)\rho v_{\text{粒子}}^2 v_{\text{声}}$ . 若  $4\pi r^2 F$  不变,  $v_{\text{声}}$  不变, 则  $v_{\text{粒子}}$  大增, 迅速超声速 (supersonic), 产生激波 (shock wave).

<sup>3</sup>自由-自由辐射, 刹车辐射.

<sup>4</sup>相对论性电子被磁场加速.

Alfvén 波:  $u = P = B^2/2\mu_0$ ,  $v = B/\sqrt{\mu_0\rho}$ .

黑子 (sunspot): 光球, 蝴蝶图, 本影 (umbra) 和半影 (penumbra), 太阳磁发电机理论 (solar magnetic dynamo theory)<sup>5</sup>.

光斑 (facula): 光球, 延伸到色球成谱斑.

谱斑 (plage/focculus): 色球, 黑子附近,  $H\alpha$  辐射, 密度较高, 磁场产物.

耀斑 (flare): 色球, 局部突发短暂大规模能量释放, 磁重联 (magnetic reconnection), 核反应: 分裂反应 (spallation reaction), 重核子变成轻核子.

日珥 (solar prominence): 色球, 耳朵, 远亮于日冕但暗于日面,

- 宁静日珥 (quiescent prominence): 持续周到月.
- 爆发/活动日珥 (eruptive/active prominence)<sup>6</sup>: 持续数小时, 能量转移给气体, 抛射出去, 可能由宁静日珥转化来.

日冕形状,

- 宁静日冕 (quiet corona): 太阳活动弱的时候, 更集中在赤道区域.
- 活动日冕 (active corona): 太阳活动强的时候, 形状更复杂.

耀星 (flare star): M 型随机快速亮度起伏星.

---

<sup>5</sup>这个理论前面好理解, 不过最后磁极反转的过程并不简单, 俺着实弄不清楚哩...

<sup>6</sup>活动日珥和爆发日珥应该是两类, 活动日珥是活动的, 爆发日珥是爆发的. 听我一席话如听一席话...



## 第十二章 星际介质和恒星形成

### The Interstellar Medium and Star Formation

原恒星演化和主序前演化见下一章.

星际消光 (interstellar extinction):

$$m_\lambda = M_\lambda + 5 \log_{10} d - 5 + A_\lambda.$$

$$I_\lambda/I_{\lambda,0} = e^{-\tau_\lambda} \Rightarrow A_\lambda = m_\lambda - m_{\lambda,0} = -2.5 \log_{10}(I_\lambda/I_{\lambda,0}) = -2.5 \log_{10}(e) \tau_\lambda.$$

色余 (color excess)  $E(B - V) = (B - V)_{\text{observed}} - (B - V)_{\text{intrinsic}} = A_B - A_V$ <sup>1</sup>.

21cm 谱: 基态氢, 自旋—自旋耦合<sup>2</sup>(超精细结构). 可测原因一: 数密度小, 电子不因碰撞跑到其他能级, 长时间后能跃迁. 可测原因二: 尺度大, 柱密度大 (即原子数多), 微小辐射可以大量叠加.

Jeans 判据: 孤立云, 云的质量大于 Jeans 质量, 即云的半径大于 Jeans 半径, 则塌缩.

林忠四郎<sup>3</sup>轨迹 (Hayashi track): 完全对流时流体静力学平衡的临界条件. 要在左边, 不能在右边, 在右边的要收缩. 原恒星演化自由落体阶段就在右边, 但形成原恒星后就只能沿轨迹向下.

补充内容:

柱密度 (column density)  $N_d$ : 数密度对路程积分, 单位截面的粒子数. 由第九章各种定义,  $\tau_\lambda = \sigma_\lambda N_d$ .

---

<sup>1</sup>这是老师的定义, 书上的定义和老师是反过来的呜呜呜...

<sup>2</sup>什么是耦合? Hamilton 算符中同时出现质子自旋算符和电子自旋算符就是耦合.

<sup>3</sup>姓林, 名忠四郎.

示踪体 (tracer): 假设比例相同.

ISM 加热: 宇宙线 (带电粒子), 紫外光电离碳原子等各种原因, SN 或星风的激波.

ISM 冷却: 红外光子发射.

尘埃来源: 冷恒星包层, SN 爆炸和星风, 尘埃生长 (coagulation) 和吸积 (accretion)

Jeans 判据 (criterion): 维里定理, 动能理想气体动能, 势能第十章  $-3/5$  倍公式, 假设密度均匀, 得 Jeans 质量和 Jeans 长度.

Bonner-Ebert 质量: 考虑外压强的判据.

自相似塌缩 (homologous collapse): 云自由落体, 无压强外推, 等温, 可得自由落体塌缩时间.

自内向外塌缩 (inside-out collapse): 密度高的中心密度增加更快.

碎裂 (fragmentation): 不等温, 因为云不透明, 辐射加热云.

褐矮星 (brown dwarf):  $> 0.06M_{\odot}$ , Li 燃烧;  $> 0.013M_{\odot}$ , D 燃烧. 光谱型 L 和 T.

零龄主序 (zero-age main sequence, ZAMS): 刚到主序, 开始稳定 H 燃烧.

电离氢区 (H II region), 外面是中性氢区 (H I region), Strömgren 半径: 单位体积单位时间复合数  $\alpha n_e n_H$ ,  $n_e \simeq n_H$ , 恒星每秒辐射的能电离氢的光子数  $N$ .

OB 星协 (association): 一堆 OB 星 (不如星团多) 一起诞生, 不能引力束缚.

原行星盘 (proplyds): 可能形成行星的盘.

# 第十三章 主序和主序后恒星演化

## Main Sequence and Post-Main-Sequence Stellar Evolution

原恒星演化 (protostellar evolution),  $1M_{\odot}$ :

1. 自由下落塌缩 (free-fall collapse). 光学薄, 等温塌缩 (isothermal collapse). 中心密度稍大, 塌缩速率更大, 密度差更大, 塌缩速率差更大..., 自内向外塌缩 (inside-out collapse).
2. 核心光学厚, 绝热塌缩 (adiabatic collapse), 塌缩速率减慢, 核心接近流体静力学平衡, 核心形成原恒星. 核外自由下落, 产生激波<sup>1</sup>, 加热核.
3. 尘埃蒸发, 核不透明度下降.
4.  $H_2$  瓦解, 吸收能量, 核再次塌缩.
5. 核重新流体静力学平衡, 持续吸积, 至 D 点燃.
6. D 燃尽, 光度剧降且温度缓降, 进入主序前.

主序前演化 (pre-main-sequence evolution):

- $1M_{\odot}$ :

1. 表面  $H^-$  高不透明度  $\implies$  完全对流. 星体塌缩.

---

<sup>1</sup>因为下落速度大于声速.

2. 核温度升高  $\implies$  电离  $\implies$  不透明度下降  $\implies$  辐射核. 星体塌缩.
3. 核反应 (pp 和 CNO) 开始.
4. CNO 温度依赖  $\implies$  高产能率  $\implies$  高温梯度  $\implies$  对流核. 高产能率  $\implies$  核膨胀  $\implies$  温度下降且光度下降.
5. C 燃尽, 恒星稳定, 进入主序.

- $< 0.5M_{\odot}$ , 无 C 燃烧.
- $< 0.072M_{\odot}$ , 无 H 燃烧, 不可持续, 失败.

褐矮星 (brown dwarf):  $> 0.06M_{\odot}$ , Li 燃烧;  $> 0.013M_{\odot}$ , D 燃烧. 光谱型 L 和 T.

零龄主序 (zero-age main sequence, ZAMS): 刚到主序, 开始稳定 H 燃烧.  $> 1.2M_{\odot}$ , CNO, 对流核<sup>2</sup>;  $0.3M_{\odot} \sim 1.2M_{\odot}$ , pp, 辐射核;  $< 0.3M_{\odot}$ <sup>3</sup>, pp, 对流核.

小质量主序演化 (low-mass main-sequence evolution),  $1M_{\odot}$ : 光度, 半径, 温度稳定增加,  $H \rightarrow He$ , 平均分子量增加, 压强不足, 核塌缩, 反应率增加.

对流超射 (convective overshooting): 对流泡泡因惯性冲出对流区.

中质量主序演化 (intermediate-mass main-sequence evolution),  $5M_{\odot}$ : 核稍稍损失质量, 形成小成分梯度, 末期星体收缩, 光度和温度增加.

$> 10M_{\odot}$ , 对流核消失.

主序后演化 (post-main-sequence evolution): H 燃烧止, 亚巨星支 (sub-giant branch, SGB), 红巨星支 (red giant branch, RGB), 红巨星支上端<sup>4</sup>(red giant tip), 蓝向/红向<sup>5</sup>(blueward/redward) 水平支 (horizontal branch, HB), 早期/热脉冲渐近巨星支 (early/thermal-pulse asymptotic giant branch, E/TP-AGB), 渐近巨星后支 (post-asymptotic giant branch, Post-AGB).

挖掘 (dredge-up). 超星风 (superwind).

$1M_{\odot}$ :

1. 核收缩, 厚 H 燃烧壳, 光度增加, 半径稍增, 温度下降.

<sup>2</sup>这能使得核内成分保持均匀.

<sup>3</sup>书上只说“最低质量”, 我猜是  $< 0.3M_{\odot}$  都行.

<sup>4</sup>很火的 TRGB!

<sup>5</sup>这里的“蓝向/红向”是我计几取的名儿...



2. 亚巨星支, 核迅速收缩, 星体膨胀, 温度下降, 光度增加.
3. 温度下降  $\implies$   $H^-$  增加  $\implies$  光球不透明度增加  $\implies$  表面对流.
4. 对流层深入中心, 红巨星支, 光度增加, 第一次挖掘. Li 燃尽, 光球化学成分变化, 红巨星支上端.
5. 核收缩, 强电子简并, 压强不依赖于温度.  $3\alpha$  反应开始, 温度增加, 压强不变, 温度不下降,  $3\alpha$  反应高温依赖, 氦闪 (Helium core flash).
6.  $3\alpha$  反应, He 燃烧, 核膨胀, H 燃烧壳膨胀 (被外推), 产能率下降, 光度下降, 壳收缩, 温度升高, 蓝向水平支. 壳收缩最终导致产能率再升高.
7. 核平均分子量增加, 至核收缩, 壳膨胀冷却, 红向水平支.
8. He 壳燃烧, 早期渐近巨星支, 壳膨胀, 温度下降, 对流层二次深入中心 (原因同第一次挖掘), 第二次挖掘.
9. He 壳燃烧初止, 热脉冲渐近巨星支, H 燃烧层生成 He 落入 He 层, He 层部分简并, 氦壳闪 (Helium core flash), H 燃烧层外推, 冷却停止燃烧, 氦壳闪终止, H 燃烧层恢复, 循环. 光度增加, 温度降低.
10. 半径大且脉动, 引力束缚弱, 光度高, 辐射压大, 快速质量损失, 末期超星风, 渐近巨星后支.

$5M_{\odot}$ :

1. 整星 KH 时标收缩, 光度稍增, 半径下降, 温度升高.
2. 厚 H 燃烧壳, 壳稍膨胀, 光度下降, 温度下降.
3. 亚巨星支, 核迅速收缩, 星体膨胀, 温度下降, 光度增加但最后稍降.
4. 温度下降  $\implies$   $H^-$  增加  $\implies$  光球不透明度增加  $\implies$  表面对流.
5. 对流层深入中心, 红巨星支, 光度增加, 第一次挖掘. Li 燃尽, 光球化学成分变化, 红巨星支上端.
6.  $3\alpha$  反应, He 燃烧, 核膨胀, H 燃烧壳膨胀 (被外推), 产能率下降, 光度下降, 壳收缩, 温度升高, 蓝向水平支. 壳收缩最终导致产能率再升高.
7. 核平均分子量增加, 至核收缩, 壳膨胀冷却, 红向水平支.

8. He 壳燃烧, 早期渐近巨星支, 壳膨胀, 温度下降, 对流层二次深入中心 (原因同第一次挖掘), 第二次挖掘.
9. He 壳燃烧初止, 热脉冲渐近巨星支, 氦壳闪. 光度增加, 温度降低.
10. 对流层三次深入中心, 第三次挖掘.
11. 半径大且脉动, 引力束缚弱, 光度高, 辐射压大, 快速质量损失, 末期超星风, 渐近巨星后支.

脉泽 (maser): 微波受激辐射.

星族 (stellar population): 年龄, 化学组成, 空间分布和运动特性. 星族 I: 年轻, 富金属, 银盘, 轨道倾角小. 星族 II: 年老, 贫金属, 银晕, 轨道倾角大. 星族 III: 第一代, 纯洁无瑕.

球状星团 (globular cluster),  $n \times 10^3 \uparrow$ , 星族 II. 疏散星团 (open cluster),  $n \times 10^3 \downarrow$ , 星族 I.

赫氏空隙 (Hertzsprung gap): 星团赫罗图空隙. 原因: 主序后快速演化.

## 第十四章 恒星脉动

### Stellar Pulsation

经典造父变星 (classical Cepheid), 星族 I.

周光关系: 平均光度-光变周期关系.

不稳定带 (instability strip): 赫罗图上接近垂直的一块区域, 部分脉动变星 (天琴座 RR 变星, 造父变星, 室女 W 型变星, 鲸鱼 ZZ 型变星, 金牛 RV 型变星, 盾牌  $\delta$  型变星, 凤凰 SX 型变星和快速震荡 Ap 星) 分布的区域, 底部在赫氏空隙.

$\kappa$  机制: 部分电离区 (partial ionization zone), 收缩时不透明度增加, ... $\rightarrow$  膨胀  $\rightarrow$  透明  $\rightarrow$  不吸热  $\rightarrow$  冷  $\rightarrow$  收缩  $\rightarrow$  不透明  $\rightarrow$  吸热  $\rightarrow$  热  $\rightarrow$ ....

$\gamma$  机制: 温度变化比临近区域小.

太阳 5 分钟震荡: 太阳表面气体 3-8 分钟周期的一种起伏运动.



# 第十五章 大质量恒星的命运

## The Fate of Massive Stars

红超巨星 (red supergiant star, RSG).

蓝超巨星 (blue supergiant star, BSG).

Wolf-Rayet 星 (WR): 强宽发射线 O 型星. 氮序 Wolf-Rayet 星 (WN): He, N 发射线. 碳序 Wolf-Rayet 星 (WC): He, C 发射线.

亮蓝变星 (luminous bright variable, LBV): 火药桶.

大质量恒星主序后演化<sup>1</sup>:

- $10M_{\odot} < M < 20M_{\odot}$ :  $O \rightarrow RSG \rightarrow BSG \rightarrow SN$ ,
- $20M_{\odot} < M < 25M_{\odot}$ :  $O \rightarrow RSG \rightarrow WN \rightarrow SN$ ,
- $25M_{\odot} < M < 40M_{\odot}$ :  $O \rightarrow RSG \rightarrow WN \rightarrow WC \rightarrow SN$ ,
- $40M_{\odot} < M < 85M_{\odot}$ :  $O \rightarrow Of \rightarrow WN \rightarrow WC \rightarrow SN$ ,
- $85M_{\odot} < M$ :  $O \rightarrow Of \rightarrow LBV \rightarrow WN \rightarrow WC \rightarrow SN$ .

可总结出两条规则:

- 质量小的变红再变蓝, 质量大的一直蓝.
- 质量最小的不吹出 He 就炸, 质量次小的吹出 He 露出 C 然后炸, 质量足够的吹出 He 和 C 露出 N 然后炸.

超新星 (supernova, SN): 爆炸.

- 没 H: SN I,

---

<sup>1</sup>“O” 代表 O 型主序星, “Of” 代表有明显发射线的 O 星超巨星.

- 有 Si: SN Ia,
  - 没 Si,
    - \* 富 He: SN Ib,
    - \* 贫 He: SN Ic,
  - 有 H: SN II,
    - 随着时间发展演变出较强 He 特征谱线: SN Iib,
    - 光度下降时仍然显示较强 H 特征谱线: SN II<sub>n</sub> (“正常” SN II),
      - \* 光变曲线极大后线性下降 (“linear”): SN II-L,
      - \* 光变曲线极大后有个平台 (“plateau”): SN II-P.
- $\gamma$  射线暴 (gamma-ray burst, GRB),  $< 2\text{ s}$  短暴, 硬 (高能), 可能源于中子星-中子星/黑洞并合,  $> 2\text{ s}$  长暴, 软 (低能), 可能源于超新星.

## 第十六章 恒星简并残骸

# The Degenerate Remnants of Stars

白矮星 (white dwarf):

- DA<sup>1</sup>: H (Balmer) 线,
- DB<sup>2</sup>: He I 线,
- DC<sup>3</sup>: 没线,
- DO<sup>4</sup>: He II 线<sup>5</sup>,
- DZ<sup>6</sup>: 金属线,
- DQ<sup>7</sup>: C 线.

完全简并 (degenerate):  $T \rightarrow 0$ , 或  $\rho \rightarrow \infty$ , 电子拼命挤到最低能态, 但每个微观状态只能有一个电子, 所以挤不到最低能态的只能挤到次低能态, 但每个微观状态只能有一个电子, 所以... 最后挤来的电子的能量称为 Fermi 能, 小于 Fermi 能的能级都挤满了电子, 大于 Fermi 能的能级空空如也.

质量体积关系: 质量乘体积得常数. 相对论效应, 体积更小.

---

<sup>1</sup>A 型星.

<sup>2</sup>B 型星.

<sup>3</sup>连续谱 (continuous spectrum).

<sup>4</sup>O 型星.

<sup>5</sup>还有弱 He I 线或弱 H 线.

<sup>6</sup>金属符号 “Z”.

<sup>7</sup>没人懂得为什么用字母 “Q” ...

Chandrasekhar 极限: 白矮星最大质量.

白矮星冷却时标: 内能除以光度.

脉冲星 (pulsar): 短周期脉冲源. 强磁场快速自转中子星 (neutron star).

同步辐射 (synchrotron radiation): 相对论性电子在弱磁场中, 连续谱, 圆轨道平面方向线偏振. 曲率辐射 (curvature radiation): 相对论性电子在强磁场中, 连续谱, 磁力线平面方向线偏振.

光速圆柱面<sup>8</sup>(light cylinder): 以脉冲星 (pulsar) 自转轴为对称轴的, 半径为光速和脉冲星角速度之比的圆柱面.

磁星 (magnetar): 极端强磁场中子星, 有相对慢的自转, 用于解释软  $\gamma$  射线复现源 (soft gamma repeater, SGR).

---

<sup>8</sup>老师称之为“光柱面”, 我用的是权威翻译~



# 第十七章 广义相对论

## General Relativity and Black Holes

太简单了，老师不讲不考。



# 第十八章 密近双星系统

## Close Binary Star Systems

平面圆型限制性三体问题: 两大星圆轨道绕转, 另有一小星. 取非惯性系使两大星静止, 则小星的等效势能 (effective potential energy) 为

$$U_{m,\text{eff}} = -\frac{GM_1m}{r_1} - \frac{GM_2m}{r_2} - \frac{1}{2}m(\omega r)^2,$$

其中  $r_1, r_2, r$  分别是小星与大星 1, 大星 2, 质心的距离.  $m(\omega r)^2/2$  为离心势能 (centrifugal potential energy), 可以认为本来惯性系中有动能  $m(\omega r)^2/2$ , 非惯性系无了, 加到势能中去.

等效引力势 (effective gravitational potential)  $\Phi = U_{m,\text{eff}}/m$ . Lagrange 点: 平衡点 ( $\nabla\Phi = 0$  点), 共 5 个,  $L_1, L_2, L_3$  不稳定,  $L_4, L_5$  只在两大星质量比大时稳定. 等势面 (equipotential surface): 等  $\Phi$  面. Roche 瓣: 临界等势面 ( $L_1$  所在的等势面), 8 字绕两大星连线转一圈.

密近双星 (close binary),

- 不接双星 (detached binary): 零星充满 Roche 瓣,
- 半接双星 (semidetached binary): 一星充满 Roche 瓣,
- 相接双星 (contact binary): 两星充满 Roche 瓣.

主星 (primary star): 半接双星中不充满 Roche 瓣的, 计质量  $M_1$ , 次星 (secondary star): 半接双星中充满 Roche 瓣的, 计质量  $M_2$ <sup>1</sup>.

双星演化<sup>2</sup>:

1. 两颗小星星快乐地生活在一起.

---

<sup>1</sup>  $M_1$  和  $M_2$  关系不定.

<sup>2</sup> 课本中的特例, 双中等质量恒星, 星 1 初始质量大于星 2.

2. 星 1 充满 Roche 瓣, 物质流向星 2 并形成公共包层 (common envelope), 第一次公共包层阶段, 距离减小<sup>3</sup>.
3. 公共包层抛去, 星 1 白矮星, 中间阶段.
4. 星 2 充满 Roche 瓣, 物质流向星 1 并再次形成公共包层, 第二次公共包层阶段, 距离再次减小.
5. 公共包层抛去, 星 2 也白矮星, 引力辐射, 距离不断减小.
6. 大半径小质量白矮星充满 Roche 瓣, 在小半径大质量白矮星周围形成吸积盘 (accretion disk).
7. 超过 Chandrasekhar 极限, 野生的 Ia 型超新星出现了!

Ia 型超新星模型,

- 双简并模型 (double-degenerate model): 双白矮星, 主星吃次星, 主星内部核反应, 爆炸, 可能形成中子星.
- 单简并模型 (single-degenerate model): 单白矮星, 吃另一正常星, 彻底爆炸干净.

毫秒脉冲星 (millisecond pulsar), 吃伴星, 角动量增大加速旋转. 伴星可能是短周期扁轨道中子星或长周期圆轨道白矮星.

---

<sup>3</sup>大质量流向小质量, 距离减小; 小质量流向大质量, 距离增大.

## 第十九章 太阳系中的物理过程

### Physical Process in Solar System

潮汐力 (tidal force): 外引力差. 大潮 (spring tide), 小潮 (neap tide).

地球自转快于月球公转, 地球变扁方向超前<sup>1</sup>, 受减速力矩, 地球自转变慢, 地球自转角动量转移到月球公转角动量 (地月角动量守恒), 月球远离.

月球一对一同步旋转 (1-to-1 synchronous rotation).

海卫一逆行, 所以靠近海王星. 同步轨道 (synchronous orbit): 同步卫星轨道. 火卫一轨道在火星同步轨道内, 所以靠近火星.

Roche 极限: 内引力小于潮汐力, 碎掉<sup>2</sup>的极限距离.

---

<sup>1</sup>书上图 19.5.

<sup>2</sup>实际上可能因为内有其他力, 不碎.



## 第二十章 类地行星

### The Terrestrial Planets

略.





## 第二十一章 巨行星的领域

### The Realms of the Giant Planets

略.



## 第二十二章 太阳系小天体

# Minor Bodies of the Solar System

短周期彗星:  $< 200\text{yr}$ , Kuiper 带. 长周期彗星:  $> 200\text{yr}$ , Oort 云.

Kuiper 带:  $30^1\text{--}50\text{AU}$  盘.

Oort 云<sup>2</sup>: 彗核群, 内云  $3000\text{--}20000\text{AU}$  盘, 外云  $20000\text{--}100000\text{AU}$  球.

---

<sup>1</sup>海王星轨道.

<sup>2</sup>没人真的看到过.



## 第二十三章 行星系统形成

# Formation of Planetary Systems

Hill 半径: 小天体绕行星<sup>1</sup>的轨道周期等于小天体绕恒星的轨道周期. 小于 Hill 半径且相对速度较小则捕获.  $L_1$  在 Hill 半径处.

---

<sup>1</sup>课本上是讲行星系统形成, 所以写的是“星子”.



## 第二十四章 银河系

# The Milky Way Galaxy

银核 (Galactic bulge), 银盘 (Galactic disk), 银晕 (Galactic halo).

薄盘 (thin disk): 标高小, 年轻恒星 + 气体 + 尘埃, 恒星数密度大.

厚盘 (thick disk): 标高大, 年老恒星, 恒星数密度小.

$[\text{Fe}/\text{H}] := \log_{10}[(N_{\text{Fe}}/N_{\text{H}})/(N_{\text{Fe},\odot}/N_{\text{H},\odot})]$ .

年龄金属丰度关系: 一个趋势, 相似光谱型, 富金属年轻, 贫金属年老.





## 第二十五章 星系特性

# The Nature of Galaxies

Hubble 序列:

- 椭圆星系 (elliptical): E0–E7, 看起来圆到扁.
- 透镜状星系 (lenticular): S0/SB0, 盘状, 核和盘差不多大, 无旋臂.
- 旋涡星系 (spiral): Sa–Sc, 核球状, 旋臂紧到松.
- 棒旋星系 (barred spiral): SBa–SBc, 核棒状, 旋臂紧到松.
- 不规则星系 (irregular): Ir, 一堆奇葩.

de Vaucouleurs 轮廓: 旋涡星系核/大椭圆星系, (单位天区某频段) 星等 (赋以恰当零点后) 正比于星系中心距离的  $1/4$  次方. Sérsic 轮廓:  $1/n$  次方.

Tully–Fisher 关系: 旋涡星系, 光度–最大视向速度关系, 光度用某波段绝对星等表示, 最大视向速度测不同频率的流量来定.

Faber–Jackson 关系: 椭圆星系, (某波段) 光度正比于中心速度弥散的 4 次方.

Lin–Shu 密度波理论: 莫名其妙能行的堵车论.



## 第二十六章 星系演化

### Galactic Evolution

动力学摩擦 (dynamical friction): 一个掉进一堆里, 一堆都受到引力, 在一个后面聚集, 反给一个以引力.



## 第二十七章 宇宙结构

# The Structure of the Universe

宇观尺度:  $> 3 \times 10^8 \text{ ly}$ .

宇宙学原理: 时空在宇观尺度下是空间均匀且各项同性的.

宇宙静系: 认为时空在宇观尺度下空间均匀且各项同性的所有观者组成的参考系. 宇宙静系被认为是唯一的.

共动 (cosmoving) 坐标系: 使得所有宇宙静系观者坐标不变的坐标系.

固有距离: “真实距离”. 共动距离: 共动坐标系中的“坐标差”.

Hubble 定律: 星系退行速度和星系固有距离成正比. 因为在宇宙静系中, 宇宙静系观者的退行速度和其固有距离严格成正比, 所以这般表述的 Hubble 定律在统计意义上是绝对成立的.<sup>1</sup> 若星系固有距离足够大, 星系退行速度是不是超光速啦?<sup>2</sup>

Hubble 参数: 宇宙静系观者的退行速度和其固有距离的比. Hubble 常数: 今天的 Hubble 参数. 天文学家说 Hubble 常数, 即非常数, 是名常数.

空间膨胀/收缩, 即宇宙静系观者的固有距离变大/变小, 即共动坐标系下的度规分量 (绝对值) 变大/变小.

退行速度 (recessional velocity): 星系处的宇宙静系观者的速度, 或者说知道距离后用 Hubble 定律算出的径向速度, 或者说“空间本身膨胀/收缩的速度”. 本动速度 (peculiar velocity): 星系相对于星系处的宇宙静系观者的速度, 或者说星系速度和星系退行速度的差, 或者说“星系相对于空间运动的速度”. Hubble 流: 脑壳里设想的, 星系因退行速度而有的运动, 或者说星

---

<sup>1</sup>如果红移非常大, 测量距离和红移后能修正距离得到固有距离, 但得到的是那时刻的固有距离和那时刻的红移, 比例系数 (Hubble 常数) 不同, 这样 Hubble 定律观测上就没法成立了. 况且只有红移很小时宇宙学红移才等于 Doppler 红移.

<sup>2</sup>答案请看梁师爷书第 372 页.

系跟随空间本身的膨胀/收缩而产生的运动.

示距天体 (distance indicator): 可以用来测距的东西.

宇宙微波背景辐射 (cosmic microwave background, CMB): 大爆炸后温度下降到一定值, 原子核与电子结合呈中性原子, 光子几乎不与中性原子作用, 因此发生光子退耦 (decoupling), 即光子的平均自由程变得极大<sup>3</sup>, 自由传播, 产生几乎各项同性的微波辐射. 已知退耦时温度大约 3000K, 为何现在 CMB 温度大约 3K?<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>除以光速后远大于宇宙当今年龄.

<sup>4</sup>相信不用看师爷书第 388 页也能正确回答这个问题呢~