



LABORATORIO DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS

IMPORTACIÓN – EXPORTACIÓN

Av. B. Ader 3205 – (1605) Munro – Buenos Aires – República Argentina

Tel.: 0054 11 4762-5163 / 1898 – Fax: 0054 11 4762-1630

E-mail: [info@chinfield.com](mailto:info@chinfield.com) - [www.chinfield.com](http://www.chinfield.com)

## FICHA TÉCNICA

**Nombre del producto: ARTIDEXA CHINFIELD**

### FÓRMULA:

Dexametasona 21 Fosfato	2.000 mg
Agentes de formulación c.s.p.	100 ml

### ESPECIE DE DESTINO:

Equinos, caninos y felinos.

### INDICACIONES:

Neuritis, tendinitis, bursitis, artritis, mialgias, eczemas, shock anafiláctico y/o traumático.

### PRESENTACIÓN:

El producto es presentado en un estuche que contiene cinco (5) frascos ampolla de 2 ml cada uno.

### APARIENCIA:

Solución límpida, incolora.

### POSOLOGÍA, DOSIS y VÍAS de ADMINISTRACIÓN:

Equinos

0,5 ml c/125 kpV por vía endovenosa, intramuscular, intraarticular, periarticular, intrasínovial.

Caninos – Felinos

0,5 ml c/5 kpV por vía endovenosa, subcutánea e intramuscular.

En caso de shock anafiláctico: 0.25 ml/kpV por vía endovenosa para todas las especies.

### CONTRAINDICACIONES:

El producto está contraindicado en animales con historia de hipersensibilidad al principio activo y/o a los componentes de la fórmula.

Infecciones sistémicas agudas (a menos que esté instaurada una terapia antimicrobiana específica).

No administrar en caso de aplicación de vacunas de organismos atenuados, ni en procesos de plena cicatrización de heridas importantes dado que retarda el proceso cicatricial.

No aplicar en caso de laminitis, ni en procesos articulares sépticos o en caso de fracturas articulares por la vía intraarticular.



LABORATORIO DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS

IMPORTACIÓN – EXPORTACIÓN

Av. B. Ader 3205 – (1605) Munro – Buenos Aires – República Argentina

Tel.: 0054 11 4762-5163 / 1898 – Fax: 0054 11 4762-1630

E-mail: [info@chinfield.com](mailto:info@chinfield.com) - [www.chinfield.com](http://www.chinfield.com)

#### **EFFECTOS COLATERALES:**

La Dexametasona sufre interacciones con Anfotericina B o Diuréticos depletors del potasio: Su uso conjunto puede provocar hipopotasemia.

Glucósidos digitálicos: Pueden aumentar la posibilidad de intoxicación digitálica asociada con hipopotasemia.

Ácido Acetilsalicílico: debe ser utilizado cuidadosamente, especialmente en estados de hipoprotrombinemia.

Isoniazida: su efectividad antituberculosa puede disminuir por aumento del metabolismo hepático, la excreción de Isoniazida o ambos, lo que provoca una disminución de la concentración plasmática de Isoniazida, especialmente en aquellos pacientes que son acetiladores rápidos.

#### **ADVERTENCIAS:**

Mantener fuera del alcance de los niños y de animales domésticos.

Centro nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160, Buenos Aires, Argentina.

Debe ser aplicado por médico veterinario. Chinfield S.A. no se responsabiliza por los inconvenientes que puedan ocasionar una inadecuada utilización y/o conservación del producto.

#### **CONSERVACIÓN:**

Por debajo de 30 °C y al abrigo de la luz.

No exponer a temperaturas de refrigeración. No congelar.

VENTA CON RECETA VETERINARIA

**Fabricado y Distribuido por: Chinfield S.A. Av. Ader 3205, Munro, Buenos Aires, Argentina**

**E-Mail: [asuntosregulatorios@chinfield.com](mailto:asuntosregulatorios@chinfield.com)**

**[www.chinfield.com](http://www.chinfield.com)**