



LABORATORIO DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS

IMPORTACIÓN – EXPORTACIÓN

Av. B. Ader 3205 – (1605) Munro – Buenos Aires – República Argentina

Tel.: 0054 11 4762-5163 / 1898 – Fax: 0054 11 4762-1630

E-mail: info@chinfield.com - www.chinfield.com

FICHA TÉCNICA

Nombre del producto: TRIAMCINOLONA CHINFIELD®

FÓRMULA:

Triamcinolona Acetonide	0,600 g
Agentes de formulación c.s.p.	100,0 ml

ESPECIE DE DESTINO:

Equinos. Bovinos, Caninos, Felinos

INDICACIONES:

Está indicado en prurito, eczema, procesos alérgicos, celulitis, artritis, sinovitis, bursitis, tenosinovitis, síndrome reumatoide, blefaritis, cetosis bovina, hepatitis, linfosarcoma, procesos inflamatorios asépticos, inflamación traumática.

PRESENTACIÓN:

Estuche de cartulina impreso, conteniendo un frasco ampolla, con etiqueta y prospecto.
Contenido: 5 ml.

APARIENCIA:

Suspensión viscosa blanca.

POSOLOGÍA, DOSIS y VÍAS de ADMINISTRACIÓN:

Bovinos, Caninos y Felinos: Subcutánea, Intramuscular o Intrasinovial

Equinos: Intramuscular o Intrasinovial (NO SUBCUTANEA)

Dosis:

Equinos	0,6 ml cada 100 k.p.v
Bovinos	0,6 ml cada 100 k.p.v
Caninos	0,4 ml cada 10 k.p.v
Felinos	0,3 ml totales

CONTRAINDICACIONES:

En casos de hipersensibilidad. No administrar por vía endovenosa.

No usar en procesos sépticos a menos que esté instaurada la correspondiente terapia antimicrobiana.

No utilizar en presencia de infecciones por hongos. No debe utilizarse en pacientes con tuberculosis activa o dudosamente inactiva exceptuando cuando se utiliza en conjunción con drogas tuberculostáticas. No utilizar cuando se apliquen vacunas de organismos atenuados.

En casos de amiloidosis, sarna, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, colitis ulcerativa.



LABORATORIO DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS

IMPORTACIÓN – EXPORTACIÓN

Av. B. Ader 3205 – (1605) Munro – Buenos Aires – República Argentina

Tel.: 0054 11 4762-5163 / 1898 – Fax: 0054 11 4762-1630

E-mail: info@chinfield.com - www.chinfield.com

No aplicar cuando esté en pleno proceso de cicatrización alguna herida importante dado que esta droga retarda la reparación de los tejidos. No utilizar en hembras durante el último tercio de la gestación por la posibilidad de provocar parto prematuro. En equinos, en presencia de úlceras gástricas y/o duodenales. No utilizar en casos de laminitis. No aplicar intraarticular en procesos articulares sépticos ni en casos de fracturas articulares. En animales diabéticos.

EFECTOS COLATERALES:

Hipercorticismo producidos por dosis elevadas continuas de corticoides durante un tiempo prolongado.

Hipocorticismo por la supresión súbita de la droga después de un tratamiento prolongado.

Retardo de los procesos cicatrizales.

En reproducción: no utilizar en hembras gestantes en el último tercio de la gestación por la posibilidad de producir parto prematuro no deseado.

Altas dosis y tratamientos largos pueden producir o agravar cuadros de laminitis.

Altas dosis y tratamientos largos pueden incrementar la producción de ácido clorhídrico y pepsina en el estómago con la consecuente producción de úlceras gástricas.

ADVERTENCIAS:

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Centro nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160. Buenos Aires, Argentina.

Debe ser aplicado por médico veterinario. Chinfield S.A. no se responsabiliza por los inconvenientes que puedan ocasionar una inadecuada utilización y/o conservación del producto.

CONSERVACIÓN:

Por debajo de 30 °C y al abrigo de la luz. No exponer a temperaturas de refrigeración. No congelar.

VENTA CON RECETA VETERINARIA.

Fabricado y Distribuido por: Chinfield S.A. Av. Ader 3205, Munro, Buenos Aires, Argentina

E-Mail: asuntosregulatorios@chinfield.com

www.chinfield.com