



LABORATORIO DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS

IMPORTACIÓN – EXPORTACIÓN

Av. B. Ader 3205 – (1605) Munro – Buenos Aires – República Argentina

Tel.: 0054 11 4762-5163 / 1898 – Fax: 0054 11 4762-1630

E-mail: info@chinfield.com - www.chinfield.com

FICHA TÉCNICA

Nombre del producto: DEXAMETASONA COMPUESTA CHINFIELD®

FÓRMULA:

Dexametasona base	450	mg
Dexametasona 21 Fosfato	450	mg
Triamcinolona	100	mg
Agentes de formulación c.s.p.	100	ml

ESPECIE DE DESTINO:

Equinos.

INDICACIONES:

Procesos inflamatorios de cualquier etiología y localización, especialmente los del colágeno.

Estados alérgicos. Enfermedades reumáticas. Dolores articulares agudos y crónicos. Dolores al estiramiento.

PRESENTACIÓN:

Estuche de cartulina impreso, conteniendo un frasco ampolla, con etiqueta y prospecto.

Contenido: 10 ml.

APARIENCIA:

Suspensión viscosa blanca.

POSOLÓGIA, DOSIS y VÍAS de ADMINISTRACIÓN:

Aplicación parenteral: intramuscular, intraarticular, intrabúrsica.

1 ml por cada 100 k.p.v. o según indicación del Médico Veterinario.

CONTRAINDICACIONES:

En casos de hipersensibilidad. En infecciones sistémicas agudas (a menos que esté instaurada terapia antimicrobiana específica). No utilizar cuando se apliquen vacunas de organismos atenuados.

En casos de amiloidosis, sarna, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, colitis ulcerativa y úlceras gástricas y duodenales. En infecciones sistémicas por hongos.

No aplicar cuando esté en pleno proceso de cicatrización alguna herida importante dado que esta droga retarda la reparación. En caso de laminitis.

No aplicar intraarticular en procesos artríticos sépticos ni en casos de fracturas articulares.

No administrar a animales en su tercer trimestre de gestación puesto que la dexametasona podría provocar inducción al parto no deseado, aunque las yeguas son muy resistentes a este efecto, ya que se requieren por lo menos dosis de 100 mg de dexametasona IM por tres días consecutivos para lograrlo, debido a que esta droga no atraviesa la barrera placentaria en esta especie.

EFFECTOS COLATERALES:



LABORATORIO DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS

IMPORTACIÓN – EXPORTACIÓN

Av. B. Ader 3205 – (1605) Munro – Buenos Aires – República Argentina

Tel.: 0054 11 4762-5163 / 1898 – Fax: 0054 11 4762-1630

E-mail: info@chinfield.com - www.chinfield.com

Podría acelerar un estado de infección latente no detectado. Disminución de eosinófilos y linfocitos disminuyendo inmunidad mediada por células. Disminución de T3 y T4. Aumento de ácido Clorhídrico gástrico.

Hipercorticismo procluido por dosis elevadas continuas de corticoides durante un tiempo prolongado.

Hipocorticismo por la supresión súbita de la droga después de un tratamiento prolongado. Retardo de los procesos cicatrizales.

ADVERTENCIAS:

Mantener fuera del alcance de los niños y de animales domésticos.

Centro nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160. Buenos Aires, Argentina.

Debe ser aplicado por médico veterinario.

Chinfield S.A. no se responsabiliza por los inconvenientes que puedan ocasionar una inadecuada utilización y/o conservación del producto.

CONSERVACIÓN:

Por debajo de 30 °C y al abrigo de la luz. No exponer a temperaturas de refrigeración. No congelar.

VENTA CON RECETA VETERINARIA.

Fabricado y Distribuido por: Chinfield S.A. Av. Ader 3205, Munro, Buenos Aires, Argentina

E-Mail: asuntosregulatorios@chinfield.com

www.chinfield.com