



LABORATORIO DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS
IMPORTACIÓN – EXPORTACIÓN
Av. B. Ader 3205 – (1605) Munro – Buenos Aires – República Argentina
Tel.: 0054 11 4762-5163 / 1898 – Fax: 0054 11 4762-1630
E-mail: info@chinfield.com - www.chinfield.com

FICHA TECNICA

Nombre del producto: NABOLIC STRONG®

FÓRMULA:

Estanozolol 5000 mg
Agentes de formulación c.s.p. 100 ml

ESPECIE DE DESTINO:

Equinos.

INDICACIONES:

Está indicado para la recuperación de organismos deteriorados por edad avanzada, enfermedades y convalecencia de las mismas, lesiones traumáticas o por trabajo excesivo. Es útil aliado en casos de fracturas, afecciones ortopédicas, distrofias musculares y deficiencias óseas en general. También está indicado como estimulante del apetito y para incrementar la potencia y la vitalidad.

PRESENTACION:

El producto es presentado en frascos de vidrio incoloro de 30 ml.

APARIENCIA:

Suspensión viscosa color blanco.

POSOLOGIA, DOSIS y VIAS de ADMINISTRACION:

1 o 2 ml cada 100 kpv, según intervalo de aplicación:
1 dosis por semana: 1 ml por 100 kpv
1 dosis cada 15 días: 2 ml por 100 kpv

Vías de administración: Intramuscular.

CONTRAINDICACIONES:

No sobredosificar.
No administrar a yeguas gestantes.
No administrar a padrillos en época de reproducción
No administrar a equinos destinados a consumo humano.
No administrar a animales en crecimiento ya que puede detener el mismo por acelerar el cierre epifisario, en caso de ser necesario por casos de desnutrición, convalecencia de enfermedades infecciosas, trastornos en el crecimiento, etc., consultar al médico veterinario. Es recomendable, en estos casos, controles radiográficos periódicos (30 días) de cartílagos epifisarios de crecimiento a fin de constatar que no se produzca osificación prematura de los mismos. Esta contraindicación no existe para caballos de más de 24 meses de edad.
No administrar en casos de tumoraciones malignas de cualquier etiología.



LABORATORIO DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS

IMPORTACIÓN – EXPORTACIÓN

Av. B. Ader 3205 – (1605) Munro – Buenos Aires – República Argentina

Tel.: 0054 11 4762-5163 / 1898 – Fax: 0054 11 4762-1630

E-mail: info@chinfield.com - www.chinfield.com

Los animales con deficiencias renales y/o cardiacas deberán ser controlados por el Médico Veterinario, mientras dure el tratamiento ya que la terapia anabólica, puede estar acompañada de una retención de sodio y agua.

EFECTOS COLATERALES:

No posee efectos colaterales ni incompatibilidades, aplicado y dosificado según lo indicado. A las dosis indicadas no se detectaron efectos colaterales indeseables.

Estos efectos secundarios pueden ponerse de manifiesto en caso de sobredosificación y en tratamientos prolongados, apareciendo signos de virilización, hepatotoxicidad de tipo colestático cuya manifestación clínica es anorexia, trastornos cutáneos, constipación, halitosis, flatulencia, timpanismo, etc., y bioquímicamente caracterizado por aumento de la fosfatasa alcalina, bilirrubina y colesterol total, glutámico transaminasa –GGT-. Es posible la retención de sodio y agua con producción de edemas como así también la alopecia difusa con localización en la parrilla costal. Estos procesos son reversibles en la medida que se deja de suministrar el fármaco.

En cuanto a incompatibilidades podemos mencionar a la hormona adrenocorticotrófica y corticoides, debido a que un uso prolongado de estas sustancias producen un catabolismo proteico exagerado.

ADVERTENCIAS:

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Centro nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160. Buenos Aires, Argentina.

Debe ser aplicado por médico veterinario. Chinfield S.A. no se responsabiliza por los inconvenientes que puedan ocasionar una inadecuada utilización y/o conservación del producto.

CONSERVACIÓN:

Por debajo de 30 °C y al abrigo de la luz. No refrigerar. No congelar.

VENTA BAJO RECETA MÉDICA VETERINARIA.

Fabricado y Distribuido por: Chinfield S.A. Av. Ader 3205, Munro, Buenos Aires, Argentina

E-Mail: asuntosregulatorios@chinfield.com // www.chinfield.com