

1. Obtener la Forma clausal equivalente de las siguientes formulas:

- a) $\forall x (\neg P(x) \vee \exists y (P(y) \wedge Q(y)))$
- b) $\exists x \forall y (P(x, y) \wedge Q(x) \wedge \neg R(y))$
- c) $\forall x (P(x) \rightarrow \neg \forall y (Q(x, y) \rightarrow \exists z P(z)))$

Soluciones

- a)
 - $\forall x (\neg P(x) \vee \exists y (P(y) \wedge Q(y)))$
 - $\forall x \exists y (\neg P(x) \vee (P(y) \wedge Q(y)))$
 - $\forall x (\neg P(x) \vee (P(f(x)) \wedge Q(f(x))))$
 - $\neg P(x) \vee (P(f(x)) \wedge Q(f(x)))$
 - $(\neg P(x) \vee P(f(x))) \wedge (\neg P(x) \vee Q(f(x)))$
- b)
 - $\exists x \forall y (P(x, y) \wedge Q(x) \wedge \neg R(y))$
 - $\forall y (P(c, y) \wedge Q(c) \wedge \neg R(y))$
 - $P(c, y) \wedge Q(c) \wedge \neg R(y)$
- c)
 - $\forall x (P(x) \rightarrow \neg \forall y (Q(x, y) \rightarrow \exists z P(z)))$
 - $\forall x (\neg P(x) \vee \neg \forall y (Q(x, y) \rightarrow \exists z P(z)))$
 - $\forall x (\neg P(x) \vee \neg \forall y (\neg Q(x, y) \vee \exists z P(z)))$
 - $\forall x (\neg P(x) \vee \exists y \neg (\neg Q(x, y) \vee \exists z P(z)))$
 - $\forall x (\neg P(x) \vee \exists y (Q(x, y) \wedge \neg \exists z P(z)))$
 - $\forall x (\neg P(x) \vee \exists y (Q(x, y) \wedge \forall z \neg P(z)))$
 - $\forall x \exists y \forall z (\neg P(x) \vee (Q(x, y) \wedge \neg P(z)))$
 - $\forall x \forall z (\neg P(x) \vee (Q(x, f(x)) \wedge \neg P(z)))$
 - $\neg P(x) \vee (Q(x, f(x)) \wedge \neg P(z))$
 - $(\neg P(x) \vee Q(x, f(x))) \wedge (\neg P(x) \vee \neg P(z))$

2. ¿Se deduce $(p \wedge q)$ de $(\neg p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow \neg q)$? Contestar utilizando el método de resolución para la lógica proposicional.

Solución

- 1) $p \vee q$
- 2) $\neg p \vee q$
- 3) $p \vee \neg q$
- 4) $\neg p \vee \neg q$
- 5) \emptyset (4 y 1)

3. Demuestre por resolución la validez del siguiente argumento: «Si continúa la lluvia el río aumentará. Si el río aumenta entonces el puente será arrastrado. Si la continuación de la lluvia hace que el puente sea arrastrado entonces un solo camino no será suficiente para la ciudad. O bien un solo camino es suficiente para la ciudad, o los ingenieros han cometido un error. Por lo tanto los Ingenieros han cometido un error».

Solución Sean:

- $ll \equiv$ «continúa la lluvia».
- $c \equiv$ «un camino será suficiente».
- $r \equiv$ «el río aumentará».
- $e \equiv$ «los ingenieros han cometido un error».
- $p \equiv$ «el puente será arrastrado».

Nuestro argumento es:

$$(ll \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow p) \wedge ((ll \rightarrow p) \rightarrow \neg c) \wedge (c \vee e) \rightarrow e$$

En forma clausal:

- $(ll \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow p) \wedge ((ll \rightarrow p) \rightarrow \neg c) \wedge (c \vee e)$
- $(\neg ll \vee r) \wedge (\neg r \vee p) \wedge (\neg(\neg ll \vee p) \vee \neg c) \wedge (c \vee e)$
- $(\neg ll \vee r) \wedge (\neg r \vee p) \wedge ((ll \wedge \neg p) \vee \neg c) \wedge (c \vee e)$
- $(\neg ll \vee r) \wedge (\neg r \vee p) \wedge (ll \vee \neg c) \wedge (\neg p \vee \neg c) \wedge (c \vee e)$

Agregamos $\neg e$ y aplicamos resolucion:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1) $\neg ll \vee r$ | 7) c (5 y 6) |
| 2) $\neg r \vee p$ | 8) $\neg p$ (7 y 4) |
| 3) $ll \vee \neg c$ | 9) $\neg r$ (8 y 2) |
| 4) $\neg p \vee \neg c$ | 10) $\neg ll$ (9 y 1) |
| 5) $c \vee e$ | 11) $\neg c$ (10 y 3) |
| 6) $\neg e$ | 12) \emptyset (11 y 7) |

4. Determinar si las siguientes fórmulas son lógicamente válidas usando resolución, es decir, la formula implicada es consecuencia lógica de la primera:

- a) $\exists x \forall y R(x, y) \rightarrow \forall y \exists x R(x, y)$
b) $\exists x P(x) \wedge \forall x Q(x) \rightarrow \exists x (P(x) \wedge Q(x))$

Soluciones

- a) Pasando a forma clausal:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ▪ $\exists x \forall y R(x, y)$ | ▪ $\forall y \exists x R(x, y)$ |
| ▪ $\forall y R(c, y)$ | ▪ $\forall y R(f(y), y)$ |
| ▪ $\boxed{R(c, y)}$ | ▪ $\boxed{R(f(y), y)}$ |

Resolviendo:

- 1) $R(c, y)$
- 2) $\neg R(f(y), y)$
- 3) No es posible unificar.

b) Pasando a forma clausal:

$$\begin{array}{ll} \blacksquare \exists x P(x) \wedge \forall x Q(x) & \blacksquare \exists x (P(x) \wedge Q(x)) \\ \blacksquare \boxed{P(c) \wedge Q(x)} & \blacksquare \boxed{P(c) \wedge Q(c)} \end{array}$$

Resolviendo:

- 1) $P(c) \wedge Q(x)$
- 2) $\neg(P(c) \wedge Q(c))$
- 3) \emptyset (1 y 2 $[c/x]$)

5. Demostrar utilizando resolución, que H es consecuencia lógica de F y G , es decir, $F \wedge G \wedge \neg H$ es insatisfactible; donde:

$$\begin{array}{ll} \blacksquare F \equiv \exists x (P(x) \wedge \forall y (D(y) \rightarrow Q(x, y))) \\ \blacksquare G \equiv \forall x (P(x) \wedge \forall y (C(y) \rightarrow \neg Q(x, y))) \\ \blacksquare H \equiv \forall x (D(x) \rightarrow \neg C(x)) \end{array}$$

Solución Pasando a forma clausal:

$$\begin{array}{ll} \blacksquare \exists x (P(x) \wedge \forall y (D(y) \rightarrow Q(x, y))) \\ \blacksquare \exists x (P(x) \wedge \forall y (\neg D(y) \vee Q(x, y))) \\ \blacksquare \exists x (P(x) \wedge (\neg D(y) \vee Q(x, y))) \\ \blacksquare \boxed{P(c) \wedge (\neg D(y) \vee Q(c, y))} \\ \blacksquare \forall x (P(x) \wedge \forall y (C(y) \rightarrow \neg Q(x, y))) \\ \blacksquare \forall x (P(x) \wedge \forall y (\neg C(y) \vee \neg Q(x, y))) \\ \blacksquare \boxed{P(x) \wedge (\neg C(y) \vee \neg Q(x, y))} \\ \blacksquare \forall x (D(x) \rightarrow \neg C(x)) \\ \blacksquare \forall x (\neg D(x) \vee \neg C(x)) \\ \blacksquare \boxed{\neg D(x) \vee \neg C(x)} \end{array}$$

Resolviendo:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 1) $P(c)$ | 5) $\neg(\neg D(x) \vee \neg C(x))$ |
| 2) $\neg D(y) \vee Q(c, y)$ | 6) $\neg D(y) \vee \neg C(y)$ (2 y 4 $[c/x]$) |
| 3) $P(x)$ | 7) \emptyset (5 y 6 $[x/y]$) |
| 4) $\neg C(y) \vee \neg Q(x, y)$ | |

6. Probar usando resolución el conocido ejemplo de «Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre entonces Sócrates es mortal».

Solución

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| | 3) $\neg M(s)$ |
| 1) $\neg H(x) \vee M(x)$ | 4) $M(s)$ (1 y 2 $[s/x]$) |
| 2) $H(s)$ | 5) \emptyset (3 y 4) |

7. Dados los siguientes hechos y relaciones,

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| a) Un ungulado es un animal. | g) La rana vive en la tierra y en el agua. |
| b) Un pez es un animal. | |
| c) Una cebra es un ungulado. | h) Los peces viven en el agua. |
| d) Un arenque es un pez. | |
| e) Un tiburón es un pez. | i) Un animal que vive en el agua puede nadar. |
| f) La cebra vive en la tierra. | |

utilizar resolución para contestar si existen animales que pueden nadar. Encontrar a partir del relato, que animal/es pueden nadar.

Solución

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--|
| ■ $U(x) \rightarrow A(x)$ | ■ $V(cebra, tierra)$ | |
| ■ $P(x) \rightarrow A(x)$ | ■ $V(rana, tierra)$ | |
| ■ $U(cebra)$ | ■ $V(rana, agua)$ | |
| ■ $P(arenque)$ | ■ $P(x) \rightarrow V(x, agua)$ | |
| ■ $P(tiburon)$ | ■ $(A(x) \wedge V(x, agua)) \rightarrow N(x)$ | |
| | ■ $\therefore \exists x A(x) \wedge N(x)$ | |

- | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1) $\neg U(x) \vee A(x)$ | 12) $\neg P(x) \vee \neg N(x)$ (11 y 2) |
| 2) $\neg P(x) \vee A(x)$ | 13) $\neg N(\text{arenque})$ (4 y 12
[arenque/x]) |
| 3) $U(\text{cebra})$ | 14) $V(\text{arenque}, \text{agua})$ (4 y 9
[arenque/x]) |
| 4) $P(\text{arenque})$ | 15) $\neg A(\text{arenque}) \vee N(\text{arenque})$
(10 y 14 [arenque/x]) |
| 5) $P(\text{tiburon})$ | 16) $A(\text{arenque})$ (2 y 4
[arenque/x]) |
| 6) $V(\text{cebra}, \text{tierra})$ | 17) $N(\text{arenque})$ (15 y 16) |
| 7) $V(\text{rana}, \text{tierra})$ | 18) \emptyset (13 y 17) |
| 8) $V(\text{rana}, \text{agua})$ | |
| 9) $\neg P(x) \vee V(x, \text{agua})$ | |
| 10) $\neg A(x) \vee \neg V(x, \text{agua}) \vee N(x)$ | |
| 11) $\neg A(x) \vee \neg N(x)$ | |

Pueden nadar la rana, el tiburón y el arenque.

8. Considérense las siguientes sentencias:

- | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| ■ A John le gusta toda clase de comida. | ■ y no le mate es comida. |
| ■ Las manzanas son comida. | ■ Bill come cacahuets y aún está vivo. |
| ■ El pollo es comida. | ■ Sue come todo lo que come Bill. |
| ■ Cualquier cosa que uno coma | |

Utilizar resolución para mostrar que a John le gustan los cacahuets.

Solución COMPLETAR.

9.

- Juan tiene un perro y Pedro tiene un gato.
- Todos los que tienen una mascota aman a los animales
- Nadie que ame a los animales los mata.
- Juan, Pedro o María mataron a la gata de Luis que se llama Iris.

Probar que María mató a Iris, usando resolución. Analizar las adaptaciones necesarias para resolver utilizando PROLOG.

Solución

```
animal(perro).  
animal(gato).  
tiene(juan,perro).  
tiene(pedro,gato).
```

10.

- Frodo era un Hobbit.
- Sam era un Hobbit.
- Todos los Hobbits vivían en la Comarca
- Todos los que vivían en la Comarca vivían en la Tierra Media.
- Todos los que vivían en la tie-
- rra Media eran leales a Sauron o lo odiaban.
- Todos los seres son leales a alguien.
- Uno sólo intenta destruir a alguien a quien no es leal.
- Frodo intentó destruir a Saurón.

Probar si odia Frodo a Sauron aplicando resolución. Utilizando un programa en PROLOG contestar si Alguien que vive en la Comarca odia a Sauron.

11.

- Los miembros del club de bridge de la calle Elm son Joe, Sally, Bill y Ellen.
- Joe está casado con Sally.
- Bill es hermano de Ellen
- El cónyuge de cada persona casada del club también está en el club.
- La última reunión fue en la casa de Joe

A partir de estos hechos (y algunos hechos de conocimiento del dominio) determine usando resolución si “La última reunión fue en casa de Sally.”