

# 1.

Supongamos que un médico pediatra realiza un primer diagnóstico observando si hay Fiebre, Dolor de garganta, Sarpullido.

- Si hay sólo fiebre media o alta, se puede pensar en una virosis de origen dudoso y se observa al paciente durante las siguientes 24 hs. Medicar con antitérmico.
- Si hay fiebre alta y dolor de garganta intenso, se puede pensar en una laringitis. Medicar con antitérmico/analgésico.
- Si hay fiebre alta y dolor de garganta y sarpullido rojo de textura áspera como la del papel de lija, se debe pensar en escarlatina (*Streptococcus* grupo A, escarlatina). Medicar con antibiótico.

Los valores normales de fiebre son desde 36 grados por debajo (alrededor) de 37 grados, entre 37 y 38 se puede pensar en fiebre media, a partir de los 39 grados, fiebre francamente alta.

Los niveles de dolor de garganta son evaluados por el paciente con una escala de 0 a 1: Bajo-Medio-Alto conjuntos separados en forma regular según las formas semi-trapezoidal inferior, triangular, semi-trapezoidal superior, respectivamente.

El aspecto del sarpullido se puede medir entre color y textura del 1 al 10 por un experto según las formas semi-trapezoidal inferior (poco color/textura), triangular (color o textura visible), semi-trapezoidal superior (color y textura importante)

## Identificar:


1. Las variables lingüísticas.
2. Los conjuntos borrosos. Dibujarlos.
3. Las reglas borrosas.

**Predecir la acción del pediatra según observe las siguientes entradas:**


4. Fiebre de 38 grados, dolor de garganta agudo (del 1 al 10 el paciente dice 7 durante el día y 9 al atardecer), no hay sarpullido. Qué operaciones borrosas utiliza?
5. Fiebre de 39 grados, dolor de garganta medio (del 1 al 10 el paciente dice 6 durante el día y 7 al atardecer), hay sarpullido rojo tipo lija (del 1 al 10 el médico observa un 7). Qué operaciones borrosas utiliza?

### Solución


1. Son variables lingüísticas: «fiebre», «dolor de garganta» y «aspecto del sarpullido».
- 2.



— Fiebre Normal  
— Fiebre Media  
— Fiebre Alta



— Dolor bajo  
— Dolor medio  
— Dolor alto



3.

- $\text{solo fiebre} : M \Rightarrow \text{virosis} \wedge \text{antibiotico}$
- $\text{solo fiebre} : A \Rightarrow \text{virosis} \wedge \text{antibiotico}$
- $\text{fiebre} : A \wedge \text{dolor} : A \Rightarrow \text{laringitis} \wedge \text{antitermico/analgesico}$
- $\text{fiebre} : A \wedge \text{dolor} : M \wedge \text{sarpullido} : I \Rightarrow \text{escarlatina} \wedge \text{antibiotico}$

4. Observemos que las primeras dos reglas no intervienen en nuestra decisión pues además de fiebre también hay dolor. Para las restantes tenemos  $\text{alta}(38) = 0$  por lo cual tampoco intervienen. Por lo tanto no podemos tomar una decisión con nuestro modelo.
5. Observemos que las primeras dos reglas no intervienen en nuestra decisión pues además de fiebre también hay dolor. Para las restantes tenemos:


- $normal(39) = 0$ ;  $media(39) = 0$ ;  $alta(39) = 1$ .
- $medio(6) = 0,8$ ;  $alto(6) = 0,7$ ;  $medio(7) = 0,6$ ;  $alto(7) = 1$ .
- $intenso(7) = 0,9$ .

Para la tercer regla durante el día, usando la T-norma mínimo obtenemos un disparo de  $\min(1; 0,7) = 0,7$  y por el atardecer  $\min(1; 0,6) = 0,6$ .

Para la cuarta regla durante el día  $\min(1; 0,8; 0,9) = 0,9$  y durante el atardecer  $\min(1; 0,6; 0,9) = 0,6$ .

## 2.

Consideremos el siguiente modelo de conocimiento borroso que vincula el «índice de masa corporal» ICM ( $peso/altura^2$ ), la presión arterial y el riesgo a padecer enfermedades cardíacas.



Calcule el Grado de Veracidad de las reglas para los valores:

1. ICM = 55; Presión = 25.
2. ICM = 55; Presión = 15.

- Si el ICM es Alto y la Presión NO es Media THEN ... hay riesgo.
- Si el ICM es Medio\_alto y la Presión es Alta THEN ... hay riesgo.

Utilice distintos operadores AND.

### Solución

1. Observemos que:

- $alto(55) = 0,6875$ .
- $media(25) = 0,335$ .
- $medio\_alto(55) = 0,278$ .
- $alta(25) = 0,665$ .

Luego, usando la T-norma mínimo tenemos que el grado de veracidad de la primer regla es  $\min\{0,6875, 1 - 0,335\} = 0,665$  y el de la segunda  $\min\{0,278; 0,665\} = 0,278$ .

2. Observemos que:


- $media(15) = 1$ .
- $alta(15) = 0$ .

Luego, usando la T-norma mínimo tenemos que el grado de veracidad de la primer regla es  $\min\{0,6875, 1 - 1\} = 0$  y el de la segunda  $\min\{0,278; 0\} = 0$ .

### 3.

Nuevamente, consideremos el siguiente modelo de conocimiento borroso que vincula el ICM, la presión arterial y el riesgo a padecer enfermedades cardíacas.

1.  $bajo \Rightarrow alto$ .
2.  $medio\_bajo \wedge baja \Rightarrow bajo$ .
3.  $medio\_bajo \wedge media \Rightarrow bajo$ .
4.  $medio\_bajo \wedge alta \Rightarrow medio$ .
5.  $medio\_alto \wedge baja \Rightarrow medio$ .
6.  $medio\_alto \wedge media \Rightarrow medio$ .
7.  $medio\_alto \wedge alta \Rightarrow alto$ .
8.  $alta \Rightarrow alto$ .



1. Determine el grado de veracidad o disparo de cada una de las reglas.
2. Estime el Riesgo según el método de inferencia MaxMin y defuzzificación según el valor medio del máximo.
3. Analice si se puede reescribir el modelo en un número de reglas menor admitiendo el uso de más operadores lógicos. Qué cambios haría?

**Solución** COMPLETAR.

#### 4. COMPLETAR

**Solución** COMPLETAR.

#### 5. COMPLETAR

**Solución** COMPLETAR.

## 6. COMPLETAR

Solución COMPLETAR.