

1. Analizar en cada caso si  $(G, \oplus)$  es un grupo, un monoide, un semigrupo o ninguno de ellos:
  - a)  $G = \mathbb{Z}$ ,  $a \oplus b = a - b$ .
  - b)  $G = \mathbb{N}_0$ ,  $a \oplus b = a \cdot b$ .
  - c)  $G$  es el conjunto de polinomios de grado menor o igual que  $n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , con la suma usual.
  - d)  $G$  es el conjunto de polinomios de grado menor o igual que  $n$  y el polinomio nulo,  $n \in \mathbb{N}$ , con la suma usual.
  - e)  $G$  es el conjunto de polinomios de grado igual a  $n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , con la suma usual.
  - f)  $G = \mathbb{R}^{n \times n}$  con la suma usual.
  - g)  $G = \mathbb{R}^{n \times n}$  con el producto usual.
  - h)  $G = \mathbb{R}^{n \times n}$  con el producto definido por  $(A \circ B)_{ij} = a_{ij} \cdot b_{ij}$ .
  - i)  $G = \mathbb{Z}^+$  con el producto definido por  $n \oplus k = \gcd(n, k)$ .
  - j)  $G = \mathbb{Z}^+$  con el producto definido por  $n \oplus k = \text{lcm}(n, k)$ .
  - k)  $G = \{f \in [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ es función continua}\}$  con el producto definido por  $f \oplus g = f + g$ .

### Soluciones

- a) COMPLETAR.
- b) COMPLETAR.
- c) COMPLETAR.
- d) COMPLETAR.
- e) COMPLETAR.
- f) COMPLETAR.
- g) COMPLETAR.
- h) COMPLETAR.
- i) COMPLETAR.
- j) COMPLETAR.

*k*) COMPLETAR.

2. Sea  $X$  un conjunto cualquiera. Probar que  $(X \rightarrow X, \circ, id_X)$  es un monoide, donde  $X \rightarrow X$  representa el conjunto de funciones de  $X$  en  $X$ .

**Solución** COMPLETAR.

3. Sea  $X$  un conjunto cualquiera. Probar que  $(X \rightarrow X, \Rightarrow, id_X)$  es un grupo, donde  $X \Rightarrow X$  representa el conjunto de funciones biyectivas de  $X$  en  $X$ . A esta clase de grupo le llamaremos grupo de biyecciones.

**Solución** COMPLETAR.

4. Probar que si  $G$  es un grupo y  $a, b \in G$  entonces  $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ .

**Solución** COMPLETAR.

5. Probar que si  $G$  es un grupo,  $a, b \in \mathbb{Z}$  y  $g \in G$  entonces  $g^a g^b = g^{(a+b)}$ .

**Solución** COMPLETAR.

6. Probar que si  $G$  es un grupo abeliano entonces  $\forall a, b \in G$  y  $\forall n \in \mathbb{Z}$  es  $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$ .

**Solución** COMPLETAR.

7. Probar que si  $G$  es un grupo y  $g \in G$ , entonces  $(g^a)^b = g^{ab}$  para todos los enteros  $a, b$ .

**Solución** COMPLETAR.

8. DIFFIE-HELLMAN. Alice y Bob desean ponerse de acuerdo en un número secreto. Sin embargo, saben que sus comunicaciones son monitoreadas por Eve, lo cual parece imposibilitar esta tarea.

Utilizando el resultado del ejercicio anterior, y sabiendo que existe un grupo cíclico finito  $G$  y su generador  $g$  para los cuales resulta computacionalmente costoso resolver el problema de Diffie-Hellman (dados  $g^a$  y  $g^b$ , encontrar  $g^{ab}$ ); proponer un protocolo que les permita a Alice y Bob establecer una clave en común y secreta.

**Solución** COMPLETAR.

9. Si  $G$  es un grupo tal que  $(a \cdot b)^2 = a^2 \cdot b^2$  para todo par  $a, b \in G$ , probar que  $G$  es abeliano.

**Solución** COMPLETAR.

10. Sea  $(M, \oplus, e)$  un monoide finito. Probar que si vale la ley de cancelación a derecha ( $a \oplus c = b \oplus c \Rightarrow a = b$ ), entonces  $(M, \oplus, e)$  es en realidad un grupo.

**Solución** COMPLETAR.

11. Sea  $n \in \mathbb{Z}$ . Definamos la relación  $a \sim b$  si y solo si el resto de dividir  $a$  por  $n$  coincide con el resto de dividir  $b$  por  $n$ .

- a) Probar que  $\sim$  es una relación de equivalencia en  $\mathbb{Z}$ .
- b) Consideremos ahora el conjunto de las clases de equivalencia definidas por  $\sim$  en  $\mathbb{Z}$ , que notaremos  $\mathbb{Z}_n$ , es decir

$$\mathbb{Z}_n = \{\bar{x} / x \in \mathbb{Z}\}$$

donde

$$\bar{x} = \{y \in \mathbb{Z} / x \sim y\}$$

y definamos en  $\mathbb{Z}_n$  la operación

$$\bar{x} + \bar{y} = \overline{x + y}$$

- 1) Verificar que esta operación está bien definida. *Sugerencia:* probar que  $a \sim b \iff \exists k \in \mathbb{Z} / a - b = nk$ .
- 2) Probar que  $\mathbb{Z}_n$  es un grupo con dicha operación.

### Soluciones

a) COMPLETAR.

b)

1) COMPLETAR.

2) COMPLETAR.

12. Sean  $(G, \oplus)$  un grupo y  $H \subseteq G$  con  $H \neq \emptyset$ . Probar que  $H$  es un subgrupo de  $G$  si y solo si:

■  $a \oplus b \in H$ , para todo par  $a, b \in H$ .

■  $a^{-1} \in H$ , para todo  $a \in H$ .

**Soluciones** COMPLETAR.

13. Probar que si  $H$  y  $K$  son subgrupos de un grupo  $G$  entonces  $H \cap K$  es subgrupo de  $G$ .

**Solución** COMPLETAR.

14. Sean  $a, b \in \mathbb{R}$ , definimos

$$\begin{array}{rcl} \tau_{a,b} & : & \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \tau_{a,b}(x) = ax + b \end{array}$$

Sea  $G = \{\tau_{a,b}/a \in \mathbb{R} - \{0\}, b \in \mathbb{R}\}$

a) Probar que  $G$  es un grupo bajo la composición.

b) Probar que  $H = \{\tau_{a,b} \in G/a \in \mathbb{Q}\}$  es un subgrupo de  $G$ .

c) Sea  $N = \{\tau_{1,b} \in G\}$ . Probar que  $N$  es un subgrupo de  $G$  y que  $g \in G, n \in N \Rightarrow gng^{-1} \in N$ .

### Soluciones

a) COMPLETAR.

b) COMPLETAR.

c) COMPLETAR.

15. Sea  $(G, \oplus)$  un grupo y  $\varphi : G \rightarrow G/\varphi(a) = a^{-1}$ .

- a) Probar que  $\varphi$  es biyectiva.
- b) ¿Que relación hay entre  $\varphi$  y  $\varphi^{-1}$ ?

**Soluciones**

- a) COMPLETAR.
- b) COMPLETAR.

16. Probar que para todo monoide  $(M, \otimes, e)$  existe un homomorfismo inyectivo emb:  $(M, \otimes, e) \rightarrow (M \rightarrow M, \circ, id_X)$ .

**Solución** COMPLETAR.

17. CAYLEY. Probar que todo grupo  $(G, \otimes, e)$  es isomorfo a un subgrupo de un grupo de biyecciones.

**Solución** COMPLETAR.

18. Sea  $G$  un grupo cíclico. Probar que  $G$  es isomorfo a  $\mathbb{Z}$  o a  $\mathbb{Z}_n$  para algún  $n$ .

**Solución** COMPLETAR.

19. Verificar en cada uno de los siguientes casos si  $\phi : G \rightarrow H$  es un homomorfismo de grupo:

- a)  $G = H = \mathbb{R} - \{0\}$  bajo la multiplicación usual,  $\phi(x) = x^2$ .
- b)  $G = H = \mathbb{R} - \{0\}$  bajo la multiplicación usual,  $\phi(x) = 2^x$ .
- c)  $G = H = (\mathbb{R}, +)$ ,  $\phi(x) = x + 1$ .
- d)  $G = H = (\mathbb{R}, +)$ ,  $\phi(x) = 13x$ .

### Soluciones

- a) COMPLETAR.
  - b) COMPLETAR.
  - c) COMPLETAR.
  - d) COMPLETAR.
20. Sean  $(G, \oplus)$  y  $(H, \ominus)$  grupos y  $h : (G, \oplus) \rightarrow (H, \ominus)$  un homomorfismo. Probar que:
- a)  $h(e_G) = e_H$ , donde  $e_G$  es el neutro de  $G$  y  $e_H$  el neutro de  $H$ .
  - b) Si  $a \in G$  es  $h(a^{-1}) = h(a)^{-1}$ .
  - c) Si  $h$  es sobreyectiva y  $G$  es abeliano, entonces  $H$  es abeliano.

### Soluciones

- a) COMPLETAR.
  - b) COMPLETAR.
  - c) COMPLETAR.
21. Sean  $f : G \rightarrow G'$  un homomorfismo de grupos,  $G'$  abeliano. Probar que si  $H$  es un subgrupo de  $G$  que contiene a  $\ker(f)$  entonces  $H \triangleleft G$ .

**Solución** COMPLETAR.

22. Sean  $(G, \cdot)$  y  $(H, \cdot')$  grupos, entonces definiendo  $(g_1, h_1) \oplus (g_2, h_2) = (g_1 \cdot g_2, h_1 \cdot' h_2)$  resulta  $(G \times H, \oplus)$  un grupo.

**Solución** COMPLETAR.

23. Sea  $G$  un grupo y  $M, N$  subgrupos normales de  $G$  tales que  $G = M \cdot N$ . Probar  $G/(M \cap N) \cong G/M \times G/N$ .

**Solución** COMPLETAR.

24. Sea  $G$  un grupo. Si definimos  $L$  como el conjunto de los subgrupos normales de  $G$ , entonces  $(L, \cdot, \cap)$  es un retículo modular.

**Solución** COMPLETAR.

25. Hacer un diagrama de Hasse de los subgrupos normales del grupo de Klein ( $V = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ ). ¿El retículo  $L$  del apartado anterior es distributivo?

**Solución** COMPLETAR.

26. Sean  $G, H$  grupos. Si  $A \triangleleft G$  y  $B \triangleleft H$ , entonces  $(G \times H) / (A \times B) \cong (G/A) \times (H/B)$ .

**Solución** COMPLETAR.

27. Probar que existen sólo dos grupos distintos de orden 4 (salvo isomorfismo). Ayuda: utilizar el teorema de Lagrange para probar que un grupo de orden 4 que no es cíclico debe consistir de la identidad y tres elementos de orden 2

**Solución** COMPLETAR.

28. Probar que todo subgrupo de  $\mathbb{Z}$  es de la forma  $n\mathbb{Z} = \{nk | k \in \mathbb{Z}\}$  para algún  $n \in \mathbb{N}$ . Mostrar que  $\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .

**Solución** COMPLETAR.

29. Probar que si  $N$  es un subgrupo de índice 2 en un grupo  $G$ , entonces  $N$  es normal en  $G$ .

**Solución** COMPLETAR.

30. En la práctica de relaciones se definió al kernel de una función  $f : A \rightarrow B$  como la relación:

$$\ker(f) = \{(a, a') \mid a, a' \in A, f(a) = f(a')\}$$

Explicar la relación entre el kernel de un homomorfismo definido para grupos, y el kernel de la función que plantea el homomorfismo.

**Solución** COMPLETAR.