


1. Considerar los siguientes diagramas. En ambos casos, probar que si los dos triángulos conmutan, también conmuta el cuadrado.



Solución

- Sabemos que $s \circ p = r$ y $t \circ q = r$ por lo tanto $s \circ p = r = t \circ q$, es decir que el cuadrado conmuta.
- Sabemos que $r \circ p = q$ y $t \circ r = s$ por lo tanto:

$$s \circ p = (t \circ r) \circ p = t \circ (r \circ p) = t \circ q$$

2. Sea P un conjunto ordenado. Mostrar que P puede considerarse como una categoría.

Solución Para (P, \leq) definimos:

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| ■ $ob \mathcal{P} = P$. | ■ $cod(a, b) = b$. |
| ■ $mor \mathcal{P} = \leq$. | |
| ■ $dom(a, b) = a$. | ■ $(b, c) \circ (a, b) = (a, c)$. |

Luego:

- Para cada objeto a por reflexividad $(a, a) \in \leq$ por lo que $(a, a) \in mor \mathcal{P}$; a este morfismo lo llamaremos id_a resultando:
 - $(a, b) \circ id_a = (a, b) \circ (a, a) = (a, b)$.
 - $id_a \circ (c, a) = (a, a) \circ (c, a) = (c, a)$.

- Sean (a, b) , (b, c) y (c, d) morfismos, luego por transitividad también son morfismos $\boxed{(a, c)}$, $\boxed{(b, d)}$ y (a, d) . Veamos que vale la asociatividad:
 - $((c, d) \circ (b, c)) \circ (a, b) = \boxed{(b, d)} \circ (a, b) = (a, d)$.
 - $(c, d) \circ ((b, c) \circ (a, b)) = (c, d) \circ \boxed{(a, c)} = (a, d)$.

3. Verificar que un monoide M define una categoría con un único objeto cuyas flechas son los elementos de M .

Solución Para $(M, 0, +)$ definimos:

- $ob \mathcal{M} = \{*\}$.
- $cod(x) = *$.
- $mor \mathcal{M} = M$.
- $dom(x) = *$.
- $x \circ y = x + y$.

Luego:

- Para el único objeto $*$ existe el morfismo $0 = id_*$ de manera tal que:
 - $x \circ id_* = x + 0 = x$.
 - $id_* \circ y = 0 + y = y$.
- Para tres morfismos x, y, z (elementos de M) por clausura de monoide también son morfismos $\boxed{x + y}$ y $\boxed{y + z}$. Veamos que vale la asociatividad:

$$(x \circ y) \circ z = \left(\boxed{x + y} \right) + z = x + \left(\boxed{y + z} \right) = x \circ (y \circ z)$$

4. Dada una categoría \mathcal{C} , podemos definir \mathcal{C}^{op} con los mismo objetos que \mathcal{C} pero las flechas con sentido inverso, es decir, $ob \mathcal{C}^{op} = ob \mathcal{C}$ y $Hom_{\mathcal{C}^{op}}(X, Y) = Hom_{\mathcal{C}}(Y, X)$. Verificar que \mathcal{C}^{op} es una categoría.

Solución Sean $f_{op} : X \rightarrow Y$ y $g_{op} : Y \rightarrow Z$ en $Hom \mathcal{C}^{op}$, definimos $g_{op} \circ_{op} f_{op}$ como $(f \circ g)_{op}$. Observemos que la composición tiene sentido pues en \mathcal{C} resultan $f : Y \rightarrow X$ y $g : Z \rightarrow Y$. Luego:

- Para cada objeto X el morfismo id_X resulta ser el mismo en \mathcal{C} y en \mathcal{C}^{op} por lo que:
 - $f_{op} \circ_{op} id_X = (id_X \circ f)_{op} = f_{op}$.
 - $id_X \circ_{op} h_{op} = (h \circ id_X)_{op} = h_{op}$ (donde $h_{op} : Y \rightarrow X$).
- Sean $f_{op} : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ y $h : C \rightarrow D$, luego:
 - $(h_{op} \circ_{op} g_{op}) \circ_{op} f_{op} = (g \circ h)_{op} \circ_{op} f_{op} = f \circ (g \circ h)$.
 - $h_{op} \circ_{op} (g_{op} \circ_{op} f_{op}) = h_{op} \circ_{op} (f \circ g)_{op} = (f \circ g) \circ h$.


5. Sean \mathcal{C} y \mathcal{D} dos categorías, se define $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ cuyos objetos son pares ordenados de la forma (C, D) con $C \in ob \mathcal{C}$, $D \in ob \mathcal{D}$ y ademas:

$$Hom_{\mathcal{C} \times \mathcal{D}}((C, D), (C', D')) = Hom_{\mathcal{C}}(C, C') \times Hom_{\mathcal{D}}(D, D')$$

Verificar que $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ es una categoría.

Solución COMPLETAR.


6. Definamos C^{\rightarrow} como la categoría de las flechas de una categoría C , es decir, los objetos de C^{\rightarrow} son las flechas de C . Una flecha de C^{\rightarrow} de $f : A \rightarrow B$ en $g : D \rightarrow E$ es un par (a, b) de flechas de C tales que $g \circ a = b \circ f$.
- a) Expresar las flechas de C^{\rightarrow} en términos de diagramas conmutativos.
- b) Probar que si en el diagrama los cuadrados conmutan, entonces también conmuta el rectángulo exterior:



- c) Utilizar el apartado anterior para definir la composición en C^{\rightarrow} .
- d) Verificar que C^{\rightarrow} es una categoría.

Soluciones


- a) El par (a, b) es una flecha de C^{\rightarrow} si el siguiente diagrama conmuta en C :



- b) Sabemos que $u \circ p = r \circ t$ y $v \circ q = s \circ u$ y queremos ver si $v \circ (q \circ p) = s \circ (r \circ t)$. Por asociatividad en C $v \circ (q \circ p) = (v \circ q) \circ p$, es decir $v \circ (q \circ p) = (s \circ u) \circ p = s \circ (u \circ p) = s \circ (r \circ t)$.
- c) Para (r, p) y (s, q) como en el diagrama, definimos $(s, q) \circ (r, p)$ como $(s \circ r, q \circ p)$.

d)

- Para cada $f : A \rightarrow B$ en $ob C^{\rightarrow}$ definimos $id_f = (id_{dom(f)}, id_{cod(f)})$.
 - Observemos que id_f es una flecha de C^{\rightarrow} pues el siguiente diagrama conmuta:




- Sean $a : A \rightarrow D$ y $b : B \rightarrow E$ como en el diagrama, luego:

$$(a, b) \circ id_f = (a \circ id_{dom(f)}, b \circ id_{cod(f)}) = (a, b)$$

- Análogamente sean $a : D \rightarrow A$ y $b : E \rightarrow B$, entonces:

$$id_f \circ (a, b) = (id_{dom(f)} \circ a, id_{cod(f)} \circ b) = (a, b)$$

- Sean (r, p) , (s, q) y (x, w) como en el siguiente diagrama:




$$\begin{aligned}
((r, p) \circ (s, q)) \circ (x, w) &= (r \circ s, p \circ q) \circ (x, w) = ((r \circ s) \circ x, (p \circ q) \circ w) = \\
&= (r \circ (s \circ x), p \circ (q \circ w)) = (r, p) \circ (s \circ x, q \circ w) = (r, p) \circ ((s, q) \circ (x, w))
\end{aligned}$$


7. Sean C una categoría y A un objeto de C . Definimos $C|A$ como la categoría cuyos objetos son las flechas f de C tales que $\text{cod}(f) = A$. Una flecha g en $C|A$ de $f : X \rightarrow A$ en $h : Y \rightarrow A$ es una flecha $g : X \rightarrow Y$ de C tal que $f = h \circ g$.
- Expresar las flechas de $C|A$ en términos de diagramas conmutativos.
 - Verificar que $C|A$ es una categoría.
 - Si P es la categoría definida por un conjunto ordenado y $x \in P$, determinar $P|x$.

Soluciones


- a) Si el siguiente diagrama conmuta en C , entonces g es una flecha de $C|A$.



- b)
- Dados dos morfismos $g : X \rightarrow Y$ y $p : Y \rightarrow Z$ en $C|A$ definimos la composición en $C|A$ como la composición en C y para cada objeto $f : X \rightarrow A$ definimos el morfismo $\text{id}_f = \text{id}_{\text{dom}(f)}$.
 - Observemos que $\text{id}_{\text{dom}(f)}$ es un morfismo de la categoría pues el siguiente diagrama conmuta:



- Una flecha α que parte de f debe tener tipo $X \rightarrow Y$, luego $\alpha \circ id_f = \alpha$.
 - Una flecha β que llega a f debe tener tipo $W \rightarrow X$, luego $id_f \circ \beta = \beta$.
- Sean g, p, q como en el siguiente diagrama conmutativo:



luego $(r \circ p) \circ g = r \circ (p \circ g)$ por asociatividad en C .

c) COMPLETAR.

8. Probar que en Set los monomorfismos (epimorfismos) son exactamente las funciones inyectivas (respectivamente sobreyectivas).

Solución

■

- \Rightarrow : Sea $f : B \rightarrow C$ un monomorfismo, luego para cualquier conjunto A y funciones $g, h : A \rightarrow B$ sabemos que:

$$f \circ g = f \circ h \Rightarrow g = h$$

Supongamos que f no es inyectiva, es decir que existen $b_1 \neq b_2 \in B$ tales que $f(b_1) = f(b_2)$. Definimos funciones constantes g, h tales que $g(x) = b_1$ y $h(x) = b_2$, luego:

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = f(b_1) = f(b_2) = f(h(x)) = f \circ h(x)$$

y como f es monomorfismo resulta $g = h$ lo cual es una contradicción pues $g(x) = b_1 \neq b_2 = h(x)$.

- $\boxed{\Leftarrow}$: Sea $f : B \rightarrow C$ una función inyectiva, luego sabemos que $f(b_1) = f(b_2) \iff b_1 = b_2$. Para $g, h : A \rightarrow B$ tales que $f \circ g = f \circ h$ resulta:

$$f \circ g(x) = f \circ h(x) \iff f(g(x)) = f(h(x)) \iff g(x) = h(x)$$

■

- $\boxed{\Rightarrow}$: Sea $f : A \rightarrow B$ un epimorfismo, luego para cualquier conjunto C y funciones $g, h : B \rightarrow C$ sabemos que:

$$g \circ f = h \circ f \Rightarrow g = h$$

Supongamos que f no es sobreyectiva, es decir que existe $b \in B$ tal que $f(x) \neq b$ (para cualquier x). Definimos g, h iguales salvo en b donde $g(b) = c_1$ y $h(b) = c_2$, luego:

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = h(f(x)) = h \circ f(x)$$

y como f es un epimorfismo resulta $g = h$ lo cual es una contradicción.

- $\boxed{\Leftarrow}$: Sea $f : A \rightarrow B$ una función sobreyectiva y sean dos funciones $g, h : B \rightarrow C$ tales que $g \circ f = h \circ f$. Supongamos que $g \neq h$, luego existe $f(x) \in B$ tal que $g(f(x)) \neq h(f(x))$ lo cual es una contradicción pues:

$$g \circ f(x) = h \circ f(x) \iff g(f(x)) = h(f(x))$$

9. Sean C una categoría y f, g flechas de C . Probar que:

- Si f y g son monomorfismos, entonces $g \circ f$ también lo es.
- Si $g \circ f$ es un monomorfismo, f también lo es.
- Si f y g son epimorfismos, entonces $g \circ f$ también lo es.
- Si $g \circ f$ es un epimorfismo, g también lo es.
- Si f^{-1} es la inversa de f y g^{-1} es la inversa de g , entonces $f^{-1} \circ g^{-1}$ es la inversa de $g \circ f$.

Soluciones

- a) COMPLETAR.
- b) COMPLETAR.
- c) COMPLETAR.
- d) COMPLETAR.
- e) COMPLETAR.

10. Mostrar que una flecha de una categoría puede ser monomorfismo y epimorfismo y no isomorfismo.

Solución COMPLETAR.

11. Mostrar que una flecha de una categoría concreta puede ser epimorfismo y no sobreyectiva.

Solución COMPLETAR.

12. Mostrar que dos objetos terminales en una categoría son isomorfos. Por dualidad: ¿qué se puede decir de los objetos iniciales?

Solución COMPLETAR.

13. ¿Cuáles son los objetos iniciales y terminales en $Set \times Set$? ¿Cuáles en Set^{\rightarrow} ?

Solución COMPLETAR.

14. Dar una categoría sin objetos iniciales. Dar una sin objetos finales. Dar una donde los objetos finales e iniciales coincidan.

Solución COMPLETAR.

15. Sea \mathcal{C} una categoría. Probar que si dos objetos admiten producto (co-producto), éste es único salvo isomorfismo.

Solución COMPLETAR.

16. Sea P un poset. Determina objetos iniciales, objetos terminales, productos y coproductos en las siguientes categorías:

- a) $Poset$.
- b) Set .
- c) Mon .
- d) Grp .

Soluciones

- a) COMPLETAR.
- b) COMPLETAR.
- c) COMPLETAR.
- d) COMPLETAR.

17. Dar una categoría donde algún par de objetos carecen de producto.

Solución COMPLETAR.

18. Sea \mathcal{C} una categoría y sean A, B, C, D objetos de \mathcal{C} . Mostrar que en caso de existir $A \times B$, $C \times D$ y dos morfismos $f : A \rightarrow C$ y $g : B \rightarrow D$, entonces puede definirse un morfismo $f \times g : A \times B \rightarrow C \times D$.

Solución COMPLETAR.

19. Mostrar las siguientes identidades:

- a) $\langle \pi_1, \pi_2 \rangle = id$.
- b) $\langle f \circ h, g \circ h \rangle = \langle f, g \rangle \circ h$.
- c) $(f \times h) \circ \langle g, k \rangle = \langle f \circ g, h \circ k \rangle$.
- d) $(f \times h) \circ (g \times k) = (f \circ g) \times (h \circ k)$.
- e) $\langle [f, g], [h, k] \rangle = [\langle f, h \rangle, \langle g, k \rangle]$.

Soluciones

- a) COMPLETAR.
- b) COMPLETAR.
- c) COMPLETAR.
- d) COMPLETAR.
- e) COMPLETAR.

20. Probar los siguientes isomorfismos:

- a) $A \times B \cong B \times A$.
- b) $A \times 1 \cong A$.
- c) $A \times (B \times C) \cong (A \times B) \times C$.
- d) ¿Cuales son los enunciados duales?

Soluciones

- a) COMPLETAR.
- b) COMPLETAR.
- c) COMPLETAR.
- d) COMPLETAR.

21. Probar que si dos morfismos $f, g : X \rightarrow Y$ admiten egalizador (coegalizador), éste es único salvo isomorfismo.

Solución COMPLETAR.

22. Encontrar el ecualizador en Set .

Solución COMPLETAR.


23. Sean $f, g : X \rightarrow Y$ dos morfismos en Set . Probar que el coegalizador de f y g es el cociente de Y por la relación de equivalencia $y \equiv z$ si y sólo si existe $x \in X$ tal que $y = f(x)$ y $z = g(x)$ o bien $y = g(x)$ y $z = f(x)$.

Solución COMPLETAR.

24. Probar que en una categoría \mathcal{C} todo ecualizador e es un monomorfismo. Mostrar que si además e es epimorfismo, entonces se tiene un isomorfismo.

Solución COMPLETAR.

25. El *pullback* de dos morfismos $f : X \rightarrow Z$ y $g : Y \rightarrow Z$ consiste en un objeto P junto con dos morfismos $p_1 : P \rightarrow X$, $p_2 : P \rightarrow Y$ tal que $f \circ p_1 = g \circ p_2$, y además si existe otro objeto Q con dos morfismos $q_1 : Q \rightarrow X$, $q_2 : Q \rightarrow Y$ tal que $f \circ q_1 = g \circ q_2$, entonces existe un único morfismo $u : Q \rightarrow P$ tal que $p_1 \circ u = q_1$ y $p_2 \circ u = q_2$. A continuación, un diagrama que muestra la situación:



Probar que el pullback de dos morfismos, si existe, es único salvo isomorfismo.

Solución COMPLETAR.

26. Encontrar el pull-back en Set .

Solución COMPLETAR.

27. Sea \mathcal{C} una categoría con exponenciales.

- Probar $curry(eval_{A,B}) = id_{B^A}$.
- Dado un morfismo $f : B \rightarrow C$, construir un morfismo $B^A \rightarrow C^A$.

- c) Dado un morfismo $f : A \rightarrow C^B$, construir un morfismo $uncurry(f) : A \times B \rightarrow C$.
- d) Probar $uncurry(curry(f)) = f$ y $curry(uncurry(f)) = f$.

Soluciones

- a) COMPLETAR.
- b) COMPLETAR.
- c) COMPLETAR.
- d) COMPLETAR.

28. Sea \mathcal{C} una CCC y sean A, B objetos de \mathcal{C} . Probar:

- a) B^A es único salvo isomorfismo.
- b) $1^A \cong 1$.
- c) $B^1 \cong B$.

Soluciones

- a) COMPLETAR.
- b) COMPLETAR.
- c) COMPLETAR.

29. Hallar los exponenciales en Set .

Solución COMPLETAR.

30. Demostrar que un álgebra de Boole es una CCC.

Solución COMPLETAR.

31. En una categoría con coproductos y objeto final, podemos definir los booleanos como el objeto $Bool = 1 + 1$. En este caso, a i_1 le llamamos *true* y a i_2 le llamamos *false*. Escribimos un morfismo $not : Bool \rightarrow Bool$ tal que:

$$not \circ true = false$$


$$\text{not} \circ \text{false} = \text{true}$$

Suponiendo que la categoría tiene exponenciales: ¿puede escribir un morfismo $\text{and} : \text{Bool} \times \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$ que se comporte como la conjunción?

Solución COMPLETAR.

Ejercicios adicionales

1. Considerar que en el siguiente diagrama los 4 trapecios conmutan.



Probar que:

- a) Si el cuadrado interno conmuta, también lo hace el cuadrado externo.
- b) Si p es epimorfismo y q es monomorfismo, entonces si el cuadrado externo conmuta, también lo hace el cuadrado interno.

Soluciones

- a) COMPLETAR.
- b) COMPLETAR.

2. Sean C y D dos categorías. Se define $C \times D$ de la siguiente manera: los objetos de $C \times D$ son de la forma (A, B) para $A \in C$ y $B \in D$ y las flechas $(f, g) : (A, B) \rightarrow (A', B')$ donde $f : A \rightarrow A' \in C$ y $g : B \rightarrow B' \in D$.
 - a) Verificar que $C \times D$ es una categoría.
 - b) Probar que $P_1 : C \times D \rightarrow C$, $P_1(A, B) = A$ y $P_2 : C \times D \rightarrow D$, $P_2(A, B) = B$, definen funtores.

Soluciones

- a) COMPLETAR.
 - b) COMPLETAR.
3. Dados dos funtores $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ y $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$, definir un funtor que componga ambos. ¿Es posible definir una categoría cuyos objetos sean las categorías y sus flechas sean los funtores entre estas?

Solución COMPLETAR.

4. Si $f : A \rightarrow B$ en Set , entonces definimos $f^{-1}(X) = \{a \in A : f(a) \in X\}$ donde $X \subseteq B$. Probar que $I : Set \rightarrow Set$ es un funtor contravariante, llevando: $I(A) = \mathcal{P}(A)$ y $I(f) = f^{-1}$.

Solución COMPLETAR.

5. Se ha visto que puede considerarse a un monoide como una categoría con un único objeto, ¿Qué es un funtor entre dos categorías de este tipo? ¿Y entre categorías formadas a partir de conjuntos ordenados?

Solución COMPLETAR.

6. Sea \mathcal{C} una categoría, para cada objeto X de \mathcal{C} definimos $Hom(X, -) : \mathcal{C} \rightarrow Set$ donde $Hom(X, Y) = \mathcal{C}(X, Y)$ y $Hom(X, f)(g) = f \circ g$. Probar que $Hom(X, -)$ es efectivamente un funtor para cada X . Definir análogamente un funtor $Hom(-, X)$.

Solución COMPLETAR.

7. Dado un semigrupo (S, \cdot) , podemos construir un monoide (S', \cdot') donde $S' = S \cup \{e\}$, $(0, x) \cdot' (0, y) = (0, x \cdot y)$ y $(1, e) \cdot' x = x = x \cdot' (1, e)$. Utilizando esta construcción, definir un funtor $F : Sem \rightarrow Mon$ y probar que es un monomorfismo en Cat .

Solución COMPLETAR.

8. Definimos la asignación $Fr : Set \rightarrow Mon$ tal que $Fr(X) = X^{*1}$ y $Fr(f)(x_1 x_2 \cdots x_n) = f(x_1) f(x_2) \cdots f(x_n)$. Usando el funtor $U : Mon \rightarrow Set$ que se olvida de la estructura de monoide, consideramos $i : X \rightarrow U(Fr(X))$ la función que lleva un elemento x de X a la palabra x .
- a) Probar que Fr es un funtor.
 - b) Probar que dado $f : X \rightarrow U(M)$ en Set donde M es un monoide, puedo construir una única $\bar{f} : Fr(X) \rightarrow M$ en Mon tal que $U(\bar{f}) \circ i = f$ en Set^2 .
 - c) ¿A cuál monoide es isomorfo $Fr(X)$ donde X es un conjunto de un solo elemento?
 - d) ¿Este funtor preserva productos?

Soluciones

- a) COMPLETAR.
- b) COMPLETAR.
- c) COMPLETAR.
- d) COMPLETAR.

9. Sea \mathcal{C} con 0. Verificar que si un morfismo $f : X \rightarrow Y$ en \mathcal{C} admite núcleo (conúcleo), éste es único salvo isomorfismo.

¹ X^* es el monoide de las palabras sobre el alfabeto X con la concatenación como operación. Puede pensar en las palabras de X como las listas de elementos de X .

²Cuando un monoide como $Fr(X)$ satisface esta propiedad, decimos que es el monoide libre sobre X .

Solución COMPLETAR.

10. Sean \mathcal{C} una categoría con 0 y $f : X \rightarrow Y$ un morfismo en \mathcal{C} . Probar que $p : Y \rightarrow C$ es un conúcleo de f en \mathcal{C} si y solo si p^{op} es un núcleo de f^{op} en \mathcal{C}^{op} .

Solución COMPLETAR.

11. Sean \mathcal{C} una categoría con 0 y $f : X \rightarrow Y$ un morfismo en \mathcal{C} . Probar que $\ker(f)$ ($\text{coker}(f)$) coincida con el egalizador (coegalizador) de f y 0.

Solución COMPLETAR.

12. Sean x e y elementos de un conjunto ordenado P . ¿Cuál sería el producto de x e y considerando P como una categoría?

Solución COMPLETAR.

13. Sean P y Q conjuntos ordenados. ¿Cuál es el coproducto de P y Q en Poset ?

Solución COMPLETAR.

14. ¿ Grp tiene productos? ¿Tiene coproductos? ¿Tiene objeto inicial? ¿Tiene objeto final? ¿Y Mon ?

Solución COMPLETAR.

15. Un ωCPO es un conjunto ordenado con mínimo (notado \perp) tal que toda cadena ascendente numerable $a_0 \sqsubseteq a_1 \sqsubseteq \dots$ (que notamos $\{a_i\}_{i=0}^\infty$) tiene un supremo $\sqcup \{a_i\}_{i=0}^\infty$. Una función monótona entre dos ωCPO es continua si $f(\sqcup \{a_i\}_{i=0}^\infty) = \sqcup \{f(a_i)\}_{i=0}^\infty$ para toda cadena ascendente numerable $\{a_i\}_{i=0}^\infty$.

- a) Probar que podemos armar una categoría cuyos objetos son ωCPO y cuyas flechas son funciones continuas.
- b) ¿Esta categoría tiene productos? En caso afirmativo, describirlos. ¿Y coproductos?

Soluciones

a) COMPLETAR.

b) COMPLETAR.

16. Probar o refutar: sea C una categoría con productos, y $F : C \rightarrow C$ un functor, entonces siempre existe un único morfismo $F(A \times B) \rightarrow FA \times FB$.

Solución COMPLETAR.

17. Sea $U : Mon \rightarrow Set$ el functor que olvida la estructura de monoide. Definimos además $U^2 : Mon \rightarrow Set$ que en objetos lleva $(X, \otimes, e) \mapsto X \times X$. Probar que a U^2 se lo puede denotar de estructura functorial.

Solución COMPLETAR.