


1. Simule estas situaciones y concluya:

- a) Se tira una moneda equilibrada 10 veces y se observa qué proporción de veces salió cara en las sucesivas tiradas, se repite el experimento en condiciones similares pero aumentando sucesivamente el número de tiradas hasta llegar a 1000000. Se realiza un gráfico de puntos en el plano XY donde el eje X representa el número de lanzamientos y el eje Y la frecuencia relativa de caras en cada uno de los ensayos.
- b) Repita el procedimiento llevado a cabo en el ítem anterior, pero en este caso la experiencia consiste en tirar un dado equilibrado y registrar la frecuencia relativa de la aparición de cada una de las caras. Graficar sólo el caso para una de las caras.
- c) En cierto país existe un control de natalidad, con lo cual a las parejas que deciden tener hijos se les impone el siguiente plan familiar: Se pueden tener hijos hasta que ocurra una de estas dos situaciones: tener 3 hijos o que nazca un varón (lo que ocurra primero). ¿Cuál es la probabilidad de tener un hijo varón bajo esta regla?

## Solución

```
a) cantidades = c(1:10, seq(20,100,5), seq(150,1000,50),  
                  seq(5000,100000,5000), 1000000)  
l = length(cantidades)  
fr = vector(length = l)  
for (i in 1:l) {  
  fr[i] <- mean(sample(c(1, 0), cantidades[i], replace = T))  
}  
dotchart(x)
```



b) COMPLETAR.

c) COMPLETAR.

2.

a) Simule la distribución de la suma de los números que salen al tirar 4 dados para una muestra de tamaño 10000.

b) Tabule los resultados.

c) Represente los resultados gráficamente.

3. Dada una urna con 3 bolas blancas y 5 bolas negras, realice las siguientes simulaciones y sus correspondientes diagramas de barras:

a) Se observa la extracción de una bola

b) Se observan 8 extracciones con reposición

c) Se observa la cantidad de bolas negras que salen al extraer 30 bolas (con reposición). Este procedimiento se repite 10000 veces.

4. En cada uno de los siguientes casos, determinar un espacio muestral asociado a la experiencia y el cardinal del mismo:

a) Extraemos una carta de una baraja española y anotamos el número.

- b)* Extraemos una carta de una baraja española y anotamos el palo.
  - c)* Extraemos sendas cartas de dos barajas españolas distintas y anotamos el palo de cada una.
  - d)* Extraemos sendas cartas de dos barajas españolas distintas y anotamos el palo de la primera y el número de la segunda.
  - e)* Lanzamos una moneda y anotamos el resultado.
  - f)* Lanzamos dos monedas distintas y anotamos el resultado.
  - g)* Lanzamos tres monedas distintas y anotamos el resultado.
  - h)* Lanzamos tres monedas distintas y anotamos el número de caras.
  - i)* Lanzamos una moneda sucesivas veces hasta que salga cara. y anotamos el número de lanzamientos que fueron necesarios.
  - j)* Lanzamos dos dados y observamos la suma de los números que se obtienen.
  - k)* Anotamos el número de llamadas a un teléfono en un intervalo de tiempo  $[0; t]$ .
  - l)* Anotamos el tiempo que media entre dos llamadas a un teléfono.
5.  $A$ ,  $B$  y  $C$  son sucesos de un mismo espacio muestral. Expresar, en función de operaciones entre ellos, los siguientes sucesos:
- a)* Ocorre alguno de los tres.
  - b)* No ocurre ninguno de los tres.
  - c)* Ocurren los tres.
  - d)* Ocurren dos de los tres.
  - e)* Ocurren al menos dos de los tres.
6. En familias de tres hijos se estudia la distribución de sexos de los hijos. Por ejemplo  $(V, M, M)$  representa que el mayor de los hijos es varón y las otras dos, mujeres. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral asociado a esta experiencia? Describir los siguientes sucesos:
- a)*  $A$ : la menor es mujer.
  - b)*  $B$ : el mayor es varón.
  - c)*  $A \cup B$ .

7. Se arroja un dado equilibrado dos veces y se observa el par ordenado de números que se obtiene.
- Describa el espacio muestral asociado a la experiencia.
  - Describa los siguientes sucesos:
    - En el primer lanzamiento se obtiene un número par.
    - En el segundo lanzamiento se obtiene un número impar.
    - Se obtienen par y par o impar e impar.
8. Sean  $A$  y  $B$  dos sucesos de un espacio muestral  $S$ . Determinar si  $A$  y  $B$  son o no excluyentes cuando se cuenta con la siguiente información:

$$P(A \cup B) = \frac{2}{3}; P(A) = \frac{1}{4}; P(B) = \frac{1}{2}$$

9. Sean  $A$  y  $B$  dos sucesos de un espacio muestral  $S$ . Sabiendo que  $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$ ,  $P(\overline{B}) = \frac{2}{3}$  y  $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ ; calcular  $P(B)$ ;  $P(A)$  y  $P(\overline{A} \cap B)$ .
10. Analizar la validez de la siguiente afirmación: Si la probabilidad de que ocurran dos sucesos a la vez es menor que  $1/2$ , la suma de las probabilidades de ambos por separado no puede ser mayor que  $3/2$ .
11. Calcule las probabilidades de los sucesos definidos en a), b) y c) del ejercicio 6 y b) del ejercicio 7. Especifique los supuestos que ha realizado.
12. Se debe formar una comisión de cuatro personas, elegidas al azar entre las siguientes:

Nombre	Profesión	Edad
Ana	Ingeniera	28
Miguel	Ingeniero	39
Beatriz	Lic. en Letras	42
Carlos	Arquitecto	30
Diana	Arquitecta	33
Pedro	Historiador	53
Juan	Abogado	25
Mónica	Abogada	55

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que los integrantes de la comisión sean todos mayores de 31 años?
  - b) ¿Cuál es la probabilidad de que la comisión no incluya arquitectos?
- 13. Se forma una comisión constituida por un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero, quienes son elegidos al azar entre las personas de la tabla del ejercicio anterior.
  - a) ¿Cuál es la probabilidad de que el presidente sea mujer?
  - b) ¿Cuál es la probabilidad de que el tesorero sea mayor de 50 años?
  - c) ¿Cuál es la probabilidad de que el secretario sea abogado y el vicepresidente licenciado en letras?
- 14. Ana, Pedro, Manuel, Margarita y Alicia se sacarán una foto sentados en línea y orden acomodándose al azar.
  - a) ¿Cuál es la probabilidad de que los hombres queden en los extremos?
  - b) ¿Cuál es la probabilidad de que se alternen los sexos?
  - c) ¿Cuál es la probabilidad de que Margarita quede en el centro de la foto?
  - d) ¿Cuál es la probabilidad de que Manuel quede en el extremo derecho y Margarita, en el centro de la foto?
- 15. Las letras de la palabra CLASE se colocan al azar y en línea. ¿Cuál es la probabilidad de que las vocales queden juntas?
- 16. Se lanzan sucesivamente cuatro monedas al aire. ¿Cuál es la probabilidad de obtener:
  - a) al menos una cara?
  - b) a lo sumo tres cruces?
  - c) exactamente dos caras?
- 17. En el juego de generala mediante un tiro, calcule la probabilidad de obtener:
  - a) Generala servida.

b) Póker servido.

18. Una caja contiene bolas blancas y negras de tal manera que, al extraer dos, la probabilidad de que sean ambas blancas es  $1/2$ . Determine el número mínimo de bolas que hay en la caja.
19. En un centro hay 1000 alumnos repartidos del siguiente modo:

	Chicos	Chicas
Usan anteojos	187	113
No usan anteojos	413	287

Se elige al azar uno de ellos.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que
- 1) sea chico?
  - 2) sea chica?
  - 3) use anteojos?
  - 4) no use anteojos?
  - 5) sea chica y use anteojos?
- b) Nos dicen que el alumno elegido resultó una chica, ¿cuál es la probabilidad de que use anteojos?
20. En una ciudad se publican los diarios  $A$ ,  $B$  y  $C$ . Una encuesta indica que el 20 % de la población lee  $A$ , el 16 % lee  $B$ , el 14 % lee  $C$ , el 8 % lee  $A$  y  $B$ , el 5 % lee  $A$  y  $C$ , el 4 % lee  $B$  y  $C$ , y el 2 % lee  $A$ ,  $B$  y  $C$ . Se elige una persona al azar. Calcule la probabilidad de que:
- a) no lea ninguno de los diarios,
  - b) lea alguno de los diarios,
  - c) lea solamente uno de los diarios,
  - d) lea los diarios  $A$  y  $B$  sabiendo que al menos lee uno de los diarios.
21. Un estudiante afirma que si se arroja un dado equilibrado tres veces y se suman los números obtenidos, la probabilidad de que la suma sea 9 es igual a la probabilidad de que la suma sea 10. Basa su afirmación en que, en ambos casos, hay 6 posibilidades de lograr esas sumas:

Suma 9	126	135	144	225	234	333
Suma 10	136	145	244	226	235	334

Analice la afirmación del estudiante.

22. En un mazo de cartas se han retirado varias de ellas. Entre las que quedan, se sabe que el 15 % son reyes, el 30 % son bastos, el 60 % ni reyes ni bastos.

- a) ¿Está entre ellas el rey de bastos? ¿Qué probabilidad hay de extraerla?
- b) ¿Cuántas cartas quedan en el mazo?

23. En un centro hay 1000 alumnos repartidos del siguiente modo:

	Chicos	Chicas
Usan anteojos	187	113
No usan anteojos	413	287

Se elige al azar uno de ellos.

- a) Se sabe que el alumno elegido resultó una chica, ¿cuál es la probabilidad de que use anteojos?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que el alumno elegido resulte una chica, dado que usa anteojos?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que el alumno elegido resulte un chico, dado que usa anteojos?
- d) Se sabe que el alumno elegido no usa anteojos, ¿cuál es la probabilidad de que resulte un chico?