

Трансляция презентации (во время очных лекций)

<https://clck.ru/3D3Efj>



При просмотре презентации в PDF для отображения анимаций на слайдах необходимо использовать Acrobat Reader, KDE Okular, PDF-XChange, Foxit Reader, браузер Firefox. Для браузеров на движке Chrome (Edge, Яндекс, Opera, ...) необходимо использовать [PDF.js](#) с опцией «Enable active content (JavaScript) in PDFs».

# Компьютерная графика

## Лекция 3

### Преобразования точек в пространстве

Гаврилов Андрей Геннадьевич

доцент каф. ИТиВС, кандидат технических наук

Кафедра Информационных технологий и вычислительных систем  
МГТУ «СТАНКИН»

Обновлено: 21 июля 2026 г.

# План лекции

- 1 Матрица преобразований
- 2 Аффинные преобразования
- 3 Преобразования систем координат
- 4 Проекционные преобразования

## Раздел 1

# Матрица преобразований

# Матрица преобразований

$$\left( \begin{array}{ccc|c} a & b & c & k \\ d & e & f & l \\ g & h & i & m \\ \hline o & p & q & r \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c|c} \mathbf{M}_{11} & \mathbf{M}_{12} \\ \hline \mathbf{M}_{21} & \mathbf{M}_{22} \end{array} \right)$$

$\mathbf{M}_{11}$  — линейное преобразование<sup>1</sup>

$\mathbf{M}_{12}$  — перемещение

$\mathbf{M}_{21}$  — перспективное преобразование

$\mathbf{M}_{22}$  — общее масштабирование

$$\begin{pmatrix} a & b & c & k \\ d & e & f & l \\ g & h & i & m \\ o & p & q & r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} wx \\ wy \\ wz \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} awx + bwy + cwz + kw \\ dwx + ewy + fwz + lw \\ gwx + hwy + lwz + mw \\ owx + pwy + qwz + rw \end{pmatrix} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \begin{pmatrix} (ax + by + cz + k)/(ox + py + qz + r) \\ (dx + ey + fz + l)/(ox + py + qz + r) \\ (gx + hy + lz + m)/(ox + py + qz + r) \\ 1 \end{pmatrix}$$

<sup>1</sup>Линейное преобразование — это преобразование, переводящее линейную комбинацию векторов в ту же самую линейную комбинацию преобразованных векторов.

# Матрица преобразований

$$\left( \begin{array}{ccc|c} a & b & c & k \\ d & e & f & l \\ g & h & i & m \\ \hline o & p & q & r \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c|c} \mathbf{M}_{11} & \mathbf{M}_{12} \\ \hline \mathbf{M}_{21} & \mathbf{M}_{22} \end{array} \right)$$

$\mathbf{M}_{11}$  — линейное преобразование<sup>1</sup>

$\mathbf{M}_{12}$  — перемещение

$\mathbf{M}_{21}$  — перспективное преобразование

$\mathbf{M}_{22}$  — общее масштабирование

$$\left( \begin{array}{ccc|c} a & b & c & k \\ d & e & f & l \\ g & h & i & m \\ \hline o & p & q & r \end{array} \right) \begin{pmatrix} wx \\ wy \\ wz \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} awx + bwy + cwz + kw \\ dwx + ewy + fwz + lw \\ gwx + hwy + lwz + mw \\ owx + pwy + qwz + rw \end{pmatrix} \Rightarrow$$


$$\Rightarrow \begin{pmatrix} (ax + by + cz + k)/(ox + py + qz + r) \\ (dx + ey + fz + l)/(ox + py + qz + r) \\ (gx + hy + lz + m)/(ox + py + qz + r) \\ 1 \end{pmatrix}$$

<sup>1</sup>Линейное преобразование — это преобразование, переводящее линейную комбинацию векторов в ту же самую линейную комбинацию преобразованных векторов.

## Раздел 2

# Аффинные преобразования

# Перенос



## Матрица переноса

$$\mathbf{T}(\vec{p}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & p_x \\ 0 & 1 & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{T}(\vec{p})\mathbf{A} = \mathbf{A}'$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & p_x \\ 0 & 1 & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + p_x \\ y + p_y \\ z + p_z \\ 1 \end{pmatrix}$$




# Перенос объекта

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.5 & -0.5 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & -0.5 & -0.5 & 0 \\ -0.5 & -0.5 & -0.5 & -0.5 & 0.5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{V}' = \mathbf{T}\mathbf{V}$$

# Масштабирование



## Матрица масштабирования

$$\mathbf{S}(\vec{s}) = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{S}(\vec{s})\mathbf{A} = \mathbf{A}'$$


$$\begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_x x \\ s_y y \\ s_z z \\ 1 \end{pmatrix}$$

Если  $s_x = s_y = s_z$  масштабирование равномерное.

# Масштабирование объекта

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.5 & -0.5 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & -0.5 & -0.5 & 0 \\ -0.5 & -0.5 & -0.5 & -0.5 & 0.5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$
$$\mathbf{V}' = \mathbf{SV}$$

# Повороты



## Матрица поворота вокруг $OX$

$$\mathbf{R}_x(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

## Матрица поворота вокруг $OY$


$$\mathbf{R}_y(\beta) = \begin{pmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

## Матрица поворота вокруг $OZ$

$$\mathbf{R}_z(\gamma) = \begin{pmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

# Комбинация поворотов

# Поворот вокруг произвольной оси



Матрица поворота вокруг произвольной оси  $\vec{v}$ ,  $|\vec{v}| = 1$

$$\mathbf{R}(\vec{v}, \theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta + (1 - \cos \theta)x^2 & (1 - \cos \theta)xy - (\sin \theta)z & (1 - \cos \theta)xz + (\sin \theta)y & 0 \\ (1 - \cos \theta)yx + (\sin \theta)z & \cos \theta + (1 - \cos \theta)y^2 & (1 - \cos \theta)yz - (\sin \theta)x & 0 \\ (1 - \cos \theta)zx - (\sin \theta)y & (1 - \cos \theta)zy + (\sin \theta)x & \cos \theta + (1 - \cos \theta)z^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

# Поворот объекта вокруг произвольной оси

$$\vec{v}(2, 2, 2)$$


$$\mathbf{V}' = \mathbf{R}\left(\frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}, \theta\right) \mathbf{V}$$

## Раздел 3

# Преобразования систем координат



# Преобразования систем координат



Пусть есть две совпадающие системы координат (СК) —  $xyz$  (мировая) и  $x'y'z'$  (локальная).


Преобразуем СК  $x'y'z'$ :

- 1 Повернём на угол  $\gamma$  вокруг оси  $z$  мировой СК.
- 2 Повернём на угол  $\beta$  вокруг оси  $y$  мировой СК.
- 3 Перенесём на вектор  $\vec{t}$  относительно начала мировой СК.

Запишем эти преобразования в матричной форме:

$$\mathbf{M} = \mathbf{T}(\vec{t})\mathbf{R}_y(\beta)\mathbf{R}_z(\gamma)$$

# Преобразования систем координат



Пусть есть две совпадающие системы координат (СК) —  $x y z$  (мировая) и  $x' y' z'$  (локальная).


Преобразуем СК  $x' y' z'$ :

- 1 Повернём на угол  $\gamma$  вокруг оси  $z$  мировой СК.
- 2 Повернём на угол  $\beta$  вокруг оси  $y$  мировой СК.
- 3 Перенесём на вектор  $\vec{t}$  относительно начала мировой СК.

Запишем эти преобразования в матричной форме:

$$\mathbf{M} = \mathbf{T}(\vec{t}) \mathbf{R}_y(\beta) \mathbf{R}_z(\gamma)$$

# Преобразования систем координат



Пусть есть две совпадающие системы координат (СК) —  $x y z$  (мировая) и  $x' y' z'$  (локальная).


Преобразуем СК  $x' y' z'$ :

- 1 Повернём на угол  $\gamma$  вокруг оси  $z$  мировой СК.
- 2 Повернём на угол  $\beta$  вокруг оси  $y$  мировой СК.
- 3 Перенесём на вектор  $\vec{t}$  относительно начала мировой СК.

Запишем эти преобразования в матричной форме:

$$\mathbf{M} = \mathbf{T}(\vec{t}) \mathbf{R}_y(\beta) \mathbf{R}_z(\gamma)$$

# Преобразования систем координат



Пусть есть две совпадающие системы координат (СК) —  $xyz$  (мировая) и  $x'y'z'$  (локальная).


Преобразуем СК  $x'y'z'$ :

- 1 Повернём на угол  $\gamma$  вокруг оси  $z$  мировой СК.
- 2 Повернём на угол  $\beta$  вокруг оси  $y$  мировой СК.
- 3 Перенесём на вектор  $\vec{t}$  относительно начала мировой СК.

Запишем эти преобразования в матричной форме:

$$\mathbf{M} = \mathbf{T}(\vec{t})\mathbf{R}_y(\beta)\mathbf{R}_z(\gamma)$$

# Преобразования систем координат



Пусть есть две совпадающие системы координат (СК) —  $xyz$  (мировая) и  $x'y'z'$  (локальная).


Преобразуем СК  $x'y'z'$ :

- 1 Повернём на угол  $\gamma$  вокруг оси  $z$  мировой СК.
- 2 Повернём на угол  $\beta$  вокруг оси  $y$  мировой СК.
- 3 Перенесём на вектор  $\vec{t}$  относительно начала мировой СК.

Запишем эти преобразования в матричной форме:

$$\mathbf{M} = \mathbf{T}(\vec{t})\mathbf{R}_y(\beta)\mathbf{R}_z(\gamma)$$

# Переход между системами координат (простой случай)




Рассмотрим 2 СК: мировую  $xyz$  и локальную  $x'y'z'$ , перемещённую на вектор  $\vec{t}$ , относительно мировой.

Рассмотрим точку  $A$  в этих СК: как  $A^{xyz}$  и  $A^{x'y'z'}$ .

$$x'y'z' \rightarrow xyz : \quad \vec{A}^{xyz} = \vec{A}^{x'y'z'} + \vec{t}$$

$$xyz \rightarrow x'y'z' : \quad \vec{A}^{x'y'z'} = \vec{A}^{xyz} - \vec{t}$$

# Переход между системами координат (простой случай)




Рассмотрим 2 СК: мировую  $xyz$  и локальную  $x'y'z'$ , перемещённую на вектор  $\vec{t}$ , относительно мировой.

Рассмотрим точку  $A$  в этих СК: как  $A^{xyz}$  и  $A^{x'y'z'}$ .

$$x'y'z' \rightarrow xyz : \quad \vec{A}^{xyz} = \vec{A}^{x'y'z'} + \vec{t}$$

$$xyz \rightarrow x'y'z' : \quad \vec{A}^{x'y'z'} = \vec{A}^{xyz} - \vec{t}$$

# Переход между системами координат (общий случай)



Рассмотрим 2 СК: мировую  $xyz$  и локальную  $x'y'z'$ , преобразованную относительно мировой матрицей  $\mathbf{M}$ .


Рассмотрим точку  $A$  в этих СК: как  $A^{xyz}$  и  $A^{x'y'z'}$ .

$$x'y'z' \rightarrow xyz : \quad \mathbf{A}^{xyz} = \mathbf{M} \mathbf{A}^{x'y'z'}$$

$$xyz \rightarrow x'y'z' : \quad \mathbf{A}^{x'y'z'} = \mathbf{M}^{-1} \mathbf{A}^{xyz}$$



# Переход между системами координат (общий случай)



Рассмотрим 2 СК: мировую  $xyz$  и локальную  $x'y'z'$ , преобразованную относительно мировой матрицей  $\mathbf{M}$ .

Рассмотрим точку  $A$  в этих СК: как  $A^{xyz}$  и  $A^{x'y'z'}$ .


$$x'y'z' \rightarrow xyz : \mathbf{A}^{xyz} = \mathbf{M} \mathbf{A}^{x'y'z'}$$

$$xyz \rightarrow x'y'z' : \mathbf{A}^{x'y'z'} = \mathbf{M}^{-1} \mathbf{A}^{xyz}$$

## Раздел 4

# Проекционные преобразования

# Ортогональная проекция




## Матрицы ортогональной проекции

$$\mathbf{P}_{xy} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{P}_{xz} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{P}_{yz} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} wx \\ xy \\ wz \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} wx \\ wy \\ 0 \\ w \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

# Ортогональная проекция



## Матрицы ортогональной проекции

$$\mathbf{P}_{xy} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{P}_{xz} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{P}_{yz} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} wx \\ xy \\ wz \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} wx \\ wy \\ 0 \\ w \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

# Проецирование куба


$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 \end{pmatrix}$$

Для всех точек куба:

$$\mathbf{P} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A}'$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} wx \\ wy \\ wz \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} wx \\ wy \\ wz \\ wz \end{pmatrix} =$$
$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x/z \\ y/z \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

# Перспективная проекция




# Матрица перспективного преобразования

Матрица перспективного преобразования (одна из множества)

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} wx \\ wy \\ wz \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} wx \\ wy \\ wz \\ wza + w \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x/(za + 1) \\ y/(za + 1) \\ z(za + 1) \\ 1 \end{pmatrix}$$

# Перспективное преобразование



$$AB \rightarrow A'B' \rightarrow A'_{xy}B'_{xy}$$

$$(A'_{xy} B'_{xy}) = P_2 P_1 (AB) \quad 1$$

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a & 1 \end{pmatrix} —$$

матрица перспективного преобразования.


$$P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} —$$

матрица ортогографической проекции на  $xy$ .

$$P(AB) = \begin{pmatrix} A_x & A_y & A_z & 1 \\ B_x & B_y & B_z & 1 \end{pmatrix}^T$$



# Перспективное преобразование



$$AB \rightarrow A'B' \rightarrow A'_{xy}B'_{xy}$$

$$(\mathbf{A}'_{xy}\mathbf{B}'_{xy}) = \mathbf{P}_2\mathbf{P}_1(\mathbf{AB})^1$$

$$\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a & 1 \end{pmatrix} —$$


матрица перспективного преобразования.

$$\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} —$$

матрица ортогографической проекции на  $xy$ .

$$^1(\mathbf{AB}) = \begin{pmatrix} A_x & A_y & A_z & 1 \\ B_x & B_y & B_z & 1 \end{pmatrix}^T$$

# Перспективное преобразование



$$AB \rightarrow A'B' \rightarrow A'_{xy}B'_{xy}$$

$$(\mathbf{A}'_{xy} \mathbf{B}'_{xy}) = \mathbf{P}_2 \mathbf{P}_1 (\mathbf{AB})^T$$

$$\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a & 1 \end{pmatrix} —$$

матрица перспективного преобразования.

$$\mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} —$$

матрица ортогографической проекции на  $xy$ .

$${}^1(\mathbf{AB}) = \begin{pmatrix} A_x & A_y & A_z & 1 \\ B_x & B_y & B_z & 1 \end{pmatrix}^T$$

# Перспективное преобразование

$$AB \rightarrow A'B' \rightarrow A'_{xy}B'_{xy}$$

$$(\mathbf{A}'_{xy} \mathbf{B}'_{xy}) = \mathbf{P}_2 \mathbf{P}_1 (\mathbf{AB})^1$$

$$\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a & \mathbf{1} \end{pmatrix} —$$

матрица перспективного преобразования.

$$\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} —$$

матрица ортографической проекции на  $xy$ .

$$^1(\mathbf{AB}) = \begin{pmatrix} A_x & A_y & A_z & 1 \\ B_x & B_y & B_z & 1 \end{pmatrix}^T$$

# Перспективное преобразование куба

# Перспективное преобразование сцены


## Исходные объекты

# Перспективное преобразование сцены


## Исходные объекты + преобразованные

# «Вид из камеры»

## Параллельная преобразования проекция на $xy$




# Двухточечная перспектива



$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & a & b & 1 \end{pmatrix}$$



# Трёхточечная перспектива



$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ a & b & c & 1 \end{pmatrix}$$