



Paciente: DORA INES SUAREZ DE GIRALDO	
Documento: :32115447	Sexo: :F
Edad: 75 AÑOS	Fecha: 2016-01-30
Estudio: TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABDOMEN TOTAL)	
Técnica: SIMPLE	Lado: N/A
Extremidad:	
EPS / Aseguradora: PARTICULAR	
Adicional:	

Técnica:

ESTUDIO : TAC DE ABDOMEN SIN CONTRASTE

TECNICASE ha efectuado una TAC abdomen y la pelvis, con cortes secuenciales desde cúpulas diafragmáticas hasta el pubis, sin inyectar sustancia de contraste iodada por vía endovenosa, guiada por una radiografía digital previa donde se señalan los mismos.

HALLAZGOS

Densidad ósea disminuida de manera difusa.

Presencia de cambios espondilósicos torácicos y lumbares.

Presencia de hipertrofia de facetas articulares más esclerosis de superficies articulares en articulaciones interfacetarias lumbares medias y bajas, con predominio izquierdo.

Presencia de fenómeno de vacío en articulaciones sacroilíacas bilaterales.

Presencia de imágenes sugestivas de discopatía degenerativa lumbar media y baja.

Se documenta rotoescoliosis lumbar de convexidad izquierda.

Se aprecia elevación del hemidiafragma derecho.

Presencia de cambios fibróticos subpleurales basales posteriores bilaterales, con predominio derecho.

Presencia de derrame pleural laminar porción posterior e inferior de lóbulo pulmonar inferior derecho, asociado a atelectasia pasiva discreta del parénquima pulmonar subyacente.

Hígado de forma, tamaño, contornos y valores de densidad preservados, sin evidencia de lesiones focales ni difusas definidas.

Se documenta presencia de grapas quirúrgicas en lecho vesicular, asociado a ausencia de visualización vesicular, a correlacionar con cambios postquirúrgicos.

Presencia de imagen sugestiva de discreto hematoma adyacente al contorno anterior y medial del lóbulo hepático derecho, que mide 19 x 11 mm de diámetros máximos, a correlacionar con cambios postquirúrgicos.

Se documenta presencia de discreto enturbiamiento de la grasa mesentérica adyacente al lecho vesicular, a correlacionar con cambios postquirúrgicos.

Llama la atención presencia de discretas adenomegalias en delantal epiploico adyacente a región infrahepática y flanco derecho, que alcanzan diámetros máximos de 12 mm.

Presencia de discretas adenomegalias retroperitoneales laterales derechas, que alcanzan diámetros máximos de 15 mm.

Presencia de cambios ateromatosos aortoiliacos significativos.

Presencia de múltiples formaciones saculares de aspecto diverticular que compromete colon sigmoides.

No hay evidencia de proceso inflamatorio asociado de manera patente.

Vejiga distendida, de paredes delgadas, sin lesiones en su interior.

Ausencia de visualización de genitales internos, a correlacionar con antecedentes.

Opinión:

Cambios espondilósicos torácicos y lumbares significativos.

Discopatía degenerativa lumbar media y baja.

Síndrome facetario lumbar medio y bajo.

Colecistectomía.

Presencia de imagen sugestiva de discreto hematoma hacia contorno anterior del lóbulo hepático derecho.

Discreta estriación de la grasa adyacente al lecho vesicular.


Discretas adenomegalias en delantal epiploico a la altura del flanco derecho y de región infrahepática.

Diverticulosis sigmoidea.

Osteopenia difusa.

Cambios fibróticos parenquimatosos pulmonares basales posteriores bilaterales con predominio derecho.

Derrame pleural laminar derecho.



Dr(a).JORGE ERNESTO AARON GOMEZ
ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA
Reg. Medico: 5210197
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA