

CLINICA LEON XIII



Calle 69 No. 51C-24 - Teléfono: 5167300 Antioquia - Medellín

| Oniversidad de Antioquia | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| ORDENES MEDICAS | | | |
| Paciente | MARIA SOLEDAD CEBALLOS | Número de identificación | CC - 21290980 |
| | AGUDELO | | |
| Número de atención: | 1202254 | Fecha de nacimiento | 27/06/1935 |
| Edad | 80 | Dirección: | CL 27DSUR 27C-150 |
| Teléfono | 3566199-3163190590 | Género | Masculino |
| Diagnostico | D649 - ANEMIA DE TIPO NO | Aseguradora | 680 - NUEVA EPS S.ASERVICIOS |
| | ESPECIFICADO | | HOSPITALARIOS |
| Cama/Ubicación | 302 | Especialidad | Geriatria |

| Cups | 871121 |
|--------------------|---|
| Especificaciones | RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, |
| | OBLICUAS O LATERAL) |
| Fecha de Solicitud | 06/02/2016 13:45 |
| Tipo Tomografía | |
| Tipo Radiografía | |
| PYP | |
| Cantidad | |
| Sustentacion: | paciente de 80 años X0AProblemas:X0A- Estamos en el contexto de una caída |
| | en bipedestación + síncope y Fractura patológica de la tibia y peroné derechos |
| | losX0Acuales se estabilizaron con férula y moduló el dolor con opiáceo.X0A- |
| | HTDS asociado con sobreanticoagulación x warfarina con anemización |
| | secundaria, ahora nuevamente con INR en valoresX0Ade anticoagulación, |
| | familia refiere aun melenas, no es claro el porquè de esta sobre anticoagulación |
| | y ante esto se estáX0Adescartando una hepatopatía (paciente tiene fenotipo |
| | de NASH) con riesgo de cirrosis- obesidad, anciana y DM2. En eco |
| | deX0Aabdomen: con aumento de la ecogenicidad y lobulación de los contornos |
| | que sugieren cirrosis, se descarta compromiso por hepatotroposX0A- Tiene una |
| | enf coronaria previa ahora estable, pero no se intervino.X0A- con alto riesgo de |
| | discapacidad bien catastrófica o progresiva permanente dado el estado de |
| | obesidad previo y posibleX0Aobesidad sarcopénicaX0Apor mal control |
| | metabolico por disminucion de al ingesta se disminuye dosis de insulina |
| | X0Apermanece con INR alto por tanto se decide iniciar manejo con |
| | fitomenadiona para disminuir el riesgo de sangrado X0Adesde ayer con |
| | aumento en los requerimientos de oxigeno, la encuentro con broncoespasmo, |
| | se decide iniciar bromuro, un ciclo de crisis y se deja por horario, solicito EKG y |
| | troponinas control y un nuevo rx de torax |
| Solicitante | Jorge Alejandro Castro Rodriguez CC: 10011924 |