



"IPS UNIVERSITARIA"
Servicios de Salud
Universidad de Antioquia

CLINICA LEON XIII

ORDENES MEDICAS

Calle 69 No. 51C-24 - Teléfono: 5167300
Antioquia - Medellín

ORDENES MEDICAS			
Paciente	MARISOL RENTERIA MORENO	Número de identificación	CC - 1078917201
Número de atención:	1159534	Fecha de nacimiento	07/07/1984
Edad	31	Dirección:	B NUEVO LLORO
Teléfono	3108412086-3145947596	Género	Masculino
Diagnostico	S823 - FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DE LA TIBIA	Aseguradora	377 - ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO AMBUQ A.R.S
Cama/Ubicación	214A	Especialidad	Ortopedia

Cups	873431
Especificaciones	RADIOGRAFIA DE TOBILLO (AP, LATERAL Y ROTACION INTERNA)
Fecha de Solicitud	30/01/2016 23:14
Tipo Tomografía	
Tipo Radiografía	
PYP	
Cantidad	
Sustentacion:	rx ap y lateral del tobillo izquierdo previo consentimiento informado sobre la magnitud de la fractura X0Aidentificación de lateralidad X0Aasepsia y antisepsia de la extremidad X0Acampos quirúrgicos X0A etiro de puntos con olor pútrido al abrir la herida localizada en la cara medial del tobillo X0Agran contaminación con tierra a la sola inspección X0A atuaje de tierra de los tejidos blando alrededor de la fractura X0Ase expone la fractura y se encuentra gran contaminación del canal endomedular de la región metafisiaria distal X0Ase procede a retirar toda la tierra X0Acuretear la herida y lavado abundante endomedular con cepillo hasta dejar el hueso totalmente limpio X0Aigual procedimiento en la tibia distal en la zona metafisiaria el cual tambien estaba contaminado X0Ase extraen pequeños fragmentos de hueso sin periostio avasculares contaminados X0Ase limpian y debridan tejidos blandos y paratenon del compartimento posterior se irrioga con 9 millcc de s salina X0Ase procede a la colocación de fijador externo transarticular con montaje tipo AO X0Acon 2 clavos X0A anteriores distales de la tibia y un clavo al medio pie sobre el navicular y otro transfiante al calcaneo X0Ase hace ligamentotaxis y se fija encontrando estabilidad adecuada a pesar de la severa inestabilidad osea por la perdida de hueso X0Ase hace nuevo lavado quirúrgico X0Ase colocan 3 puntos a la piel X0A o complicaciones X0APLAN X0ANECESITA NUEVO LAVADO QUIRURGICO EN 24 HORAS X0Acontinuar tratamiento antibiótico X0Aanalgésicos X0Amedidas antiedema X0Aprofilaxis antitrombotica X0Apor la perdida osea necesitara transporte oseo posiblemente X0Aalto riesgo de complicaciones por la alta contaminación
Solicitante	Carlos Enrique Crismatt CC: 71623920